



1271/8

Pent

D E
N A T U R L Y K E
H I S T O R I E
D E R
I N S E C T E N.

D E
N A T U R L Y K E
H I S T O R I E
D E R
I N S E C T E N;

Voorzien met naar 't Leven getekende en gekleurde Platen.
Volgens eigen ondervinding beschreeven, door den Heer

AUGUST JOHAN RÖSEL

VAN ROSENHOF, Miniatuur-Schilder.

Met zeer nutte en fraaie Aanmerkingen verrykt, door den Heer

C. F. C. KLEEMANN,

Uit den echten Hoogduitschen Druk van den Heer RÖSEL, en de geschreeven
Aanmerkingen van den Heer KLEEMANN, vertaald,

Onder het toezicht en de beschaaving van eenige voornaame Liefhebbers.

VIERDE DEELS, IIde STUK.

behelzende een

ALGEMEENEN BLADWYZER

op alle de Deelen, opgemaakt door

ADAM ABRAHAMSSZ *•* AN MOERBEEK,

Leeraar der Doopsgezinden te *Dordrecht*.



Te HAARLEM en AMSTERDAM.

By C. H. BOHN EN ZOON EN H. GARTMAN, Boekverkoopers

Met Privilegie.

N A A M R E G I S T E R

Der Vlinders, afgebeeld in RÖSELS Natuurlyke Historie der Insecten, volgens de benaamingen van LINNÆUS, met de daar by gevoegde gebruykelyke Nederduitsche benaamingen.

RÖSELS I. DEEL.

I. CLASSE DER DAGVLINDERS.

- T**ab. I. Linn. ed. 12 p. 776. Sp. 165. *Antiope*, de Rouwmantel, de Purpermantel, de Bonte Mantel, de Truurster, de Moor.
- II. Linn. p. 777. Sp. 166. *Polychloros*, de groote Vos, de groote Aurelia. In de aanhaaling van Linnæus is eene drukfeil: want daar staat, *Röf. Inf. I. app. I.* dat p. 1. zyn moer, vermits de Letters *app.* het III Deel van *Röfel* aanwyzen.
- III. Linn. p. 769. Sp. 131. *Jo*, de Paauwenooch.
- IV. Linn. p. 777. Sp. 167. *Urtica*, de kleine Vos, de kleine Aurelia, de Lentebode, de Brandnetel-Vlinder.
- V. Linn. p. 778. Sp. 168. *C. Album*, de C. Vlinder, de Menschenvriend, de gehakkelde Aurelia.
- VI. Linn. p. 779. Sp. 175. *Atalanta*, de Admiraal, de Bontwiek, de Nummer-Kapel de Agt-en-negentiger, de Mars.
- VII. Linn. p. 785. Sp. 209. *Paphia*, de Zilverstreep, de gestreepte Paerle-moer-Kapel, de Imperator, de Keizermantel.
- VIII. Linn. p. 783. Sp. 202. *Prorsa*, de Tralie-Vlinder.
- IX. Linn. p. 783. Sp. 201. *Leuana*, het Net, de Onweerstraal.
- X. Linn. p. 774. Sp. 17. *Cardui*, de Distelvink.

II. CLASSE DER DAGVLINDERS.

- Tab. I.** Linn. p. 750. Sp. 33. *Machaon*, de Venkel-Vlinder, de Zwaluwenstaart, de Koninginne-Page.
- II. Linn. p. 751. Sp. 36. *Podalirius*, de Koning-Page, de Zegevlinder.
- III. Linn. p. 758. Sp. 72. *Cratagi*, het duitsche Witje, de geaderde Witte Kapel.
- IV. Linn. p. 759. Sp. 75. *Brassica*, de groote Witte Kapel, het Koolwitje.

- Tab. V. Linn. p. 759. Sp. 76. *Rapa*, het kleine Witje, het Raapwitje.
 — VI. Linn. p. 787. Sp. 220. *Betula*, de Niervlek, het groot Oranje-Schild-
 pagetje.
 — VII. Linn. p. 788. Sp. 221. *Pruni*, de Puutband.
 — VIII. Linn. p. 761. Sp. 85. *Cardamines*, de Aurora, het Oranje-Pieterse-
 lie-Beestje, de Landkaart.
 — IX. Linn. p. 788. Sp. 222. *Quercus*, de Blaauwstaart, de kleine Weerschyn-
 Vlinder, het Schildpad-Vlinderje van den Eik. *Rösel* heeft slegts het Man-
 netje; het Wyfje is met meer blaauw voorzien.
 — X. Linn. p. 795. Sp. 267. *Malva*, de Malvavlinder.

I. CLASSE DER NACHTVLINDERS.

- Tab. I. Linn. p. 796. Sp. 1. *Spbix ocellata*, de Nachtpaauwenooog, de Paauwen-
 oog-pylltaart.
 — II. Linn. p. 797. Sp. 3. *Tilia*, de Lindenzuiger, de Linduil.
 — III. Linn. p. 802. Sp. 19 *Euphorbia*, de Hondenspoor, de Wolfsmelkvlinder,
 de bonte Olifant.
 — IV. Linn. p. 801. Sp. 17. *Elpenor*, de groote Wynvogel, de Wyngaards-Oli-
 fant.
 — V. Linn. p. 801. Sp. 18. *Porcellus*, de kleine Wynmot, de kleine Olifant.
 — VI. Linn. p. 802. Sp. 22. *Pinasiri*, de Dennenpyl, de Pynbooms Pyltaart.
 — VII. Linn. p. 798. Sp. 6. *Convolvuli*, de Windevlinder, de Mofch, de Brom-
 Vogel, de groote Turk.
 — VIII. Linn. p. 803. Sp. 27. *Stellatarum*, de Karperstaart, het Muisje, het brui-
 ne Onrustje.

II. CLASSE DER NACHTVLINDERS.

- Tab. I. Linn. p. 819. Sp. 38. *Pbal. B. Caja*, de groote, de ruige Beer, de Letterhouts-
 Uil, de wyfjes kunnen meer dan 1000 eijeren leggen.
 — II. Linn. p. 813. Sp. 23. *B. Potatoria*, de Eenhoorn, de Goudboord, de On-
 kruidspinner, de Drunkert.
 — III. Linn. p. 821. Sp. 44. *B. Dispar*, de Stammot, de Roozenboomschenders-
 Uil.
 — IV. en V. Linn. p. 810. Sp. 7. *a. B. Pavonia minor*, de kleine Nachtpaauwen-
 oog (1).

Tab.

(1) 'Er is nog eene soort, welke aan deeze Vrouwelyke Nachtpaauwenooog zeer gelyk is; en waarvan het Mannetje zyn Wyfje volkomen gelykt; uitgenomen dat het Wyfje wat grooter zy. Deeze soort komt uit eene dergelyke, maar zwarte en met oranjegeele knoppen versierde Rups, te voorschyn: dezelve wordt, benevens deeze, doch zeldzaam, op de Sleedoornstruiken gevonden.

- Tab. VI. *Linn. p. 818. Sp. 35. B. Neustria*, de Stamring - Vlinder, de Boomringspanner, de Blaauwkops - Uil.
- VII. en VIII. *Linn. p. 846. Sp. 135. Noët. Pfi.*, de Pylmot, het Piekenierje.
- IX. *Linn. p. 822. Sp. 46. B. Salicis*, de Ringvoet, de Verreziender.
- X. *Linn. p. 828. Sp. 67. B. Purpurea*, de geele Purperen Beer.
- XI. *Linn. p. 856. Sp. 181. Noët. Pyramidea*, de Pyramidemot, de Vlamveugel, de Meudonet.
- XII. *Linn. p. 857. Sp. 188. Noët. Delphinii*, de Roozenmot, de Ridderspoor.
- XIII. *Linn. p. 846. Sp. 136. Noët. Chi*, de Chi linder.
- XIV. *Linn. p. 816. Sp. 31. B. Bucephala*, de Maanvogel, het vermoldme Hout, de Wapendraager.
- XV. *Linn. p. 841. Sp. 119. Noët. Nupta*, de Jongvrouw, het vermiljoen-roode Weeskind. — NB. Hier is eene drukfeil by *Linn.*; want 'er staat *Röf. Inf. IV. T. XV.* doch het moer zyn, *Inf. I. Ph. II. T. XV.* By de volgende *Sp. 120. Paëta*, staat ook wel *Röfel T. XV.* Doch het daarop gegeven kenmerk, *abdomine supra rubro*, voegt hier niet.
- XVI. *Linn. p. 826. Sp. 59. B. Ceruleocephala*, de Bruinkop, de zonder Zomer.
- XVII. *Linn. p. 840. Sp. 114. Noët. Quadra*, de Vierkantvlak, de Teerlingvogel, de Stroohoed.
- XVIII. *Linn. p. 827. Sp. 63. B. Cosfus*, de Willigen - beer, de Houtuil. — NB. Deeze is de door den Heer *Lyonet* zo fraai ontleede Houtrups.
- XIX. *Linn. p. 815. Sp. 29. B. Vinula*, de Vork - of groote Tweestaart, de Hermelynvlinder.
- XX. *Linn. p. 827. Sp. 61. B. Ziezac*, de Zadelmot.
- XXI. Deezen heeft *Linnaeus* niet; maar *Fueszlin* noemt hem, in zyne verzameling der Zwitserfche Inſecten, *p. 35. N. 662. Phal Cygni Similis*, de Zwaan.
- XXII. *Linn. p. 822. Sp. 45. B. Chrysorrhaa*, de Goudachtige Zwaan, het Donskakkertje.
- XXIII. *Linn. p. 850. Sp. 153. Noët. Verbasci*, de bruine Monnik, de Wollekruidsuil.
- XXIV. *Linn. p. 849. Sp. 151. Noët. Exfoleta*, de Aspeemot, het verrotte Hout, de Roetvlak, de Nachtuil.
- XXV. *Linn. p. 849. Sp. 150. Noët. Umbratica*, de Kapdraager, de Graauwe Monnik.
- XXVI. *Linn. p. 824. Sp. 53. B. Anastomosis*, de Populiermot, de verwarde Band.
- XXVII. *Linn. p. 852. Sp. 164. Noët. Rumicis*, de Zuuringuil.
- XXVIII. *Linn. p. 832. Sp. 80. B. Camelina*, het Kameeltje, het Kroonvogeltje.
- XXIX. *Linn. p. 852. Sp. 163. Noët. Brassica*, de Kooluil.

- Tab. XXX. Linn. p. 847. Sp. 142. Noët. *Periscaria*, de Zingrand, de Zwaanuil.
- XXXI. Linn. p. 854. Sp. 173. Noët. *Atriplicis*, de Mildemot.
- XXXII. Deze Tab heeft Linnaeus p. 853. by Sp. 171. onder den naam van *N. Oleracea* aangehaald; ichoon 'er door eens drukfeil XXXI. staan. Ook schynt de beschryving van Linnaeus, *N. Spirilinguis Cristata, alis deflexis, superioribus ferrugineis Lunula lutescēnte, striga alba pectice bidentata*, niet in alle deelen daar mede over een te komen.
- XXXIII. Linn. p. 852. Sp. 165. Noët. *Oxyacanthæ*, de Hoogstaartuil, de Boekvink.
- XXXIV. Linn. p. 854. Sp. 175. Noët. *Triplacia*, de Driebulige.
- XXXV. a. Linn. p. 814. Sp. 26. *Dumeti*, de Grasmot, de Grasjaager, de Haagespinner.
- XXXV. b. Linn. p. 814. Sp. 25. *Quercus*, de Haagheld, de Jaager van den Eik, de Eikenspinner, de Eikenklimmer. NB. *Röfel* heeft de Rupsen deezer beide Nachtvinders, door hem op Tab. XXXV. a. en XXXV. b. voorgesteld, verwisseld; zo dat de Rups en Pop van den Haagheld, op Tab. XXXV. a. Fig. 1. 2. 3.; en die van de Grasmot, op Tab. XXXV. b. Fig. 1. 2. 3. voorkomen. De Rups van de *Pb. Dumeti*, of Grasmot, onthoudt zig meest in 't Veld, en voedt zig met het smalle Gras.
- XXXVI. Linn. p. 813. Sp. 22. *B. Pruni*, de Vischstaart.
- XXXVII. Linn. p. 825. Sp. 55. *B. Fascelina*, de Borstelmot, de bruine Antiek.
- XXXVIII. Linn. p. 824. Sp. 54. *B. Pudibunda*, de Hoofdhanger, de geele Antiek. Deeze echter zou, volgens *Mulleri Faun. Friedr* p. 47. n. 142. de *Pbal. Noët. Jutica*, zyn.
- XXXIX. Linn. p. 825. Sp. 56. *B. Antiqua*, de Lastdraager, de kleine Antiek, de Zonderlinge. — NB in *Röfels* III Deel Tab. XIII. vindt men het Manetje.
- XL. Linn. p. 826. Sp. 57. *B. Gonostichma*, de Hoekvlek.
- XLI. Linn. p. 812. Sp. 18. *B. Quercifolia*, het Eikenblad, de Oostmot, het verdorde Blad, de dorre Bladbondel, de Kopervlinder.
- XLII. Deezen heeft Linnaeus niet. Hy wordt van eenige Liefhebbers de *Afch. vleugel* genaamd; doch heeft veel overeenkomst, met dien van Tab. XXV. de *Umbratica* by Linn. Sp. 150.
- XLIII. Linn. p. 836. Sp. 95. *Pb. Noët. Fuliginosa*, de Roervleugel, het Winterbeertje.
- XLIV. en XLV. ontbreken by Linnaeus.
- XLVI. Linn. p. 829. Sp. 69. a. Bomb. *Lubricipeda*, de Glibbervoet, de witte Lospoot, de Hermelynmot.
- XLVII. Linn. p. 829. Sp. 69. b. houdt deezen voor geen onderscheiden soort; doch dezelve is wezenlyk eene onderscheiden soort van die op Tab. XLVI; en wordt de geele Lospoot of de geele Hermelynmot genaamd.
- XLVIII. ontbreekt by Linnaeus.

P R E F A C E.

“**H**E that enlarges his curiosity after the works of nature,” says a celebrated writer, “demonstrably multiplies the inlets to happiness. A man that has formed a habit of turning every new object to his entertainment, finds in these productions an inexhaustible stock of materials upon which he can employ himself, without any temptations to envy or malevolence; faults, perhaps, seldom totally avoided by those, whose judgment is much exercised upon the works of art. He has always a certain prospect of discovering new reasons for adoring the sovereign author of the universe, and probable hopes of making some discovery of benefit to others, or of profit to himself.”

No method appears better calculated to enlarge our knowledge of Natural History, than visiting foreign countries, and carefully attending to the different objects they afford, which more or less delight by their novelty and variety; but our inquiries should not be confined merely to private gratification; there are duties of a more rational nature; to be useful to

society by distributing happiness amongst our fellow creatures, is one of the highest and most necessary. The numerous products of nature, their application to the wants, the comforts and even ornaments of life; the manners, customs and opinions of mankind; agriculture, manufactures, and commerce; the state of arts, learning, and the laws of different nations, when judiciously investigated, tend to enlarge the human understanding, and to render individuals wiser, better and happier.

The introduction of the common potatoe, the management of silk-worms, the discovery of jesuits bark, the uses of cochineal, Lacca and Indigo, are undeniable proofs of the advantages which might be derived from the inquiries of ingenious men. The discovery of another such root as the potatoe, another such article of commerce and apparel as silk, another such remedy as the bark, and such other dyeing articles as cochineal and indigo, would prove acquisitions of the greatest importance to a trading nation, and render the inquisitive traveller conspicuous as a public blessing.

Many gentlemen and sea-faring persons who go abroad, by their office and situation in life, enjoy both time and opportunity for collecting the best information

Tab. XLIX. Linn. p. 839. Sp. III. *Pb. Noct. Jacobae*, de St. Jacobsmot, het Zand-
uiltje.

— L. ontbreekt by *Linnaeus*.

— LI. Linn. p. 854. Sp. 174. *Pb. Noct. Praecox*, de Roodzoom, de Parallelmot.

— LII. Linn. p. 854. Sp. 172. *Pb. Noct. Pisi*, de Peuluil, de Schelleneeter.

— LIII. LIV. en LV. ontbreken by *Linnaeus*, in *Fabricii Syst. Entom.* p. 600 N. 42. wordt hy genaamd *Noct. Cerasi* de Kerfenuil.

— LVI. Linn. p. 857. Sp. 186. *Pb. Noct. Typica* de Splinterstreep.

— LVII. Linn. p. 805. Sp. 34. *Sphinx Filipendula*, de Cirkelmot, het groenglan-
zige roodgevlakte Duinuiltje.

— LVIII. Linn. p. 823. Sp. 50. *Pb. Bomb. Coryli*, de Hazelaars Uil.

— LIX. Linn. p. 814. Sp. 24. *Pb. B. Pini*, de Pynboomuil, de Pynbooms spinner-
uil, de Banduil van den Sparreboom.

— LX. Linn. p. 818. Sp. 34. *Pb. B. Populi*, de Populiertvlinder, de Kruismot.

— LXI. Linn. p. 845. Sp. 133. *P. N. Absinthii*, de Vierlingspunt.

— LXII. Linn. p. 815. Sp. 28. *Pb. B. Lanestris*, de Achterwollige.

— LXIII. Linn. p. 832. Sp. 81. *Pb. B. Oo.* de dubbelde O.

III. CLASSE DER NACHTVLINDERS.

Tab. I. Linn. p. 860. Sp. 205. *Pb. Geom. Alniaria*, het Bord, de Nachtvleugel.

— II. Linn. p. 867. Sp. 242. *Geom. Grosulariata*, de Inktvlek, de gevlekte Ty-
ger, de Arlequin, het Aalbezen - Uiltje.

— III. Fig. 3. Linn. p. 862. Sp. 216. *Geom. Fasciaria*, de Gebandeerde. —
NB. *Linnaeus* heeft hier *Röfel* niet aangehaald: in *Scopoli Entomol. Carn.* 534.
heet deeze Vlinder *Cervinalis*.

— IV. Linn. p. 863. Sp. 219. *Wauaria*, de V. Vlinder. In *Mulleri, Faun. Friedr.*
p. 49. N. 434. wordt hy echter *Viduaaria* genaamd.

— V. Linn. p. 843. Sp. 127. *Pb. Noct. Gamma*, de Gamma - Vlinder, de Goud-
gamma, de Ypsilon, het Pistooltje. De Rups kruipt als eene Spanrups, en
daarom heeft *Röfel* haar in zyne derde Classe gesteld.

— VI. Linn. p. 860. Sp. 203. *Geom. Sambucaria*, de Spitsstaart, de Puntkapel.

— VII. Linn. p. 872. Sp. 267. *Succenturiata*, de Aanhang.

— VIII. ontbreekt by *Linnaeus*.

— IX. Linn. p. 862. Sp. 211. *G. Elinguaria*, de Koolzuiger.

— X. Linn. p. 860. Sp. 206. *G. Syringaria*, de Vliertmeeter.

— XI. ontbreekt by *Linnaeus*.

— XII. Linn. p. 864. Sp. 225. *G. Papilionaria*, de Dagvlinderachtige, de Brem-
vlinder.

— XIII. Linn. p. 865. Sp. 23. *G. Viridata*, het groene Lint, het Groentje. By
Fabricius, S. E. P. 620. N. 3. heet hy *Pbal. Geom. Vernaria*, de Lentevlin-
der; en in *Müllers Fauna Friedrichsdal*, p. 51. No. 454. *Sirigata*

IV. CLAS-

IV. CLASSE DER NACHTVLINDERS.

- Tab. I. *Linn. p. 835. Sp. 286. Ph. Tortrix viridana*, de groene Bladroller. (NB.) In *Linnaeus* moest, by de aanhaaling van *Rösel*, niet staan. T. III. maar T. I.
- II. *Linn. p. 876. Sp. 293. Rosana*, de zwarte Bladroller. *Linn.* heeft hier *Rösel* niet aangehaald, en ook, behalven dit, den Vlinder zo beschreeven, dat hy met de beschryving van *Rösel* niet regt overeenkomt.
- III. *Linn. p. 876. Sp. 287. Clorana*, de Wilgebladroller.
- Tab. IV. *Linn. p. 882. Sp. 335. Phal. Pyralis verticalis*, de Brandnetel-vlinder. *Linn.* heeft 'er by gevoegd, *Tortrix*.
- V. *Linn. p. 900 Sp. 459 Ph. Alucita pendactyla*, de Vyfveder, het vyfvederige Pennuiltje.
- VI. *Linn. p. 881. Sp. 332. Ph. Pyralis Rostralis*, de Langsnavel.
- VII. *Linn. p. 885. Sp. 351. Phal. Tinea padella*, de Oofsmot, de Ragrupsuil.
- Tab. VIII. *Linn. p. 884. ed. 350. Euonymella*, de Ragrupsuil van den Paa-penboom.
- IX. *Linn. p. 887. Sp. 367. Salicella*, de Wilgenmor.
- X. *Linn. p. 890. Sp. 389. Xylosteffa*, de Leukojenmot, het Saladevlindertje. (NB.) In *Linn.* staat: *Röf. inf. IV. T.* moet zyn: *Inf. I. Ph. IV. T. X.*
- XI. *Linn. p. 887. Sp. 376. Cucullata*, de Sperwer-mot.
- XII. *Linn. p. 889. Sp. 377. Granella*, de Graanmot, de Koornuil.
- XIII. *Linn. p. 892. Sp. 401. Pomonella*, de Peermot, het Appel- en Peeren-uiltje.
- XIV. *Linn. p. 873. Sp. 272. Ph. Geom. Urticata*, de Brandneteluil.
- XV. ontbreekt by *Linnaeus*.
- XVI. *Linn. p. 892. Sp. 406. Tin. Resinella*, het Harstuiltje.
- XVII. *Linn. p. 888. Sp. 372, 373. Pellionella & Sarcitella*, de Pels- en Kleedermot. Hierby heb ik den Leezer nog te berichten, dat 'er, wanneer 'er in *Linn.* staat, by voorbeeld: p. 754. Sp. 52. *Piera. Röf. add. T. VI.* enz. daardoor altoos *Kleemans Vervolg*, en de daartoebehoorende Platen aangeduid worden. Maar wanneer 'er staat. *Rof. app.* dan ziet dat op het derde Deel van *Rösels Natuurlyke Historie der Insecten*, of op de bygevoegde Platen in het Aanhangfel, of vierde Deel.

R Ö S E L S IIIde D E E L.

- Tab. I. en II. *Linn. p. 799. Sp. 9. Sphinx Atropos*, het Doodshoofd. (NB.) Dit Meeftersluk van *Rösels* Kunstvermogen heeft *Linnaeus* agterwegen gelaaten.
- III. *Linn. p. 871. Sp. 262. Phal. Geom. Sordiana*, de Vuilvlak.
- IV, ontbreekt by *Linnaeus*.

Tab. V.

Tab. V. Linn. p. 799. Sp. 8. Sphinx Ligustris, de Ligusteruil, de Hulster, (NB.) *Linnaeus* heeft *Röfel* hier niet wel aangehaald; het moet zyn: *Röf. app.* of: III D. T. V.

— VI. *Fig. 1. 2.* De Rupsen van een *Sphinx*, die zeer veel overeenkomst heeft met den *Sphinx Euphorbia*, in *Röfels* I. Deel I. Classe der Nachtvinders *Tab. III.* Gemelde Rups vindt men op de *Gallium* of het Kleefkruid, is ook vry gelyk aan de Wolfsmelk-rups; schoon zy niet slegts enkel dat kruid eete. In myn Vervolg op *Röfel* hoop ik den Nachtvlinder dier Rups te zullen kunnen afbeelden.

— VII. VIII. IX. *Linn. p. 817. Sp. 33. Pb. B. Mori*, de Zydeplooier.

— X. is volgens *Linn. p. 786. Sp. 213. Pap. Lathonia*: doch de *Lathonia* is iets grooter; anderzins is hy dien van *Röfel* zeer gelyk. In *Scop. Carn. p. 162. N. 440.* is de volgende Vlinder *Euphrosyne*, de Prins, de Bergviolenvouwer, de Paarlemoervlinder.

— XI. ontbreekt by *Linn.*

— XII. *Linn. p. 816. Sp. 30. Pbal. B. Fagi*, de Eekhoorn.

— XIII. *Linn. p. 825. Sp. 56. Pb. B. Antiqua*. Dit is het Mannetje, behoorende tot het ongeveugelde wyfje, in *Röfels* I. Deel. Nachtl. II. *Cl. Tab. XXXIX.*

— XIV. *Linn. p. 874. Sp. 281 Pbal. Geom. Brumata*, het Vorstuitje, het Wintermeeterje. Doch deeze Rözelsche Vlinder is het waare eigenlyke Wintermeeterje niet: den echten heb ik op de XXXI *Tab.* myner *Byvoegfelen* afgebeeld. En 't Mannetje, dat tot het Rözelsche wyfje behoort, is in dit III Deel op *Tab. XL. Fig. 6.* te vinden.

— XV. XVI. *Linn. p. 798. Sp. 5. Sphinx Nerii*, de Oleander of Roozenlaurier-vlinder.

— XXX. *Linn. p. 797. Sp. 2. Spbinx Populi*, de Tandvleugel, de gehakkelde Pylftaart.

— XXXIII. *Fig. 1. 2. Linn. p. 776. Sp. 162. Pap. Populi*, de groote Ysvogel. Deszelfs Rups en Pop vindt men in het IV. Deel, *Tab. XXXI, Fig. 1-5.*

— XXXIII. *Fig. 3-4. Linn. p. 781. Sp. 187. Pap. Camilla*, de Bandvlek. Deeze zou, volgens *Röfel*, dezelfde zyn, met den in dit Deel, op *Tab. LXX. Fig. 3.* afgebeelden zwarten Vlinder; welks Rups en Pop mede in de 1 en 2 *Fig.* afgemaakt zyn. *Linnaeus* heeft deezen Vlinder *Pag. 781. Sp. 186.* ten onregte, *Sybilla* genaamd, welke door den Heer *Röfel* nog geheel niet afgebeeld is; doch zeker Liefhebber van Insecten heeft my willen verzekeren, dat *Röfel*, op *Tab. XXXIII. Fig. 3-4.* en op *Tab. LXX. Fig. 3.* geen Vlinders van eenerleie soort, maar veeleer de wyfjes van twee verschillende soorten afgebeeld heeft.

— XXXIV. *Fig. 5-6. Linn. p. 773. Sp. 149. Pap. Hermione*, de Duitfche Atlas; *Fueszlin* noemt hem daar en tegen, in zyne Verzameling der Zweedfche Insecten, p. 29. No. 563. de *Semele* van *Linn. p. 772. Sp. 148.* De voorgemelde *Hermione* van *Linn. Sp. 149.* zou *Röfel* echter in zyn IV Deel op *Tab. XXVII. Fig. 3-4.* afgebeeld hebben. Maar de Heer van *Rottensburg* noemt den laafsgemelden in zyn VI stuk van den Hallifchen Natuuronderzoeker, p. 17. N. 3. niet *Hermione*, maar *P. Velleda*; en houdt hem voor eene van de *Pap. Her-*

mione gansfch onderscheiden foort. Doch ik laat het geheel onbefliffcht, of *Röfel* de *Pap Semele*, al of niet afgebeeld hebbe.

Tab. XXXIV Fig. 7. 8. *Linn. p. 774. Sp. 155. Pap Jurtina*, de geele Sandange. En, fchoon *Linnaeus*, by *Pamphilus p. 791. Sp. 239.* deeze XXXIV Tab. Fig. 7. 8. insgelyks wel aanhaale, is dezelve echter eene volltrekt andere, en door *Röfel* geheel niet aangehaalde foort. *Röfels Jurtina*, *Linn. p. 774. Sp. 155.* is eigenlyk het wyfje, behoorende tot de *Javira* van *Linnaeus*.

— XXXVII. Fig. 1. 2. *Linn. p. 772. Sp. 147. Pap. Galathea*, het Dambord, de Marmerargus. Deszelfs Rups is door *Röfel* in dit Deel op Tab. LXX, Fig. 6. b. afgebeeld. Hy heeft 4 voeten; behoort, om die reden, in *Röfels* eerste Claffe der Dagvlinders; en hy heeft denzelven, ten onrechte, in de tweede Claffe geplaatst.

— XXXVII. Fig. 3. 4. 5. Deeze zou, volgens *Linn. p. 789. Sp. 232. Pap Argus*, het Zilveroog zyn. Maar de Heer van Rottemburg houdt Fig. 4. voor het Manneetje van *Geofroys Demi-Argus. Fueszlin* daar en tegen houdt Fig. 5. voor den *Argus* en Fig. 3. 4. voor den *Argiolus* van *Linnaeus*. Ik laat het onbefliffcht, wien van deeze Vlinders de naam van *Argus*, *Semiar-gus*, *Icarus*, *Demiargus*, *Damatas*, of *Argiolus*, toekome; en merk hier alleenlyk aan, dat Fig. 3. en 5. eenerleie foort is; zynde eigenlyk een blaauw Manneetje, van een Wyfje, welks bovenfte Vleugelzyde eene donker-bruine koleur heeft; en aan den rand, met eene bezooming van Oranje-geelee, doch op ieder niet even duidelyke, en by het Manneetje bykans geheel niet zichtbaare vlekken, voorzien is.

— XXXVII. Fig. 6. 7. *Linn. p. 789. Sp. 232. B. de Goud- of Ducaatenvlin-der, de Vuurvlinder, de Veeloog. Röfels* afbeelding stelt ons voor oogen het Manneetje van de *Pap. Hippothæ. Linn. p. 793. Sp. 294. Scopoli Entomol. Carniol. p. 180. 181. N. 462.* Hy wordt dikwils met *Virgaureæ* en *Phlacas*, by *Röfel, Tab. XLV. Fig. 5. en 6.* afgebeeld, verwisfeld. Ook heeft het Wyfje *Hippothæ* werklyk veel overeenkomst met den *Papilio Phlacas*, op de bovenfte zyde der Vleugelen; fchoon het niet zo zeer vuurkoleurige, als het Manneetje, maar veel eer zwartbruine en vercheiden zwarte Vlekken vertoonne. Zo nogthans iemand het beter mogte weeten en anders ondervinden, met dien begeer ik, over zulke willekeurige bloote benaamingen, geen twistgeding aan te vangen; maar zal hem gaarne de eer van eene voldoende benaaming te kunnen geeven afstaan.

— XXXVIII. Fig. 2. 3. *Linn. p. 803. Sp. 28. de Sphinx fuciformis*, de Hommelmot, de Glasvleugel, het Glazen Onrustje. Deszelfs Rups en Pop vindt men in het IV. Deel. Tab. XXXIV. Fig. 1-4.

— XXXIX. Fig. 1. 2. *Linn. p. 835. Sp. 92. Phal. Noct. Matronula*, de Dame, de Augsburger Beer. Deszelfs Rups is in het IV. Deel. Tab. IV. Fig. 4, afgebeeld.

— XXXIX. Fig. 3. *Linn. p. 817. Sp. 32. Ph. B. Versicolora*, de Bontvleugel, de Elzenmot. Het Wyfje Fig. 4. ontbreekt in *Linn.*; volgens *Fabric. Syst. Entom.*

rom. p. 614. No. 100. is het de *Phal. Noct. Aprilina*. Linn. p. 847. Sp. 138. Het wordt ook de Seladon, de Pylpunt en Diana genaamd.

Tab. XL. Fig. 1-5. ontbreekt by *Linneus*.

— XL. Fig. 6. is het Mannetje van het Wyfje.

— XIV. Fig. 4. Linn. p. 874. Sp. 281. *Phal. Geom. Brumata*, het Vorstuilje, het Wintermeeterkje.

— XLI. Linn. p. 888. Sp. 575. *Phal. Tin. Mellonella*, de Honiglikker, de Byen-mot.

— XLII. Linn. p. 775. Sp. 161. *Pap. Iris*, de Changeant, de Weerschynvlinder, de Regenboog.

— XLIV. vertoont de verwisfelende of weerschyngeevende Vleugelde en deeze Vlinders, of deszelfs Schelfertjes. Men vindt deszelfs Rups in het IV. Deel Tab. XXXI. Fig. 6. het Rheeboekje geheeten; en de Pop is in *Kleemans Byvoegfelen*, Tab. IX. Fig. 3. a. afgebeeld.

— XLIII. Linn. p. 823. Sp. 52. *Pb. B. Curtula*, de groote Erpelstaart. Den kleinen vindt men in het IV Deel Tab. XI. Fig. 1-6.

— XLV. Fig. 1. 2. Linn. p. 754. Sp. 50. *Pap. Apollo*, de Rooden-Oogspiegel, de Roozenvlinder. De heldere soort is de *Papilio Rhea*; de hier toe behoorende Huislookrups is te vinden in het IV Deel Tab. IV. Fig. 1-2. (NB) Linn. heeft alleenlyk de Rups, maar niet den Vlinder, uit *Röfel* aangehaald.

— XLV. Fig. 3-4. Linn. p. 789. Sp. 238. *Pap. Arion*, de Randpunt.

— XLV. Fig. 5-6. Linn. p. 793. Sp. 253. *Pap. Virgaurea*, de Vuurvlinder. Doch hy is niet zo zeer de *Pap. Virgaurea* als wel de *Phlacas*, Linn. p. 793. Sp. 252. de Aardvlinder.

— XLVI. Fig. 1. 2. 3. Linn. p. 765. Sp. 106. *Pap. Ramni*, de Citroenvlinder, de Citroenwitte, de Borerkapel, het wandelende blad, Fig. 1, 3. is het Mannetje, Fig. 2. het Wyfje. Derzelver Rups en Pop vindt men in het IV Deel, Tab. XXVI. Fig. 1-5.

— XLVI. Fig. 4. 5. Linn. p. 764. Sp. 100. *Pap. Hyale*, de Oranje geele Hooiuil. *Röfel* heeft alleenlyk het Wyfje; want aan het Mannetje ontbreken, in de bruine bezooming, de geele Vlekken.

— XLVII. Linn. p. 834. Sp. 90. *Ph. Noct. Dominula*, het Juffertje, de Specht.

— XLVIII. Fig. 5. 6. Linn. p. 833. Sp. 83. *Phal. Noct. Aesculi*, de blaauwe Zeef, de Landryger. *Röfel* heeft alleenlyk de Rups: den Vlinder vindt men by *Reaumur. Mem. Tom. II. pl. XXXVIII. Fig. 1-4.*

— XLVIII. Fig. 3. vertoont alleenlyk eene Rups; derzelver Pop en Vlinder is in *Kleemans Byvoegfelen*, Tab. XIII. Fig. A. B. afgebeeld.

— XLIX. Linn. p. 813. Sp. 21. *Phal. Bomb. Rubi*, het Braamboezenblad, de Braamvuil, de Veelyraatsvlinder.

— L. Linn. p. 855. Sp. 176. *Phal. Noct. Satellitia*, de Trauwant.

— LXVIII. Fig. 1-2. de Rups en Pop behooren tot Linn. *Phal. Att. Tau*, de Tauvlinder, p. 811. Sp. 8. deeze zelfde Rups is, in eene jongere gestalte, op Tab. LXX. Fig. 4. a. 5. a, met Karmynroode Doornspitzen. waar mede zy uit

het Ei komt, doch welken zy daar na weg werpt, afgebeeld. De Vlinder is te zien in het IV Deel *Tab. VII. Fig. 3. 4.*

Tab. LXVIII. Fig. 6. Eene Rups, waar van men in *Kleemans Byvoegfelen* op *Tab. XVII. Fig. A. B.* de Pop en den Vlinder vindt.

— *LXVIII. Fig. 8.* Van deeze Rups is een uitvoerig berigt te vinden in *Kleemans Byvoegfelen Tab. XXIX.*

— *LXX. Fig. 1-3. Linn. p. 781. Sp. 187. Camilla,* zie boven, by *Tab. XXXIII. Fig. 3-4.*

— *LXX. Fig. 4 a. 5. a.* Zie *Tab. LXVIII. Fig. 1. 2.*

— *LXXI. Fig. a. 1. a. 2. a. 3.* Eene Rups en Pop welker Vlinder in het IV. Deel *Tab. XXXIV. Fig. A. B.* te vinden is.

— *LXXI. Fig. 11.* Zie het geheele beloop der veranderinge deezer Rups tot in een Vlinder in *Kleemans Byvoegfelen, Tab. XXIV.*

R O S E L S IV. D E E L.

Tab. II. Fig. 1. Linn. p. 780. Sp. 180. Pap. Nymph. Phæruſa, de Indiaanſche Ooft-wett.

— *II. Fig. 2. Linn. p. 747. Sp. 16. Pap. Equ. Tr. Aeneas,* de Groenvlek, de Beerenpoot.

— *II. Fig. 3. Linn. p. 756. Sp. 64. Pap. Equ. Hel. Psidii, Cujawer,* de Cujavenvlinder, Zomervlinder, Nimphenvlinder. Men vindt denzelven in America en Azia.

— *III. Fig. 4. ontbreekt by Linn. maar is het Wyfje van Cramers Virginifche Elathea, Pap. Exot. IX. Tab. XCIX. Fig. C. D. p. 5.* Dezelve wordt in Zuid en Noord-America gevonden.

— *III. Fig. 5. Linn. p. 764. Sp. 104. Pap. Dan. Philea,* de Indiaanſche Goudrand, de Goudboordzel.

— *III. Fig. 6. Linn. p. 758. Sp. 71. Melpomene,* de Roodband, de gloeiende Roodvlek.

— *III. Fig. 7. Linn. p. 787. Sp. 217. Cupido,* de Americaanſche Zilverdrop.

— *IV. Fig. 1. 2. 3.* De Huislookrups en Pop, behoorende tot *Apollo,* zie III. Deel *Tab. XLV. Fig. 1. 2.*

— *IV. Fig. 4.* De Rups van *Matronula,* zie III Deel, *Tab. XXXIX. Fig. 1. 2.*

— *IV. Fig. 5.* De Kaſtanjerups, waar van in *Kleemans Vervolg, Tab. XVII. Fig. 1-5.* een volledig berigt te vinden is.

— *V. Fig. 1. Linn. p. 756. Sp. 63. Pap. Equ. H. Ricin,* de Wondervlinder.

Tab.

- Tab. V. Fig. 2. Linn. p. 755. Sp. 58. Pap. Equ. Polymnia, de Surinaamsche Oranjevleugel.
- VI. Fig. 1. Linn. p. 753. Sp. 47. Pap. Equ. Demophon, de Groenmarmer, NB Linn. heeft hier *Rös. Inf* 4. Tab. IV. Fig. 1; 't moet zyn: T. VI.
- VI. Fig. 2. ontbreekt by Linn. Maar is de *Oxythea*, de Indiaansche bonte Pauwenoog uit China. In *Cramers Pap. Exot.* II Pap. 28. Tab. XIX. Fig. C. D. is het Wyfje deezer soorte te zien.
- VI Fig. 3. Linn. p. 811 Sp. 12. Phal. Attac. Militaris, de Kroon. Zie *Cramers Papil. Exot.* III Tab. XXIX. Fig. B. alwaar het Mannetje.
- VII. Fig. 1. 2. ontbreekt by Linn. Volgens *Fabricii*, S. E. p. 513. zou het zyn de Pap. Nymph. Phal. Rumina, de Roodpunt, de Drekpunt: maar in *Scop. Ent. Carn.* 425. is het de Pap. *Hypermnestra*. Dan de Heer Pastor Goetze houdt hem in het eerste boek, van het derde deel der *Entomologische Bydraagen*, Pag 334. 362. voor de *Polyxene* der Weener Entomologen; en voor eenlei met den Scopolischen; maar voor onderscheiden van den *Rumina* van *Fabricius*. Hy noemt deezen Vlinder pag. 362. No. 6. *Hypsipyle*, het Haanekammetje.
- VII. Fig. 3. 4. Linn. p. 811. Sp. 8. Phal. Attac. Tau, de Tauvlinder, de witte Nagelvlek, de Voetangel, de Leidekker. — De Rups is in *Röfels* III Deel, op Tab. LXX. Fig. 4. 5, en volwasfen op Tab. LXVIII. Fig. 1. afgebeeld.
- VIII. Linn. p. 800. Sp. 12. *Sphinx Celurio*, de Phenix-zwermer, de Wynstokzwermer.
- IX. Linn. p. 845. Sp. 132. Phal. Noct. *Meticulosa*, de Agaatvleugel, de eenvondige Driehoek.
- X. *Phalena bicolorana*, de lichtgroene Wilkkeler. Linnæus schynt deezen Vlinder met dien van *Röfels* IV. Deel, Tab. XXII Fig. 4 en 5. voor denzelfden te houden, dien hy pag. 875. *Phalena Prasinana* noemt; maar de Rupsen, zo wel als de Vlinder, geeven duidelyk te kennen, dat ze twee geheel onderscheidene soorten zyn.
- XI. Fig. 1-5. Linn. p. 828. Sp. 52. Phal. B. *Curtula*, de kleine Erpelstaart.
- XI. Fig. A. B. C. Linn. p. 853. Sp. 167. Phal. N *Myrtilli*, de Moerasheidenuil.
- XIII. Linn. p. 784. Sp. 205. Pap. Nymph. *Cinxia*, de gebandeerde Mantel. (NB) Van deeze soort zyn 'er eenige *Varieteiten*, of *Bysoorten*, zulken, die een onderscheiden voorkomen hebben.
- XIV. Linn. p. 818. Sp. 36. Ph. B. *Castrensis*, de Legermot, de Kruidringvlinder, de Vlokbloemspinner, de Livereivlinder, de Weiland-Livereivlinder, de Veldringrupsvlinder.
- XV. XVI. XVII. XXIII. Linn. p. 810. Sp. 7. B. Ph. Att. *Pauonia Major*, de groote Nachtpauwenoog.

Tab.

- Tab. XVIII. Fig. 1-2. Linn. p. 842. Sp. 122. Phal. Noët. *Paranimpba*, de Juffrouw
Bruid, de geele Ordeband, de Fortificatie of het Veflingwerk. (NB) Van
deezèn heeft men eene byfoort, welke iets kleiner en donkerer is.
- XVIII. Fig. 3. Linn. p. 864. Sp. 225. Phal. Geom. *Papilionaria Major*, de
groote Dagling, de groote Zeeegroene Dagvlinder.
- XVIII. Fig. 4. *Piloſella*, of de *Delia* der Weener Entomologen, de Puntige Weeg-
breevlinder.
- XIX. Linn. p. 841. Sp. 118. Phal. Noët. *Sponſa*, de Bruid, het Weeskind.
- XX. Linn. p. 831. Sp. 78. Ph. B. *Libatrix* de Snoeper, de Stormkuiſ. Vol.
gens *Mulleri Faun. Friedrichsdal*, p. 42. N. 378, zou het eigenlyk de *Modes-
ta* zyn.
- XXI. Fig. 1-3. ontbreekt by Linn. De Molvlinder.
- XXI. Fig. a. b. c. d. Linn. p. 331. Sp. 75. Phal. B. *Grammica*, de Streep-
vleugel *Röfel* heeft alleen het Mannetje. Aan het Wyſje is de zwarte bezoo-
ming aan den buitenrand van den ondervleugel zo breed niet; en in de bo-
venvleugelen zyn de zwarte Aderen naauwlyks te bemerken. Voorts heeft het
Wyſje zwarte Punten en hairduune Voelhoornen. — 'Er zyn van deezèn
Vlinder ook byfoorten
- XXII. Linn. p. 875. Sp. 285. Phal. Tortr. *Prasina*, de Elzenwik-
keler.
- XXIV. Linn. p. 820. Sp. 42. Phal. B. *Plantaginis*, de Spaanſche Vaan,
de Weegbreeſpinner.
- (NB) Van deezè zyn 'er nog wel 3. a 4. zeer gelykende foorten.
- (1.) Eene foort, waar van het Mannetje gelykt naar Fig. 8; doch het heeft, in
den voor-en agtervleugel, eene witte in plaatze der geele Verwe. Het Wyſ-
je daarentegen zou het Mannetje van *Röfel*, Fig. 8. byna in alles gelyk zyn;
vallende alleenlyk die geele Verw meer in 't Oranje-geelachtige.
- (2.) Een Mannetje, als dat van Fig. 8. Maar het heeft, in den agtervleugel, zo
groot eene geelverwige ruimte niet; en van den binnenſten Vleugelhoek af,
tot over het midden des Vleugels, vertoont zich eene zwarte koleur; in
welke men echter geene dergelyke heldere hakvormige vlekken als in Fig. 9.
gewaard word.
- (3.) Een Mannetje, als Fig. 9; maar met minder langwerpige zwarte vlekken, in
den agtervleugel.
- (4.) Inſgelyks een Mannetje, dat weder noch zo veele noch zulke groote geele
Vlekken, en zodanig eene koleur heeft, als die van *Röfel*, en alle de
voorbefchreevene foorten; maar veel meer zwart bezit, byzonderlyk op de
agtervleugels; die 'er grootendeels mede gevuld zyn. Alle de Wyſjes van
deezè zo verſcheidene Mannetjes zullen nogthans met roode vlekken voorzien
weezen. In myn *Vervolg* hoop ik, ten minſten, de Afbeeldſels der Vlin-
ders deezè verſchillende foorten te zullen kunnen mededeelen.
- XXV. Linn. p. 186. Sp. 213. *Latonia*. Maar volgens *Fueſzlin's Verzame-
ling*

ling van Zwitserfche Inſecten. p. 30. N. 587. *Pap. Nymph.* heet hy *Aglaja*. By *Linn.* p. 735. Sp. 211. komt hy ook voor onder de benaaming van *Violæ canina*, de Hondſkarſvlinder, de groote Paerſvlinder, Dezelve heeft veel overeenkomst met twee andere ſoorten, die door *Röſel* nog niet afgebeeld zyn; waar van de eerſte ſoort thans onder den naam van *Niobe*, en de anderen onder dien van *Atippe* bekend is. Deeze beiden, benevens de daartoe behoorende ſoorten, denk ik, in myn *Vervolg*, nog eens zeer naauwkeurig te zullen voorſtellen.

- Tab. XXVI. Fig. A. B. C. *Linn.* p. 836. Sp. 97. *Phal. Noct. Batis*, de Braam-beziemot, de Bruinoog, de Munt. — (NB.) Fig. 1. - 4. is de Rups en Pop van *Pap Rhamni*, in het III Deel Tab. XLVI. Fig. 1. 2. 3.
- XXVII. Fig. 1. 2. *Linn.* p. 820. Sp. 40. *Phal. Bomb. Hebe*, de Weduwe (NB) *Röſel* heeft alleenlyk het Wyfje. In myn *Vervolg* is de Rups en Pop op Tab. XIII. Fig. 1. - 4. afgebeeld. Het Mannetje zal ik mede nog opgeeven.
- XXVII. Fig. 3. 4. zou, volgens *Linn.* p. 772. Sp. 148. *Pap. Nymph. Se-mele*, de Europeſche Atlas zyn. Hy wordt ook de *Heremiet* genaamd. Doch de Heer van *Rottemburg* noemt hem in 't VI. St. des Halliſchen Natuuronderzoekers. p. 17, No. 3. *P. Velleda*: en houdt hem voor eene van de *P. Hermione Major*, waar voor anderen hem aangezien hebben, verſchillende ſoort; en mogelyk met regt; nadien men van de groote en kleine *Hermione* twee verſchillende ſoorten ontdekt heeft.
- XXVIII. Fig. 1. *Linn.* p. 843. Sp. 125. *Phal. Noct. Fraxini*, het Blaauwe Engelfche Ordelint.
- XXVIII. Fig. 2. *Linn.* p. 820. Sp. 41. *Phal. B. Villica*, de Zwarte Beer, de Roomvlek. De Rups, Pop en Vlinder, vindt men op Tab. XXIX. Fig. 1 - 4.
- XXIX. Fig. A. B. C. De Rups en Pop van eene byſoort der *Cinxia*, op Tab. XIII.
- XXVIII. Fig. 3. *Linn.* p. 834. Sp. 91. *Phal. Noct. Hera*, de Ruſſiſche Beer. De Rups, Pop en Vlinder, heeft *Kleemann*, met de geheele verandering, in zyn *Vervolg*, op Tab. XLI. voorgesteld.
- XXXI. Fig. 1. - 5. De Rups en Pop van *Pap. Populi*, de groote Ysvlinder. Zie III Deel Tab. XXXIII. Fig. 1 - 2.
- XXXI. Fig. 6. De Rups genaamt, het Rheeboekje, behoorende tot *Pap. Iris*, den Regenboogverwigen Vlinder, den Weerſchynvlinder. Zie III Deel Tab. XLII. De Pop ſtaat in *Kleemanns Vervolg* Tab. IX. Fig. 3. a.
- XXXII. *Linn.* p. 842. Sp. 121. *Phal. Noct. Pronuba*, de Huismoeder, de Looper. Hier van zyn byſoorten, die ik in myn *Vervolg* zal mededeelen.
- XXXIII. Fig. 1 - 2. *Linn.* p. 774. Sp. 154. *Pap. Nymph. Gemm. Dejanira*, de Weegdoornuil.
- XXXIII. Fig. 3 - 4. *Linn.* p. 771. Sp. 143. *Pap Nymph. Ageria*, de Woud-argus. De Rups en Pop ſtaan in *Kleemanns Vervolg*, Tab. XIX. Fig. A. B.

- Tab. XXXIV. Fig. 1. 4. De Rups en Pop van *Sphinx Faciformis*. III Deel. Tab. XXXVIII. Fig. 2, 3.
 — XXXIV. Fig. a. b. Linn. p. 815. Sp. 27. *Phal. Bomb. Catax*, de Rolrand, de Boschpeerfipinnen.

N A A M R E G I S T E R

Der overige door RÖSEL afgebeelde Inſecten, zo Kevers als anderen, volgens de benaamingen van LINNÆUS, en andere Natuuronderzoekeren, opgeſteld door den Heer Paſtor GOEZE.

R O S E L S IIde D E E L.

I. CLASSE DER AARDKEVERS.

- Tab. A. I. Fig. 1. *Scarab. Hercules*. Linn. p. 541. Sp. 1. De groote vliegende Eenhoorn. In het IV Deel. Tab. V. Fig. 3. ſtaat eene andere ſoort.
 — A. II. Fig. 2. *Scar. Actæon*. Linn. p. 541. Sp. 3. de vliegende Stier.
 — A. II. Fig. 3. *Scar. Fimitarius*. Linn. p. 548. Sp. 32. De Mestkever, de Stompe Driehoorn.
 — A. II. Fig. 4. a. b. *Scar. Nuchicornis*. p. 547. Sp. 24. De Nekhoorn.
 — A. III. Fig. 5. *Scar. Gideon*. Linn. p. 541. Sp. 2. De kleine vliegende Eenhoorn.
 — A. III. Fig. 6. *Scar. Aloëus*. Linn. p. 542. Sp. 7. De Reuskever.
 — A. III. Fig. 7. *Scar. Rhinoceros*. Linn. p. 544. Sp. 14. Het Indiaanſche Neushoorndier.
 — B. Fig. 1. *Scar. Mimas*. Linn. p. 545. Sp. 17. De Bultkever, de Kameel.
 — B. Fig. 2. *Scar. Lunaris*. Linn. p. 543. Sp. 10. De Eenhoorn, de Rondkop. (NB). Deeze gelykt wel naar de *Hispano* van Linn. p. 546. Sp. 21. Maar hy is kleiner.
 — B. Fig. 3. *Scar. Lanius*. Linn. p. 557. Sp. 77. De Americaan, de Bloedkever, de Vleeschhouwer.
 — B. Fig. 4. *Scar. Nitidus*. Linn. p. 552. Sp. 51. De Groene Americaan.
 — B. Fig. 5. onthreekt by *Linnaeus*.
 — B. Fig. 6. *Scar. Capensis* Linn. p. 556. Sp. 73. De Africaanſche Kaapkever, de Kaapenaar.
 — B. Fig. 7. *Scar. Lincolnia*, Linn. p. 552. Sp. 53. De Streepkever, de Gelineerde Kever.

Tab.

- Tab. B. Fig. 8. *Scar. Festivus*. Linn. p. 552. Sp. 52. De Staatfiekever.
 — I. *Scar. Melolontha*. Linn. p. 554. Sp. 60. De Maikever, de Loofkever.
 — II. Fig. 8, 9. *Scar. Auratus*. Linn. p. 557. Sp. 78. De Goudkever, de Groene Duitscher.
 — II. Fig. 6, 7 *Scar. Variabilis*. Linn. p. 557. Sp. 79. De Onbestendige.
 — III. Fig. 1, 5. *Scar. Nobilis*. Linn. p. 558. Sp. 81. De Edelman.
 — III. Fig. 6. *Scar. Eremita*. Linn. p. 556. Sp. 74. De Heremiet, de Jugt- of Schoenmakerskever, de Dikke Rouwdraager.
 — IV, V. *Lucanus Cervus*. Linn. p. 559, 560. Sp. 1. a, b. De Hartshoornkever.
 Tab. V. Fig. 7, 8, is het Mannerje. Maar Fig. 9. het Wyfje. *Geofroi* en de Heer Staatsraad *Muller* houden Fig. 9. voor eene byzondere soort. De Knyp-
 hoornkever, Rhebokhoornkever.
 — VI, VII. *Scar. Nasicornis*. Linn. p. 544. Sp. 15. De Europifche Neushoorn-
 kever.

II. CLASSE DER AARDKEVERS.

- Tab. I. Fig. a. *Cerambyx. Longimanus*, Linn. p. 6. 21. Sp. 1. De Americaanfche
 Langhand, de Langarm.
 — I. Fig. b. *Cerambyx. Cervicornis*. Linn. p. 6. 22. Sp. 3. De Hartenbok, de
 Americaanfche Berhyceefch Houtkever.
 — I. Fig. 1. *Cerambyx. imbricornis*. Linn. p. 6. 22. Sp. 5. De Schilferhoorn. —
 Het Mannerje.
 — I. Fig. 2. *Cerambyx. Coriarius*. Linn. p. 622. Sp. 7. De Looijer, de Berken-
 fchorskever. — Het Wyfje.
 — III. *Cerambyx. Cylindricus*. Linn. p. 633. Sp. 59. De Rolle.

III. CLASSE DER AARDKEVERS.

- Tab. I. *Chrysomela Vitellina*. Linn. p. 889. Sp. 23. De Blankeftaalkever, De Willi-
 genknaager.
 — II. *Coccinella. 7 Punctata* Linn. p. 581. Sp. 15. De Zevenpuntige Bladluiske-
 ver, de Zonnekever, Marienkever, Lievenheershaantje, Gods Koertje, Gods
 Schapje, de Halfrondekever.
 — III. *Coccin. 2. Pustulata*. Linn. p. 585. Sp. 42. De Tweevlek.
 — IV. *Chrysom. Asparagi*. Linn. p. 601. Sp. 112. Het Aspergiehaantje.
 — V. *Chrysom. Goettingensis*. Linn. p. 586. Sp. 4. Het Schaapsgarve- of Het Dui-
 zendbladhaantje.
 — VI. *Cassida Nebulosa*. Linn. p. 575. Sp. 3. De Wolkschildige of *Viridis*; De
 Groene Schilpadde, de Groene Disfelfchildkever, Het Schildtorretje. Echter is
 de *Nebulosa* eene van de *Viridis* van *Röfel* indedaad onderscheidene soort.

I. CLASSE DER WATERINSECTEN.

- Tab. I. Fig. 9. *Dytiscus marginatus*. Linn. p. 665. Sp. 7. Het Mannetje, De Geel-zoom. Fig. 10. *Semistriabus*. Sp. 8. Het Wyfje. De Halfgestreepte Waterkever.
 — II. Ontbreekt by Linn. De Duikkever van Röfel.
 — III. Fig. 6. *Dytiscus cinereus*. Linn. p. 666. Sp. 11. Het Mannetje. Fig. 7. *Sulcatus*. Linn. Sp. 13. Het Wyfje. Het Ribbenschild.
 — IV. Fig. 1. 2. *Dytiscus Caraboides*. Linn. p. 664. Sp. 2. De kleine zwemmer et *Scarabæides*. Sp. 3. De Zeiler, de Loopkeverfoortige Waterkever.

II. CLASSE DER WATERINSECTEN.

- Tab. II. Fig. 12 is volgens Mulleri Faun. Friederichsdal. p. 61. N. 541. *Libellula Cyanca*.
 — III. IV. Fig. 14. *Libellula Grandis*. Linn. p. 903. Sp. 9. De Reuzin. Volgens Mulleri Faun Friedr. p. 61. N. 540. *Quadrifasciata*.
 — V. Fig. 2. *Libellula anea*. Linn. p. 902. Sp. 8. De Koperborst.
 — V. Fig. 3. *Libellula vulgatisfima*. Linn. p. 902. Sp. 6. De Hoer.
 — V. Fig. 4. *Libellula flaveola*. Linn. p. 901. Sp. 2. De Geelvleugel. — Fig. 3, 4. is, volgens Mulleri Faun Friederichsdal. p. 61. N. 539. *Lib. forcipata*.
 — VI. Fig. 4 en Tab. VII. Fig. 3. *Libellula depressa*. Linn. p. 902. Sp. 5. De bruine en blaauwe Platbuik.
 — VII. Fig. 4. *Libellula rubicunda*. Linn. p. 902. Sp. 4. De Roodborst. Volgens Mulleri Faun. Friederichsdal. p. 62. N. 55. *Lib. frumenti*.
 — IX. Fig. 5. *Libellula Virgo*. Linn. p. 904. Sp. 20. De Riviermaagd.
 — IX. Fig. 6. *Virgo*. γ .
 — IX. Fig. 7. *Virgo*. α , β .
 — X. XI. *Lib. Puella*. Linn. p. 905. Sp. 21. α , β , γ , δ . De Moerasnymph.
 — XII. Fig. 2. *Ephemera Procellaria*. Het Stormhaft. Zie Fueszlin, Verz. van Zweedsche Inf. p. 45. N. 869.
 — XII. Fig. 6. *Ephemera horaria*. Linn. p. 907. Sp. 9. Het Dag- of Uurdiertje. Zie Fueszlin, Verz. van Zweedsche Inf. p. 45. N. 817.
 — XIII. *Hemerobius Lutarius*. Linn. p. 913. Sp. 14. De Straatveeger.
 — XIV. ontbreekt by Linnæus.
 — XV. XVI. *Phryganea rhombica*. Linn. p. 909. Sp. 8. De Ruiten- of Dobbelsfeenvlek.
 — XVII. *Phrygan. Grandis*. Linn. p. 909. Sp. 7. De Waterrupsuil.

SPRINGKHAANEN EN KREKELS.

- Tab. I. II. Fig. 1, 2, 5. *Mantis religiosa*. Linn. p. 690. Sp. 5. Het Europeische wandelende Blad, de Vangspringkhaan (*).
- II. Fig. 6. *Mant. Oratoria*. Linn. p. 690. Sp. 6. De Africaanſche Vangspringkhaan, het Bidparpje.
- III. Fig. 1. 2. *Mantis Strumaria*. Linn. p. 691. Sp. 13. De Kropdraager.
- IV. Fig. 1. 2. *Gryllus nasutus*. Linn. p. 692. Sp. 1. De Africaanſche Langreus.
- V. Fig. 1. 2. *Gryllus Locust. Cristatus*. Linn. p. 699. Sp. 37. De Kuifſpringkhaan.
- VI. Fig. 1. Ontbreekt by Linnaeus.
- VI. Fig. 2. *Gryll. Loc. Elephas*. Linn. p. 699. Sp. 35. De Africaanſche Olyphant.
- VI. Fig. 3. *Gryll. Tettigon. Pupus*. Linn. p. 699. Sp. 34. De Ethiopiſche Poggelykende Springkhaan.
- VII. Fig. 1. 2. 3. *Mantis Gongylodes*. Linn. p. 690. Sp. 4. De Podagrist.
- VIII. en IX. *Gryll. Tettigon. Verrucivorus*. Linn. p. 698. Sp. 33. De Wratenkruideeter, de Graſſpringer.
- X. en XI. *Gryll. Tettigon. Viridisimus*. Linn. p. 698. Sp. 31. De Degenkling, de groote Groene Europeiſche Boomſpringer.
- XII. *Gryllus Acheta. Domesticus*. Linn. p. 694. Sp. 12. De Huiskrekel, het Huiskriekje.
- XIII. *Gryllus Acheta. Campestris*. Linn. p. 695. Sp. 13. De Veldkrekel. Zy worden van de Vogels en Hagediſen vervolgd; en zelve verdryven ze de Huiskrekels.
- XIV. en XV. *Gryllotalpa*. Linn. p. 693. Sp. 10. De Veenmol, de Molkrekel, de gevleugelde Mol, de Aardkreeft, de Verwarder.
- XVI. Fig. 1. *Gryll. Loc. Citrifolius*. Linn. p. 695. Sp. 16. Het Indiaanſche Citroenblad.
- XVI. Fig. 2. *Gryll. Bulla. Serratus*. Linn. p. 993. Sp. 5. Het Kaapſche Zeefchild.
- XVI. Fig. 3. *Gryll. Tettigon Triops*. Linn. p. 697. Sp. 24. De Drieoog.
- XVII. Fig. 4. 5. *Mantis Siccifolia*. Linn. p. 689. Sp. 3. Het Wandelende Blad.
- XVIII. Fig. 6. *Gryllus Locusta Morbilosus*. Linn. p. 700. Sp. 38. De Mazelenvlek.

Tab.

(*) Dit Inſect is in het IV. Deel van *Röſel*, Tab. XII. benevens zyne Eieren en Jongen, ook afgebeeld. Het wordt mede het waakende of oppaſſende Schoothonde genaamd; en men vindt het in Ooſtenryk, in Moravien, te Frankfort aan de Main, in Zwitſerland by Geneve en Luggeris; als mede by Luik in Waſſerland, en in het landſchap Vaud.

- Tab. XVIII. Fig. 7. *Gryll. Tettigon. Elongatus. Linn. p. 696. Sp. 20.* De Indiaanſche Sleep, de Langvleugel.
- XVIII. Fig. 8. ontbreekt by *Linn.*; 't zal een Tartariſche Geſtreepte Springhaan zyn.
- XIX. Fig. 9. 10. *Mantis Necdaloides. Linn. p. 691. Sp. 14.* De Surinaamer, de Baſterdbokaarrige Springkhaan, de Schermmkel, de Wandeltok. NB. Dit ſchynt Fig. 10 te weezen. De *Gigas* van *Linn. p. 689. Sp. 1.* is daarentegen mogelyk Fig. 9; en dit Inſect heet het Amboiniſche ReuZENſpookfel. Het zweeft Legertogtſwyze over het water, en wordt van de Indiaanen gegeten. Deeze trekken het de pooten en vleugels af, en braaden het Lyf; maar de Koejen ſterven 'er van als zy dezelve nuttigen; daar zulks toch echter den Ingezetenen niet wedervaaft.
- XX. Fig. 1—10. Ontbreekt by *Linn.* Maar *Scopolus* heeft dit Inſect, in zyn *Entomol. Carn. p. 110. No. 328. Fig. 6 a 7.* onder de benaaming, *Gryllus Lunulatus*, de Duiſche Maanlinie.
- XXI. Fig. 1—3. *Gryll. Loc. Stridulus. Linn. p. 701. Sp. 47.* De Klapperman, de Ratelwagt, de Knarschtand, de ſnaterende Springkhaan. Men vindt hem ook op de Velden by de Stad Wolodomir.
- XXI. Fig. 4. *Gryllus Loc. Cærulescens. Linn. p. 788. Sp. 44.* De Zwartband, de Blaauwvleugel.
- XXI. Fig. 5. Ontbreekt by *Linnaeus*.
- XXI. Fig. 6. *Gryllus Loc. Italicus. Linn. p. 701. Sp. 46.* De Italiaander.
- XXI. Fig. 7. Ontbreekt by *Linnaeus*; maar is, volgens *Fabric. Syſt. Entomol. p. 291. No. 20. Gryllus Germanicus*, onthoudt zich in Duitschland, en heet van daar, de Duiſcher.
- XXII. Fig. 1. 2. Ontbreekt by *Linnaeus*. De Hoogſpringer.
- XXIII. Fig. 1—6. *Cicada Spumaria. Linn. p. 708. Sp. 4.* De Schuimkrekkel, de Geſtworm.
- XXIV. *Gryllus. Loc. Migratorius. Linn. p. 700. Sp. 41.* De Trekspringkhaan, de Reiziger, de Legerspringkhaan; zommigen willen, dat hy boven in 't Voorhoofd drie kleine oogen zou hebben.
- XXV. XXVI. XXVII. *Cicada Orni. Linn. p. 707. Sp. 16.* De Gemeene. Zie *Fabric. Syſt. Ent. p. 680, No. 12. Tettigonia Hematodes*, de Bloeding, volgens *Scop. Entom. Carn. p. 118. No. 347.*
- XXVIII. XXIX. *Fulgora Laternaria. Linn. p. 703. Sp. 1.* De Lantaarndrager, de Lantaarn, de Fakkelvlieg. Tab. XXX. *Fulgora Candelaria. Linn. p. 703. Sp. 3.* De Lichter, de Chineefche Lantaarndrager.

HOMMELEN EN WESTEN.

- Tab. I. en XI. *Tentredo Amerina. Linn. p. 921. Sp. 4.* De Willigekruiper. Zie *Fueszlin's Verz. van Zweedſche Inf. p. 47. No. 908.*

Tab.

- Tab. II. *Tenthredo Rosæ*. Linn. p. 925. Sp. 30. De Roozenruiker, de Zaagvlieg, *Mouche a soie*.
 — III. Fig. 4 en 5 *Ichneumon Puparum*. Linn. p. 939. Sp. 66. De Poppenmoorder.
 — III. Fig. a. en b. *Ichneumon Glomeratus*. Linn. p. 940. Sp. 75. De Vuilzak.
 — IV. Fig. 3. en 4. *Ichneumon Larvarum*. Linn. p. 939. Sp. 67. De Grysdooder. Volgens Scop. Ent. Carn. 766. *Ichn. Globatus*, de Wolzak.
 — V. en VI. ontbreeken by Linnæus.
 — VII. *Vespa parietum*. Linn. p. 919. Sp. 6. De Wandwesp.
 — VIII. en IX. *Sirex Gigas*. Linn. p. 928. Sp. 1. De Reuzenstaartwesp.
 — X. Fig. 5, 6, 7. *Cynips viminalis*. Linn. p. 919. Sp. 13. De Bindwilligeboorder.
 — XI. Zie Tab. I.
 — XII. Fig. 2, 3. *Ichneumon Cunctator*. Scop. Ent. Carn. 752.
 — XIII. *Tenthredo Lutea*. Linn. p. 921. Sp. 3. De geele Kruiper.

V L I E G E N E N M U G G E N.

- Tab. I. *Tigula Cornicina*. Linn. p. 972. Sp. 12. Het Kraaijenvoeder.
 — II, III, IV. *Pulex irritans*. Linn. p. 1021. Sp. 1. De gemeene Vloo, de Nachtwekker.
 — V. *Musca Chamaleon*. Linn. p. 979. Sp. 3. De Cameleon.
 — VI. *Musca scripta*. Linn. p. 987. Sp. 54. De Bloemzuiger.
 — VII. en VIII. Ontbreeken by Linnæus.
 — IX. en X. *Musca Carnaria*. Linn. p. 990. Sp. 68. De Vleesch- of Beemetvlieg, de Blaauwaars.

R O S E L S I I I. D E E L.

- Tab. XVII. - XX. *Myrmeleon Formicarum*. Linn. p. 914. Sp. 3. De Mierenleeuw.
 — XXI. Fig. 1. *Hemerobius speciosus*. Linn. p. 912. Sp. 7. De Panthervlieg.
 — XXI. Fig. 2. *Myrmeleon Formica Lynx*. Linn. p. 914. Sp. 4. De Mierenlynx.
 — XXI. Fig. 3. *Hemerobius Chrysops*. Linn. p. 912. Sp. 4. De Goudoog.
 — XXI. Fig. 4, 5. *Hemerobius Perlæ*. Linn. p. 911. Sp. 2. De Luizenvreeter.
 — XXI. Fig. 6 en 7. *Raphidia Ophiopsis*. Linn. p. 916. Sp. 1. De Kameelhals.
 — XXII. Fig. 6, 7 en 8. *Nepa Cinerea*. Linn. p. 714. Sp. 5. De Europeische Waterschorpioen.
 — XXIII. *Nepa Linearis*. Linn. p. 714. Sp. 7. De Naaldschorpioen.
 — XXIV. ontbreekt by Linnæus.

Tab

- Tab. XXV. *Acarus aquaticus*. Linn. p. 1025. Sp. 21. De Roode Watermyt.
 — XXVI. *Nepa grandis*. Linn. p. 712. Sp. 1. De groote Surinaamsche Waterschorpioen.
 — XXVIII. *Nepa Cinnides*. Linn. p. 714. Sp. 6. De Waterschorpioen.
 — XXIX. *Notonecta striata*. Linn. p. 712. Sp. 2. De Dwarsbaar.
 — XXXI. *Gyrinus Nator*. Linn. p. 576. Sp. 1. De Zweimmer, de Draaikever.
 — XXXII. Fig. 1-4. *Hirudo Geometra*. Linn. p. 1080. Sp. 8. De Spanmeeter, de Vischegel, de Bloedzuiger.
 — XXXV. en XXXVI. *Cynips Quercus petiali* Linn. p. 918. Sp. 7. De Steelneut.
 — LI. en LIII. *Cynips quercus folii*. Linn. p. 918. Sp. 5. De Galnoot.
 — LIV-LIX. *Cancer Astacus*. Linn. p. 1051. Sp. 63. De Rivier-Kreeft.
 — LXII. *Cancer Pulex*. Linn. p. 1055. Sp. 81. & *Locusta* Sp. 82. De Vloorkreeft, de Springer.
 — LXIII. *Cancer Crangon*. Linn. p. 1052. Sp. 67. De Garnaal.
 — LXIV. *Phalangium Cancroides*. Linn. p. 1028. Sp. 4. De Schorpioen-ReetSpin, de Boekschorpioen.
 — LXV. *Scorpio Afer*. Linn. p. 1038. Sp. 3. De Africaaner.
 — LXVI. Fig. 1, 2. *Scorpio Europæus*. Linn. p. 1038. Sp. 5. De Europeaaner.
 — LXVI. Fig. 5. *Scorpio Americus*. Linn. p. 1038. Sp. 4. De Americaaner.
 — LXVII. Fig. 1-6. *Curculio Nucum*. Linn. p. 613. Sp. 59. De Nootsnuutkever, de Nootenboorder.
 — LXVII. Fig. A. B. C. D. *Curculio Röselin*, Rösels-Anjelierboorden.

POLYPEN DER ZOETE WATEREN, EN ANDERE WATER-GEWORMTE.

- Tab. LXXIII. LXXV. *Tabularia Gelatinosa*, de Vederboschpolyp. Zie Muller Linn. Nat. Syst. VI. Tb. p. 820. Pallas, Elenchius. Zoophyt. p. 85. 86. Tusfchen de *Tabularia Crystallina* van Linnaeus, en deeze *Gelatinosa*, is de *Tabularia* van Muller. Zie Vermium Hist. Vol. I. P. II. p. 16. No. 150. Schöff. Armpolyp. 1754. T. I. Fig. 1, 2. De Koraalswyze-Kampolyp.
 — LXXVI. en LXXVII. *Hydra Pallens*. Linn. 1320. Sp. 5. De bleeke Polyp.
 — LXXVIII-LXXXIII. *Hydra Grisea*. Linn. p. 1320. Sp. 3. De geele Polyp.
 (NB.) Tab. LXXVIII. Fig. 16 en 17. Tab. LXXIX. Fig. 1. *Nereis Lacustris*. Linn. p. 1085. Sp. 2. De Getongde Naide. Linnaeus heeft duidelyk de Getongde Naide, of de Duizendbeen met de Spies, (*Millepied a dard*,) met den Ael van Schaffer, en den Worm van Bonnet, verwisseld. De eerste zou, eigenlyk, *Nais proboscidea* heeten; en de anderen is de Gebaarde Naide van Mullers Waterwormen. p. 14-73. T. 1. Fig. 1-4. Bonnet. Insectol. 21. Beob. Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. 21. No. 153. *Nais proboscidea*.
 Tab.

- Tab. LXXXIV-LXXXVII. *Hydra fusca*, Linn. p. 1320. Sp. 2. De bruine Polyp Fig. 86. m. m. r. Polypluis Muller Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. 54. N. 42. *Cyclidium Pediculus Trembl.* Polyp. T. VII. Fig. 10. 11. Overz. Fig. 1.
- LXXXVIII. en LXXXIX. *Hydra Viridis*, Linn. p. 1320. Sp. 1. De groene Polyp.
- XCII. De geslangde Naïde, of het Mercur-Slangeje. Zie Muller over de Waterwormen, p. 84. 86. Verm. Hist. Vol. I. p. II. p. 20 No. 152. *Naïs serpentina*.
- XCIII. Fig. 1. 7. Het Madegelykende Slangje, Muller, Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. 20. No. 151. *Naïs Vermicularis*, de Madenachtige Naïde, Fig. 8. 11. De Oegenlooze Naïde, met een gegaffelden staart, zie Muller over de Waterwormen, p. 95.
- XCIV. Fig. 7. 8. *Hydra Stentoria*, Linn. p. 1321. Sp. 6. De Trechterpolyp, de Waterrecht, het Schalmiediertje, het Trechterdier, Muller, Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. III. No. 150.
- XCV. Fig. 1. 6 Tab. XCV. en XCVI. *Hydra Socialis*, Linn. p. 1321. Sp. 7. De gezellige Polyp. In Muller Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. 113. No. 122. is de *Vortic. fuscifolia*, die hy lange voor de *Socialis* gehouden heeft, maar nogthans van de *Socialis*, No. 121. onderscheidt.
- XCVII. Fig. 1. 2. *Vorticella arafatica*, Linn. p. 1317. Sp. 3. De Boschpolyp.
- XCVII. Fig. 3. *Brachionis ramosissimus*, Pallas, Elench. Zooph. p. 98. *Polype a bouquet*, de Kuifpolyp, de Struispolyp.
- XCVII. Fig. 4-8. *Vorticella Contralaria*, Linn. p. 1319. Sp. 11. De Struikpolyp, de Klokpolyp, de Klok-Maaltroom, *Brachionis Campanulatus*, Pallas, El. Zooph. p. 97. No. 54. Muller, Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. 118. No. 149. Het Klokdier, het Bokerswyzedier.
- XCVIII. Fig. 1. 2. d. e. *Vorticella Pyramida*, Linn. p. 1318. Sp. 5. De Peer-gelyke, Muller, Verm. Hist. Vol. I. P. II. p. 126. No. 138. De Peervormige Polyp, Fig. 2. a. a. Fig. 3. *Vorticella Cratagaria*, Linn. p. 1318. Sp. 6. De Sorbenbezievormige Polyp. de Sorben-Maaltroom, *Bakers Moerbezie-Insect*, het Stekdier, het Kuisbezievormige diertje, Muller, Verm. Hist. Vol. I. P. I. p. 105. No. 112.
- XCVIII. Fig. 4. *Oaon Vorticella digitalis*, Linn. p. 1319. Sp. 10. De Peperhuisvormige Polyp, de Peperhuis-Maaltroom.
- XCVIII. Fig. 5. 6. *Vorticella opercularia*, Linn. p. 1318. Sp. 1. De Dekzel Polyp, de Dekzel-Maaltroom.
- XCIX. Fig. 1. 2. *Monoculus-quadricornis*, Linn. p. 1058. Sp. 6. De Drui-verdraager.
- XCIX. Fig. 3. 4. *Vorticella Berbirlina*, Linn. p. 1319. Sp. 9. de Lyfterbezievormige Polyp, de Lyfterbezie-Maaltroom.

Tab.

- Tab. C. *Vorticella umbellaria*. Linn. p. 1318. Sp. 8. De Zonnescerm, de Zonnescerm-Maaltroom. Muller, *Verm. Hist.* Vol. I. P. II. p. 122. No. 135.
Vortic. acinosa, de Mispelvormige Basterd-Polyp.
 — CI. Fig. 1 — 3. *Volvox globator*. Linn. p. 1325. Sp. 3. Het Kogeldier.
 Muller, *Verm. Hist.* Vol. I. P. II. p. 32. No. 9.
 — CI. Fig. A. T. *Chaos Proteus*. Linn. p. 1326. Sp. 2. De Onbeständige.

R O S E L S IV. D E E L.

- Tab. I. Fig. 1. 9. *Silpha vespillo* Linn. p. 569. Sp. 2. De Doodgraaver.
 — I. Fig. 10-15. *Acarus Coleoptriorum*. Linn. p. 1026. Sp. 27. De Kevermyt.
 — V. Fig. 3. *Scar. Hercules*. Zie boven, II. Deel, Kevers.
 — A. Fig. 1.
 — XII. *Mantis religiosa*. Linn. p. 690. Sp. 5. Het Europeische wandelendeblad, de Vang-Springkhaan, het Bidpaapje, de Godenbidster, het waakende of opspassende Schoothondje. Zie boven II. Deel, Springkhaanen. Tab. I. II. Dit Insect zou, zo men wil, wel tien jaaren oud worden.
 — XXX. *Scarab. Fullo*. Linn. p. 553. Sp. 57. De groote Juliekever, de gemarmerde Tyger.
 — XXXV-XL. *Aranea diadema*. Linn. p. 1030. Sp. 1. De Kruisspin, de Kruisdraagster.

(NB.) De Naamlyst der Insecten in het *Vervolg* van *Kleeman* op *Rösel* voorkomende, zal, na eene volkomene overzetting van hetzelfde, insgelyks volgen-

ALGEMEENE BLADWYZER

O P

AUG. JOH. RÖSELS

NATUURLYKE HISTORIE

D E R

I N S E C T E N.

A

Aardkevers. Daardoor worden dezulke verstaan, die, zo niet het grootste, of hun Leven in hunnen volwasfen staat, ten minste het meeste gedeelte van hun Leven, als Wormen en Kevers, onder de aarde doorbrengen; II. *voorbericht*, 2 *classen* derzelve; *ald.* en IV. *Voorber.* hunne algemeene *eigenschappen* en *kenmerken*; zie *Eigenschappen der Aardkevers*; voorbeelden der *eerste klasse*; II. 33 *enz.* der *tweede klasse*, II. 117. *enz.* der *derde klasse*, II. 131. Zie verder *classen der Aardkevers*.

Aardkreeften, eigenlyke zyn 'er niet, ten ware men de *Scorpioenen* zodanig noemen wilde; want betreffende de Land- en Aard-Kreeften, die men wil, dat in de *West-indien* worden gevonden, deze hebben, volgens de berichten van daar, ook hun verblyf kort by de Zee: en die geene, welke SCALIGER (*de subtilitate, exercit.* 245.) uit de aarde heeft zien graaven, heeft hy zo naauwkeurig en omstandig niet beschreeven, dat men ze voor echte Kreeften houden konne, III. 268.

Aardmade, zie *Mest-Made*.

Aardmugge. 'Er zyn veelerle'e soorten van *Aardmuggen*, welke geen harden steek-

priem hebben, om bloed te zuigen. De *grootte langbeenige Aardmugge* kan men van andere, door haare grootte en koleur, onderscheiden. Zy heeft haaren *oorsprong* uit eene Made, die zich in de aarde onthoudt, en aldaar haar voedsel zoekt; om die rede wordt ook aan deze soort van Muggen de naam van *aardmuggen* gegeven; II. 535. De *grootste lengte* van zulk een Worm of Made, die zommigen dezer soorte erlangen, is omtrent anderhalve duim; doch ze kan zich wel de helft korter zamen trekken, en evenwel voortkruipen. Het *Lyf* is bykans overal even dik; behalve dat het naar den Kop toe, die, ten aanzien van het Lyf, zeer klein, en ook blinkend zwart is, iets durner toeloopt. Het laatste lid van 't lyf is van agteren plat stomp; en boven op die platte stompen staan vier weeke spitzen, of punten, straalswyze om hoog, en naast elkander; zynde de beide middelsten iets korter, dan de buitensten. De *Koleur* dezer vlakte is helder Oker-geel; en men vindt op dezelve eenige zwarte *punten*. De twee bovensten dezer punten zyn klein; daarop volgt een grooter paar

A

paar; onder dezen ziet men weder twee dwarsstreepjes, en daar na nog twee kleine punten. Van onderen heeft ze twee *Wratjes*, welke de Made, naar believen, kan intrekken en uitschuiven; en waarvan ze zich derhalve als Naschuivers bedient. De Kolor boven op den *Rug*, is donkerer dan ter zyden aan 't *Lyf*; en in dien donkeren grond worden twee Oker-geele Aderen gezien. Deze *Aderen*, die zich aan beide de zyden van den *Rug* van achteren tot vooren uitsprekken, gelyken naar twee doorloopen- de draaden, die zig schikken naar het buigen of draajen der Made. Want als zy uitgestrekt is, loopen de draaden recht uit; maar als zy haare *leden of ringen*, die 12 in getal zyn, te zamen trekt, dan vertoonen zy zich slangswyze, of gekronkeld. En op ieder lid zyn ook eenige enkele hairige spitzten te zien, *ald.* bl. 536. Waarin eigenlyk haar *voedzel* in de aarde bestaat, kan men tot nog niet volstrekt bepalen, *ald.* De tyd haarer veranderinge daar zynde, begeeven zy zig in de hoogte, derwyze, dat ze loodrecht met de Koppen buiten de aarde staan. Naa dus een dag stil gestaan te hebben, strooken zy, eindelyk, haaren dunnen Maden-balg naar onderen af; kruipen iets hooger uit de aarde, invoe- gen dat ze uit de aarde opgroeijende ke- gels schynen te zyn, *ald.* 537. — De *Poppen* hebben twee tedere afgestompte hoornen op den *Kop*; die men voor luchtpypjes houdt, en nevens dezen staat 'er nog een paar, die echter nauw- lyks zichtbaar zyn, *ald.* 537. Het *achterlyf*, dat het grootste gedeelte der pop- pen uitmaakt, heeft, op ieder ring, rond- somme eenige spitze punjes; en het ach- terste of laatste lid draagt zes spitzten, dikker en langer, dan de eerst genoem-

den. Her kort daaraan verknochte lid heeft bykans even zo veel spitzten, die echter iets korter zyn; en, benevens de voorigen, der *Poppen* eigenlyk die- nen, om 'er zich daar door uit de aarde om- hoog te heffen. De *kolor* dezer *Pop- pen* is meestal dof-bruin; en, wanneer ze worden aangeraakt, geeven ze wel dra te kennen, dat ze niet ongevoelig zyn, *ald.* 537. Binnen 10 dagen komen uit deze *Poppen*, loutere *langbeenige Muggen* te voorschyn, die ten eersten, zo dra haare vleugels en overige leden de behoorelyke hardig- en styvigheid ver- kreegen hebben, te zamen paaren, *ald.* 537, 538. Het *Wyfje* is niet alleen door de grootte, maar ook door het dikker achterlyf, mitsgaders door de daaraan zittende Legpyp, van 't *Mannetje* on- derscheiden. Het *voorlyf* is aan deze soort zeer verwulfd; en heeft, bene- vens den zeer kleinen nederwaards staan- den *Kop*, eene fluweel zwarte grond- verwe; die echter met veele citroen- geele vlakjes versierd is. De ronde *Kop* dezer *Muggen*, hoe klein hy ook zy, heeft nog een nog dunner *hals*, die denzelven eenigzins van 't borststuk afzondert. Van vooren is hy met een breed en zwart snuitvormig deel voor- zien; aan 't welke 2 hair-dunne tong- vezels zitten, die even zo lang, en als eenes nederwaarts geboogen zyn. Bo- ven de beide *oogen* is een geel vlakje, en daar aan een paar hairvormige, kor- te, en opwaarts staande sprieten te zien. De *zes pooten* hebben hunne in- leding onder het ronde Borststuk, en zyn van zulk eene lengte, dat één derzelven de lengte van het ganfche lyf des schepzels bykans tweemaal overtref- se. Ieder *Poot* bestaat uit 4 deelen of leden; de bovenschonkel aan 't borst- stuk.

fluk is Oranje-geel; doch de overige zyn zwart. De 2 doorzichtige *vleugels* hebben, boven aan het voorste deel, hunne inleding; zyn aan den rand, daar de dikste aderen doorloopen, bruin; en aan het uiterst einde vertoont zich in ieder van dezelve een zwart vlakje, dat zich in eene te rug loopende linie verliest. Voorts zyn ze, in 'plaats van de ondervleugelen, met een paar *Kolffjes* voorzien; *ald.* 538. welke, door hunne wervelachtige beweeging, in het vliegen, zo veel luchts onder de vleugels dezer Insecten dryven, als zy tot de vlucht noodig hebben; *ald. bl.* 539. *aann.* Het *Achterlyf* is aan 't *Mannetje* veel dunner en ranker, dan aan 't *Wyfje*. Aan 't eerstgemelde eindigt het stomp, met 2 kleine spitzen, welke ter vasthoudinge dienen. Deszelfs *Koleur* is meerendeels graauw, en ter zyde heeft het eene rei langwerpig overgeboogen geele streepjes; die aan 't achterlyf van 't *Wyfje* merkelyk grooter zyn, en zich veeleer als vlakjes vertoonen, die eene geele *Koleur*, en van onderen zodanig eene zwarte bezooming hebben, dat ze 'er schubbenvormig uitzien. De benedenste helft van dit *Achterlyf* is aan het *Wyfje* meestal graauwachtig; doch het laatste lid, en zo ook de spitze legpyp, schynt geel-bruin. Het uiterste einde dezer Legpyp is dubbel, en zeer teder. Door middel van dezelve legt het *Wyfje* zyne Eieren in eene brose aarde; en by deze verrichting zet het zich indier-voege op de Pooten, dat het lyf recht op en neder te staan kome; in hoedanig eene gesteltenis het geduurig voort huppelt, terwyl het telkens, onder die beweeging, een Eitje in de aarde laat vallen, het welk zo lang duurt, tot dat het alle zyne *Eijeren* kwyt is, welke lang-

werpig, rond, en blinkend zwart van *Koleur* zyn. Deze 10 dagen in de aarde gelegen hebbende, kruipen 'er de jonge Maden uit; doch de oude Muggen leven zelden zo lang, tot dat de jonge Muggen te voorschyn komen, *ald. bl.* 539 540.

Aardmyt, zie *Akkermannetje*.

Aardrups, de onaanzienlyke *bruine*, heeft eene bruine aardkoleur, overeenkomstig met de aarde, waarin ze zich meestal onthoudt; III. 344. Waarin haar voedsel eigenlyk bestaat, heeft de Schryver niet kunnen ontdekken, *ald.* Alles is aan dezelve bruin, behalve de *Kop*; die, in zyne geele koleur, wederzyds met 2 tegenover elkander staande, buitenwaards gekromde, zwarte streepen doortoogen is; en ieder ring of lid heeft van achteren twee dwarsvouwen, *ald.*

Aas-kevers, behooren tot de zesde *Classe* der Kevers; II. *Voorber.* 2 IV. *Voorber.* 2. Zommigen van deze, en wel de a merkelykste of grootste zoeken alleen vochtige en stinkende aazen tot hun voedsel; doch de overigen en kleiner soorten eeten niet alleen deze, maar voeden zich ook met oude, dorre en verdroogde overblyfsels van Dieren; zo dat ze niet alleen derzelver vellen en verdroogde huiden, maar ook de haren, vederen, en wat dies meer zy, verteerren. En, even als de Kevers hierin te werk gaan, zo doen het ook de *Wormen*, daar ze uit voortkomen, IV. *Voorber.* bl. 3. Anders zyn deze *Aas-Kevers* genoegzaam te onderscheiden van andere *Aardkevers*, door de achter aan als afgesneden breede, hoekige gestalte hunner *vleugeldekzelen*; welke niet verder reiken, dan tot aan de drie laatste leden van het lyf; en van achteren breeder zyn, dan voor aan het borststuk; alwaar

men tusschen dezelve een driehoekig Ruggeschildje ziet. Aan den *Kop* zyn ze met 2 taamyke groote uitpuilende *oogen*, en kort by dezelve met een paar *Sprietten* voorzien, die uit 9 *leden* bestaan, van welken de 4 voorsten de grootste zyn, en een bladig Kolsje vertoonen. Hunne 6 pooten hebben elk aan 't voorste klauwdeel 5 leden, welke aan de voorste pooten, wegens het vereischte gebruik, sterker en dikker, dan aan de andere, en, gelyk by de Houtkevers, hartvormig van gestalte zyn, IV. *Voorber. bl. 2 aanm.* Zie verder by *Doodgraaver*.

Aas-vlieg, zie *Besmet-vlieg*.

Ademhaaling. De *rupsen* en *poppen*, schepzelen zynde, die in de lucht leven, moeten gewislyk adem haalen; dat is, zy moeten iets van de haar omringende lucht, beurtswyze, in haar lichaam trekken, en weder uitblaazen. Hiervan kan men zich ten vollen verzekeren, als men maar nagaat, dat ze, wat lang in het water liggende, verdrenken, en in eene lucht-ledige plaats onbeweegelyk, en als dood blyven liggen. Nu is de vraag: *door welken weg de Rupsen en Poppen adem haalen?* By de eersten geschiedt zulks niet door den mond; gelyk men duidelyk kan zien, wanneer men eene Rups in 't water werpt, dewyl 'er geen luchtblaasjes voor den mond opwellen: en by de laatsten is dit onmogelyk, dewyl zy eigenlyk geen mond hebben, of dezelve ten minste onder het Poppevlies verborgen zit, I. 155. 156. Zy haalen ook geen adem door de neus; want die ontbrekt hen; III. 268. Des moeten 'er andere wegen zyn, waardoor de lucht 'er in- en uitgaan kan. Dit nu zyn de *zogenaamde Spiegelpunten*. Alle deze *Spiegelpunten* zyn ovaal-rond. Ee-

nige derzelve zyn met eene dubbele lyf omgeeven; andere hebben maar eene enkele lyf. Die met eene dubbele lyf zyn doorgaans binnenwaarts verdiept, en zomwylen zeer diep; waar tegen die met eene enkele lyf meerendeels vlak zyn. Ieder dezer *Spiegelpunten* heeft overlans in zyne middellyn eene kloof, welke zig beurtwyze opent en wederom toefluit. Men ziet 'er naamlyk van boven tot beneden, tegen over elkanderen, veele styve vezelen in, die in 't midden vast aan een sluiten. Deze 2 reien vezelen wyken nu eens van elkander, en voegen zich dan weder te zamen, waar door de kloof geslooten wordt. Dus kunnen ook zelfs de lyfsten der *Spiegelpunten* by de *Rupsen* (maar niet by de *Poppen*) zich in de breedte verwyderen, zo, dat haar omtrek nu ronder, dan langwerpiger worde. Doch by de *Poppen* blyven die buiten lyfsten onvermydelyk, terwyl alleen de binnenste wanden open en toegeschooven worden. Nu kunnen deze openingen, waarvan 'er aan ieder zyde van het lyf der *Rupsen* en *Poppen* 9 geteld worden, die zulk eene wonderlyke werktuiglyke gesteltenis hebben, en waaraan de beide schuifladen onophoudelyk in beweging zyn, geen ander oogmerk of nuttigheid hebben, dan dat de in- en uitgang der lucht in 't lichaam van de *Rups* door dezelve geschiede. Het welk verder proefkundig wordt bewezen, I. 156. 157.

Agley, } In het Latyn *Aquilegia borten-*
Akeley. } *sis major*, is eene plant, waar-
van 'er, gelyk van de *Ridderspooren*, enkele en dubbele, en daar onder wederom drieërleie soorten, ten aanzien der koleure, zyn, naamlyk blaauwe, witte en vleeschverwige. Van deze alle bedient zig de *bleek-groene, gladdé Rups* zom-

ger

der onderscheid, tot haar verblyf en voedsel, I. 253.

Aktermannetje, zo noemen de Landlieden, op sommige plaatsen, de *hoog-roode Aard myt*, die men in het voorjaar des zomers op de akkers en velden verneemt; om dat zy, op eene overlevering, gelooven, dat het goed zy te zaaijen en te planten, wanneer dit gedierte te voorschyn komt. Anderen noemen het zelve de *kleine sluweel roode Aardspin*; welke naam haar echter, als zynde eene soort van myten of maaijen, niet toekomt, III. 145.

Alsem-rups, de *bontgevlakte*, beschryving derzelve; I. 449. heeft haaren naam naar de *Alsem-plant*, die haare liefste spyze is. Deze is altoos met eenerleie koleuren verciert; behalven dat ze in haare jeugd wat bleeker, en niet zo gloeiend is, als by toeneemenden ouderdom. Volwassen zynde is haare grootste *lengte* nooit boven de $1\frac{1}{2}$ duim. Zy is gansch glad, en met geen hair bezet. De *ringen* of *leden* zyn, door diepe inkerlingen, zeer merkelyk van elkander onderscheiden, en zy kan den blinkenden, helder-bruinen *Kop*, die bovenden bek eene heldere winkelhoek-linie verzoont, zeer sterk intrekken. De rood-bruine *Hals* is, naar de lengte, met helder geele streepen of linien doorsneden, en van onderen ter wederzyde groen. De grondverwe der *overige leden* is geel, en deze, zo wel onder als achter aan, verdwynt in 't groene. Alle de *ringen*, tot aan den *naschuiwer* die gansch groen is, en geele streepen heeft, zyn van boven in het midden met witte liniën getekend, die nogtans niet aan elkander raaken. Even diergelyke liniën wordt men ook onder, aan beide de zyden, gewaar, en deze zyn van boven, doch

de andere links en rechts, met een verdwynenden rood-bruinen streep bezoomd. Tusschen deze maakt de geele grondverwe een helder streepje, en daar nevens staan kleine rood-bruine knopjes. De 5 paar stompe *Pooten* zyn groen, en de 3 paar spitze bruinachtig; die echter nu helderer, dan donkerer worden bevonden. De beweeging dezer Rups is zeer langzaam; als ze veranderen wil, kruipt zy onder de aarde, en maakt aldaar een spinzel, waarin zy allerhande andere deeltjes, die ze in de nabyheid vindt, vermengt. De meeste spinnen zich in de maand *September* in, en veranderen naderhand, binnen 5 of 6 dagen, in eene *pop*. Alle de *leden* van derzelver achterlyf zyn geelachtig-bruin rood, en eindigen met een staartpunt. De *vleugelscheden*, die met eene spitze kromte verre over het achterlyf heen zitten, zyn, benevens de spits toeloopende *Kop*, blinkend-groen; welke koleur allengskens in 't bruinachtige verandert. De byzonder opgeworpen *balskraag* van den *Vlinder* is, benevens de *Kop* en het *voorlyf*, wit-graauw; doch het *achterlyf*, het welk van boven een regel zwarte punten vertoont, en wiens laatste hairige lid gelyk een zwaluwen-staart gespleeten is, heeft eene geelachtig bruin-graauwe koleur. De *Bovenvleugels* zyn helder-graauw, en met een versmeltend bruin alom verciert. Door derzelver midden loopt overdwars een dubbele, uitgetande, zwarte streep; en nevens denzelven ziet men eenige, zo wel groote, als kleine, zwarte vlakken en punten. De *Ondervleugels* zyn wit bezoomd; het daaraan volgende is donker-graauw, en naar het lid toe worden ze steeds meer bruinachtig helder-graauw. Deze *Vlinder* heeft eenige zwarte *dwarsstreepen*

over den *Kop*; de 6 *poen* en hunne hairige bovenschenkels hebben dezelfde kleur, als het voorlyf. De hairvormige *Sprieten*, die aan het mannetje en wyfje eenerlei zyn, kan de Vlinder, in het zitten, langs het lyf leggen en verbergen, I. 449. 450.

Americaanfche Lantaarndraager, zie *Lantaarndraager*.

Ammoniten, } in het Latyn *Cornua*
Ammons-hooren, } *Ammonis*, zyn steenen van verschillende grootte; waarvan zommigen der grootften anderhalven voet of meer in den doormeter hebben; die echter allen eene soort van flakken verbeelden, welke men nog nergens anders, dan in steen, heeft gevonden, III. 512 en 515. *aann.*

Appel- en Peeren-rups, } Deze Mot-rups
Appel en Peeren worm, } verandert, gedurende haaren wasdom, die zeer langzaam voorgaat, zo dikwyls van huid, als andere rupsen, en bereikt eindelyk eene grootte, welke op zyn hoogst $\frac{3}{4}$ duim uitmaakt. Zy heeft een blinkenden rood-bruinen *Kop*, die in het midden, naar de lengte, eenigzins verdeeld is. De *Hals*, of het eerste lid, is van boven met een verdeeld schildje voorzien; dat by zommigen in 't bruine, doch by anderen meer in het graauwe valt. Het overige deel van 't zelve heeft, gelyk alle de andere leden, eene bleeke, geelachtig-bruine grondverwe. Ieder lid op de zyden heeft 3 of 4 zwart graauwe puntjes, welke paarswyze, doch verschooven, by elkander staan. De 6 *spit-ze Voor-* en de 8 stompe *Buikpooten* hebben, benevens de Nafchuivers, dezelfde Kleur, als de grondverwe van het lyf. Het ooft ryp wordende, is cok de tyd voorhanden, waarin ze gemeenlyk ter veranderinge over-

gaat. Des begeeft ze zich aan den stam des booms, waarvan ze tot hier toe de vrucht heeft genooten, of aan dien van een anderen, welke in de nabylheid staat, en zoekt zich, onder aan, in dezelve, zo veel als mogelyk is, te verbergen. Dan gaat ze aan 't werk, om de plaats, tot haar verblyf uitgekoozen, door het afknaagen der schors, uit te hoolen en aldaar ruimte te maaken. Zy omspint zich met een wit en taai weefzel, en in dit haar welbezorgde winter kwartier blyft ze, tot in de maand *Juny* des volgende Jaars, onveranderd liggen, wanneer zy eerst verandert in eene *Pop*. De kleur van deze is geel bruin; maar dezelfde wordt allengskens donkerer, naar maate dat de geboorte des Vlinders nadert. Van agteren heeft ze, in plaats van een staartpunt, eenige naauwlyks zichtbaare hair-borsteltjes, welke haar dienen, om zich in deze behuizing te wenden en te keeren. Deze *Pop* 3 weken in haar spinzel gelegen hebbende, komt 'er in de maand *July*, een zeer schoon *Vlindertje* uit te voorschyn. Het *Wyfje* is alleen door het dikker achterlyf van 't *Mannetje* te onderscheiden. Deszelfs *bovenvleugels* hebben wel eene helder-graauwe grondverwe, maar die is met zeer veele finalle, en eenige breede, slangswyze en zaagvormige donkere dwars-linien doorweeven. Kort aan den *buitenrand* bespeurt men eene groote rood-bruine vlak, welke zwart bezoomd, en met goud-blinkende trekken en punten vercierd is; naast dezelve word men het golvend boordzel van den buitenrand gewaar. De *Ondervleugels* hebben eene goud-blinkende bruin roode Kleur, en zyn aan den buitenrand met eene breede en heldere franje bezoomd. Het *voor-* en *achterlyf* is geel-bruinachtig graauw van ko.

koleur. De *Kop* is klein, en vooruitsteekende; en de daaraan zittende *spriet*en zyn aan 't Mannetje, gelyk aan 't Wyfje, hairvormig, 1 549 — 552. *Aptera* worden die Insecten genoemd, welke geene vleugels hebben, II. 540.

Arachneolhitbi, } zie *Spinnensteenen*.
Arachnites, }

Arbe, *Selaam*, *Hargol*, en *Hagab*, woorden staande *Levit.* XI 22, des schryvers gevoelen over dezelve, II 286 enz. houdende het daarvoor, dat 'er door de vier, met ons onbekende *Hebreeuwfche* naamen, benoemde Dieren, niet ander dan *gevederde vogels* te verstaan zyn, welke, in tegenoverftellinge der onreine vogelen, werden aangehaald. *ald:* 291, en wel allerlei soorten van tamme en wilde hoenders, mitsgaders allerlei soorten van tamme en wilde Ganzen, Eenden, Braakvogels en Duiven. *ald:* 294.

Amptolypen. Alhoewel men, raakende deze, nog niet met zekerheid heeft ondervonden, dat ze zich ook door Eieren vermeederen; zy kunnen zich nogtans, door het uitspruiten der Jongen uit hun' lyf, en door de hen eigen zynde verdeeling, grootlyks vermenigvuldigen. III 477 *aann:*

Aspecten rups, zo noemt *Frisch* de groote, gladde, groene, en op verscheide wyze getekende *Melden rups*, en mogelyk zou zy dezen naam van *Aspecten rups*, uit hoofde der tekeninge, beter verdienen, dan dien van *Melden rups*; want zy geneert zich van de *Melde* niet alleen, maar aast ook op verscheide andere Gewassen. I 313. Zie verder *Melden rups*.

Asperfie-rups, de, met den rooden zydeftreep getekende is op het uitgelopen *Asperfie-kruid* te vinden, 1 416 Deze

soort van rupsen ontstaat uit kleine, ronde helder-geele, blinkende *Eieren*, die, door een vergrootglas beschouwd, van boven in eene laagte een klein knopje vertoonen, waarin veele tedere ribbetjes, daar de Eierschaale mede verciert is, te zamen loopen. Wanneer het daarin geflooten Rupsen-broedzel tydig wordt, vertoonen zich de Eiertjes bruiner, en eindelyk worden ze gansch loodkoleurig *ald: aann:* In het midden over den *rug* dezer rups loopt, naar de lengte, eene tedere donkere linie; op de meeste ringen staat een puntje, en de *Spiegelpunten* zyn donkerer, dan de hoofdkoleur. Wanneer zy haare uiterfte grootte heeft bereikt, is ze doorgaans iets meer, dan één duim lang. Haar *lyf* is middelmaatig dik, en de leden zyn zeer gemakelyk van elkander te onderscheiden. Het zy de grondverwe dezer rupsen groen of bruin is, zy hebben toch altoos van anderen, ter wederzyde langs het lyf een schoonen roozen-rooden streep, die van boven en van anderen wederom wit bezoomd is. Haar *Kop*, die naar geraade van het Lyf niet zeer groot is, heeft eene blinkende bruine koleur. De 3 paar *Voor-* en de 5 paar *Achterpooten* zyn doorgaans van koleur, gelyk het gansche lyf. Wanneer deze rups haaren volkomen wasdom heeft bereikt, en de tyd haarer veranderinge, met den invallende Herfst, ook nadert, verbergt ze zig onder de aarde, en maakt 'er een hol in tot haar verblyf, in het welke zy, binnen 10 dagen, in eene *Pop* verandert. Deze is in het begin geelagtig bruin, doch verandert naderhand in diervooge, dat het *Achterlyf* niet zyne ringen rood-bruin worde, en het *Voorlyf*, benevens de *Vleugelsche*

scheden, eene groenagtig-blinkende koleur, die in het zwarte valt, aanneeme. In de maand *Juny* des volgenden jaars komt uit dezelve een *Nachtvlinderij*, behoorende tot de *tweede klasse*. Het *Wyfje* is, door het dikke achterlyf alleen, van 't *Mannetje* te onderscheiden; want de *Sprieten* zyn aan beiden dun en hairvormig; en voor 't overige hebben zy eenerleie koleur en cieraaden. De *bovenvleugels* zyn smal, van onderen uitgerand, en met een helder boordzel voorzien; de *Onder-vleugels* hebben ook een helder-geelagtig, maar breeder boordzel, ende daarop volgende graauwe grond valt naar den kant van 't lid in 't heldere. Aan het stompe *Voorlyf* hebben de *balskraag* en *zwarte oogen* insgelyks eene heldere omzooming. I 417. 418.

Aurelia de *gehakkelde*, zo wordt de *Vlinder* van de eenzaame *Doornrups*, met den half geelen en half witten rug en bruin lichaam, genoemd, behoorende tot de *eerste Klasse* der *dagolinders*. I 33. Zie verder *Eenzaame Doornrups* als boven. Anders komt de naam van *Aurelia*, welke, gelyk de *Grieksche* naam *αυρηλια*, een *goud-koleurig* schepzel betekent, den *Poppen*, die niets goudachtigs aan zich hebben, eigenlyk niet toe; maar dezelve is, door misbruik, van eenige soorten op allen overgebracht, zo als het met veele woorden in verscheide weetenschappen is gegaan, derwyze, dat men naauwlyks de oorzaak raamen kan, waarom dit of dat ding een' naam draagt, gansch strydig met zyne eigenschappen. I 57, 58.

Asiatische Lantaarndraager, zie *Lantaarndraager*.

Basterd Galvespe, zie by *Galvespe*.

Basterd-Hommelen, zie *Threenen*.

Basterd-polyp, de *gezellige Knodsvormige*. Deze *basterd polypen* zyn zo veele enkele diertjes, die zich, gelyk de *gezellige Rupsen*, by een houden, III. 538. Behalven dat deze schepzels zich, gemeenlyk, in een' klomp by elkander houden, (om welke reden zy ook van zommigen, die ze voor *Polypen* uitgeeven, te *zamenhangende Polypen* werden genoemd,) hebben ze ook nog deze eigenschappen, dat ze, een iegelyk op zich zelve, door middel van den mond, een' wervelftroom in 't water kunnen maaken; bestendig in beweeging gevonden worden, en zich liever in onklaar, dan in helder water onthouden; het welk louter eigenschappen zyn, die by de *Arm-polypen* niet worden gevonden, *ald.* Men vindt deze soort van *Basterd polypen* niet alleen aan de wortels der waterlinzen, maar ook onder en tusschen dezelve aan de oppervlakte des waters, *ald.* 539. Op hoedanig eene wyze deze diertjes zich aan elkander hechten, dat ze één Geheel schynen uit te maaken, kan men niet anders dan by gisting bepaalen. Zy konnen zich, naamlyk, met het einde van den staart, of door middel van een spinzel, of van een slym aan elkander vast maaken; of zy konnen zich ook met het zelve, gelyk de bloedegels, vast zuigen; *ald. bl.* 540. verder beschreeven, *ald. enz.*

Basterd-polyp, de *kleine gezellige*; III.

548. Deze soort van *Basterd-polypen*, welke de gemeenste en bekendste zyn, wordt nooit in frisch en klaar water gevonden, maar wel in onzuiver water, schoon het stinke, by menigte, zo dat zy,

zy, uit hoofde van hun witachtig lichaam en kleinheid, waaruit diergelyke zwermen bestaan, eene kleine wolk schynen te wezen. Zodanige zwermen zetten zich niet alleen aan verscheide levende water-insecten, maar ook menigmaal aan leevenloozelichaamen, en vermeerderen in korten tyd ongemeen sterk. Het voedzel der meesten dezer Basterd-polypen bestaat in de tederste deelen der planten en dieren, *ald.* De enkele Diertjes, waaruit een zwerm dezer Basterd-polypen bestaat, gelyken, by vergroo-ting, meer na een Klokje of Meibloem-tje, dan na een diertje; en met het bloote oog is 'er niets van te zien, om dat ze te klein zyn, *ald.* Het lichaam van elk diertje uit zodanig een zwerm bestaat uit een wit doorzichtig slym, dat van loutere korreltjes te zamen gezet schynt te wezen. De gedaante is als een Bekertje, met een verwulfd bodem, of als een Theekopje zonder voetstuk. Doch, dewyl dit schepzelje zyn lyf op verscheide wyze kan veranderen; zo ziet men hetzelfde nu eens van onderen rond; dan weder langwerpig, en daarbenevens heeft het nu een wyder dan een naauwer mond, *ald.* 550. Voor dezen mond, voorzien met 2 paar tegen over elkander staande spitzen, ontdekt men, veeltyds, eene snelle wervelvormige beweging, die zeer natuurlyk by een kleinen *Maalstroom* kan worden vergeleken, *ald. aanm.*

Basterd-polyp, den Lyfterbeziën gelykende. Deze *Basterd polypen*, worden zo genoemd, vermits zy een struik van de *lyfterbeziën* vertoonen. Want, gelykerwys ieder lyfter-bezie op een steel zit, zo heeft ook elk dezer Basterd polypen zyn eigen steel; die echter by den éénen korter, by den anderen langer, en aan de vrucht dikker, dan by zynen oorsprong

is. Zommigen dezer schepzelen hebben, schoon 'er meer by elkander op éénen grond zitten, hun eigen steel op zich zelve; doch dikwils staan 'er twee, drie of vier derwyze te zamen, dat ze, hoewel ieder zyn eigen steel hebbe, uit een gemeenen stam voortkomen. Gevalt het, dat 'er veelen van die stammen by een staan; dan vormen zy een' struik; en veelen dezer struiken te zamen vertoonen een ganschen Boomgaard in 't klein. Ze scheiden zich, ten hunnen tyde, van elkander, en zwemmen deels in de hoogte, deels zydwaarts en na beneden, zwemmende zy alsdan in verscheide kromme en geboogen liniën in het water heen en weder, III. 562. 563.

Basterd-Polyp, de Mispalvormige. Het lyf van dezen zou genoegzaam kogelrond zyn, ingevalle de mond en 't half ronde deel, daar de steel aan zit, de ronde gedaante niet eenigzins veranderden. Rondom het ringvormig mondstuk ziet men verscheide tedere wipperpitzen, welke iets dieper in den mond op een anderen ring vast zitten; en binnen dezen is wederom een andere ring, die de opening van den flokdarm schynt te zyn. Het *Lyf* zelf is witachtig- of beengeel van koleur, en ziet 'er uit, als of het gepuncteerd ware. Voorts zyn 'er, dewyl het ook doorzichtig is, verscheide donkere en byna gansch zwarte korrels, even als de pitten in de rype kruis- of St. Jansbeziën, in te zien, welke wel Eieren zouden kunnen zyn. Daarbenevens ontdekt men tusschen dezelve niet alleen een klein, wit en rond vlakje; maar ook nog een even zo helder en eenigzins slangachtig lichaam, III. 564.

Basterd polyp, de peervormige. Deze draagt dien naam van wegen zyne gedaante, en is daardoor niet alleen onderschei-

den van den forbenbezievormigen Polyp, maar ook door de 4 wipperhairtjes, mitsgaders door de lange steelen, waarop deze kleine schepzeltjes zitten. Het doorzichtig *lichaam* is wel geëllachtig wit van kleur; maar aan het achterdeel, by den steel, helder; vertoonende zich van boven, tot aan de ronde mondöpening, als of het uit loutere korreltjes te samen gesteld, of gepuncteerd ware; terwyl de mond-opening genoegzaam als met een helderen ring omzoomd is. Uit dezelfde komen 4 wipperhairtjes te voorschyn, waarmede dit schepzeltje, even als een otter, by een open mond, met zyne tong gewoonlyk doet, bestendig wippert. Dit diertje maakt den mond nu enger, dan wyder; waarby, in het eerste geval, de wipperhairtjes verdwynen, en te rug getoogen worden, III. 556.

Basterd-polyp, de Peperbuisjesvormige.

Het *lichaam* van dezen is van zo zonderling eene vorm, dat het bezwaarlyk valt, om 'er, ter onderscheiding van anderen, eenen gevoegelyken naam aan te geven. De gedaante schynt wel Cylinderachtig of Spilvormig te zyn, nadeemaal het byna doorgaande van eene gelyke dikte is; maar het eindigt aan den steel kegelvormig: en de *mond*, of het bovendeel, heeft eene indrukking, waar door het een hartvormigen omtrek erlangt. Dienvolgens is dit lichaam ook geen rechte Cylinder; te meer, dewyl het zich laat aanzien, dat zich deze indrukking, by ieder doorsnede, overdwars zou vertoonen. By aldien dit zo niet ware, liet hy zich ook niet ongevoegelyk by eene *Vingerhoedbloem* vergeelyken; dan, om dat zyn lyf meestal de gedaante van een Peperhuisje schynt te hebben, zo draagt hy den naam van *Pe-*

perbuisjesvormigen Basterd-polyp. Het *lyf* is, ongeveer, viermaal zo lang, als de mond in zyn doormeeter, en, schoon hy geene wipspitzen in denzelven heeft, kan hy dien nogthans, even zo wel als de andere soorten, die ze hebben, naar believen, wyder en naauwer maaken; en ook, zo als deze, een wervelstroom in het water verwekken. De inkrimpende beweging des lyfs is insgelyks aan hem waar te neemen; en de verkorting en verlenging van het zelve heeft hy ook met de anderen gemeen, III. 558.

Basterd polyp, de Schalmeyachtige. Het *Lyf* van dezen bestaat uit een witachtig slym; en, schoon de Polyp geduurig van gedaante verandert, zo blyft hetzelfde altoos voorāan op zyn dikste, en van achteren, by het aanzet-punt, of den staart, op zyn dunste. Wanneer zulk een Basterd-polyp zyn dikke voorste deel, daar eigenlyk de kop en de mond is, opent; gelykt dat deel zeer wel na het uiterst einde van eene *Trompet* of *Schalmey*; en het heeft ook, gelyk deze, aldaar eene verdieping; terwyl de buitenrand, even als onze oogendekzels, met eene rei witte hairtjes, van gelyke lengte, bezet is, die, zonder ophouden, beurtswyze in beweging zyn. Alhoewel nu deze rand zich gemeenlyk cirkelrond vertoone, ziet men denzelven nogtans ook menigwerf met eene inkringing. Deze Basterd-polypen kunnen met den mond een bestendigen wervelstroom of draaiking in het water maaken; en door middel van denzelven veelerhande kleine lichaaamen tot zich trekken; mitsgaders het geen hen niet aanstaat, weder van hun afstoeten. By hunne onderscheiden bewegingen, verlengen zy zomtyds hun lichaam, of strekken het vol-

volkomen uit, en openen dan altoos het voorste deel; op een anderen tyd verkorten zy hetzelfde, of trekken het ylings te zamen, en dan zwemmen ze; wanneer hun lyf insgelyks op veelerleie wyze verandert. In het zwemmen maaken zy nu eene rechte, dan eene slangwyze linie, en zomtyds een rond gaanden cirkel, III. 546.

Basterd-polyp, de Serbenbezievormige. By de vergelyking dezer Basterd-polypen by de *Serben- of Spreeuwbeziën* wordt alleen derzelver gedaante bedoeld: want ten aanzien der koleure is 'er een merkbaar onderscheid tusschen die beiden, en omtrent de groote kan 'er, in het geheel, geene vergelyking plaats vinden. De *Spreeuwbeziën* zyn eerst geelachtig rood; en, als ze ryp worden, bruin; waartegen deze Basterd-polypen, door een vergrootglas beschouwd, geelachtig wit zyn. Ieder derzelven heeft boven, ter plaatse van de verdiepte indrukking, 2 haarspitzen, die tegen over elkander staan; welke dit diertje nu intrekt, dan uitsteekt, en waarmede het ook, veeltyds, op en neder wippert. Behalve dit hebben ze, bestendig, eene soort van op- en nedertrekkende beweging, als of ze zich terug toogen; en zulks geschiedt niet zo zeer door de verkorting van den steel, als wel door de inkrimping of terugtrekking van het lyf. Deze Basterd-polypen hebben ook nog het vermogen, dat den dieren eigen is, van zich naamlyk te kunnen beweegen, waar door ze zich van de ééne plaats na de andere kunnen wenden. Zy zwemmen, wanneer deze schepzels tot rypheid zyn geraakt, en de één voor, en de ander na den steel verlaat, op veelerhande wyzen door het water, maakende nu eene rechte, dan eene krinkelende, en dan

eene slangachtige Linie; menigwerf draajen zy ook, met eene groote snelheid in 't rond, en vormen eene slakenlinie, III. 555. 556.

Basterd-polyp, met het deksel. Wanneer deze Basterd-polyp zynen mond sluit, dan verbeeldt hy in het klein een *Citroen*, maar hy heeft, behalve deze gedaante nog een soort van stamper, waarop van boven eene ronde, platte, dekselvormig schyf overdwars staat, die rondsom den rand met wipspitzen, als met stralen, bezet is. Dezen Stamper kan het schepzel, te gelyk met de schyf, uittrekken of insteeken, en 'er, als het wil, de opening van den mond volkomen mede sluiten. En dit deksel heeft gelegenheidgegeeven, om dit diertje den naam van *Basterd-polyp met het deksel* toe te voegen. Deze Basterd polypen kunnen met hun lyf eene op- en nedertrekkende beweging maaken. Als zy hunnen stamper uittreken; dan ontdekt men, dat hun mond een ringvormigen rand heeft. Wanneer ze denzelven weder intrekken, en wel derwyze, dat 'er niets anders, dan alle de om de schyf zittende wipspitzen van te zien zyn, het welk ze veelmaals doet; dan maaken ze ook altoos daarmede een' wervelstroom in 't water. Het lyf dezer Basterd polypen is wel helder geelachtig wit, maar niet zo doorzichtig, als dat der anderen; aangezien het in 't midden eene onregelmaatige bruine vlak heeft, welke beweegelyk, en met eenige donkere korrels bezet is, die men, uit hoofde van hunne ongelyke menigte, voor Eieren houdt, III. 559. 560.

Basterd rups, de gele en groene, met verheven zwarte punten, die zich op de Roozenbladeren onthoudt, benevens hare verandering in eene gele Blad wespe.

II. 483. Deze soort van Basterd-rupfen wordt, in de maanden van *Augustus* en *September*, in tamelyke menigte, op de opene bladeren van den Roozenboom by een gevonden. Deze soort van rupfen is onder de schadelyke te rekenen, aangezien zy de bladeren van den Roozenboom menigmaal zo volkomen afknaagen, dat 'er niets, dan de bloote adertjes, van overblyven. Deze Basterd-rups vervelt verscheide maalen; maar vertoont zich in het begin geheel anders, dan naa de verandering van huid; want in de eerste jeugd is ze groen, en in den ouderdom geel. Wanneer ze beezig is met de beknaaging der bladeren, dan houdt ze, menigmaal, haar achterlyf zodanig in de hoogte, dat ze alleen op haare 6 voorpooten schyne te rusten. Deze 6 *voorpooten* zyn lang en zwart; doch de *buikpooten*, waarvan 'er deze soort maar 10 heeft, hebben, benevens het *achterlyf*, eene groene kleur. De *buikpooten* zyn zeer kort; en men moet de wederzyde, op kleine wratten staande, zwarte punten niet voor pooten aanzien. Deze Rups die huid eindelyk afgelegd hebbende, verschynt zy in een genoegzaam gansch Oranje geel gewaad; waaraan men alleenlyk, ter wederzyde, een iets helderer streep bespeurt; doch de zwarte punten blyven. Zo dra deze Basterd-rups tot haaren volkomen wasdom is gegroeid, begeeft ze zich, in den *Herfst*, onder de struiken, eenigzins in de aarde, en maakt een bruin, hard, eivormig huisje, en blyft den ganschen winter over liggen, tot in de maand *April*, wanneer ze zich van haare rupfenhuid ontdoet, en in eene geelachtig-witte *pop* verandert; II. 483. 484. maar indien ze reeds in *Mai* of *Juny* uit het

ei is gekomen, dan begeeft ze zich eender onder de struiken, en verschynt daarop, nog in den zomer, in haare wespen-gestalte, *ald.* 484. *aanm.* Schoon het *mannetje* en *wyffe* elkander in kleur gelyk zyn; men kan het laatste, door het met Eieren opgevulde achterlyf, zeer ligt van het eerste onderscheiden. De *Kop*, die niet groot, en met 2 kolfachtige *Sprieten* voorzien is, heeft, benevens het voorlyf, eene zwarte kleur; waartegen het gladde, en blinkende *agterlyf*, mitsgaders de 6 *pooten*, schoon Oranje-geel is; en de doorzichtige *vleugels*, aan den buitenrand, een langwerpig zwart streepje hebben. Deze *Wespen* uitgekomen zynde, bestaat haare eerste verrichting daarin, dat ze paaren; doch waar, en hoe; zy haare Eieren leggen, heeft de Schryver tot nog toe niet kunnen bespeuren, II. 483 -- 485. *Basterd-rups, de groote bleek-groene, van den Wilgeboom, met 14 buikpooten, benevens haare verandering in eene Blad-wesp.* II. 477. In de maanden van *July* en *Augustus* is deze, op de *Wilgeboomen*, van welke bladeren zy haar voedsel trekt, reeds volwasfen te vinden, *ald.* Haare *lengte* is omtrent 1½ duim, en haare *Kleur* is over het geheel blaauwachtig groen. De blinkende *Kop* laat zyne 2 *oogen* duidelyk zien, en onder aan den *bek* heeft dezelve een paar *vreetspitzen*. Het ranke *lyf* loopt na achteren iets dunner toe; is van boven fraai rond verwulfd, en schynt niet, gelyk dat der waare rupfen, uit 12 leden te bestaan. Behalven de 6 *Voor-* en 14 *Buikpooten*, ziet men aan 't laatste lid nog twee; zo dat deze Basterd-rups 22 *Pooten* hebbe. Zy heeft, ter wederzyde, 9 zwarte *luchigaten*, welke tot spuiten verstrekken. Behalven deze ei-

eigenſchap, van zich, door het uitspuiten van vocht, dat niet vergiftig is, der vervolginge te onttrekken, heeft zy nog het vermogen van zich, zo dra men haar te na komt, het zy men haar aanraake of niet, als eene ſlak te zamen te rollen, *ald.* 478. 479. Haare volkome grootte bereikt hebbende, begeeft zy zich onder de ſtruiken op de aarde, of in de reeten der ſtammen en ſchorſen, alwaar zy zich omſpint met een ſtyf, doch doorzichtig *ſpinzel*, het welk gemeenlyk van eene blinkende bruine, maar zelden van eene witte koleur is. In dit *ſpinzel* onthoudt zy zich den ganschen winter door, in hare Rupfen-gedaante, maar wordt iets korter en dunner. In het begin van 't Voorjaar ſtrookt zy haare oude huid af, en wordt eene *Pop*, die aanvangelijk wit groenächtig is; doch naderhand donkerer en groener wordt, *ald.* 479. Naa dat deze *Pop* tot in *Mai*, en zomtyds nog langer, in haar *ſpinzel* is verborgen geweest, komt 'er eindelyk de *Wesp* uit voort. De *Kop* van deze is groot en graauw van koleur; voor aan denzelven zit een paar groote zwartblinkende *oogen*; en naby dezen 2 korte, en met oker-bruine kolfjes voorzien zynde *Sprieten*; *ald.* 480. welke, behalven het wortellid, ſlechts uit drie hoofdleden ſchynen te beſtaan, *ald. aanm.* Ter plaatze van den *bek* ziet men eene lange en ſcherpe *gebittang*, en tuiſſchen dezelve de geele *bovenlip*. Het voorlyf en de *bovenſchenkels* der 6 *pooten* zyn, meer dan de *Kop*, met graauwe wolächtige haren begroeid; doch de *ondervlakke* van 't *achterlyf*, dat van boven donker-graauw is, en de beide voorſte deelen der 6 pooten, hebben eene geelächtig-roode kleur. De 4 *vleugels* zyn doorzichtig, gelyk aan alle an-

dere wesp; en de bovenſte, die langer zyn, dan de onderſte, bedekken deze geheel en al, het welk voor een algemeen kenteken van alle *Bladwespen* gehouden kan worden. De *bovenvleugels* zyn met bruine aderen doorweeven; en in het midden aan den buiten-rand, van eene bruine vlak voorzien, en haar eindſpitze is bruinachtig, *ald.* 480. De beſchryving van het *Wyſje* dezer *Wespe*, zie *Bladwesp*, het *Wyſje*.

Daſterd-rups, de groote, geel en groen verciende, des *Elzenbooms*; benevens haare verandering in eene *Bladwesp*, II. 521 enz. Haar *Kop* is zeer groot, verheven verwulfd, en zo glad, dat dezelve een glans hebbe, als of hy gepolyſt ware. Deszelfs koleur is bleek blaauwachtig-groen. De 6 vooraan zittende *klaauwpooten* hebben dezelfde koleur; en de 4 *buikpooten*, mitsgaders de beide *Nafſchuivers* zyn, benevens de gansche ondervlakte, deſgelyks met die koleur verciend. De grondverwe van 't gansche *Lyf* is ſchoon groen; welke koleur naar de bovenvlakte allengskens donkerer, en naar beneden helderder uitvalt. De *Rug* pronkt met 2 ſchoone hoog-geele ſtreepen, die van den *Kop* tot aan de *Nafſchuivers* reiken, en door een even zo breedden groenen ſtreep der grondverwe, waarin men ettelyke zwarte ſtreepjes ziet, van elkander geſcheiden worden. Voorts heeft deze *Rups*, op ieder zyde, 2 reiën zwarte *punten*, te zamen 21 in getal; van boven 12, van onderen 9, zynde de laaſte eigenlyk *Luchtgaten*. Aan den buitenrand ziet men, op ieder tand, eene dubbele rei ſtompes *wratten*, en alle deze zyn met nog kleiner, witte, verheven puntjes bezet. Alle der *ringen* of leden, uitgenomen de *nafſchuivers*, zyn niet glad, maar met veele

vouwen voorzien, *ald.* 522. 523. Naa de inspinning, welke in het eerst meer wit, dan geel was, maar eindelyk in schoon Oranje geel veranderde, bleef de *Pop* liggen, tot den 28 *Mai* des volgende jaars, wanneer daaruit de *Wesp* verscheen, die een *wyffe* was. Haar *Kop* is tamelyk groot, meer plat, dan rond, of verwulfd, en roodachtig-geel van koleur, welke echter, naar den *bek* toe, in het geele valt. Hy is met 2 vry groote, blinkende, ovaal ronde, zwarte *oogen* voorzien; die meer voordan zydwaarts staan; en tusschen deze hebben de beide eenigzins lange *Sprieten* haare inleding, dezelve zyn Oranje-geel, en eindigen met een kolsje. Het *Tanggebit* is redelyk groot, en de beide harde deelen, die 't zelve uitmaaken, vindt men, tamelyk lang en na elkander toegekromd; hebbende voorts eene zwarte koleur, en geevende den *Kop* eene veel grooter gestalte. Het *borststuk* of *voorlyf* is bruin-rood, draagende, op zyne bovenvlakte, in het midden, verscheide verdiepingen en blinkende hoogzels. Daar onder hebben de 6 lange *Pooten* hunne inleding, welke van dezelfde koleur zyn. De *Vleugels* zyn doorzichtig en geelachtig-bruin; de beide bovenste overtreffen de onderste zeer veel in grootte, en vallen aan den buitenrand in het donkere. Het *Achterlyf* is gansch dik; deszelfs grootste deel, na achteren toe, heeft eene zwavel-geele grondverwe, en is met ettelyke zwarte dwarsstreepen doortoogen, waartegen het, van vooren, uit eenige gansch zwarte leden bestaat, *ald.* bl. 524. 525.

Gasterd rupsen, beschryving van twee kleine, die zich in de roode builen, of knoppen der Wilgebladeren ontbouden,

en naderhand veranderen in G al wespen, II. 511. enz.

Beer, de groote, zo wordt de zwarthairige *Beeren-rups* by de liefhebbers genoemd, l. 191. Zie verder *Beeren-rups, de zwarthairige*.

Beer, de Rusfische, dien naam draagt de uitneemend fraai getekende *Vlinder*, met hoogroode en zwart-gevlakte onder-vleugelen; wiens bovenvleugels bruin geruit, en met eenige witachtig geele dwarsstreepen doortoogen zyn, by LINN. *Syst. nat. Phal. noct. pag.* 834. *sp.* 1. IV. 156. *aanm.*

Beeren-rups, de bruinhairige; tot de tweede clasje der nachtvinders behoorende, IV. 29. wordt zo genoemd, om dat haar gansche *lyf* met zeer veele en lange haren bezet is, welke bruin van koleur zyn. De *ringen* zyn overdwars met veele knopjes bezet, en deze zyn, benevens de 9 luchtgaten, roodachtig bruin, en helderer dan de grondverwe, gelyk ook de lange haren, welke op de daardoor heen schynende knopjes zitten. De *lip* en de *vreetpunten* aan den *Kop* hebben, zo als ook de 6 voorste *klaauwen* en de 10 *buikpooten*, eene oker-bruine koleur. In het kruipen is deze *Rups* zeer snel; en by de aanraaking kruipt ze mede, zo als de anderen, te zamen. IV. 32. De *Vlinder*, uit deze rups voortkomende, wordt beschreeven III. 204. *enz.* Het gansche *achterlyf* en de *onder-vleugelen* hebben eene hoog Oranje-geele grondverwe, en eenige ongelyk breede, aan elkander hangende, sluweel-zwarte-dwarsvlakken. Doch het *dikke achterlyf* is schoon hoog-rood; welke koleur nog schooner in het oog valt door de rei zwarte vlakken, die op het midden en ter zyde staan. De grond der *boven- of voorste vleugelen* is bruin; en

in dezelve ziet men, aan den voorsten rand, doorgaans 5 geele vlakken, die van verschillende grootte zyn. Het *borststuk* of *voorlyf* heeft ook wel, gelyk de bovenvleugels, eene bruine grondverwe; maar dezelve is veelal donkerer, en pronkt bovendien met 2 hoog carmyn-roode streepen, die aan den Kop nader, dan achter, by elkander staan: en op den *Kop* zelven vertoont zich een hoekige streep van gelyke koleur; nevens welken ter wederzyde, by de inleding der vleugelen, eene schoone geele bezooming is, III. 205. Zyne zes *pooten* maaken, wegens de met zwart vermengde roode koleur, eene cierlyke vertooning; en het is te vermoeden, dat de eenigzins lange, hairvormige, zwarte *Sprieten*, aan de *Mannetjes* iets dikker vallen dan aan de *Wyfjes*; en dat het *achterlyf* daarëntegen merkelyk dunner is, III. 206.

Beeren-rups, de kleine, zwarte, en tegelroode, benevens haare verandering in een schoon Vlindertje, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, IV. 131. enz. De *Eieren*, waaruit deze *Beerenrupsen* voortkomen, zyn paerelrond en helder groen, *ald.* 131. De *rupsjes* zyn in 't begin gansch wit, en met enkele hairen bezet, maar worden naderhand iets donkerer. Vervolgens worden ze bruiner, en krygen meer zwarte hairen, onder welken 'er op den rug verscheide okerbruin van koleur zyn. Grooter wordende, vertoonen ze zich met meer styve zwarte hairen bezet, en hebben op den *rug* eene geel-bruine *vlak*, die uit de gelykverwige hairen ontstaat, *ald.* 131. Ten derden maale van huid veranderd zynde, is de *ruggevlak* iets helderer, en b staat uit rood bruine borstelhairen;

naa de vierde verandering bestaat haare groote *ruggevlak* uit meer tegelroode hairen. Naa de vyfde verandering hebben ze na genoeg de lengte van één duim, *ald.* 132. De voorheen, nog klein zynde, zwarte blinkende *Kop* van deze *Beeren-rups* was nu merkelyk grooter. De grondverwe des *lyfs* en der *pooten* vertoonde zich dof zwart, welke koleur ook de hairen, op de 3 voorste en 2 achterste ringen staande, hadden. Van dezen waren de achtersten wederom niet alleen de langste, maar nu veel langer, staande schuins op in de hoogte, terwyl de overige meer korte en afgestompte borstels geleecken: doch allen stonden zy staartvormig op verheve knoppen. De tegelroode hairen besloegen nu, meerendeels, de 6 middelste ringen van boven, *ald.* 132. De *Pop* zelfe is koolzwart, en van achteren met een kleine staartspits voorzien, *ald.* 133. Het *Mannetje*, uit deze *Pop* voortgekomen, wordt beschreeven, *ald.* 133. Deszelfs *ondervleugels* hebben eene meer oranje geele, dan donkere oker-geele grondverwe, en daarin bespeurt men verscheide, ten deele verstrooide, ten deele te zamenhangende zwarte vlakken en streepen, van verschillende vorm en grootte. Aan den achtersten rand wordt men ook nog eene rei van zodanige te zamen hangende vlakken gewaar, omvat met eene finale oranje-geele bezooming. Het *achterlyf* schynt eene even zo geele en breede bezooming te hebben, doordien deszelfs middelste grond zwart, en ter wederzyde ingetand is. De grondverwe der *bovenvleugelen* is meestal koolzwart; en door deze loopt 'er, van de inleding af, tot aan de uiterste hoekspits, een geslingerde ongelyk breede en ingetande hel-

helder-geele streep, met verscheide zydetakken van dezelfde kleur voorzien. Eene andere zodanige dwarsvlak ziet men in het midden naby den voorsten tand; en deze heeft, aan de inleding, een smallen streep van gelyke heldergeele kleur. Ook hebben deze *bovenvleugels* aan den buitensten rand, even als de *onderste*, eene gelyke breede oranje-geele bezooming, en aan den achtersten eene smallere. De *Kop*, mitsgaders de vedervormige *Sprieten*, en het kleine *voorlyf* is zwart; van achteren heeft de kop een paar groote geele punten; waartegen de smalle en lange *schouderbladen* een heldergeel boordzel hebben, *ald.* 133. 134. De grondverwe der *onder vleugelen* van het *Wyfje*, en de bezooming van het *achterlyf* zyn niet geel, maar schoon vuurrood; doch de bezooming van den achtersten rand is niet van eene diergelyke kleur: voorts ziet men ze echter ook met zwarte vlakken versierd; en van de inleding af is ieder, over de helft, tot aan een smal overdwars rood vlakje, geheel zwart. De *bovenvleugels* zyn aan die van 't Mannetje tamelyk gelyk; maar hebben, aan den buitenrand, geene bezooming; en de geele streepen en vlakken vertoonen zich schooner geel, en omtrent den voorsten rand eenigzins in 't vuurroode verdreeven. De *Sprieten*, terwyl het achterlyf dikker is, dan dat van 't Mannetje, zyn dunner, en de 2 punten achter den kop vuurrood *ald.* 134.

Beeren-rups de zeldsaame bruinhairige, met den rooden kop en pooten; benevens baare verandering; behooren de tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, IV. 158. enz. De *Eieren*, waaruit deze Rups voortkomt, gelyken veelal na kleine zand-

paereltjes in gestalte en kleur *ald.* 159. De kleine rups is, zo als de enkele langen hairen, waarmede zy bezet is, in haare eerste huid geelachtig wit. Naa het afleggen van deze huid is zy iets hairiger, en bleek geelachtig bruin, en naa de tweede verandering van huid genoegzaam geheel zwart; maar over den rug loopt eene heldere linie, en de *Kop* is, zo als ook de *pooten*, reeds rood. Voorts is zy van eene bruine kleur, en blyft, den winter over, tot in de volgende Lente liggen, en is onder de Winter-rupsen te rekenen. *ald.* De grootste dezer rupsen hebben, in het kruipen, de lengte van ruim 2 duimen. Haare grondverwe is bruinachtig-zwart, en op de bovenvlakte van ieder ring vertoont zich, na vooren toe, een paar eenigzins verheve, bruinachtig-okergeele, hoekige vlakken, bezet met korte hairen van dezelfde kleur. Op de zyde-vlakten van ieder ring wordt men 3 verheve ronde wratten gewaar, welke onder elkander staan, en dus in de lengte 3 reien vormen, waarvan de bovenste of eerste rei uit iets grooter wratten, dan de overige bestaat. Deze zyn rondom met bruinachtig geele lange en styve borstelhairen bezet. De *bals* of het kleinste voorste lid is, van boven, aan het voorste deel, slechts met 2 dergelyke, doch veel kleiner wratten voorzien, en de 9 *luchtgaten* ter wederzyde schynen zo veele witte punten. Haar *Kop*, even als de 6 spitze *klaauwpooten*, en de overige 10 *stompe pooten*, zyn bruin rood. Zich ingesponnen hebbende in een doorzichtig weef en wit weefzel, niet ongelyk aan eene hangmat, blyft ze wel 6 of 7 dagen, geheel

heel, te zamen gekrompen, en als opgezwollen liggen; dan strookt zy de rupfthuid eensklaps af, en wordt eene *Pop*, welke tamelyk dik, en van agteren met eene staartspitze voorzien is; hebbende de *Pop* eene dofzwarte koleur. Naa verloop van 14 dagen kwam 'er de *Vlinder* uitte voorschyn, *ald.* 160. welke den naam draagt van *ongemeen schoonen koolzwarten, met witte vlakken en Oranje-geele zwartgevolakte Ondervleugelen, benevens een carmynrood Achterlyf*, en beschreeven wordt, IV. 155. 156. De *bovenvleugels* zyn, even als het *borststuk*, in den grond koolzwart en wit gevlaakt; *ald.* doch aan eenigen, inzonderheid de *Wyfjes*, vallen deze witte plekken ook iets in 't zwavelgeele, *ald. aanm.* De *Ondervleugels* zyn altoos zeer schoon en hoog Oranje-geel; in dezelve ziet men, behalven een zwart punt, 6 in grootte en vorm verschillende zwarte vlakken, die aan het buitenst stomp einde nog in grootte verre overtroffen worden door eene zevende vlak, in welke men, aan den rand, 2 langwerpige oranje-geele vlakjes kort by elkander ziet; *ald.* 155. welke wel eens veel uitgebreider, en geheel te zamenhangende zyn, *ald. aanm.* Het *achterlyf* by 't *Mannetje* is tot over de helft hoog carmynrood; en 't overig gedeelte, na den kant van het *borststuk*, in 't oranje-geele verdreeven. Aan de *Wyfjes* is het *achterlyf* gemeenlyk hoogrood; en beide hebben, op de oppervlakte, eere rei zwarte punten. De *Sprieten* zyn vedervormig en zwart, doch aan de *Wyfjes* vry wat smaller, dan aan de *Mannetjes*, *ald.* 155. 156.

Beeren-rups, (de *zwartbairige*,) benevens *haare verandering tot ineen Vlinder*,

behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 184. *enz.* Zy heeft den raam van *Beeren-rups* verkreegen, om dat ze met zuilte lange en zo menigvuldige hairen bezet is; *ald.* 184. Zy onthouden zich meest om laag, en gebruiken het naaste beste kruid tot spyze. De *Eieren* zyn, inzonderheid van boven, mooi rond, en in het eerst witachtig van koleur, doch worden naderhand donkerer. De grootste dezer *rupsen*, uit dezelve voortkomende, en haaren wasdom bereikt hebbende, zyn dikwils meer, dan 22 duim lang, *ald.* 185. Het *Hoofd* is blinkend zwart van koleur. De grondverwe van 't gansche *lyf* is dofzwart. Op ieder ring ziet men, ter wederzyde, 3 overdwars staande, verheve, blinkende, graauwe knopjes; en benevens ieder onderste knopje vertoont zich nog eene in de hoogte langwerpige ronde en bleek-geele Spiegelvlak. De 3 eerste *ringen*, van 't hoofd af, zyn met louter geellichtig-roode hairen bezet, en van onderen langs den buik, loopt 'er een streep van diergelyke hairen tot aan het achterste lid. De overige hairen, waarvan de langste meer, dan een halven duim lang zyn, zien 'er zwart uit, doch derzelver uiterste einden zyn eenigzins muisvaal. De *Pooten* zyn van koleur gelyk, en meer zwart, dan bruin te noemen, *ald.* 186. Haare verandering in eene *Pop* geschiedt in *July* of *Augustus*, naar maate dat deeze *rupsen* vroeger of later haaren volkomen wasdom hebben bereikt, 187. *aanm.* Aanvanglyk ziet 'er deze *Pop* helder groenlichtig-graauw uit, maar wordt wel haast donkerer, en binnen 't half uur geheel zwart. Zy is zeer dik van *lyf*, zelden mee, dan een duim lang, en

van

van achteren met een kort staartpuntje voorzien. Zy blyft doorgaans by de 4 weken in haar spinzel beflooten, eer de *Vlinder* zyne volkomenheid hebbe, en 'er uit breeke; *ald.* 188. Deze uit zyn Poppevlies gekroopen zynde, moet nog eerst door 2 wanden heen breeken, eer hy de vrye lucht kan genieten, te weeten het dubbele spinzel, *ald.* 189. De *Bovenvleugel* heeft, op zyne bovenzyde, eene oker-bruine grondverwe, die by den een' iets donkerer, en by den anderen iets helderer is. Door dezen bruinen grond loopen eenige geelachtig-witte, hier en daar gekromde streepen, die vaneene ongelyke breedte zyn. Om trent den buiten rand ziet men 2 zodanige streepen, die elkander in het midden doorkruisen. Aan den voorsten rand staat eene grooter, en meer na het lid toe een kleiner witte streep of vlak. Wat nader aan het lyf loopt een veelvuldig gekromde streep dwars door den ganschen vleugel, en van daar een naar de lengte tot in den naasten dwarsstreep aan den buiten-rand. Kort aan het lid ziet men nog etlyke smalle streepen, zo in de lengte, als overdwars, *ald.* 189. De grondverwe der *Ondervleugelen* is schoon hoog menie-rood: in ieder vleugel ziet men 6 groote en kleine blaauw-achtig blinkende zwarte vlakken, die alle zeer reder geelachtig-rood geboord zyn. Van deze vlakken zyn de drie, aan den voorsten rand staande, de grootste. Het *voor-* en *achterlyf* zyn niet van eenerleie kleur. De grondverwe van het *voorlyf* is koffi bruin, rond van gedaante, dik en redelyk hairig. De *Kop* is niet zeer groot, ros-bruin van kleur, en met een paar zwarte *oogen* voorzien, boven welken 2 geelachtig-witte *Sprieten* staan. Een smal kaneel-kleurig

boordzel onderscheidt den kop van den *bals*; en deze vertoon't eene soort van *kraag*, die donker-bruin, en met een breed kaneel-kleurig boordzel omzoomd is. De *Rug* is donker-bruin, breed en hairig. Op de boven zyde van het *achterlyf*, dat schoon menie-rood en hairig is, ziet men 5 overdwars staande, langwerpige zwarte vlakken, de eene achter de andere, byna in gelyken afstand. Van onderen is zo wel het *voor-* als *achterlyf* met Menie-roode hairen digt begroeid, zo als mede de *bovenschenkels* der 6 aan het voorlyf zittende *Pooten*. De *vleugels* zyn van onderen genoegzaam even als van boven getekend, behalven dat 'er de kleuren van onderen niet zo regt schoon en frisch uitzien, *ald.* 190. De *Sprieten* zyn by 't *Mannetje* breeder en korter, en by het *Wyfje* langer en smaller, *ald.* 190. *Besmet-vlieg*, anders de *Aas-* of *Vleesch-vlieg*; II. 566. heeft dezen naam gekregen, doordien ze verscheide dinge, inzonderheid vervuuld vleesch en ander Aas, met haare Eieren besmet. De *Hollanders* noemen deze vliegen gemeenlyk, *Brommers*, *Madenschuyters*, *Keizers.* enz. *ald.* 567. Haare eieren zyn geelachtig-wit, en de gestalte langwerpig. Op den eigensten dag komen 'er al de jonge *Maden* uit, die, binnen 2 dagen, driemaal grooter worden, en bereiken in 9 dagen haaren volkomen wasdom, *ald.* 571. Schoon het spitze deel der *Made* na geen *Kop* gelyke, is het nogtans dat gedeelte, waar door zy haar voedzel tot zich trekt; en, dit geschiedende, beweegt zich de zwarte streep in dit spitze deel, geduurig heen en weder, of van vooren na achteren, of van achteren na vooren. In 't midden van het *Lyf* ziet men, door de geelachtig-

g witte *luid* heen, eene groote rood-
 chiep *huire* vlak, welke de *Maag*
 aanduidt. Van den *Kop* af, neemt de
 Made allengskens in dikte toe, zynde
 haar gansche *lyf* van eene kegelvormige
 gestalte. Dit bestaat uit 12 *ringen* of
 leden; *ald.* op de beide bovenste ziet
 men een paar roode vlakjes, en vandaar
 door 't midden van het *lyf*, tot byna
 aan de helft, een bruinächtigen streep,
 welke niets anders is, dan de *Endel-*
darm, die even als de *Maag*, door de
 Maden huid schemert, welke met 12
 wrattenvormige spitsjes bezet is. Haare
Pop heeft de gedaante van een eivormig
 Tonnerre. In het begin is deze *Pop-*
*pen*huid nog wit en week; maar neemt,
 naderhand, van uur tot uur, toe in
 hardheid, en de koleur wordt teffens
 allengskens donkerer. Dezelve is eerst
 helder rood, maar eindelyk donker bruin-
 rood en blinkend: doch de tedere
 dwarsstreepjes vindt men eenigzins dof
 zwart graauw. Deze *Poppen* blyven 9
 of 10 dagen liggen, wanneer'er *Vliegen*
 uit te voorschyn komen. In het eerst
 hebben deze rog kleine en bekrompe
vleugels, maar krygen, binnen een half
 uur, hunne behoorlyke grootte en sty-
 vigheid, *ald.* 571. 572. De byzondere
 dikte van het *achterlyf* is het voornaame
 kenteken der *Wyfjes*, zynde het voorts,
 ten opzichte der koleure en der overige
 gestalte, volkomen gelyk aan 't *Manne-*
lyf. De koleur van 't *Achterlyf* onder-
 scheidt deze soort van *Vliegen* van alle
 anderen; hebbende hetzelfde op zyne
 bovenvlakte eene helderblauwe vlak,
 welke niet zonder glans is; is voorts helder
 en donker afchgrauw, en met 2 grove
 zwarte dwarsstreepen doortoogen, *ald.*
 573. Voor 't overige is dit *Achterlyf*
 et slyve hairjes bezet. Het voorste

lid daarvan is gansch zwart. Over het
 zelve liggen 2 schubbenvormige plaat-
 jes, welke, naar het gevoelen van zom-
 migen, het suizen en brommen dezer
 vliege, in haare vlucht, zouden ver-
 oorzaaken. Onder dezelve zit een klein
 kolvenvormig deel, of een op een steel
 staande rond knopje verborgen. Aan
 het *Voorlyf* of *Borststuk* is niets blaauws
 te bespeuren, maar 't heeft eene afchgrau-
 we grondverwe, die op de bovenvlakte,
 in de lengte, met zwarte streepen door-
 toogen, en hier en daar met hairjes
 bezet is; waar onder de 6 zwarte *Poo-*
zen, en ter wederzyde de 2 doorzichte-
 ge, met verschillende koleuren, en met
 zwarte aderen doorweeven *Vleugels*
 hunne inleding hebben, *ald.* 574. De
 beide rood-bruine *Oogen* maaken het
 grootste deel van den *Kop* uit. Tusschen
 dezelve ziet men een okergeel *Voorhoofd*,
 en daar onder draagt de *Vlieg* een *slurp*,
 om te zuigen en te likken, *ald.* 574.
 Die bestaat uit 2 deelen, waarvan het
 een breed en kort, en 't ander lang en
 smal is; is meer oranje-geel, dan geel.
 Deszels voorste of lange deel wordt van
 vooren breeder en hartvormig; door 't
 midden loopt, in de lengte, een bruine
 sleuf, en aan den buitenrand is hy met
 tedere hairjes bezet, *ald.* 575. 575. De
 doorzichtige huid, waaruit de *Oogen*
 bestaan, heeft zeer veele verheve en
 zeshoekige afdeelingen, die allen een
 rond of verheven glas vertoonen, *ald.*
 577.

Bidpaapje, zo wordt het zo genoemde
wandelende-blad genoemd, IV. 66.
aamm.

Blad, zie *Wandelend Blad*.

Blad, het *vliegend geele*, zo zou men niet
 oneigenlyk den byzonder schoonen zwa-
 velgeelen dagylinder kunnen noemen, III.

233. Zie *Dagvlinder*, de byzonder *fchoone zwavelgeele*.

Bladkever, de *blaauwe*, zie *Keverworm*, de *gezellige*.

Blad-Kevers, *kentekens en eigenschappen derzelve*, als mede van de *wormen*, waaruit zy voortkomen, II. 127. enz.

De plaats, daar zich deze Insecten onthouden, zal hen, buiten twyfel, aanleiding tot deze benoeming hebben gegeven; dewyl ze niet alleen als *Kevers*, maar ook als *Wormen*, meendeels, op het loof, het gras en de bladeren der boomen zyn te vinden, *ald.*

Blad-made, (de *bleek-okerkoleurige*,) *benevens haare verandering in eene fchoone geele vlieg*; II. 560. enz. wordt niet boven een vierde van een duim lang, en is bleek, of flecht okergeel van koleur, en in de lengte met eenige graauwe streepen doortoogen. Haar *lyf* is tamelyk dik, van vooren zeer spits toeloopeude, en deze spits, welke zy geduurig uit en intrekt, is zwart; van achteren heeft ze in tegendeel eene stompe breedte, waaraan men van boven weder eene spits befpeurt. Zo verwulfd als de bovenzvakte van haar *Lyf* is, zo plat is de ondervlakte, op welke zy voortkruipt. Hiertoe bedient zy zich van geene *Pooten*, dewyl haar die ontbreken. Doch het geen haar, by mangel van pooten, mist, weet zy te vergoeden door een taai en kleeverig flym, dat dit Insect van vooren fchynt uit te geeven; want door behulp daarvan kan ze aan 't gladfte lichaam blyven hangen, en over het gansche lyf is zy zo kleeverig, als de flakken, *ald.* 561. Veranderen willende, houdt ze den spitzen kop ingetoogen, en is als volkomen verflyfd, *ald.* 562. hebbende de gedaante van kolfvormige poppen, zonder mer-

kelyke afdeelingen en vleugelfcheden *ald. aanm.* Naa verloop van 12 of 14 dagen komt 'er de *vlieg* uit, *ald.* Haar fmaai, lang, dik *Achterlyf* heeft eene fchoone Citroen-geele grondverwe; en dezelfs leden vertoonen verfcheide dwarsstreepen of vlakken, van eene ongelyke breedte. Het *Borstftuk* is, op zyne bovenzvakte, wel zwart, maar heeft eene bezooming; en onder hetzelve hebben de 6 *pooten* hunne inleding, welke meestal Oranje-geel uitvallen. De *Kop* is tamelyk groot, van vooren met eene geele verhevenheid of voorhoofd voorzien. De groote *Oogen* in het zelve zyn bruin, en tuffchen dezelve ziet men 2 naauwlyks zichtbaare *Spriet-haartjes*. Haare *Vleugels* zyn zo dun en doorzichtig, dat 'er de koleur van het *Achterlyf* duidelyk doorheen fchittere. Zy heeft geen ftevig *Voedzel-angel*; maar is met een *zuiger* of slurp voorzien. In het zitten houdt ze haar lyf nooit ftill, maar beweegt het beftendig op en neder, *ald.* 563.

Bladwesp. zie by *Basterd-rups*, de groote *bleek groene*.

Bladwesp. (geele) zie by *Basterd-rups*, de geele en groene.

Bladwesp. (het *Wyffe* der,) befchreeven, II. 518. Het onderscheid tuffchen dit en het *Mannetje*, aan het *Achterlyf* van 't *Wyffe* te zien, beftaat daarin, dat alle dezelfs *ringen* bleek-geele zoomen, in een gladden en zwarten grond, hebben; mitsgaders dat de *ondervlakte* niet bruin rood, maar zwart, en 't laafte lid geheel Oranje geel is. Aan dit laafte lid ontdekt men den zaagvormigen *Leg angel*. Deze beftaat uit 2 evengelyke, eenigzins gekromde, doorzichtige *bladen*, die byna de gedaante van een S uitmaaken, en in het mid-

midden eene iets donkerer Ader hebben, dan de overige koleur is; en met veele tedere, schuins loopende streepjes doortoogen zyn. Aan den binnenrand zyn deze beide bladen doorgaande met scherpe tanden, als een grote zaag, bezet, waarmede zy de boombladeren opzaagt of opent, om 'er haare *Eieren* in te brengen, vattende het blad, met haare 6 geelachtig-roode *Pooten* altoos derwyze, dat haar kop tegen den steel aan ligge, en de ingetande kant van het blad tegen haar *lyf*, *ald.* 519. Deze *Eieren* zyn bleek, blaauwachtig groen van koleur, eenigzins plat, en daarby langwerpig rond; en, naa omtrent 8 dagen, komen de jonge *Rupsen* uit, *ald.* 520.

Bladwikkeler, zo wordt, van zommigen, de *Rups* van de vierde classe der *Nachtvlinders* genoemd, welke de groene bladeren tot haare wooning verkiest, I. 516. 517.

Bladwikkeler, (de dikke groenachtig-graauwe,) die zich op de *Wilgenboomen* onthoudt, benevens haare verandering tot in een *Vlinder*, I. 504. 525. De *Wyfjes-vlinder* dezer *Rupsen* legt zyne *Eieren* enkelvoudig in het hartje van een frisch uitspruitzel, en als de tedere blaadjes zich beginnen uit te breiden, spint het daarin zittend, en reeds gebooren zynde jonge *Rupsje* dezelve rondom zich te zamen; en, naar maate het sterker en grooter wordt, verkiest het ook grooter bladeren, die het zo weet te draajen en rondom te wikkelen, dat ze, in eene slakkenvormige linie buitenwaarts gerold, aan elkander vast blyven. Haare volkomen grootte bereikt hebbende, is zy, zelden, meer dan een half duim lang. Haar *lyf* is van eene ongelijke dikte; want van

vooren, omtrent in 't midden, heeft zy eene soort van bochel; na den kop toe wordt ze eensklaps spits, en na achteren allengskens dunner en snaller. De *Kop* is helder-bruin van koleur, en heeft van vooren een paar zwarte *oogpunten*. De snalle *Hals* is, by de meesten, digt aan den *Kop* wit; doch het gansche *Lyf* graauwachtig groen. Over den *Rug* loopt een breede streep, veel helderer, dan de grondverwe, en wederzyds een helder-bruin boordzel, verciert met eenige donkerer punten. Van achteren, alwaar de *rugstreep* snaller toeloopt, eindigt deze in 2 zwarte streepjes. De 16 *Pooten* zyn van koleur, als het *Lyf*. Wanneer ze verandert, maakt ze in haare bladeren-wooning een wit *spinzel*, van vooren even als een beitel scherp toeloopende, in 't midden dik, en van achteren hoe langer hoe snaller; neemt, binnen 2 dagen, de gedaante van eene *Pop* aan. Deze is tamelyk klein, en loopt van achteren en van vooren rond toe, zonder eenige spitzigheid; doch haare roodachtig-bruine koleur is op de vleugelscheden iets donkerer. Binnen 14 dagen of 3 weken komt de *Vlinder* te voorschyn, wiens *bovenvleugels* in het gras-groene vallen; en het buiten-boordzel zo wel, als de *Kop*, het *Lyf* en de *ondervleugels* zyn witter, en bezitten niets geels; waartegen de *Pooten* eene bruinachtig-geele koleur hebben, *ald.*

Bladwikkeler,) de groenachtig graauwe, donker- en helder-gefrepte, op de grote brandnetel,) benevens haare verandering tot in een *Vlinder*, I. 553. enz. Deze *Rups* volwasfen zynde belooft haare grootste lengte, in 't kruipen, op één duim. Zy is wat rank, en zeer behendig in het kruipen, kunnende zich,

zo wel na achteren, als na vooren even snel beweegen, gelyk de andere Rupsen dezer *vierde klasse*. Haare grondverwe is bleek geelachtig-graauw, maar die koleur valt hier ook iets in 't groenachtige. Door alle de *leden*, den hals en het laatste lid uitgenomen, loopt een gelyk breede zwart-graauwe streep, in de lengte, over het midden van den *rug*, die ter wederzyde een smal helder boordzel heeft; waarop een donkere streep volgt, die na beneden toe in den helderen grond verdwynt. De *bals* is ter wederzyde met een zwart vlakje, en de gansch zwarte *Kop* met 3 kleine okergeele vlakjes voorzien, de 16 *Pooten* hebben de grondverwe van het lyf. Wanneer haare eetlust begint te vergaan; verandert haare eerste koleur in eene roode vleeschkoleur, en aan beide de zyden wordt men, op ieder ring, een wratje gewaar, doch de bals behoudt zyne vlakjes, en de kop blyft als vooren. Hierop verschuilt ze zich in een wit doorzichtig spinzel, waarin eindelyk de roode in eene geelachtig-witte koleur verandert. In deze gedaante blyft zy, als Rups, den ganschen winter door, tot in de maand *Mai* of *Juny*, verandert dan in eene Pop, en verwisfelt haare voorige groenachtig-witte koleur in eene Oranje bruine. De *Pop* zelve is rank van lyf, en de *Kop* wordt 'er zeer duidelyk afzonderlyk aan gezien; van achteren heeft ze een Staarpunt. Naa omtrent 14 dagen verschilt haare koleur eenigzins, en men ziet op de vleugelscheden verscheide zwarte vlakken doorschemeren. *ald.* 553. 554. Het *voorlyf* en de *Kop* van het *Mot-uilje*, daaruit voortkomende, hebben eene heldere Oranje-geele grondverwe; de *Oogen* zyn zwart; de *Spruiten* harvormig, en

op den *Rug* ziet men, voorwaarts, eene verdeelde, en daar achter eene halve maanswyze zwarte vlak. Het *achterlyf* heeft, op alle de leden Oker geele streepen, welker tusschenruimte donker-graauw gevuld is, en wel derwyze, dat beide die koleuren in elkander versmelten. De grondverwe der 4 *vleugelen* is blinkend wit. De 2 *bovensse* zyn, aan den voorsten rand, met 2 zwarte Aderen voorzien, wier tusschenruimte geel is. De buitenrand is zwart bezoomd, en kort daarby ziet men eene rei wiggeschulpte vlakjes van dezelfde koleur. In de overige witte ruimte des Vleugels ziet men nog andere zwarte vlakken, ten getalle van vier of vyf. De *Ondervleugels* hebben een wit boordzel, en daarop volgt een zwarte zoom van dezelfde breedte; voorts eene rei kleine geschulpte vlakjes, en naa eene breede ruimte ettelijke grootere vlakken, *ald.* 555. De bovenschenkels der 6 *Pooten* zyn van eene helder-graauwe koleur. De *Zuiger* is tamelyk lang. Het onderscheid der *geslachten* is kenbaar aan de dikte van het *achterlyf*. Zy paaren kort naa hunne geboorte, en het Wyfje legt weinig dagen daarna zyne bevruchte Eieren, aan de onderste zyde van de Netelbladeren, 556.

Bladwikkeler, (de groene, met kleine zwarte punten,) die zich in de Eikenbladeren onthoudt, benevens haare verandering tot in een Vlinder, behorende tot de VIERDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 520. enz. De Eieren zyn geel van koleur, eivormig rond, en met veele onregelmaatige, hoekige groefjes voorzien, *ald. aanm.* Naa verloop van 8 of 12 dagen werden de jonge rupsjes daaruit geboren; en 4 of 5 mail verveld hebbende, 521. *aanm.*

beloopt haare lengte omtrent $\frac{3}{4}$ duims, of 7 linien. Dit rupsje, deze grootte bereikt hebbende, maakt van het *Eikenblad* eene wooning, en wikkelt het meer, dan eens te zamen, door middel van veele digte draaden, die het zelf spint, zo dat het eene overdwars of schuins staande rolle uitmaakt. De *Kop* is blinkend zwart, en de *Hals* helder-bruin: de *ringen* zyn helder-groen, en met veele zwarte punten bezet. De 6 spitze *Voorpooten* zyn zwart, en de 8 stompe *Buikpooten* en de *Naschuivers* geelachtig-graauw, I. 521. Kort voor de verandering maakt deze Rups, in het omgewikkeld blad, meer *spinzel* om zich heen, *ald.* 522. zynde wit, en zeer zacht op het gevoel, *ald. aanm.* en verandert, naa eenige dagen, in eene *Pop*. Deze is zwart-bruin, *ald.* 522. maar wordt eindelyk gansch zwart, *aanm.* is aan 't einde van haar spits toeloopend *achterlyf* met een gespleeten staartpunt voorzien, doch haare leden zyn met verheven streepjes getkend, *ald.* of eigenlyk is dit staartpunt, aan 't achterste lid, een stomp, breed, en met styve hairtjes bezet deel, *ald. aanm.* Naa dat de *Pop* 14 dagen heeft gelegen, komt daaruit een schoon blinkend-groen *Motvlindertje*, waarvan de *Bovenvleugels*, benevens, het *voorlyf*, groen, doch het *Achterlyf* en de *Ondervleugels* grauw zyn. De smalle zoom aanden buitenrand der vleugelen is aan alle vier wit, maar de voorste rand der beide bovenvleugelen is, na het lid toe, geelachtig. Deze koleur heeft ook de *Kop*, waaraan men een paar zwarte *Oogen*, en 2 hair-dunne *Sprieten* gewaar wordt. 'T Wyfje overtreft het Mannetje in 't achterlyf. De *Zuiger* is zo kort en teder, dat men 'er, met de bloote

oogen, naauwlyks eenig teken van kan vinden, *ald.* 522. 523.

Bladwikkeler, (de groote groene,) op de groote brandnetel, benevens haare verandering tot in een Vlinder, behooren de tot de VIERDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 526. De *Eieren*, waaruit deze soort van rupsen voorkomen, worden van den Moeder-vlinder enkelvoudig op de bladeren van de groote *brandnetels* gelegd. Nauwlyks zyn 'er de jonge rupsjes uitgebooren, of zetslen hunne eerste pooging al in 't werk, om een hoek van 't blad, door hun spinzel, te zamen te trekken. Het binnenste deel van deze wooning dient der Rups tot spyze, 526. Zy verandert verscheide maalen van huid, en, haaren volkomen wasdom hebbende, beloopt haare lengte, menigmaal, iets meer dan één duim. Haar rank lyf wordt, na vooren en achteren, allengskens dunner; de *ringen* zyn door diepe inkervingen onderscheiden, en de grondverwe is eenigzins vaal-groen. De kleine *Kop* is eenigzins bleek geelachtig-bruin, en heeft ter wederzyde een zwart bruin puntje, welke de *Oogen* zyn. De 8 paar *Pooten* zyn geelachtig van koleur; doch de stompe *buikpooten* en nog meer de *Naschuivers* zyn langer en ranker, dan aan andere rupsen. Midden over den rug loopt eene tedere linie, en alle de *ringen*, den *Kop* uitgezonderd, zyn met eenige, niet zeer digt by elkander staande, graauwe hairen bezet, *ald.* 527. De *Pop* is, gelyk de rups rank en dun, van achteren met een staartpunt begaafd, en blinkend, donker-rood-bruin van koleur. Veertien dagen, of, naar maate van de warmte, ook wel 3 weeken daarna, komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn. Deszelfs grond-

grondverwe, zo van het *Lyf* als 'der 4 vleugelen, is bleek-oker-geel, doch de laatste hebben een zeer schoonen in 't roode speelende glans. De overige cie-raaden der vleugels bestaan in 4 overdwars loopende graauwachtig-bruine golf-wyze vlakken. De *Spriet*en zyn hairvormig, en de 6 *pooten* hebben dezelfde koleur van het gansche lichaam. De *Oogen* zyn bruin, en de *Zuiger* is eenigzins lang, *ald.* 528.

Bladwikkeler, (de zwarte,) met witte punten, die zich op de Kerseboomen onthoudt, met de verandering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de VIERDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 523. enz. Zy gebruikt de kerfen- en eiken-bladeren ter spyze, *ald.* en *aanm.* Haare lengte beloopt wel $\frac{3}{4}$ duim, en heeft een doorgaande dof-zwarte grondverwe. De *Kop* is blinkend zwart; doch de *Hals* bruin. Zy heeft witte streepen. Onder de 16 *Pooten*, zyn de 6 voorste en de 2 achterste zwart, maar de 8 andere aan den buik zyn bruin, *ald.* 523. Zy spint zich in een zacht wit spinzel in; *ald.* *aanm.* De *Pop* is zwart, 523. maar is op den rug van de leden des *Achterlyfs* met verscheide kleine doornpunjes, en achter aan het spitze staartpunt met eutelyke kromme hairtjes voorzien, *ald.* *aanm.* Na 14 dagen komt 'er de *Vlinder* uit. Deszelfs koleur is doorgaande blinkend graauwachtig-bruin; van de *Vleugels*, die ten eenemaal onbevoord zyn, hebben de bovenste, na den buitenrand toe, 2 donkere hoekige vlakken, en in het midden aan den voorsten rand een iets kleiner. Het gansche *Lyf* is met de *Ondervleugels* eenkoleurig. De *Pooten* zyn, gelyk de *Kop*, bruin, aan welken 2 hairvormige *Spriet*en ziten, *ald.* 524.

Bladwikkeler, (de zwarte,) met witte punten bestippelde, op de Wilgeboomen, benevens haare verandering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de VIERDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 537. enz. Deze volwassen *Rups* is ruim $\frac{3}{4}$ duim lang; heeft een zwart rank *lyf*; de *ringen* zyn heen en weder met witte punten bezet. Zy heeft, even als andere rupsen, 16 *pooten*, blyft; ten tyde van haare verandering, tusschen de bladeren liggen, en verandert aldaar in eene *Pop*, *ald.* Deze is langwerpig van gedaante; het *voorlyf* en de vleugelscheden zyn zwartachtig, doch het *Achterlyf* is doorgaande bruinachtig geel-rood en zonder staartpunt. De ronde *Kop* van den *Vlinder* is zwart, en met een wit ringetje omgeeven; en vooraan den *Bek* heeft hy een wit vlakje. De *Spriet*en, zo wel aan het Mannetje, als aan het Wyfje zyn hairvormig. Het *Voorlyf* heeft, mer de bovenste helft der grootte *Vleugelen*, eene bleek oker-geele koleur, die zich echter niet geheel tot aan den buitenrand uitstrekt. Boven op het *Voorlyf* heeft hy een verdeeld *Pinnetje*, uit wederstok te zamen gesteld, en het is aldaar graauw besprenkeld. Het *Pinnetje* zelf is bruin, en heeft, in het midden, een geel ringetje. Voor 't overige bestaat de eene helft der bovenvleugelen van het *Wyfje* uit blaauwe, geelachtig bruine en zwarte vlakken, trekken en punten, welke, nu uit het heldere in 't donkere, en dan uit het donkere in 't heldere vallen; doch de buitenste donkere rand der *bovenvleugelen* is met een iets helderer zoom omgeeven. De *Ondervleugels* zyn gansch bruin, en met een geelen zoom voorzien; het *Achterlyf* is graauw, en

ieder lid van 't zelve vertoont een hielderer ring, *ald.* 528. 529.

Blinkende Eikenrups, (de *Eikenrups*, de *blinkende*.

Bloedzuiger, zie *Vis-egel*.

Boekeboomen-rups, (de uitneemend schoone geelachtig-groene,) benevens haare verandering, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, IV. 119. enz. Deze wordt alleen in *September* en *October* op de Boekeboomen gevonden, wier groene bladeren haare eigenlyke spyze zyn. De grootste *lengte*, die ze bereikt, is één duim en 2 liniën. Zy is ongelijk dik van *lyf*; in het midden iets dikker, dan van vooren, en van achteren dunner, *ald.* 119. De *Kop* is tamelyk groot, glad en rond van gedaante; deszelfs koleur is schoon dof groen, en ter wederzyde wordt men ettelijke zwarte puntjes of *oogjes* gewaar. Het gansche *Lyf* heeft over het algemeen eene geelachtig-groene grondverwe. De *Hals* is, aan den voorsten rand, met een geelen zoom omgeeven, en vooraan verschynt een hoog-carmynrood boordzel. Aan ieder zyde van het *bovenlyf* ziet men eene grove hoog-geele linie, voortloopende tot in de naschuivers, en den Staartklep als een boordzel omringende. De *Naschuivers* hebben, omtrent het midden, nog een schoon hoog-rood streepje, nevens den groenen grond. De *bovenvlakke van het Lyf* is, op alle de ringen, met veele kleine geelachtig witte punten bezaaid, waarvan zommige aardige ruiten of vierkantjes vormen. Even dergelyke punten zyn 'er ook, op iedere *zytvlakke*. De 6 spitze *Voorpooten* zyn wiachtig groen, doch na het spits einde met zwarte puntjes besprenkeld; en de 4 paar breede en stompe *Buikpooten* zyn wiachtig met

eenig rood doormengd, *ald.* 120. Haar *Spinzel* is bleek geelachtig-roodbruin, nu helderer dan donkerer, *ald.* De gansche *ruggevlakke der Pop* is schoon donker violet-blaauw, welke koleur zich, ter wederzyde, allengskens in het roozen roode verliest; die aan de *ondervlakke* in het geele verandert, en zo is het ook met de vleugelscheden gelegen. Aan het *achtereinde* heeft ze geen staartspits, en de *buid* is teder en week, *ald.* 121. De *Vlinder* heeft eene schoone geelachtig groene grondverwe; en het *Voorlyf* is met dezelfde koleuren overtoogen, maar heeft, aan den rand der schouderbladen, en des kraags, eene witte bezooming. Op de *bovenvleugels* ziet men, van vooren, eenige schuins nederwaarts loopende, deels geele, deels heldere en donkere groene streepen en liniën. Door 't midden loopt een streep, welke, van de roozenroode bezooming des achtersten, en voorsten rands, tot verre in den vleugel gaat. De *buitenrand* heeft, behalve eene tedere witte linie, aan 't einde ook nog een carmynrood boordzel; en de roozenroode bezooming van den *achtersten rand* wordt, na de inleding toe, breeder en wit; maar aan 't gelid zelf ziet men een geel en roozenrood vlakje, *ald.* 121. De tedere *Sprieten*, de kleine *Kopspitzen*, de *Oogen* en de 6 *Pooten* zyn alle roozenrood. De *Ondervleugels* hebben eene bleke oranje geelachtige grondverwe, die aan den buitensten hoek wat helderer uitvalt; en zyn aan den achtersten rand met eene witte bezooming voorzien. Het *achterlyf* is meergroen, dan geel, en deszelfs dikte onderscheidt het Wyfje van het Mannetje, *ald.* 122. *Bonner*, (*Carel*,) heeft, door eene veeljarige beschouwing van de heerlyke schikking.

king der gansche natuure, geleerd, dat zy geen oversprong gedooge, maar door onmerkbaare trappen ieder geslacht en ieder enkel lid met den anderen verbindende; en dat 'er altoos tusschen 2 aangrenzende geslachten of Classen *eenige middeldingen* der Natuure worden gevonden, die noch tot de ééne, noch tot de andere zyde behooren, maar alleen schynen te dienen, om ze aan elkanderen te verbinden, I. 468. *enz. aanm.*

Bontverwige Pinnenrups, zie *Pinnenrups*, de *bontverwige*.

Boomrups, (de *gezellige*, *bruine*, *rood-hairige*, *schadelijke*,) *benevens* *baare verandering tot in een Vlinder*, behoorende tot de *TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS*, I. 306. *enz.* De aldergrootste wordt nooit meer, dan 1½ duim lang. De 4 middelste *ringen*, waaraan de Buikpoeten zitten, zyn iets dikker, dan de overige. Schoon de grondverwe der *huid* zwart-graauw zy, is echter het grootste gedeelte van het *Lyf* met korte hairtjes begroeid, welke op den *rug* bruin zyn, maar van onderen ter wederzyde donker-graauw. De *Kop* en de 3 eerste *ringen* zyn van eene rood-bruine kleur. Van den derden ring af, tot op het midden van den laatste, loopen over den *Rug* 2 rood geele evenwydige liniën, wier smalle tusschenruimte zwart is. De 2 laatste *ringen* op een na zyn, van boven, met een ménierood knopje voorzien, het welk de *Rups* beurtelings uisteecken en intrekken kan. Op den laatste ring, aan het einde der *rug*-liniën, staan nog een paar geelroode knopjes. Op beide zyden van den *Rug* is, zo ver de roode streepen loopen, eene rei witte vlakjes, of bosjes van witte hairtjes. Doch de *Kop* en *alle de leden* zyn nog, daarenboven, hier

en daar, met lange bruin-roode hairen begroeid. De kleur van alle de *Pooten* komt met die dezer hairen overeen, *ald.* 308. Haar *Spinzel* of weefzel is gansch doorzichtig, langwerpig rond van gedaante, en de kleur valt uit het witte in 't bruinachtige. De *Pop* is van vooren tamelyk dik, van kleur zwart-graauw, van achteren kort toegepunt, en eenigzins bruinachtig. Binnen 4 weken komt 'er de *Vlinder* uit, die wit van kleur, en alleen achter, aan de 2 of 3 laatste leden van het lyf, roodachtig Oker geel getekend is. Van de laatste kleur zyn ook de *Sprieten*, die aan het *Mannetje* iets breeder zyn, dan aan het *Wyfje*. By sommigen der *Mannetjes* bespeurt men op den *Bovenvleugel* eenige zwarte stippen. Het *achterlyf* van 't *Wyfje* is niet alleen veel dikker, dan by het *Mannetje*, maar deszelfs achterste lid is buitengemeen dik. Het *Voorlyf* en de *Bovenschenkels* der 6 *Pooten* zyn zeer hairig, *ald.* 309.

Boomrups, (de *gladde helder graauwe*,) *met bruine ruiten*, *benevens* *haare verandering tot in een Vlinder*, behoorende tot de *TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS*, I. 351. *enz.* De graauwe grond haarer *huid* is niet alleen wederzyds en achter op den den staartklep met onregelmaatige, donker-bruine vlakken voorzien, maar ook de *Rug*, van den derden of vierden ring af, tot aan de scherp toeloopende verhevenheid op den achtersten ring, met ruitvormig te zamen gestelde liniën, die insgelyks donker-bruin is, versierd. In ieder dezer ruitvelden staat in het midden een bruin vlakje. De verhevenheid op den laatste ring is, aan haaren laatste scherpen rand, rondom zwart bezoomd, *ald.* 353. De *Kop* is bruin, en rondom den

den hals zwart geboord. De *Pooten* zyn gezamenlyk bruinächtig van koleur, en de *ringen*, waaraan de 4 paar stompe *Buikpooten* zitten, overtreffen de overigen in dikte, *ald.* 352. De *Pop* is blinkend Oranje-geel; aan 't achterste lid heeft ze een kort staartpunt; en is naar geraade van haare lengte tamelyk dik, *ald.* 554. De *Bovenvleugels* van den *Vlinder*, die donker-bruin van grondverwe zyn, praalen met schoone, groote, vleeschverwige en geelächuige vlakken en streepen. De *buitenrand* is cierlyk gegolfd, en niet verre van dien ziet, men, aan een smallen groenen dwarsstreep, eene rei zwarte ringetjes, en in den vleeschverwigen streep eenige donker-bruine punten. Aan den voorsten Vleugelrand bevinden zich eenige zeer kleine, witte puntjes. De *Kop*, *Sprieten*, het gansche *Voor-* en *Achterlyf*, en de 6 *Pooten* zyn bruinächtig-graauw. Het *Voorlyf* aan den *Kop* en aan de leden der Vleugelen is donker-bruin bezoomd; en het *Achterlyf* op ieder ring met een zwart-bruin vlakje verciert. De koleur der *Ondervleugels* is gelyk met die van 't lyf; *ald.* 554. en ze zyn aan den buitenrand uigerond. De *Sprieten* zyn aan beide geslachten eveneens hairvormig, en van eene zelfde koleur, *ald.* 555.

Borstel rups, (de geele,) benevens haare verändering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 380 enz. De bladeren der Peereboomen zyn het aangenaamste voedsel voor deze Rups. Zy is, van haare eerste jeugd af, door alle vervellingen heen, zwavel-geel; en de allergrootste wordt, zelden, boven 1½ duim lang. De *Kop* is nog hooger geel en blinkender, *ald.* 380. doch by zom-

migen valt deze koleur in 't groene, en haar groote *Kop* is van anderen veel breeder; dan van boven, *ald.* aan. Ieder lid van 't lyf, den *Kop* uitgezonderd, is, op ieder zyde, met een verheven ronden knop voorzien. De 4de, 5de, 6de en 7de ring, van den *Kop* af, hebben een afgestompt hair-bosje, welk geel is, als de gansche huid. De inkervingen der ringen tusschen deze 4 hair-bosjes zyn fluweel-zwart, welke zwartigheid spits toeloopt. De 4 overige ringen verminderen allengskens in dikte. Het laatste lid heeft een langen en dunnen hairigen staart, is roozen-rood van koleur, en na achteren schuins opwaarts uitsteekende. De 3 ringen tusschen dezen staart, hebben elk, ter wederzyde, een kort dwarsstreepje, en zomwylen ziet men 2 dergelyke streepjes op ieder ring onder den anderen. De gansche *huid* van 't lyf, tot aan den *Kop*, is alom met geele en graauwe haren dun begroeid. De *Pooten* zyn geel van koleur, en de *onderzyde des buiks* is gansch zwart, *ald.* 380 381; doch by eenigen dezer Rupsen, helt die geele koleur na 't groene over, en door de zwarte ondervlakte des buiks loopt, gemeenlyk, eene helder-geelächuige, smalle linië, 381. *aann.* Het voorste deel der *Pop* is donker-roodachtig zwart, en 't achterste helder rood-bruin. De inkervingen der leden zyn verciert met geele streepjes. Boven op het lyf, midden over den *Rug*, staat eene digte rei korte en styve haren, bruin van koleur, Het laatste lid heeft een staartpunt, *ald.* 381. Het dikke *achterlyf* van den *Wyfjes-Vlinder* onderscheidt het van 't *Mannetje*. De *Sprieten* zyn aan beide geslachten eveneens, en zeer dun of hairachtig. De *Bovenvleugels* zyn graauw-

achtig-wit, gelyk de gansche Vlinder over het geheel. Dwars door dezelve loopen eenige bruine golfs- en zaagswyze linien, doorgaans 3 of 4 in getal. De bovenrand der boven- en *ondervleugelen* is met zwart-bruine punten versierd. De koleur van 't *Achterlyf* valt eenigzins in 't geel. De 6 *Pooten* zyn met hairige vezelen overtoogen, *ald.* 381. De *Eieren* zyn rond vangedaan-

te, helder bruin van koleur, en hebben ieder een ingedrukt puntje, *ald.* 382.

Borstel-rups, (de geelenroode,) met den *bruinen Kop*, en *ruitvormige zwarte rugcieraaden*. Haar *lyf* is schoon citroengeel, even als de 5 paar stompe *buikpooten*, maar de 6 *klaauwpooten*, benevens de *Kop* zyn blinkend bruin. Langs den rug ziet men eene rei byzondere ruitvormige witte vlakken, die eene zwarte bezooming hebben. Elke ring heeft zulke vlak, en op deze staan vele pyramiedeswyze borstels, rechtop in de hoogte. Sommige daarvan, voor- aan en in het midden staande, zyn carmynrood; doch de overige zo geel als het *lyf*. Dit heeft ter wederzyde nog eene rei tedere punten, en 'er schynen, behalve deze borstels, ook nog eenige andere hairen aan te zyn, IV. 33.

Borstel-rups, (de graauwe,) benevens *baare verandering tot in een Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 376. enz. Deze Rups is overal, met geelachtig-grauwe hairen begroeid. Ter zyde van den *Kop*; aan den hals, staan 2 zwarte spits toeloopende hair-bosjes, als een paar hoornen voorwaarts uitsteekende. Na den derden ring, van den *Kop* af, hebben 5 ringen, boven op den rug, ieder een vierkant, van boven afgestompt, hairbosje, *ald.* 377. Het voorste deel daar-

van is het hoogste en dikste, daarop volgt 'er een iets kleiner, en zo voorts tot het laatste toe. De beide zyden dezer bosjes zyn wit, maar boven zyn ze van achteren en van vooren zwart. Op het laatste bosje volgen 2 ringen, ieder met een Oranje-geel knopje voorzien. De laatste ring is met een langen staart, uit styve zwarte hairen te zamengesteld, en schuins na achteren opwaarts staande, versierd. Ieder lid heeft wederzyds 2 of 3 zwarte knopjes, rondom welke lange heldere hairen staan. Van onderen langs den buik ziet men 6 of 7 Oranje-geele punten, in eene evenredige linie. De *Pooten* zyn geelachtig-grauw, en de ondervlakte van den buik is met Oranje-geele vlakjes besprenkeld, *ald.* 378. Haar *Spinzel* is bruinachtig van koleur. De *Pop* is, van vooren tot achteren, over den rug, met rood bruine hairen begroeid, en aan het laatste lid met een lang staartpunt voorzien, *ald.* Binnen 3 of 4 weken komt de *Vlinder* daaruit voort. Deze is even zo van kleur, als de Rups van te vooren geweest is; heeft eene graauwe grondverwe, is met vele opgeworpe punten besprenkeld, en op de *Bovenvleugels* en het *Voorlyf* draagt hy verscheide witte, zwarte en Oranje-geele tekeningen; doch deze graauwe grondverwe der *Bovenvleugelen* is iets donkerer, dan die der overige deelen. Midden in den Vleugel staat een byna driehoekig witachtig vlakje, met 2 zwarte puntjes. Na den buitensten uitgeronden rand des vleugels loopt eene zwarte linie overdwars, en naast daaraan een Oranje-geel streepje. Na den kant des *Ondervleugels* staat een Oranje-geel vlakje. De *Sprieten* zyn zeer dun, zonder vedervezelen. De *Pooten* zyn hairig. Ongeveer 8. dagen naa de ver-

men-

menging met het Mannetje, legt het Wyfje zyne Eyeten, welke witachtig zyn, aan de wollen-wilgen, *ald.* 379. 380.

Borstel-rups, (de graauwe, met roode Knoppen versierde,) benevens haare zonderlinge verandering tot in een Worm-vlinder, behoorende tot de **TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS**, I. 382. enz. III. 78. enz. Deze Rups wordt aan de pruinen- en kwezeboomen gevonden, I. 382. ook op de Braambezen-struiken, *ald. aanm.* Haar gansche *Lyf* is byna overal even dik, 383. De *Kop* is blinkend zwart, en over het zwarte gebit met eene geelachtige lip, mitsgaders geele vreespunten voorzien; doch de graauwe hairen, waarmede de voorste rand van den eersten ring sterk bezet is, breiden zich zo dicht over denzelfden heen, dat zyne zwartigheid niet duidelyk gezien kan worden. De vederachtige bosjes staan aan de zyden van dien voorsten rand van den eersten ring op verheve deeltjes, die rood bezoomd zyn. Tusschen deze verheve deeltjes ziet men nog 2 andere, driehoekige roode bultjes kort achter den *Kop*. De lange hairen der vederbosjes vertoonen zich voor 't bloote oog wel, van boven aan de einden, als afgezengd; maar, door het vergrootglas beschouwd, hebben ze geene knobbeltyes, maar digte vezelige uiteinden, als pluimen, I. 383. *aanm.* Naa den tweeden ring, van den hals af, volgen 4 andere, waarop, in een gansch zwarten grond, 4 laage, plat afgestompte, geele (ook wel even zo bruinachtig geele) hairborstels staan. Van onderen, ter wederzyde van den buik, onder de 2 eerste rugborstels, steeken 2 paar lange en smalle hairborstels als riemen uit,

waarvan het voorste paar aan den 4den ring geelachtig wit is. Op het laatste lid is een zwarte, na achteren schuins uisteevende, dikke, en tamelyk lange staart, bestaande uit een bosje gekronkelde hairen, die schuins afgestompt, en van onderen aan den wortel helder zyn; en op de staartklep steeken nog 4 korter borstels achter uit. Tusschen de geele rug-borstels en de staart is de geboorde grond van den rug rood bruin, *ald.* 384. doch by eenigen dezer rupsen is de grond van den rug zwart-bruin, *ald. aanm.* maar op den laatste ring is die grond zwart. In dezen grond staan 3 paar wit geboorde hoog-roode knopjes; *ald.* 384. doch tusschen deze ziet men altoos 4 zeer kleine geele punten, en tusschen het laatste paar dezer roode knopjes, naamlyk midden op den 9den en 10den ring staan nog 2 veel hooger-roode knoppen, die echter zo vast of vleeschig niet zyn, als de andere roode knoppen, *ald. aanm.* De *Pooten* zyn helder geelachtig bruin van kleur. Het *Spinzel* is bruinachtig graauw. De *Pop van den Wyfjes vlinder* heeft geene vleugelscheden; haare kleur is heldergeel, en donker bruin overdwars gevlaakt, *ald.* 385. De *Pop van 't Mannetje* is aan het achterlyf schoon geel, en heeft aan het einde een korte staartpunt. De *Vleugelscheden* zyn rood-bruin, en de ruimte, waarin de *Kop*, de *Sprieten* en *Pooten* liggen, maakt eene Oker geele vlak uit. Op de boven-vlakte van den rug is deze *Pop*, welke veel kleiner is, dan de *Wyfjes-Pop*, met tedere hairtjes begroeid, III. 79. De *Wyfjes vlinder* heeft geene vleugels; I. 385. het *Lyf*, uit leden of ringen bestaande, is na den *Kop* toe zeer dik, van boven met graauw en van onderen, zo als ook ter weder-

zyde, met helder-geel Vederstof belegd, even als de *Kop*, die niet zeer groot is. Onder de dunne, en zeer lange *Sprieten* staan 2 kleine zwarte *oogen*. De 6 *Pooten* hebben weinig veder hairen. Aan het achter-einde ziet men een beweegelyk uitsteekzel, dat het reellid is, I. 386. De *Sprieten* van den *Mannetjes vlinder* zyn breed en vederachtig, en het gansche *lyf* en de 6 *Pooten* zyn bruinachtig-graauw van koleur. De 4 *vleugels* hebben eene schoone, heldere kaneel-bruine grondverwe; in de 2 bovenste ziet men, naby den buitenrand, niet verre van den binnenhoek, een gansch wit vlakje, het welk eene ongeelyk breedte, zwart-bruine bezooming heeft. De *Ondervleugels* zyn enkel eenverwig. Het *achterlyf* is zeer dun, III. 79.

Borstel-rups, (de kleine, uit den geelen vleeschverwige,) met 2 hairige hoornen, die zich aan den Hazelnoot-struik onthoudt, benevens baare verandering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 441. enz. Haare grondverwe is doorgaande eenigzins helder-geel, doch echter ook vleeschverwig. De *Kop* heeft dezelfde grondverwe; op den *bals* ziet men van boven eene graauwe vlak, die wederzyds en ook van achteren met een zwart randje bezoomd is. Van dit zwart zoomtje af loopt 'er, aan beide de zyden, een zwart steeppje, totn in het volgend lid, alwaar 't met eenige stippen eindigt. Onder hetzelfde ziet men, ter wederzyde, een uitsteekenden hoorn, bestaande uit geelachtig-roode, styve, en digt aan elkander zittende hairen. Op den 4den en 5den ring, van den *Kop* af, staat, boven, in het midden, een kleine, en kort afgestompte geelachtig-

roode borstel, even als op elk laatste lid gezien wordt. Het gedeelte van den *rug*, tusschen deze borstels, heeft in het midden een cierlyken zwarten streep en op ieder zyde, behalven de gewoone Spiegelpunten, heeft het nog eenige kleine graauwe puntjes. De gansche *bovenvlakte* is met zeer tedere en bleekgeele hairtjes bezet, en de 8 paar *Pooten* zyn van gelyke koleur. Haar *Spinzel* is eivormig, witachtig-graauw en doorzichtig. De *Pop* is met een staartpunt voorzien; het voorste deel is zwart-bruin, en 't achterste rood-bruin, ald. 441. 442. De grondverwe van dezen *Mannetjes-vlinder* is, zo wel wat het *lyf*, als de *bovenvleugels* aangaat, helder-graauw. De *Ondervleugels* zyn donker Oker-geel, en met een met vlakken vercierden rand bezoomd. In het graauwe *Achterlyf* ziet men eenige verheve, zwarte vlakken, achter elkander staande. De eenigzins gebochelde *rug* van het *voorlyf* is van boven en ter zyde geelachtig, en daar tusschen met eettelyke bruine vlakken bezet. De 6 *Pooten* zyn graauw; de *Oogen* zwart, en de *Sprieten* oker-geel; doch het steeltje der *Sprieten* in het midden is zwart, ald. 442. 443.

Borstel-rups, (de schoone Oranje-geele gestreepte,) benevens baare volkome verandering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 387. enz. De grootste van deze heeft, de hoornen 'er by gerekend, de lengte van 2 duim. Haare *Kop* is zwart, en met zeer lange hairen behangen. Ter wederzyde van dien ziet men, voor aan den *hals*, op vuur-roode Wratten, 2 dunne en lange zwarte hoornen, van styve stompe hairen, van boven met kleine knopjes.

voor-

voorzien; en uit even zulke haren bestaat ook de achterste, lange schuins afgestompte staart, die achteruit opwaards steekt, aan den wortel bruin, en rondom schoon vuur roodachtig-geel bezoomd is: en onder dezen staart word men nog een paar dunne hair-bos op den staartklep gewaar. Het *Lyf* dezer *Rups* heeft eene zwarte grondverwe, en deze is doorgaande met een wat breeder vuur- of Oranje-rood boordzel voorzien. Boven op den *Rug* staan 4 ronde, van boven afgestompte, Borstels dubbel overdwars te zamen, en wel op de Ringen, zynde bruinachtig-geel van koleur. Voor en achter deze borstels staan, op het geelachtig-roode boordzel van den *Rug* gansch witte laag bosjes van pelsairen, van vooren 2, en van achteren 3 paar tegen overelkander. De geele ringetjes op alle de ringen zyn met graauwe haren omzet; en op den *Rug* bespeurt men nog eenige geele punten, en het gansche *Lyf* is zeer dun, en met graauwe haren bezet. De 8 paar *Pooten* hebben eene helder-bruine koleur. Haar *Spinzel* is eivormig, bruinachtig en doorzichtig, met tusschen-mengzel van haare haren, *ald.* 387. 388. De *Pop* is redelyk dik, van vooren wat spits toeloopende, en van achteren met een staartpunt voorzien. De koleur is over het algemeen blinkend zwart. Tusschen de achterste 4 ringen ziet men de inkervingen hoog Oranje-geel, en het gansche *Lyf* is met tedere bruine haren bezet. De *Vleugelscheden* benevens de *Rug* zyn donker-bruin, doch het van achteren spits toeloopende deel vertoont zich helder Oker-geel, en de geheele *Pop* is, overal, met tedere hairtjes bezet, *ald.* 388. De *Wyfjes-vlinder* i een ongeveleugeld Schepzel, zyn-

de alom met donker, of bruin graauw wolachtig stof belegd. De *Pooten* van den *Mannesjes-vlinder* zyn zwart en helder-bruin bestreept, en met weinig hairstof bezet, *ald.* 389. Hy heeft schoone blinkende *Bovenvleugels*, derzelve buitenrand is, in een helderen grond, met donker-bruine uigteronde vlakken verciend; in den buitensten hoek ziet men eenige te zaamen loopende witte vlakjes, en 2 langwerpige gespleeten schubachtige vlakken naast elkander, waarvan de voorste hoog Oranje-koleurig, en de andere helder-geel is. In den achtersten hoek staat een enkelvoudig, gekromd wit vlakje, het welk na het lid toe aan een rood-bruinen grond grenst. De *Ondervleugels* hebben eene blinkend zwart-bruine koleur, en zyn alleen aan den buitensten rand Oker-geel bezoomd. De *Sprieten* zyn vedervormig, en hebben, benevens het *Lyf*, eene bruin-grauwe koleur; maar het *Achterlyf* is donkerer, en, even als het *Voorlyf*, zeer leenig en ligt. De *Eieren* zyn wit en rond, doch het hairig pelswerk is van koleur als het lyf der moeder, *ald.* 391. waaruit, naa verloop van ruim 14 dagen de jonge rupsjes voortkomen, *ald.*

Borstel-rupsen, noemt men die geslachten van rupsen, welke met haren verciend zyn; en hierin bestaat het voornaamste kenteken dezer soort van Rupsen, I. 377.

Brommers, zie by *Besmet-vlieg*.

Brom-vlinder, zo wordt de *Vlinder* van de groote, roode en vleeschverwige Hout-rups van eenige Liefhebbers genoemd, I. 289.

Bruine Doornrups, (de eenzaame,) zie *Eenzaame bruine Doornrups*.

Bus hommelen, zo noemt *FRISCH* eenige Hom-

Hommels, om dat ze voor ieder Ei een byzonder busje vervaardigen, II. 527. 528.

Byën, deze voeden meerendeels hunne jongen met Honing, tot dat ze in Poppen veranderen; bouwen hunne nesten in korven of boomen, of andere dingen boven de aarde; hebben in den bek niet alleen eene *gebittang*, maar ook een *Zuig-tong*; om den honig uit de bloemen en bloessens te zuigen. De *Sprietjes* zyn meer kort, dan lang, meerendeels kolfachtig en hoekig gebroken. De *Kop* is bykans even zo lang, als het borststuk. Zy hebben aan het voorste deel des voets 5 leden, waarvan de 4 voorste zeer klein zyn, maar het vyfde is ongelyk grooter, breeder en hairiger. De *Ondervleugels* zyn altoos kleiner, dan de *bovenvleugels*. De *Eieren* zijn men, meerendeels, helder van koleur, en ze hebben eene langwerpige ronde gestalte, die aan het ééne einde spitzer is, dan aan het ander. De jonge wormen, daaruit voortkomende, zyn helder en witachtig van koleur, en hebben geene pooten, maar aan den *Kop* 2 kleine zwarte *oogen*. Zy hebben, van het ei af, tot aan haaren gevleugelden toestand, niet meer dan 3 weeken noodig tot haaren volkomen wasdom. Het *Wyfje* derzelve is eene zeer vruchtbaare moeder, en verdient met recht de *Koningin der Byën* genoemd te worden, II. 465. enz. *aanm.*

Byën-Koning, des Schryvers eerste gedachten daaromtrent, II. 526. enz. en verdere by ondervinding bevestigd, dat de Koning der Byen een *Wyfje* en geen *Mannerje* is, II. 527 — 529.

Byen-motie, (de,) benevens haare verandering in een *Vlinderje*, behoorende tot de vierde classe der *Nachtvlinderen*.

DEERS, III. 213. enz. Deze, die anders ook de *Wolf*, of *Byen plaager* wordt genoemd, ontstaat uit eene Rups, die nergens anders, dan in de Byen-Korven, en zelfs maar zeer zelden in de Hommels-nesten wordt gevonden. Zy is aanvangelijk eene Rups, welke uit de Eieren des Vlinders, naa verloop van 10 of 12 dagen wordt gebooren. Zo dra zy uit het Ei te voorschyn komt, is ze gewoon, zich in te spinnen, om veilig te zyn voor de yverige Byen, *ald.* 214. Dit *Spinzel* is meestal witachtig, en aanvangelijk zo doorzichtig, dat men 'er de Rups den meesten tyd doorheen zien kan. Binnen 3 weeken krygt zy eerst haaren vollen wasdom en grootte, zynde de grootste, waaruit de Wyfjes-vlinders voortkomen, bykans één duim lang. Haar gansche *lyf* draagt veelal eene bleek okergeele koleur, en boven loopt 'er, door het midden, eene heldergrauwe linie. De blinkende *Kop* is, benevens de *bals* of het eerste lid, roodbruin; en deze heeft van vooren een helderen zoom, maar van boven is hy, in het midden, door een streep in de lengte verdeeld. Op de 2 *ringen*, naast den hals volgende, zyn in ieder, 2 heldere punten; en achter aan het einde staat, boven de beide *Nascheuivers*, een helder-bruin vlakje. De 6 spitze *Klaauwpooten*, en de 8 stompe *buikpooten* hebben dezelfde koleur als het *Lyf*, *ald.* 215. 216. Veele dezer Rupsen blyven, zomtyds, wel 4 weeken lang, onveranderd als Rupsen liggen, doch eenige veranderen reeds binnen 20 dagen in Poppen. De *Pop* is doorgaans, op het midden van haaren ouderdom, helder geelachtig-bruin, doch in 't begin helderder, en ten laatste donkerer. Aan haar achtereinde kan men weinig of niets

van eene staartspits zien. De Rups, laat in den Herfst veranderd zynde, blyft de Pop liggen tot in het voorjaar; maar die vroeger Poppen zyn geworden, liggen slegs 14 dagen, naa verloop van welken de *Vlinder* te voorschyn komt. Het *Mannetje* en *Wyfje* hebben, wat de koleuren aangaat, eenerlei tekens; *ald.* 216. De *Bovenvleugels* zyn meestal afchgrauw, doch aan den *buitenrand* bruin, en deze koleur wordt ook aan den *achtterrand* tamelyk breed gezien. Deze beide koleuren worden, in de lengte, door een helderer streep gescheiden, hier en daar met zwarte aderen doorweeven, en met vlakken verciert. De *Ondervleugels* zyn meer afchgrauw, wordende deze koleur omtrent de inleding echter in het geelachtig-bruine verdreeven. Aan den *buitenrand* hebben zy een breedten helderen zoom. Voor aan den *Kop* vertoont zich eene soort van snuit, die uit 2 aan elkander liggende deelen schynt te bestaan. De *Oogen* zyn bleek-grauw, en kort daarby staan 2 hairächtich-dunne *Sprieten*. Het *voorlyf* is op de bovenvlakte bruinachtig, en by zommigen met zwarte vlakken verciert, waarönder die boven aan het einde van 't voorlyf in het midden staat, meest verheven, en gedeeltelyk wit is. Deze vlak mag aan alle *Vlinders* dezer soorte voor een zeker kenteken van dezelve worden gehouden. Het *Achterlyf*, aan 't *Wyfje* dikker, dan aan 't *Mannetje*, heeft, op zyne bovenvlakte, ook wel eene grauwe koleur; maar ieder lid is, door een helderen okergeelen ring, van 't ander onderscheiden, waarvan 'er 7 zyn. De ondervlakte van 't achterlyf valt meer in het rood-bruine. Zy paaren kort naa hunne geboorte. En de *Wyfjes* hebben

aan het einde van hun achterlyfeene dunne Spits, niet ongelyk aan een Steekangel, die zy verre weeten uit te steeken, en waardoor de Eieren gelöst worden; *ald.* 217. die kogelrond, en bleekgeel van koleur zyn. *ald.* 213.

Byen-plaager, zie *Byen-motte*.

C.

C. of V. *Vlinder*, zo wordt de *Vlinder* van de eenzame Doorn rups, met den half geelen en half witten rug, en bruin lichaam, wegens de letter, die hy op 't onderste des vleugels draagt, doorgaans genoemd, I. 33.

Celadon, een ongemeen schoone groene *Vlinder*, zie *Vlinder*, ongemeen schoone *Celadon* groene.

Charlevoix, *Pater*, zegt, in zyne beschryving van het eiland St. Domingo, (*bist. de l'Isle St. Dominique*, Tom. I. pag. 45.) dat een Neushoorn-Kever, in een afgehouden Palmboom, eene menigte van gehoornde Wormen doet voortkomen, welke de Inwooners vlytig opzoeken, en voor eene lekkere spyze houden: maar men kan hem zyne toestemming niet geeven, II. 31.

Chineesche Lantaarndrager, zie *Lantaarndraager*, de *Chineesche*.

Cbrusalis (*χρυσάλις*) betekent een goudkleurig Schepzel, en dezen naam heeft men als een gemeenen naam der Poppen gebruikt, die in 't geheel goudkleurig zyn, bekend onder den naam van *Aurelia*, I. 57.

Cicad, men wil, dat dit woord zyn' oorsprong van daar hebbe, *quod cito cadat*, dat is, dat de *Cicaden* spoedig vergaan: doch BECMANN beweert in zyne *Manuductio ad linguam latinam*, pag. 358. dat deze naam zyn oorsprong heb-

be van κικα ^{αδειν}, 't welk zo veel zeggen wil, als door een beweegelyk vliesje een gezang maaken, betekene *Cicum* of *Cicum* een dun vliesje der Granaat-appelen, II. 434.

Cicaden, *verscheide buitenlandsche soorten van Cicaden*, II. 421. enz. Deze schepzels zyn reeds by de oude *Latynen* onder dien naam bekend geweest, en daaruit hebben de *Franschen* hun *Cigale*, en de *Italiaanen* hun *Cicala* gemaakt. De *Hollanders* en *Engelschen* heeten dit Insect een *vreemden Kreekel*, *ald.* 422. *Vylderlei soorten van Cicaden*, 426. Zy hebben gemeenlyk een *Kop*, die wel breed, maar kort, en meer stomp, dan rond is, waardoor haare beide groote *Oogen* niet alleen verre van elkander staan, maar ook wederzyds zeer uitpuilen. Tusschen dezelve ziet men, op de smalle bovenzvlakte, nog 3 zeer kleine, ronde, half verheven en rood blinkende oogen. Naby de 2 groote oogen hebben de tamelyk korte *Sprieten*, die uit 4 of 5 leden bestaan, en spits toelopen, hunne inleding. Voor aan den *Kop*, in 't midden na den benedenkant, ziet men eene groote ronde verhooging, die zich, ook aan de ondervlakte, uitstrekt, tot het borststuk; en voorāan in het midden een gladden, langwerpigen, geelen streep heeft; aan welks einde de overige helft door verscheide, overdwars loopende, diepe linien als verdeeld wordt. En, daar deze linien ophouden, vertoont zich een kleiner, scherp en smal toeloopend deel, aan welks einde de *Zuig-angel* vast zit, welke zo lang is, dat hy tot aan de inleding der 2 achterste Pooten reike, waardoor hy dan ook tusschen de 2 andere paaren doorloopt, en kort

aan 't lyf geslooten ligt, *ald.* 425. Het *borststuk* is tweeledig; het eerste deel heeft scherpe uitsteekzels aan beide zyden. Het andere deel is boven rond verheven, en in het midden met eene andere eenigzins vlakke verhooging voorzien. Aan 't einde van dit gedeelte ontdekt men ook nog 2 geboogen of gedwongen scherpe hoogzels van eene Oranje-geele kleur, *ald.* Het *achterlyf* bestaat uit 6 leden, wanneer men 't *Teellid* mede rekent. Van de 6 *Pooten* hebben de 2 voorste de dikste bovenschenkels, en deze zyn met 2 spitzen gewapend, die aan andere paaren ontbreken; waartegen alle de 6 pooten, aan het einde van het daarop volgend dunner deel, met een paar kleine spitzen voorzien zyn. De *Vleugels* zyn van ongelyke grootte; de grootste zyn met veele aderen doortoogen, en doorzichtig als glas, *ald.* 426. De *Legpyp* van eene Wyfjes-Cicade is zeer hard, en zwart-bruin van koleur; iets voor over geboogen. Het puntig deel heeft de gedaante van eene Piek, welker yzer wederzyds met tanden voorzien is, die tamelyk hard, en scherp zyn, en veel toebrenge tot de doorbooring van het hout, waarin de Cicade haare Eieren wil leggen. Deze moeten, noodwendig, door het Mannetje bevrucht zyn: het welk, ten dien einde, vervuld is met zeer veele zaadvaatjes, waarin de vruchtigheid toebereid wordt. Deszelfs teellid is in den laatste ring van 't achterlyf verborgen, *ald.* 437. De *Angel* is by de Mannetjes en Wyfjes eveneens; *ald.* 439.

Citroen-geele Rups, zie *Eenzaame pruim-geele Rups*.

Classen der Aardkevers. Deze worden ver-

verdeeld in 7 *Classen*. De *eerste* bevat de in 't byzonder zo genoemde *Aardkevers*; de 2de de zo genoemde *Houtbokken* of *Houtkevers*; de 3de de *Bladkevers*; de 4de de *Zuiger*. of *Slurpkevers*; de 5de de *Springkevers*; de 6de de *Aaskevers*, en de 7de de *Roofkevers*; II. 2. *Eerste classe der Aardkevers*; ald. 33. enz. *tweede classe*, ald. 102. enz. *derde classe*, ald. 127. enz.

Classen der Landspinnen zyn vyf, III. 138. IV. 193. enz. Onder de *eerste classe* worden gerekend zodanige, die een perpendicular of loodrecht spinzel maaken, dat bykans radvormig is, behoorende daartoe ook de *Kruisspinnen*, welke zyn 1.) de groote bruine, welke zich in de gebouwen zo wel, als in de tuinen en boschen onthouden; 2.) de kleine en smallyvige bruine; 3.) deroode; 4.) de witte; 5.) de groene, en 6.) de geele. De *Tweede classe* maaken de *Hoek- of Hoolspinnen* uit, waarvan in de gebouwen zo wel, als in de boschen en velden, veelerleie soorten zyn: 1.) zommige vormen hun *Spinzel* in een hoek, en spreiden hetzelfde horizontaal of vlak uit, 2.) andere vervaardigen een even dergelyk *Spinzel*, maar overtrekken daarmede alleen de aarde en de velden, en worden daarom *Aardspinnen* genoemd. Daartoe brengt men ook 3.) de gebochelde of krom-zittende Spinnen, die een onregelmatig of wanschikkelyk, echter doorzichtig en wyd uitgebreid, *weefzel* maaken. Eindelijk heeft men 4.) de *booi-spinnen*, die alleen in gaten en hollen wonen, welke zy van binnen met haar *Spinzel* bekleeden, en van buiten slechts eenigermate overtrekken. Onder de *derde Classe* behooren de *Kleefspinnen*, waar-

van 2 soorten zyn. De *eene* zit aan de stammen der boomen, en aan de muuren met uitgebreide pooten, als of zy 'er aan vast gekleefd ware, en onder haar ziet men een klein plakje van wit *Spinzel*, waar onder haare Eieren verborgen liggen. De *andere soort*, de *langbeenige Kleefspin*, vindt men op veelerlei loof en kruid, aan riet en gras. Tot de *vierde classe* behooren veele, zo wel kleine, als groote soorten van spinnen, welke doorgaans *Spring-spinnen* worden genoemd, om dat ze gemeenlyk geen *Spinzel* hebben, herwaarts en derwaarts loopen, en zich door een sprong meester van haaren buit maaken. Deze zyn deels zwart-bruin, deels met verscheide streepen en vlakken zeer net vercierd, en eenigzins langwerpig van lyf. Eindelijk is 'er nog eene *vyfde Classe*, van kleine snelloopende Spinnen. Deze zyn deels roodachtig, en zo klein als de korrel van het Maanzaad; andere zyn bruiner, en wederom andere witachtiger, ald. 138. 139. en IV. 193. 194.

Classen der Polyphen, III. 384. *aanm.* TREMBLEY heeft de hem voorgekomen *Polyphen* in 3 *Classen* verdeeld. In de *eerste* plaatst hy die geene, welke hun lyf en armen 't minste uitstrekken of verlängten kunnen, en deze noemt hy *groene kortärmige*. In de *tweede Classe* stelt hy die geene, welke hun lyf en armen wel langer, dan die der eerste classe vergrooten, maar het nogtans zo sterk niet doen, als men het wel van anderen ziet. Deze zou men *Middelpolyphen* of *halfärmigen* mogen noemen. In de *derde Classe* komen die geene, welke hunne Armen buitengemeen lang uitbreiden; wier achterdeel nog daarenboven zeer uitgerekt, en veel dunner is, dan

dan het lyf, zo dat het niet ongelyk zy aan een staart. Mischien, zegt GOEZE, kon men dezelve de *langärmige Staartpolyphen* noemen, *ald.*

Classe der Spinnen, zie voor *Classe der Landspinnen*.

Clasen der Springbaanen. Schoon men 't geslacht der *Springbaanen* maar in *eene Classe* verdeele, echter schynt die soort, welke hairdunne *Sprieten*, aan de *pooten* vierledige voerbladen, en daar benevens zodanig een *bals- of rug Schild* hebben, dat van achteren niet spits toeloopt, en welker *Wysjes* met eene *Legpyp* voorzien zyn, eene byzondere *Classe* uit te maaken. En zo schynen ook die soorten, welke korte dikke *Sprieten*, en daarby gemeenlyk maar drieledige voerbladen, benevens een van achteren spits toeloopend *rug Schild* hebben, eene byzondere *Classe* te vereischen; te meer, nademaal hunne *Wysjes*, zelden, met eene *Legpyp*, of ten minste maar met eene zeer korte voorzien zyn, II. 257. *aanm.*

Clasen der Water-insecten; in de *eerste* worden verscheide Water-insecten beschreeven, II. 143. *enz.* en zo mede in de *tweede classe*, II. 174. *enz.*

Crabbenie, zo noemen de *Dantzigers* de *Garnaalen*, III. 312.

D.

Dadel-korrel, zo wordt de *Pop* van den *Zy-worm* genoemd, hebbende zy, ten aanzien der koleure, de meeste gelykheid met den *Dadel*, II. 54.

Dagolinder, (een by uitstek *schoone*,) van de *eerste Classe*, met hoog-blaauwe en roode oogspiegels versierde *ondervleugelen*, als ook met prachtig getekende *bovenvleugelen*; IV. 40. afbeelding van

het Mannetje, *ald. aanm.* De *ondervleugels*, zynde van eene kostelyke *Utermarynblaauwe koleur*, hebben eenen ronden en eenigzins uitgeschulpten achterrand, voorzien met een breeden, roodachtig-geelen zoom, waarin zich 3 zwarte linien vertoonen. In elk dier vleugelen ziet men 2 roode cirkelronde oogspiegels. De beide andere oogspiegels zyn meer donkerrood, hebbende in het midden een wit punt. Aan den binnenrand zyn deze ondervleugels, in eene ongelyke breedte, fluweelzwart. Zulk een zwarte grond vertoont zich ook in het grootste deel der *bovenvleugelen*; en 't overige is helder roodachtig okergeel, pronkende met verscheide bruine dwarslinien, streepen en vlakken. Ook zyn 'er in die *bovenvleugelen* 2 spiegelvlakken, de eene, die aan het buiteneinde des vleugels staat, bestaande uit een Oranje-geelen ring en zwarte vlak, die in het midden een wit puntje heeft. De andere, die grooter is, en aan den achtersten hoek staat, heeft eene half donkere en half heldere bezooming, en de daarmede omgeeven zwarte nier-vormige vlak heeft een blaauw punt in het midden. Het *Lyf* is zwart, en de *Sprieten* zyn als die der andere *Vlinders* van deze *Classe*, *ald.* 41.

Dagolinder, (de byzonder *schoone* zwavel-geele,) met 4 oranje-geele vlakken, behoorende tot de *TWEDE CLASSE*, III. 233. *enz.* Wegens deszelfs vleugels, die juist zodanig een omtrek hebben, dat ze na overëenkomen met sommige stomp toegespitste bloem- en boombladeren, zou men hem niet oneigenlyk het *vliegende geele Blad* kunnen noemen. In het midden van ieder *Vleugel* heeft hy eene kleine hoog-oranje-geele, ruit-vormige vlak, die in den achtervleugel groe-

grooter is, dan in den voorsten. Aan de onderzyde van deze vleugels zyn die vlakken slecht bruin. Behalven de zonderringe uitroncing der 4 vleugelen, hebben zy, aan hunnen buitenrand, omtrent de spits toeloopende hoeken, etelyke redere bruin-roode stippen. De *Sprietten* zyn roozenverwig; de *Oogen* zwart-bruin, en het *Lyf* is van boven graauw, van onderen geelachtig, *ald.* 234. De beschryving van de *Rups*, waaruit deze *Vlinder* voorkomt, zie by *Rups*, (de *mat- of dofgroene*) van den *Elzenboom*, IV. 140. *enz.*

Dagvlinder, (de donker-bruine,) met lange, doch smalle vleugelen, waarin 2 groote vuurroode vlakken staan, IV. 21. LINNÆUS noemt hem *Melpomene*, *Roodband*, *ald.* *aann.* De grondverwe zyner 4 vleugelen is donker Cofsi-bruin, en door dezelve wordt de onregelmaatige Menie-koleurige, of hoog vuurroode vlak, in ieder *bovenvleugel*, tamelyk verhoogd. Aan de *ondervlakte* is deze *Vlinder* bykans eveneens; maar de grondverwe zo wel, als de koleur der beide vlakken, is aldaar merkelyk bleeker, *ald.*

Dagvlinder, (de goudblinkende, of vuurroodschemerende,) van de TWEEDE CLASSE, III. 199. *enz.* zynde het *Mannetje* *ald.* 200. *aann.* De vleugels zyn, naar den buitenrand, smal zwart bezoomd, en rondom deze bezooming loopt ten laastten een witte rand. De voorste rand van den *Bovenvleugel*, die geen witten zoom heeft, is by zommigen breeder, by anderen smaller, en zomtyds wordt men 'er een zwart dwarsstreepje aan gewaar, dat nu grooter, dan kleiner is. Het *voor-* en *achterlyf* vertoont zich wel in 't algemeen donker-grauw, of bruinächtigt zwart; maar het eerste is

na vooren eenigzins helder blaauwächtigt, en heeft wederzyds eene witte bezooming, *ald.* 200.

Dagvlinder, (de groote hoog Citroen- en Oranje-geele,) met breede vleugelen, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, IV. 21. LINNÆUS noemt hem *Pap. Dan. Phileas*, *Goudboordzel*, *ald.* *aann.* De Vleugels hebben, op de bovenvlakte, eene ongemeen schoone hoog citroen-geele grondverwe. In den voorsten ziet men eene ongemeen groote oranje-geele vlak; en de *ondervleugels* zyn, aan hunnen rand, met dezelfde koleur tamelyk breed bezoomd; doch omtrent het midden verdwynt dezelve allengskens in de heldere grondverwe. De oppervlakte der 4 vleugels is heel anders getekend, hebbende elk derzelven, omtrent in het midden, eene dubbele purperroode vlak, waarin zich nog eene witte vertoont. De grond is met eenige kleine byzondere winkelhoekvormige streepen doortoogen, waarvan zommigen eene V verbeelden, *ald.*

Dagvlinder, (de hoog-blaauwe,) met zwart gevulakte en donker bezoomde vleugelen, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, III. 231. De vleugels zyn, in hunnen schoonen blaauwen grond, met verscheide zwarte vlakken, van ongelyke grootte, verciert, en hebben aan den buitensten rand eene breede, zwart-bruine bezooming, die met wit omtoogen is. De *bovenvleugels* hebben ook van vooren iets zwart-bruins; en in de donkere bezooming der *ondervleugelen* ziet men eenige zwarte punten, van vooren met eene witte halve cirkel-linie omgeeven. De grondverwe van het *voor-* en *achterlyf* is ook blaauw, doch veel helderer, dan aan de vleugelen. De *ondervlakte* der 4 vleugelen valt meestal

in het graauwe, maar na de inleiding toe wordt ze meer helder-blaauw, pronkende met verscheide zwarte vlakken, van ongelyke grootte en gestalte, *ald.* 232.

Dagvlinder, (de Indiaansche,) wiens bovenvleugels met helder-geele, en de ondervleugels met vuur of menie-roode vlakken versierd zyn, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, IV. 34. LINNÆUS noemt hem Ricini, den Wonder-vlinder, ald. aanm. De vuurroode vlakken in de *Ondervleugelen* zyn zo groot, dat ze veel eer derzelver grondverwe, dan vlakken schynen uit te maaken. In ieder *bovenvleugel* zyn 'er 2 bleek of zwavel-geele vlakken, verschillende zo wel in grootte, als in gestalte. De grootste staat in het midden des vleugels, en de kleinste na het buitenst einde, vertoonende byna eene Latynsche S. De *Spriet*en zyn zeer lang, doch teder, en hebben aan het einde dikke kolfjes, *ald.* 34. 35.

Dagvlinder, (de kleine, buitengemeen schoone, hoogblauwe,) behoorende tot de TWEEDE CLASSE, III. 197. enz. De grondverwe der *bovenvlakte* der *4 vleugelen* is hoogblauw; by sommigen valt deze blauwe kleur meer in het violet-verwige. De voorste rand van den *Bovenvleugel*, benevens die van alle de *vleugelen*, is met een witten zoom omgeeven, in welken de blauwe grond zich in het donkere verliest. Doch het *voorlyf* zo wel, als het *achterlyf*, is van eene nog helderer blauwe kleur, en schynt, na het midden, in het zwart-achtige te verdwynen. In den *onder-vleugel* vertoonen zich verscheide Oranje-geele vlakjes. Na den kant van het *Lyf* verdwynt de graauwe grond meer en meer in 't helder-bruine, welke kleur

ook aan het *Lyf*, doch eenigzins in het graauwe verdreeven, bespeurd wordt, *ald.* 198. 199.

Dagvlinder, (de kleine bleekgeele en witte,) met breede bruin-bezoomde vleugelen, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, IV. 20. De grondverwe der *bovenvleugelen* is zwavel-geel, en die der *Ondervleugelen* wit. De *ondervlakte* is alleen wit en geelachtig; *ald.*

Dagvlinder, (de kleine vuurroode en goudglanzende,) met donkere versierfelen, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, III. 232. De grondverwe der *bovenvleugelen* schittert op de *bovenvlakte*, en is met zwarte vlakken besprenkeld, en heeft aan den buitenrand eene breede, doch aan den voorsten rand eene smalle, donkere bezooming. De grondverwe der *Ondervleugelen* is donker olyf-bruin; en aan dezelve ziet men een vuurrood breed boordzel, met eene gansch zwarte en ingerande bezooming, daar eene witte op volgt, welke laatste de *bovenvleugels* ook aan den buitenrand hebben. Het *Lyf* is donker van kleur, maar heeft van achteren eenen blaauwachtig-graauwen zoom. De *ondervlakte* der *achtervleugelen* is helder-graauw, met eenige zwarte stippen besprenkeld. De *grond der voorvleugelen* is meestal geelachtig rood: van dezelfde kleur is ook de bezooming der verscheide vlakken der *bovenvlakte*, en het *Lyf* is eenigzins helder blaauwachtig graauw, *ald.*

Dagvlinder, (de kleiner,) der eerste Classe, die met veele geele vlakken en diergelijke ringen getekend is, IV. 182. enz. De grondverwe van dezen *Mannerjes-vlinder*, *ald. aanm.* is bruin olyf-verwig; en elk der beide *bovenvleugelen* heeft, behalven zyn byzonderen witten en hoe-
 kig uitgespitsten rand, na de buitenste
 zy.

zyde 2 ovaal ronde zwarte oogvlakken, in welker midden een klein wit puntje is, en die voorts met een oranje-geelen ring omgeeven zyn. Daarbenevens pronken zy met verscheide heldere, ten deele schoon oranje-geele, ten deele zeer donkere vlakken, van verschillende grootte en gedaante. De *Ondervleugels* hebben, op hunne oppervlakte, dezelve grondverwe, als de bovenste, maar zyn, aan hunne witte bezooming, met 7 veel scherper toeloopende uitsteekende spitzen voorzien. Wyders ziet men 3 zwarte oogvlakken, in een fraajen oranje-geelen ring staande, hebbende de 2 grootste een wit puntje in het midden, en boven dezelve, in den bruinen grond, zulk een puntje. Het *Lyf* is zwartachtig-blaauw; de *Oogen* groen, en de *Pooten* zyn geel, *ald.* 183. 184.

Dagvlinder, (de ongemeen prachtige en schoone,) met Celadons koleurige streepen en vlakken, in een donker-bruinen grond, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, IV. 39. LINNÆUS noemt hem Pap. Eq. Demophon, Groenmarmel, ald. aanm. Deszelfs bovenvleugels loopen, na het uiterste einde, smal toe. De Ondervleugelen loopen, achter over het achterlyf, lang en spits uit, en hebben, aan den buitenrand, 6 of 7 uitsteekende stompe spitzen. De koleur der 4 Vleugelen is, gelyk het Lyf, donker-bruin, en daar door wordt de Celadongroene streep, door ieder dier vleugels gaande, niet weinig verhoogd. In de bovenvleugels is deze streep na voren toe afgebroken, veroorzaakende daardoor verscheide schildvlakken in dezelve, die allens in grootte afneemen. In de Ondervleugels ziet men, kort aan den puntigen rand, 5 Celadons groene fikkel- of maanvormige vlakken, welke

eene evenredig voortloopende rei uitmaaken, *ald.* 40.

*Dagvlinder, (de ongemeen schoone Indiaansche,) met hoogroode en groene vlakken in den donkeren grond, IV. 19. welke van LINNÆUS genoemd wordt Aeneas, de Groenvlak, de Beerenpoot, ald. aanm. Hy heeft, over het geheel, eene zeer donkere, en bykans meer zwarte, dan bruine grondverwe. Ieder der bovenvleugelen heeft eene enkele heldergroene schildvlak, en in ieder Ondervleugel, die scherp uitgepunt is, vertoont zich eene schoone, hoog karmynroode vlak, in het midden, en genoegzaam het meerendeel des vleugels bestaande. De gedaante dezer vlakken kan men by een Beerenklaauw vergelyken, waarvan de 4 deelen, die dan de toonen verbeelden, van vooren bleek of helderrood, vervolgens hoog Karmynrood, en eindelyk naast den voet-zool, de hiel en den vyfden achterklaauw zich gansch donker voordoen. Het Lyf is met ettelijke schoone Karmynroode vlakken vercierd. Op de ondervlakte van het Lyf zyn de groene vlakken in het geheel niet te zien, en van deroode niets anders, dan de toonvormige punten, die eene roozen-roode koleur hebben. De Oogen zyn bruin, *aid.**

Dagvlinder, (de Oranje-geele Indiaansche,) met donker-bruine streepen, behoorende tot de EERSTE CLASSE, IV. 18. van LINNÆUS genoemd Pap. Nymph. Pharus, de Oostwest, ald. aanm. Deze heeft op het Lyf, en op de bovenzyde der Vleugelen, eene oranje-koleur, hoewel niet zeer gloejende. Op dezelve zyn donker-bruine streepen en vercierselen, en de ondervleugels hebben eene dubbele rei gebroken getande vlakken, waarmede de uiterste gepunte rand bezoomd

zoomd is. De *Onderzyde* is in zo verre anders van gedaante, dat de grondverwe en de streepen iets bleeker, en ook eenigzins anders van beloop zyn, *ald.*

Dagvlinder, (de Oranje-geele, Indiaanfche,) der TWEEDE CLASSE, met veele donkerbruine en heldergeele vlakken verciert, en met smalle en lange vleugelen, IV. 35. enz. LINNÆUS geeft hem den naam van *Polymnia*, den *Oranjevleugel*, *ald. aanm.* De beide langwerpige ovaal-ronde *Ondervleugels* hebben eene Oranje-geele grondverwe, en op ieder zyn eenigzins schuins, in de lengte, 2 reien zeer scherp getande vlakken, van eene donkerbruine koleur. In de beide lange *bovenvleugelen* is genoegzaam de eene helft van den grond Oranjegeel, en de andere zwavelgeel. De *Vleugels* zyn voorts getekend met donkerbruine streepen en vlakken. Het lange en dunne *Achterlyf* wordt na achteren eenigzins dikker, en verkrygt eene knodsvormige gestalte: De kleur is helder bruin, maar de 6 tedere *pooten* zyn met de lange *Spriet*en zwart, *ald.* 35. 36.

Dagvlinder, (de schoone oranje-geele,) met zwarte en helder-geele vlakken, behoorende tot de TWEEDE CLASSE, III. 234. enz. De voorste *Vleugels* hebben eene Oranje-geele grondverwe, in welker midden men eene zwarte vlak ziet. Elke vleugel heeft, langs den buitenrand, eene breede, zwartbruine bezooming. De grondverwe der *ondervleugelen* is niet zo hoog Oranjegeel, maar zy hebben, in het midden, eene schoone ronde vlak van die koleur, en aan den buitenrand eene donkere, doch niet overal even breede bezooming, en in deze weder eenige helder-geele vlakken. Aan den binnenrand zyn ze helder-geel, en na de inleding toe groenachtig. Het

gansche *Bovenlyf* is groenachtig-graauw, doch aan de *ondervlakte* helder-geel. De *Hals* en *Kop* zyn, zo als de beide *Spriet*en, schoon roozenverwig, en de *Pooten* hebben dezelfde koleur, *ald.* 235.

Dagvlinder, een van die byzondere soort der Indiaanfche, welke lange en smalle vleugels, en een teder smeedig lyf hebben, IV. 20. Deze heeft, in zyne 4 *vleugelen*, tamelyk groote doorzichtige, bruinbezoomde, onregelmaatige vlakken. In den voorsten zyn 'er 3, en in den *Ondervleugel* twee te zien. De *ondervlakte* der *ondervleugels* is, aan den buitenrand, in den donkeren grond, derwyze met witte punten bezet, als of ze met een snoer paerlen bezoomd waren. Eenige dergelyke punten vertoonen zich ook aan den buitenrand der *bovenvleugelen*, en eenige ziet men insgelyks by derzelver inleding, mitsgaders op het voorste en achterste deel van het *lyf*, *ald.*

Dagvlinder, (de wit en zwart-gevekte,) welke zich in de weiden en beemden onthoudt, III. 195. behoorende tot de EERSTE CLASSE, *ald. aanm.* De grondverwe der 4 *vleugelen* is geelachtig-wit, en pronkt met veele zwartbruine vlakken, van ongelyke grootte en gestalte. Het *Voorlyf* en de *Kop* zyn byna geheel zwartgrauw, en op het *Achterlyf* ziet men, overdwars, tusschen ieder lid, een helderen streep of bezooming. De vlakken in de *onderste vleugels* zyn niet zwart, maar helder grauww, hebben eene zwarte bezooming, en zyn, na den buitenkant, met 6 ringetjes verciert. De *Bovenvleugel* heeft wel verscheidene, even zo donkere, en genoegzaam nog zwarter vlakken, dan die van de bovenzijde dezer vleugelen; maar ze zyn

zyn zo breed niet, en aan de buitenste zyde ziet men ook een zwart ringvlakje met een wit puntje. De *Pooten* zyn even zo gesteld, als by andere *Vlinders* dezer *Classe*, *ald.* 196. 197.

Dagvlinders, worden verdeeld in 2 *Classen*; I. 2. eigenschappen, die alle *dagvlinders* der eerste *Classe* gemeen hebben, en men in tegendeel by die der tweede niet aantrest; *ald.* zie *Eigenschappen der dagvlinders*; voorbeelden der eerste *Classe*, *ald.* 7. enz. der tweede *Classe*, 62. enz. drieërlei soorten van fraaie *dagvlinders*, III. 195. enz.

Dagvogeltje, (het ongemeen schoone,) met zilveren vlakjes, en lange vleugelspitzen, behoorende tot de EERSTE *CLASSE*, IV. 22. LINNÆUS noemt het *Cupido*, *Zilverdrop*, *ald.* *aanm.* De ondervlakte daarvan is veel schooner, dan de bovenvlakte. De menigte en verscheidene helderblinkende zilvervlakjes geeven de *Ondervleugelen* een uitnemend sierlyk aanzien. En dit wordt door den Okergeelen grond, waarop deze vlakjes, als druppels van vloeibaar zilver, verheven staan, grootlyks vermeerderd. Ook geeven de daaraan zittende uitsteekende spitzen van ongelyke grootte hem nog meer cieraad. Aan den buitenrand der *bovenvleugelen* ziet men mede eene rei zeer kleine zilverflappen, op een recht uitlopenden bruinen streep staande, en met eene evengelyke donkere koleur, is de heldere, okergeele, en groote vlak, in deze vleugelen, op eene byzondere wyze bezoomd, *ald.*

Dennebooms-pylsteert, zo wordt de *Vlinder* van de schoone, groen, geel, wit en bruin gestreepte *Pynboom-rups*, met een staart en Springkhaanen-kop, genoemd, I. 163.

Diana, by dezen naam is de *Rups*, waaruit de bleek blaauwachtig-groene, wit en zwart geschakeerde *Nachtvlinder* gebooren wordt, den liefhebberen der *Insecten* bekend, III. 208. *aanm.* 343. *aanm.*

Dikke grasgroene, en geel geborduurde, Schildrups, benevens haare verandering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE *CLASSE* der *DAGVLINDERS*, I. 99. enz. Zy draagt den naam van *Schildrups*, wegens de uiterlyke gedaante. Zy is van onderen aan den buik gansch plat, maar van boven, zittend of kruipende vertoond, breed verwulfd; heeft het gewoon getal *Pooten*, die klein zyn. Het *Lyf* is in het midden heel dik, maar loopt, inzonderheid na het achter-einde, wat smaller toe. De *huid* is gras groen. Boven over den *Rug* loopt een paar geele boordzels; en onder aan den *buik* is het gansche *lyf* met een dergelyk boordzel omtogen. Aan elke zyde van het *Lyf* ziet men 9 of 10 witte schuins loopende lniën, die alle, van het bovenste geele boordzel af, tot aan 't begin van den *buik*, schuins over 3 ringen na beneden loopen, *ald.* 99. De tyd der veranderinge naderende, verandert de groene koleur der *huid* in eene roodachtige, die hoe langer hoe donkerer wordt, tot dat eindelyk de balg geheel afstroomt. De *Pop* is byna geheel glad. De grondverwe is roodachtig-bruin; doch over den *Rug* loopt, in de lengte, een iets helderer smalle streep, en aan beide zyden ziet men nog verscheidene dergelyke korte schuinsche streepen. Na 14 dagen komt 'er de *Vlinder* uit, *ald.* 100. De grondverwe der 4 *vleugelen* is, op de bovenzyde, donker olyfkoleurig-bruin. De *Voor-vleugels* zyn in het geheel niet, maar de

achter-vleugels sterk uitgeschulpt, met een wit boordzel omzoomd. Dit heeft, binnenwaarts, eene smalle zwarte vulling. De 2 grootste uitsteekzels der *achter-vleugelen* zyn Oranje-geel gevuld; en in ieder *Voor-vleugel* ziet men eene groote vlak van dezelfde koleur. Het geheele *bovenlyf* heeft dezelfde donker Olyf-bruine grondverwe als de *Vleugels*. De *Oogen* zyn zwart, met een smallen, blinkenden, witten kring omgeeven. De grond van de *onderzyde der Vleugelen* is bleek geel. Niet verre van de vlak in den *Voor-vleugel* ziet men eene andere, driekantige, die zwart is, en een smal wit boordzel heeft. Het *Lyf* aan de onderzyde is helder-graauw, welke koleur ook de *Pooten* hebben, *ald.* 101.

Distelvink, zie *eenzaame geel- en graauwe Doornrups*, met het *byzonder Naricht* daaromtrent, I. 54. en 60. *enz.* *Dofgroene, kleine Koolrups*, zie *kleine dofgroene Koolrups*.

Doodgraaver, (de met recht zo genoemd,) behorende tot de ZESDE CLASSE der AARDREVERS, IV. 1. *enz.* LINNÆUS noemt hem *Silpha Vespulio*, en is onder den Hollandschen naam van *Mollebegraver* bekend, *ald. voorber.* 1. Het *Mannetje* en *Wyfje* zyn, ten aanzien der gestalte en koleur, elkander zo gelyk, dat alleen de grootte, waarin het *Wyfje* 't *Mannetje* overtreft, eenig onderscheid tusschen beide maakt. De *Vleugeldekkzels* zyn byna een derde korter, dan het *Lyf*; de grondverwe dezer vleugeldekkzels is roodachtig oranje-geel, en in ieder loopen 3 zwarte dwarsvlakken, de middelste de breedste zynde, doch even als de voorste ingetand. Aan den zwarten *Kop* heeft hy wel een scherp *tanggebit*, maar is niet van de sterkste. De *bovenlip* is, benevens de

2 *vreespunten*, geelachtig bruin. De 2 *Oogen* puilen aan den kop tamelyk verre uit, en de *Sprieten* bestaan uit 5 zwarte leden, waar onder het eerste 't langste en dikste is. Het *achterlyf* loopt spits toe, en bestaat uit 6 of 7 leden. Deze leden hebben, aan de beide scherpe zyden, zo veel als een zoom van korte, geelblinkende hairtjes. De 6 zwarte *Pooten* bestaan uit 3 hoofddeelen, uit den dikken schenkel, het dunner scheenbeen en het eigenlyke voetstuk. Het middelste en achterste paar pooten is, aan het einde van het scheenbeen, met 2 spitzten, een groot en een klein, voorzien, *ald.* 8. De koleur der *Eieren* is wit, de vorm derzelve wel tweemaal zo lang, als dik, doch niet recht ovaal-rond. De *Wormen*, uit deze Eieren voortkomende, schynen, met den ouderdom van 4 weeken, reeds volwassen, *ald.* 12. De grootste lengte van zulk een *Worm* beloopt ruim anderhalven duim. Het *Lyf* bestaat, zonder den kop en naschuiver, uit 12 leden, waarvan de middelste de grootste zyn, hebbende zy eene byzondere graauwachtig-witte grondverwe. De *Kop*, het klein *tanggebit*, en 2 tedere *Sprietjes* zyn oranje-bruin. Hunne 6 *poortjes* onder de 3 eerste ringen zyn oranje-geel, maar zo kort, teder en zwak, dat ze naauwlyks te zien zyn, *ald.* 13. Wanneer hy op het punt is, van zyne wormhuid af te leggen, geeft hy zig dieper in de aarde, makende in dezelve een eivormig glad verwulfsel, door middel van eene by zich hebbende vochtigheid daaraan de behoorlyke stevigheid geevende, en verschynt daarna in de gestalte der *Poppe*. Deze is in het begin wit van koleur, maar wordt allengskens geeler en donkerer,

kever, ja gansch oranje geel, en, haare wooning willende verlaaten, dan wordt ze nog donkerer. Als *Pop* worden op haar halschild en beide oogen eenige enkele hairtjes gezien, en het achterste kleine lid is met een paar binnenwaarts gekromde spitzen voorzien. Als *Kever* zullende verschynen; dan beginnen alle de deelen, die aan den Kever zwart zyn, eerst bruinrood te worden, terwyl de overige nog geel blyven. Zy legt haare huid niet geheel, en op eenmaal te gelyk, maar by stukken en brokken af; veränderende de *Pop* binnen 3 weken in een Kever, en blyft niet lang meer onder de aarde, maar komt in de open lucht, en vliegt weg, *ald. 14.*

Doodsboofds-Vlinder, zie *Jasmyn-rups*.

Doorn-rups, (*de byzonder getekende*,) benevens haare verändering tot in een *Vlinder*, behoorende tot de EERSTE CLASSE der DAGVLINDERS, IV. 169. *enz.* III. 175. *enz.* Haare lengte belooft na genoeg 2 duimen, en haare doornen gelyken meer na pinnen, dan na doornen. Deze zyn met louter hair en dunne steeltjes voorzien, welke aan het einde korreltjes of knopjes draagen. Haare 6 voorste *klaauwpooten* zyn donkerer dan de overige. Veränderen willende, maakt ze zich met het achterdeel ergens aan vast, en hangt dan lynrecht neder, IV. 171. De *Pop*, waaruit een *Mannetjes-vlinder* voortkomt, is altoos merkelyk kleiner, dan waaruit het *Wyfje* wordt gebooren. Ook is de laatste van de eerste zeer onderscheiden, door de groote in den geelen grond doorfchynende zwarte vlakken; voor 't overigen gelyken de Poppen elkander, ten aanzien der gestalte, volmaakt wel, IV. 172. De grondverwe der *ondervlakte* van den *Vlinder* is schoon oranje-geel, en de

Vleugels zyn met verscheide witte, blaauwachtige, ook zwarte vlakken en trekken, in eene fraaie schakeering verciert. De *bovenvlakte* heeft, voor het meerder gedeelte, eene aardbruine grondverwe. De beide *achter- of ondervleugelen* hebben eene blaauwe en zwarte, uitgeronde, breede bezooming, en pronken in 't geheel met schitterende, overdwars loopende, oranje-geele, halfsmaanswyze geboogen streepen. Aan den *buitenkant der Bovenvleugelen* ziet men desgelyks eene bezooming van zodanige koleuren; doch dezelve is smaller; en de koleuren zyn zo frisch niet. Even als de *bovenvleugels* verscheide witte vlakken vertoonen; zo loopt 'er midden door de *Ondervleugelen*, overdwars, een witte streep, die van de donkere en dikke aderen dermaate wordt doorsneden en verdeeld, dat dezelve niets anders, dan eene verzameling van vlakken schynt te zyn, III. 176.

Doorn-rups, (*eenzaame bruine*,) zie *Eenzaame bruine Doornrups*.

Doornrups, (*de eenzaame*,) zie *Eenzaame Doornrups*.

Doornrups, (*de eenzaame diklyvige*,) zie *Eenzaame diklyvige Doornrups*.

Doornrups, (*de eenzaame geele en graauwe*,) zie *Eenzaame geele en graauwe Doornrups*.

Doornrups, (*de eenzaame koolzwarte*,) met iegelloode zydelakken, benevens haare verändering in den schoonen grooten *Parlemoer-vlinder*, behoorende tot de EERSTE CLASSE der DAGVLINDERS, IV 135. Haare grondverwe is over het algemeen zwart, en haar byzonder eigen kenteken bestaat in 8 heldere tichelroode vlakke, welke men onderaan ter wederzyde op de ringen, op de 3 eerste volgende, ziet. Midden

over den *Rug* loopt, in de lengte, eene dubbele, en veelmaals overdwars afgebroke, eenigzins doffe, en daarom naauwlykskenbaare okergeele linie. Voor 't overige is alles aan haar zwart, zelfs de 16 *Pooten*, maar de 4 paar stompe *buikpooten* hebben bruine zoolen. Haare *Doornspitzen* zyn volkomen zwart, tamelyk lang, en meer met tedere styve hairen, dan met bytakken bezet. Op elken der 3 eerste ringen, op den hartvormigen *Kop* volgende, staan 'er vier, op elken van de 7 volgende ringen zes, en op elken van de twee laatste weder vier *ald.* 136. 137. De gedaante der *Pop* komt na genoeg met die der andere *Poppen* dezer *Classe* overeen; maar haar achterdeel is meer gekromd, en tusfchen dit en het voorfte deel is eene grooter inbuiging. Op haare *ringen* heeft zy etelyke reien laage wrattenvormige *spitzen*, en aan het voorfte deel zyn de verhoogingen, die anders de oogen en neus vertoonen, naauwlyks zichtbaar. Haare koleur, inzonderheid aan 't achterdeel, is bleek tegelrood, of liever blinkend roodbruin, doch hier en daar donker of zwartbruin, en zo zyn ook de verhoogde wratten en spitzen, als mede de *Staartspits*. Naa 12 dagen komt 'er de groote en fchoone *Paerlemoer-vlinder* uit, *ald.* 137. Aan den *Ondervleugel* van dezen ziet men meer *Paerlemoer-vlakken*, dan aan den *Bovenvleugel*. De grondverwe der *Ondervleugelen* is altoos bleeker, dan die der *Bovenvleugelen*, en genoegzaam ftroogeel. De zilverblinkende *Paerlemoer-vlakken* ftaan niet alleen op een byzonderen groenen grond, maar hebben ook eene tedere, onglyk breede, zwarte, en tusfchen de fchaduw en het licht verdeelde bezooming. De grondverwe der

bovenvleugelen is meefal donker oranjegeel; maar aan den uiterften hoek wordt ze even zo helder of bleek ftroogeel, als die der *Ondervleugelen*. In den overigen donkeren grond is de *bovenvleugel* met louter zwarte vlakken, van ontfcheide vorm en grootte, befprekeld. Op dezen *Vlinder* ziet men het getal van 1556 verkeerd geplaatft, *ald.* 138. De *Sprieten* zyn tamelyk lang; hebben boven aan den top dikke kolfjes; zyn van boven, tot over de helft, altoos okergeel, en van onderen zwart. De *Oogen* zyn van een blinkend graauwgroen, daar eenige zwarte punten door heen fchemeren. Het *voorlyf* is okergeel, doch iets befmuld. De 4 lange, met klauwen voorziene *Pooten* zyn helderder dan de 2 voorfte kolfachtige *voelpooten*, *ald.* 139.

Doornrups, (de gezellige *Fluweel* zwarte,) zie *Gezellige Fluweel* zwarte *Doornrups*.

Doornrups, (de gezellige, zwartächtige,) zie *Gezellige, zwartächtige Doornrups*.

Doornrups, (de gezellige, zwarte bruin gestreepte en geboornde,) zie *Gezellige, zwarte, bruin gestreepte en geboornde Doornrups*.

Doornrups, (de geheel zwarte, geboornde en gezellige,) zie *Geheel* zwarte, geboornde en gezellige *Doornrups*.

Doornrups, (de groote gezellige,) met geel-roode vlakken, en haare verandering tot in een *Dagvlinder* der EERSTE CLASSE, I. 7. enz. Deze wordt de groote *Doornrups* genoemd, om dat zy overäl met groote doornachtige punten bezet is; en de gezellige, door dien ze altoos van andere *Rupfen* haarer foort verzelde gevonden wordt op allerlei foorten van *Wilgeboomen*. Haare eerste buid

is bruin-zwart, en met korte doornpun-
tjes voorzien, *ald.* Voor haare laatste
verveling vertoont zy op den *Rug* geel-
achtig roode vlakken, en is met korte
zwarte doornpunten voorzien, maar nog
zonder hairen. Haare grootte is dan één
duim, maar volwassen zynde is zy, naa
de laatste vervelling, byna $2\frac{1}{2}$ duim lang,
ald. 7. 8. Het *Hoofd* is hartvormig, in
het midden iets ingeboogen. Aan den
Bek gaan 2 spitzen of punten neder-
waarts, die de *Vreetpunten* worden ge-
noemd. Het *Lyf* bestaat uit 10 afdeelin-
gen. Aan den hals en aan de ringen
te zamen bevinden zich 8 paar *Poo-*
ten. Op den *Rug* ziet men de geelach-
tig-roode vierkante vlakken, waarvan
ieder ring, den eersten en de 2 laatste
uitgezonderd, één heeft. Deze vlakken
worden, in de lengte, door den zwart-
ten streep doorsneden, die over den
geheelen ring wat breeder uitloopt. Op
alle ringen ziet men, behalven de korte
grauwe hairtjes, zwarte eenigzins lan-
ge, doch zeer ongelyke Doornpunten,
ald. 9. In eene *Pop* willende verande-
ren, hecht zy zich met een weinig
spinzel aan de achterste pooten vast, zo
dat het hoofd nederwaarts gekeerd, en
zy omtrent den buik binnewaarts ge-
kromd is. In die gestalte één dag, of
wel langer gehangen hebbende, veran-
dert zy in eene *Pop*. Deze *Pop* ver-
toont, aan de bovenzijde, een Gyns,
een Mombakkes of Masker. Het ander
gedeelte der *Poppe* bestaat in 8 leden,
aan welke 7 paar spitze punten zyn. Voor
t overige is de kleur flykachtig of
donker-bruin, *ald.* 10. Deze *Pop* 14
dagen in die gestalte gehangen hebben-
de, komt 'er de *Vlinder* uit voort, *ald.*
11. De verkeerde zijde van deszelfs
vleugelen is graauwachtig zwart, met

veele afgezette dwarsstreepen zwart-
achtig gemarmerd, en aan den buitenrand
met een bruin-witten zoomgeboord. Op
ieder Ader der vleugelen ziet men, in
een zwarten grond, blaauwachtige hart-
vormige, en aan den rand der 2 voorste
vleugelen bruinachtige witte vlakken.
Ook heeft elke vleugel, byna in het
midden, een klein geelachtig wit vlakje.
Deze *Vlinder* heeft, gelyk alle dagvo-
gels der eerste *Classe*, niet meer dan 4
Pooten, en van vooren nog een paar hai-
rige stompjes. Het *Lyf* is doorgaans
zwarthairig, en aan den *Kop* staan 2
ronde bruine *Oogen*. De *bovenvleugels*
zyn donker-bruin-rood, als fluweel, en
hebben een breeden geelen rand, waar-
in men, even als aan de onderzijde, lang-
werpige zwarte streepjes of stippen ziet,
en in den zwarten grond staan schoone
blauwe hartvormige vlakken. Ook
hebben de bovenste vleugels, in zodani-
gen grond, 2 geele vlakken, welke na
den kant van het hoofd smal geborduurd
zyn, met kleine zwarte en geele dwars-
streepjes, *ald.* 12.

Doornrups, (de kleine, belder-bruine,
zwart gevlakte,) met den witten rug-
gestreep, benevens haare verandering,
behoorende tot de EERSTE CLASSSE der
DAGVLINDERS, III. 65. enz. Haare
lengte belooft niet boven drie vierde
van een duim. De *Kop* is klein en rond,
bruin van kleur, en van vooren met
eene zwarte driekantige vlak verciert. De
grondverwe van haar *lyf* vertoont zich
genoegzaam bruinachtig graauw, en ie-
der lid heeft ettelyke doornspitzen, op
het eerste vier, op ieder der volgende
zes lagere, en op het laatste vier kor-
te. Deze *doornspitzen* hebben eene ok-
geele kleur. Boven over den *Rug* loopt
een witachtige streep, en ter wederzijde

van denzelven op ieder ring, na vooren toe, 2 of 3 zwarte vlakken. De 16 *Pooten* zyn okergeel, *ald.* 66. De *Pop* is, in haar achterlyf, gedeeltelyk okerbruin, doch, dwars door hetzelfde, loopt in het midden, een breede, ongelijke witachtige streep, *ald.* 66. Het *achterlyf* is, voorts, ter wederzyde, in de lengte, met 2 zeer zwarte streepen doortoogen. De *Vleugelscheden*, zo als ook het voorste gedeelte van het *lyf*, zyn meer zwart-graauw, dan bruin, en na den stompen *Kop* ziet men een paar kleine, goud blinkende stippen. Deze *Pop* is met eene soort van Gyns voorzien. Naa 14 dagen komt 'er de kleine *Parlemoer-vlinder* uit te voorschyn. De grondverwe zyner 4 *vleugelen* is over het geheel oranje-geel, doch valt, na de inleding toe, in 't bruinachtig-zwarte, met welke koleur ook het *Lyf* overtoogen is. Deze oranje-geele kleur der *Vleugelen* wordt door de veelvuldige en veelerleie zwarte vlakken zeer verheven. De voorste rand der *bovenvleugelen* is zwart; aan den buitenrand ziet men een smallen witten zoom, waarop een iets breeder zwarte streep volgt. Door elk der *bovenvleugelen* loopt een zwarte hoofddader, tusschen welke 12 of 14 zwarte vlakken worden gezien. De *Ondervleugels* hebben ook dergelyke vlakken, 19 in getal, vertoonende zich als louter roode punten. De buitenste rand dier *Ondervleugelen* heeft ook wel een witten zoom; maar daarop volgen 2 fraaje slinger-linien. De groote *Oogen* hebben eene blaauwachtig groene koleur; en de *kolsjes* der 2 hairvormige *Sprieten* zyn half zwart en half geel, *ald.* 67. Het *voorlyf* is van anderen helderer, dan van boven. De 4 *Pooten* zyn okergeel, *ald.* 68.

Doornrups, (*de kleine, zwarte, met vele witte punten besprenkelde,*) met den rooden kop en pooten, benevens haare verandering, behoorende tot de EERSTE CLASSE der DAGVLINDERS, IV. 161. enz. Deze *Rups*, volwassen zynde, heeft de lengte van één duim. Haare grondverwe, zo als de doornspitzen, van welke 'er op de meeste ringen 6 staan, is koolzwart. Ieder ring is met kleine witte stippels besprenkeld; maar de *Kop* en de 16 *Pooten* zyn schoon bruinrood. De tyd haarer veranderinge naderende, verkieft zy een laag gewas, waaraan ze zich met het achterlyf, door middel van eenige draaden, gekromd vast maakt, en aldus één dag gehangen hebbende, verandert zy in eene *Pop*, hebbende eene bruine grondverwe, en haare iets verhoogde punten, op de dwarslinien staande, zyn oranje-geel. Uit deze *Pop* komt een *dagvlinder*, als die uit de *schoon getekende, en met Oranje geele en witte doornpunten bezette Rups*, beschreeven IV. 77. enz. dit onderscheid alleenlyk daarin zynde, dat hy een weinig grooter, en de oranje grond van de bovenvlakte der 4 *vlerken* niet zo helder, maar meer bruinachtig-geel uitgevallen is, IV. 162.

Doornrupsen, vier *Dagvlinders*, uit de *Doornrupsen* voortkomende, beschreeven III 174. enz.

Doosjes-bommelen, onder dezen naam is, by de Kenners der Insecten, zekere breede soort onder het geslacht der *Hommelen* bekend, welke de Cellen der Jongen, in de gedaante van een Mithridaat-doosje, van Bessen-, Roozen-| of andere bladeren, op eene verwonderenswaardige wyze, weet te bouwen, II. 465. *aann.*

Draad-vlinder, zie *Geaderd Witje*.
Dui.

Du velsmelk, zie *Wolfsmelk*.

Duizendbeenen, behooren mede onder de *Vivipara*, het welk door proeven wordt bevestigd, I. 384. enz.

Diklyviige, eenzaame Doornrups, zie *Eenzaame, dyklyviige Doornrups*.

E.

Eendags vlieg, zo noemen sommigen het *Haf of Oever-aas*, II. 230.

Eenhoorn rups, (de zonderlinge,) met 4 lange voorpooten, en 2 staartspitzen, benevens haare verandering in een *Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS, III. 76. enz. Deze heeft haar verblyf op de *Hazelaar-bladeren*, en men zou haar, gevolgelyk, de *Hazelaar rups* kunnen noemen. Doch, om dat ze den *Kop* en 't *Achterlyf* te gelyk om hoog steekt, byna op eene soortgelyke wyze, als de *Eekhoorns* gewoon zyn te doen, zo heeft men haar den naam van *Eekhoorn-rups* gegeven, te meer, om dat zy in koleur met den rossen *Eekhoorn* veele overeenkomst heeft, *ald.* 72. 73. Haare gansche lengte belooft genoegzaam 2 duimen, en de dikte van haar lichaam is vry ongelyk. Over het algemeen is ze roodachtig okergeel, doch de *Kop* heeft meer eene blinkende bruin-roode koleur, *ald.* 73. en ziet gelyk die van een *Springkhaan* aan den romp. De voorste vlakke van dezen *Kop* is meestal rood-bruin; door deszelfs midden loopt een heldere streep, en de *Bek* is zwart-bruin. De 2 eerste *ringen* hebben, van onderen, ter wederzyde, eene sikkelvormige fluweel-zwarte vlak, die men, wanneer de *Rups* stil zit, volkomen uitgebreid ziet. Zy draagt haar *Achterdeel* altoos omhoog, en aan deszelfs einde zitten 2

dunne, bruine en harde spitzen, wier lengte omtrent een derde van een duim zal belooopen. Schoon zy aan den 6den, 7den, 8sten en 9den *ring* met 2 buikpooten voorzien is, haar ontbreken nogtans de 2 laatste, naamlyk de *Naschuivers*. Het eerste paar *Voorpooten* is niet grooter, dan de gewoone klauwpooten van andere rupsen; maar de 2 volgende hebben eene ongemeene lengte, *ald.* 74 75. Haar *Spinzel*, by de verandering, is gansch wit, en niet zeer grof en dicht, maar tamelyk groot en plat. De *Pop* is blinkend, rood-bruin van koleur, en heeft aan 't uiterst einde een kort staartpunt, komende voor het overige met de meeste *Poppen* der *Nachtvlinders* van de tweede Classe overeen, 76. De *Vlinder* heeft eene graauwe grondverwe, die nu helderer, dan donkerer uitvalt, zynde dezelve, op sommige plaatzen, meer geelachtig-bruin, en hier en daar, nu met donkerer, dan met helderer vlakken en schubben versierd. De 6 *Pooten* zyn, zeer dicht met lang graauw vederstof bezet, dermaate, dat zelfs de kleine pootleden, tot over de klauwen, daarmede zyn bedekt; nogtans is het hier ter plaatze iets korter, dan aan de bovenschakelen. De dunne *Sprietten* zyn roodachtig-geel-bruin, *ald.* 77.

Eenzaame Doornrups, (de,) met den half geelen en half witten rug, en bruin lichaam, benevens haare verandering tot in een *Vlinder* van de EERSTE CLASSE der DAGVLINDERS, I. 27. Deze *Rups* nog zeer klein, en voor haare eerste vervelling zynde, is donker-bruin van koleur, hebbende witte vlakken en een zwarten kop, *ald.* aanm. Wanneer ze tot haare volkomen grootte geraakt is, welke zelden meer, dan $\frac{1}{4}$ duim

duim in de lengte belooft; dan heeft zy een zwartachtig *hoofd*, dat van boven hartvormig verdeeld, en met 2 kleine uitsteekzels of knopjes, welke met veele puntjes of hairjes bewaflên zyn, bezet is: van vooren aan het zelve ziet men 2 schuins tegen elkander loopende linien, die de gedaante van eene verkeerde V of W uitmaaken. Op de ringen staan verscheide aardige, deels Oranje-geele, deels witte vlakken en streepen. De koleur der *doornen* op den Rug is als die der ringen. De 3 paar spitze *Voorpooten* zyn zwart, en de 4 paar stompe *Buikpooten*, benevens het enkele paar *nafschuivers*, geelachtig-bruin. Zy hecht zich, willende veranderen, aan eene plaats, daar ze voor den regen en de zonnestralen veilig is, met haar achtereind vast, buigt het Lyf te zamen, en hängt indiervoegen: waarop, by warm weer, in korten tyd, eere aardige *Pop* van eene zonderlinge gedaante, met eene Gyns, te voorschyn komt, *ald.* 28. De grondverve dezer *Poppe* valt meestal uit het roozenroode in 't bruine. Hierop staan verscheide donker-bruine vlakken, en aan den *Hals* 3 paar ordentelyk onder elkander goud-blinkende punten of stippen, *ald.* 29. Naa verloop van 14 dagen komt de *Vlinder* voor den dag, *ald.* 29. Desezelfs *voorste* en *achterste Vleugels* zyn beide, aan hunnen binnensten rand uitgeschulpt, en aan de buitenste vleugelranden ziet men mede diepe uitshulpingen, verciert met groote en kleine uitsteekzels of tanden, *ald.* 30. Het overrige deel der *Vleugelen* is, tot aan den buitensten zoom, iets helderer, of liever bruinachtig graauw, en daarby aardig gemarmerd. Behalven eenige onregelmaatige groenachtige vlakjes ziet men,

by ieder binnenrand des Vleugels, een kleinen ronden Spiegel, enigzins uit het groene in 't geele vallende. Het *Lyf* is van onderen donker-bruin, zo als ook de stompe *Pooten* zyn; doch beide de deelen zyn met hairen bezet. De overige pooten zyn geel, *ald.* 31. hebbende het achterste paar één lid meer, dan de voorsten, en zynde, van den schinkel af tot aan de klauwen, met vederachtige vezelen bezet, *ald.* 32. De *bovenzyde der Vleugels* is, in het midden, tusschen bruin en Oranje geel. De buitenste rand heeft rondom een smallen Oker geelen zoom. In den voorsten *vleugel* is nog een breeder uitgeschulpt en donker-bruin boordzel. Hieraan grenzen eenige Oranje-geele halve maanswyze vlakken, dwars over de vleugels. Aan den voorsten rand ziet men eene bruine, doch meer na het lyf toe eene bruin zwarte vlak; en in het midden des vleugels nog 3 iets grootere zwarte vlakjes. De *Achter-vleugel* is, aan den buitensten rand, even als de voorste, maar het bruine boordzel is wat breeder, en inwendig met Oranje-geele half ronde vlakjes verciert, doch aan den rand is de *Achter-vleugel* zwartachtig graauw. Het geheele *Lyf* is, van boven, in een zwartachtigen grond, met veele glinsterende hairjes bezet. Op de *Sprietzen* zit, boven aan, op een teder en hair fyn steeltje, een langwerpig kolfje of knobbelje, het welk tot over de helft zwart, en vooraan geel is, *ald.* 32.

Eenzaame, blaauwstaartige, dikke groene Rups, met schuinse witte zyde-streepen, benevens haare verandering tot in een Vlinder, van de EERSTE

CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 124.
enz.

enz. Deze rups onthoudt zich meeren-deels op de Wilgeboomen, als mede op de Sleetruiken; *ald.* 125. ook dienen de bladeren van Linde- en zo genaamde Popelboomen haar ten verblyf en voedsel, *ald. aanm.* De *Eieren*, waaruit deze Rupsen voortkomen, zyn ovaal-rond, glad en helder groen-koleurig, hebbende een maand noodig, eer ze ryp, en de jongen bekwaam zyn, om uit te komen. De grootste dezer Rupsen is omtrent 3 duim lang, en zo dik, als een Mans kleine vinger. De *Kop* is langwerpig rond, van boven wat smaller toeloopende en ingekorven. De koleur is meer blaauw, dan groen. Over denzelven loopt van vooren, na beneden toe, 2 kromme, verheven en geele linien. De gansche *huid* is helder-groen, waarin men veele schoone tekeningen beseurt, die ter wederzyde van het lyf eveneens zyn, *ald.* 125. De bulten of *luchtgaten* zyn geel, en met een teder zwart randje bezoomd. Aan elk der 3 voorste ringen zit een paar geellichtige spitze *Pooten*, de 2 volgende ringen rusten op geene pooten, maar de 4 buikringen worden op zo veel paar stompe pooten gedraagen, welke groen zyn, met zodanige witte puntjes als het lyf besprenkeld, en van onderen met een smal bruin randje voorzien. Het achterste paar, of de *Naschuiver*, is zeer dik en stomp, groen van koleur, en ook wit gestippeld, *ald.* 126. De tyd haarer veranderinge naderende, kruipt ze onder de heggen of struiken, wroet in den grond, en blyft 5 of 6 dagen in haar hol liggen, gedurende welken tyd haare schoone groene koleur allengskens in het geellichtig-bruin verandert. De *Pop* is omtrent $1\frac{1}{2}$ duim lang, de koleur bliakend zwart, en het achter-

ste deel donker-bruin; *ald.* 127. Zy blyft den ganschen winter over onder haar verwulfel liggen, en de *Vlinder* komt zelden voor het einde van *Mey* daaruit te voorschyn, ja zommige blyven zelfs tot in *Juny*, en menigmaal tot in *July* onder de aarde, *ald.* 128. Hoewel de *voorvleugels* niet zeer bont zyn, ziet men ze echter overal uitnemend fraai beschaduwde, en met groote en kleine donker-bruine vlakjes getekend. De grondverwe der vleugelen is helder bruin, en valt een weinig in het Roozen-roode. De helderste vlakken in dezelve zyn met veele bruin graauwachtige stippen heel aardig besprenkeld. De grondverwe der *Ondervleugelen* is, van het lid af tot kort aan den buitenrand, hoog roozen-rood, en van daar tot aan dien rand vleeschverwig. Ter plaatze daar de roozen-roode en vleesch koleur zich van een scheiden, staat een schoone, groote oogvormige spiegel, zynde langwerpig rond, en hebbende rondom een breedden zwarten zoom, die van binnen schoon helder-blaauw, en in het midden met eene donker-blaauwe graauwachtige vlak gevuld is. Beide de *Boven-* en *Ondervleugels* zyn buitenom met eene ongemeen tedere en naauwlyks zichtbare franje omgeeven. De grondverwe van het *Voorlyf* is helder bruinachtig graauw, *ald.* 129. op 't midden van den *Rug* ziet men eene groote, bruine en langwerpig vierkanter vlak. Het *Hoofd* is van boven helder, en heeft een paar groote verheven bruine *oogen*. De *Sprieten* zyn helder-geel. Onder aan het Hoofd zit een zeer korte *Zuiger*, geel van koleur. Het onderste gedeelte van dit Voorlyf is, benevens de 6. *Pooten*,

geheel donker-bruin, en, gelyk ook de *bovenschenkels*, met wollige hairen overtoogen, *ald.* 130.

Eenzaame, bruine Doornrups, (de,) met den breedten geelen streep over de Rug, benevens baare verandering in een Vlinder, behoorende tot de EERSTE CLASSE der DAGVLINDERS, I. 41. *enz.* Wanneer deze Rups haare grootste gestalte bereikt heeft, is zy uitgestrekt byna 2 duimen lang. De *Kop* is recht donker-bruin van kleur, en met korte puntjes of hairtjes begroeid. Van den *Kop* af tot aan het uiterste einde van den laatste ring loopt een breede helder-geele streep over den rug, welke aan beide kanten een breedten donker-bruinen zoom heeft. De *Buik*, de stompe en spitze *Pooten* zyn donker-bruin van kleur. Boven aan den *hals* heeft de Rups een paar zeer lange doornen, boven en onder even dik, en ongemeen lang. De kleur der *halsdoornen* is donker-bruin: deze staan recht op, en slechts zo verre van elkander, als de geele ruggestreep breed is, *ald.* 43. De 2 groote hoornen aan het hoofd dezer *Poppe* zyn niet zo lang en spits, als aan de meeste andere. De *Neus* is wat wanschapen; de *hals* is tamelyk dun, en het middenlyf daarentegen des te dikker. De grondverve des Hoofds en der Vleugelscheden is voorwaarts bleekgrauw, doch van achteren, om de hoornen en den rug na beneden, geelachtig bruin. Wanneer deze *Pop* geen spadeling is, en omtrent 14 dagen op haare plaats heeft gehangen, komt de *Vlinder* ter wereld, *ald.* 45. De *Ondervleugels* van dezen zyn tamelyk groot; de buitenste rand is aan beide vleugels schulpswyze, en met een final geel boordzel omringd. De grondver-

we des *achtervleugels* is glinsterend bleek groen, en de daarin zynde cieraaden schynen van zilver ingelegd te zyn. De grondverve der *onderzyde* des voorsten vleugels is okergeel, en de *buitenrand* met een bleek groenen streep vercierd. Aan den *bovenkant des vleugels* staan 15 à 17 zwarte vlakken, waarvan eenige rond, andere hoekig, eenige smal andere breed zyn, doch 3 of 4 daarvan hebben de gedaante van een hart. De kleur van het *voor-* en *achterlyf*, als mede van de *bovenschenkels* der *Pooten* is bleek groen; de *Oogen* zyn groot, groen, en met eenige zwarte stipjes voorzien. De *baardspitzen*, en het paar stompe, als ook de overige 2 paar *pooten* zyn geel, van den schenkel af tot de klauwen. De 4 *vleugels van boven* hebben eene aangename oranje-geele grondverve, *ald.* 46. De *buitenrand* is rondom final met een geel boordzel. De overige grond is met een groot getal zwarte vlakken van veelere gedaanten vercierd, *ald.* 47.

Eenzaame, (de,) diklyvige, aazende op kleine brandnetels, met baare verandering tot in een Vlinder, behoorende tot de EERSTE CLASSE der DAGVLINDERS, I. 33. *enz.* De kleur der *Eieren*, waaruit deze Rupsen voortkomen, is groen, en hunne figuur rond, en, door een vergrootglas beschouwd, met verscheide inkervingen en een fynen glans vercierd, *ald.* 35. en *aann.* De Rups, volwasen zynde, is omtrent $1\frac{1}{2}$ duim lang. Op het *hoofd*, dat de gedaante van een hartje heeft, staan eene menigte redere doornpuntjes, en op de 2 eerste ringen elk 4, en alle overige, tot aan den laatste, hebben 'er 7, en de laatste 6 doornen, *ald.* 36. De gewoone kleur der *Poppe* is
bruin

bruinachtig helder-graauw, maar de punten of hoogzels zyn donker-bruin, *ald.* 37. Naa verloop van 14 dagen wordt uit dezelve de *Vlinder* gebooren. De grondverwe van deszelfs *Vleugels* is zwart. Van den voorsten rand af tot omtrent aan den achtersten hoek loopt 'er een breede hoog Menie roode, en wederzyds onregelmatig uitgeschulpte streep dwars door, en uit dezen streep komt, by den voorsten rand des *Vleugels*, een smal krom streepje, donker-rood van koleur, zich uitstrekken tot omtrent in het midden der breedte des *Vleugels*. In den zwart-blaauwen grond ziet men, in het midden aan den voorsten rand, eene groote witte vlak, en achter deze nog 4 of 5 kleinere van ongelyke gedaante. De uitschulping van alle de 4 *vleugels* is rondom met een witten boord voorzien, *ald.* 38. Op de *Achtervleugels* wordt men, naast dien witten boord, een diergelyke eenigzins bleeker Menie-roode streep, als in het midden der Voorvleugels, gewaar. In dezen streep zit, tusschen ieder paar aderen, een vierkant vlakje. De hoek van den binnenrand is met eene langwerpige bleek-blaauwe, en zwart omzoomde vlak versierd. Het gansche *Lyf*, en ook het hoofd, is op de bovenzyde met zwarte hairen bedekt. De achterste vleugel pronkt met de meeste ciernaaden. In den buitenrand, met eene witte geschulpte linie omboord, staan zo veele donker-bruine vlakjes, als deze rand hoeken of punten heeft. Langs dezen boord loopt eene geele linie van eene bleke roozen-roode koleur, waarin men eenige driekantige bruine, en, tusschen deze, blaauwächtig-graauwe vlakken ziet.

Aan den rand, floatende aan den bovenvleugel, ziet men eene groote okergeele vlak, en, na het lid toe, eene kleiner van gelyke verwe. De geheele overige grond des *vleugels* is helder-bruin, en met veele donker-bruine, graauwe, golvende, en getande linien overdwars doorweeven. In het midden des *vleugels* ziet men een paar heel donker-bruine vlakken, waarvan zommigen de getallen van 98 of 86 weeten te maaken, en waarom hy ook van veelen de *nommer-vlinder* wordt genoemd. De *buiten-rand* heeft mede zynen witten getanden boord, met zwarte spitzen, en andere kleine ciernaaden. De *onderzyde van het voor- en achterlyf* is met bruine hairen begroeid, en de *Pooten* met de baardspitzen zyn geel, *ald.* 39. 40.

Eenzaame, (de, dof-groene,) rups, die zich op de wilde kool onthoud, benevens haare verandering in eenen zeer schoonen DAGVLINDER, der EERSTE CLASSE, I. 114. enz. De volkomen grootte dezer *Rups* beloopt zelden meer, dan $1\frac{1}{4}$ duim. Haare koleur is meestal dof-groen, die zich echter na den buik toe in het witte verliest, wordende die dofheid grootlyks veroorzaakt door de ontelbaar redere, korte en fluweel-zagte hairtjes, waar mede zy doorgaans bezet is, *ald.* 106. De 8 paar *Pooten* zyn ook groen, en boven het achterste paar ziet men de *staariklep*, *als een uitsteekend flapje, dat spits toeloopt. De koleuren der *Poppe* zyn verscheide. Want eerst is haare grondverwe altoos bevallig groen; *ald.* 106. maar, in ouderdom toeneemende, wordt haar schoon groen bleek-Oker-bruin. In *April* en *Mey* van 't volgend voorjaar komt de *Vlinder* te voorschyn, *ald.* 107. Uit een-

nerleie Poppen komen *tweërleie Vlin-*
ders, ten aanzien der koleure; zommi-
 ge hebben, zo wel aan de boven- als
 onderzyde der *vleugelen*, eene zeer
 schoone vuur-koleurige of Oranje-geele
 vlak, en andere zyn 'er in het geheel
 van ontbloot. De witte soort zyn de
 Wyfjes, en die met oranje-geele vlak-
 ken op de *Vleugelen* der Mannetjes. De
onderzyde der achtervleugelen is aan
 beiden met geel-groene vlakken, van
 ongelyke grootte en gedaante, op den
 witten grond besprenkeld, en als ge-
 marmerd, en tusschen dezelve worden
 de geele verspreide aderen gezien.
 De *bovenzyde der vleugelen* zyn aan
 beide soorten, door de vuur-koleurige
 of oranje-geele vlakken onderscheiden.
 Aan den buitensten hoek hebben ze eene
 zwartächtig bruine uitgeschulpte vulling,
 voorāan met eene rei witte vlakjes of
 stippen verciert. Gelyk de uiterste hoek
 van de bovenzyde der *Voorvleugelen*
 zwartächtig bruin is, zo is dezelve aan
 de *onderzyde* met eenige groene vlak-
 ken in een vleeschverwigen en bleek-
 groenen grond verciert, *ald. 107--109*.
 De *voorvleugels* der andere soort hebben
 noch van boven, noch van onderen,
 iets van de Oranje-geele vlak, maar hun
 buitenste hoek is, aan de bovenzyde,
 alleen zwartächtig groen, en de *buiten-*
rand met zeer bleek-geele vlakjes voor-
 zien. Op de *onderzyde* is die buitenste
 hoek met groenächtige vlakken en stip-
 pen besprenkeld. Beide soorten hebben
 achter de glinsterende groene *Oogen* een
 Oranje-geel vlakje. De *Kolfjes* der te-
 dere *Sprieten* zyn geelächtig; de flak-
 vornige *Zuiger* is tamelyk lang: de
 hairige *Kop*, zo wel als het *voor-* en
achterlyf, op de onderzyde, benevens
 de 6 *Pooten*, is veel witter van koleur,

dan op de bovenzyde, die donker-
 graauw is, *ald. 109*.
Eenzaame, (de,) *geele en graauwe*
Doornrups, op *distelen aazende, bene-*
vens haare verandering tot in een
DAGVLINDER, der EERSTE CLASSE, I.
54. enz. Deze soort van rupfen wordt
 zelden langer, dan $1\frac{1}{2}$ duim. Men
 vindt ze van onderscheide verwe. De
 hier ontworpen is zwart van grondver-
 we, en met ontelbaare kleine blinken-
 de stippen besprenkeld, die alle met te-
 dere korte hairjes bezet zyn. Midden
 over den *Rug* loopen een paar heldere
 geele streepjes, en zulken geelen streep
 ziet men ook aan ieder zyde des *buiks*.
 De 8 paar *Pooten* zyn bruin van ko-
 leur, *ald. 56*. De koleur der *Poppen*
 van de tegenwoordige soort is merkelyk
 onderscheiden. Eenige zyn helder-bruin,
 met graauwe streepen en gouden stippen
 voorzien; waartegen andere geheel
 goud-geel zyn, *ald. 57*. De grondver-
 we der *Vleugelen des Vlin-*
ders is hoog
 geelachtig-rood, of vuurverwig, doch
 aan de *achter-vleugels* zo schoon niet,
 als aan de voorste. De buitenste rand
 van de 4 vleugels is met een finallen
 witten zoom omringd, langs welken, in
 de voorste vleugelen, een Oker-geel
 boordzel heen loopt, door veele zwarte
 tanden verdeeld. De bovenste hoek
 des voorsten vleugels is, tot aan het
 midden toe, zwart, en van daar loopt
 een breede zwarte streep tot aan de be-
 nedenste zyde langs den rand. In den
 vuurverwigen grond ziet men 3 zwarte
 vlakken, onregelmatig van figuur, en
 ongelyk van grootte, *ald. 58*. De bui-
 tenste rand des *achtervleugels* is met een
 dubbele rei zwarte ruitvormige vlakken
 verciert, op welke volgen 4 ronde
 zwarte vlakjes in een regel overdwars
 staan.

staande. Het *Hoofd*, *Voor-* en *Achterlyf* hebben op de bovenste vlakke eene Oker-bruine koleur, en bleeker zoom. De *Baardspitzen* en *Sprieten* zyn, als by alle Vlinders dezer Classe. De *Pooten* zyn geelachtig, de *Oogen* bruin, en met witte ringen omzoomd, *ald.* 59. Deze Vlinder wordt van eenige Insecten-verzamelaars de *Dijstelvink* genoemd, *ald.* 60.

Eenzaame, (de,) *koolzwarte*, *Doornrups*, zie *Doornrups*, (de *eenzaame koolzwarte*.)

Eenzaame, (de,) *pruim-geele Rups*, op de *blauwe kool auzende*, *benevens haare verandering in een DAGVLINDER der TWEEDE CLASSE*, I. 76. enz. De *Eieren* waaruit deze soort van rupsen voortkomen, zyn geelachtig en kegelvormig, *ald.* 76. De *Rups*, nog jong zynde, is bleek oranje geel, en wordt geduurig helderer-geel. Volwassen zynde, is zy iets minder dan $1\frac{1}{2}$ duim lang. Het *Hoofd* is helder bleek-groen, en het *Lyf* met de *Pooten* is geel; niet verre van haare verandering zynde, verandert haare groene koleur in bleek pruimen-geel, 77. en *aann.* De eerste en tweede *ring* heeft eenige roode, als ook op ieder zyde een bruin vlakje; maar op de andere *ringen* ziet men, op de ziden, 3 of 4 zulke vlakjes of slippen, *ald.* 77. Op de eerste en geringste aanraaking steekt zy, eensklaps, een paar geele Hoornen achter het hoofd omhoog, en geeft een walglyken reuk van zich, 78. *aann.* By haare verandering spint zy een draad om haar lyf en wordt te gelyk dikker en korter, tot dat de Rupsen-huid openberst, en vervolgens geheel afvalt, het welk doorgaans in 2 minuten geschiedt, waarop de *Pop* te voorschyn komt. De koleur van deze

is byna dezelfde, als die der *Rups* was; haar *voorse gedeelte*, welk bleek-rood is, heeft van vooren een paar korte dikke hoornen; het *achterlyf* loopt spits toe, en is eenigzins roodachtig; en de *slippen*, aan de rups geweeft zynde, bevinden zig ook aan de *Pop*, hoewel iets bleeker van koleur. By warm weer komt 'er binnen 14 dagen, doch als het een spadeling is, eerst in het volgende Voorjaar, de *Vlinder* uit te voorschyn, zynde één van de grootsten dezer tweede Classe. De grondverwe der beide *vleugelen* is bleek zwavel-geel. De onderste, zich wat ver uitstreckende *vleugel* heeft een lang uitsleekzel, *ald.* 78. dat zwart, geel geboord, spits toeloopend, en met een geelachtig knobbeltje voorzien is. De buitenste inwaarts geschulpte rand heeft een dubbeld zwart boordzel. Aan den *ondersten*, en eenigzins uitgeschulpten hoek van dezen *vleugel*, ziet men een Oranje-geelen, en, naar den uitersten rand, meer dan half zwarten Spiegel, die in het zwarte nog een *bleumourant* vlakje heeft. De binnenste rand na het lyf is graauwachtig, en na het lid toe zwarter. De grondverwe der *bovenvleugelen* is even als op de onderzyde, maar met breeder zwarte dwarsstrepen getekend. De buitenrand des voorsten vleugels is ook met een smallen geelen zoom voorzien, waarop een breede zwarte streep volgt, en dan een smalle geele streep; naast dezen weer een zwarte, die boven aan den rand een geel vlakje heeft, *ald.* 79. Ieder *achtervleugel* heeft een geschulpten zoom als de onderste zyde; de *binnenzyde* na het lyf toe is zwart, met graauwe haren bedekt. Het *Lyf* zelf is zo gekoleurd als de vleugels. De *Pooten*, wier bovenschensels in het midden zwart zyn,

zyn, hebben wederzyds geele hairen. Aan de *Oogen*, als ook midden over het hoofd, ziet men een zwarten streep; het *achterlyf*, van boven graauwachtig zwart zynde, is op ieder zyde, in den geele grond, met 2 zwarte streepen in de lengte getekend; en het *voorlyf* is van boven, ter zyde van den Rug, met geele hairen bezet, *ald.* 80.

Eenzaame, (de.) *schoone*, *groen geelachtige Venkelrups*, enz. Zie *Venkelrups*, (de *eenzaame schoone*) enz.

Eieren, (de.) der *Spinnen* zyn Kogelrond; hebben meer eene weeke doorzichtige huid, dan eene harde schaal: en de koleur is, naar de onderscheidene soorten, verschillend. Eenige zyn wit, andere geel, wêer andere groenachtig, helder blaauwachtig, en ook nog wel anders gekoleurd. Van eenige *Spinnen* worden de *Eieren* reeds in 't begin van het voorjaar, van anderen nog voor het einde van 't zelve, en wederom van anderen in den Zomer of in den Herfst gelegd. Uit de eerste komen de jonge *Spinnen* gemeenlyk nog in dat jaar, waarin de *Eieren* gelegd zyn, in de zomermaanden te voorschyn; doch de laatste blyven meerendeels den Winter door liggen, en de jonge *Spinnen* worden eerst in het volgend voorjaar gebooren. De meeste *Spinnen* overtrekken haare *Eieren* deels met een digt, en deels met een dun Spinzal. 'Er zyn *Spinnen*, die gestadig over haare *Eieren* zitten, zo dat men byna zou denken, dat zy dezelve, even als de hoenders en vogelen, uitbroeden; doch zy broeden ze, als een Schepzel, dat van natuure koud is, niet uit. Dit zitten op haare *eieren* schynt haar alleen ingeschapen te zyn, om het broed tegen de najaaging van zekere Sluipwespen,

Muggen en andere Insecten, die de *Eieren* der *Spinnen* met hunne Eieren beleggen of wel geheel opeeten, te beschermen. Onder de heromkeerende *Spring-spinnen* vindt men zelfs eenige soorten, die haare Eieren en Jongen mede herom sleepen, IV. 194. *aann.*

Eigenschappen, (algemeene) der AARDKEVERS.

1.) De *Wormen* van alle deze Kevers onthouden zich nooit buiten, maar altoos in de aarde. 2.) Allen hebben een harden bruinen *Kop*; ze zyn lang van *lyf*, week, van achteren als een Sak gevormd, vol dwarsplooijen. Naby den *Kop* hebben ze 6 *pooten*, welke aan de eindden doorgaans stomp, en met bruine hairtjes bezet zyn. 3.) Deze *Kever-Wormen* hebben, van het Ei af, tot aan hunnen volkomen wasdom, gemeenlyk 4 à 5 jaaren noodig, waarna ze veranderen in *Poppen*, waaruit, in 't volgende jaar, de *Kevers* worden gebooren, invoege dat 'er eenige 5, andere 6 jaaren, van het Ei af, in de aarde blyven. Dit zyn de *algemeene Kentekens der Wormen*, waaruit de *Aardkevers* worden gebooren. Deze van de *eerste Klasse* hebben dit met elkander gemeen, en dit is het eenige merkteken, dat de beide voorste *pooten*, aan den achtersten scherpen kant van hun middendeel, *uitgetand*, of met *scherpe punten* voorzien zyn, met welker behulp zy door de vaste aarde heen graaven kunnen, II. 4. 5.

Eigenschappen der BLADKEVERS, II. 127.

Deze, tot de *derde Classe* der *Kevers* behoorende, hebben dit met elkander gemeen, dat ze op de bladeren woonen; maar eene byzondere eigenschap van veelen derzelve is, dat ze zich, en als *Wormen*, en als *Kevers*, enkel en

alleen met de groene bladeren generen, *ald.* 128.

Eigenschappen van alle DAGVLINDERS der EERSTE CLASSE. Deze bestaan in de volgende byzonderheden. 1.) Alle *rupsen*, waaruit de *Dagvlinders* dezer Classe voortkomen, zyn voorzien van doornen, of doornachtige borstels, of uitsteekzels met spitze bytakjes en syne hairtjes. 2.) Zy hebben een *hoofd* in de gedaante van een hart. 3.) Ten tyde haarer veranderinge hangen zy zich onder eenig uitsteekend dekzel, 't zy een blad, plank of iets van dien aart. 4.) Behalve het weinig *Spinzel* maaken zy by haare verandering, geen *Spinzel* meer. 5.) Zy hangen altoos loodrecht nederwaarts in de lucht, zo dat het achtereinde van haar lyf boven is, terwyl het midden en het voorste deel eenigzins gekromd en inwaarts getrokken hangt, tot dat ze de rupsen-huid afwerpen. 6.) De *Poppen* dezer *eerste Classe* hebben alle de gedaante van eene *Gryns*, en de meeste zyn verciert met gouden of zilveren vlakjes. 7.) De *Vlinders* hebben slegts 2 paar volmaakte *Pooten*, ter kruipinge en zitringe: in plaats van het derde paar *pooten*, hebben zy alleen een paar *stompjes*. 8.) Wanneer deze *Vlinders* zitten, wordt het achterlyf, door de Ondervleugelen, aan beide zyden geheel bedekt. 9.) Wanneer zy paaren of vermengen, blyven ze niet zo lang, als de *Vlinders* van andere Classen aan elkander vast. 10.) De *Eieren* dezer *Vlinders* zyn meerendeels rond en groen van koleur; en 11.) De Insecten dezer eerste Classe leeven, doorgaans, maar zeer kort, I. 2 — 4.

Eigenschappen van de DAGVLINDERS der TWEEDE CLASSE. 1.) Alle *rupsen* dezer *Classe* hebben een rond hoofd. 2.)

Men vindt onder deze *Classe* geen eene *Doornrups*; maar alle zyn of glad, of met korte, en tedere hairtjes, bewassen. 3.) Zy kruipen, by haare aanstaande verandering, niet verre; maar hechten zich aan den naasten Muur of Wand, aan een Stam, Tak, blad of diergelyke. 4.) Zy bespiinnen meestal de plaats, tot haare verandering uitgekoozen, en maaken zich met tedere draaden daaraan vast, maar op eene geheel andere wyze, dan de *Doornrupsen*, I. 62. 63. en *aanm.* 5.) De *Poppen* zyn met geene gouden of zilveren stippen verciert, en hebben over den Rug noch spitze bultjes, noch hoeken. 6.) De *Vlinders* hebben 6 volkomen *Pooten*, en kunnen, in het zitten, nooit het geheele achterlyf met de vlerken bedekken. 7.) By de vermenging blyven de *Vlinders* een tamelyken tyd lang aan elkander vast, *ald.* 65. 8.) De *Eieren* dezer *Classe* zyn meerendeels kegelvormig, of kogel- en plat rond, en zyn rondom met tedere ribbetjes verciert. 9.) Deze *Rupsen*, *Poppen* en *Vlinders* vindt men niet denganschen Zomer door; zy hebben meest haare bepaalde maanden, *ald.* 66. en *aanm.*

Eigenschappen, die beide Classen der DAGVLINDERS met elkander gemeen hebben. 1.) Elke *rup*, waaruit een *Dagvlinder* voorkomt, heeft 12 *ringen* of leden, behalve het hoofd. 2.) Zy heeft 8 paar *Pooten*, te weeten 3 paar spitze, en met eene harde of hoornachtige huid overtrokken *Voorpooten*, 4 paar stompe en platte *Buikpooten*, en onder den 12den of laatsten ring nog een paar platte stompe *pooten*, de *Naschuivers* geheeten. 3.) De *Poppen* zyn nooit in diergelyke huisjes of spinzels beslooten, als de meeste *Poppen* der nacht.

nachtvlinders. 4.) Alle Dagvlinders steeken, in het zitten, hunne 4 vleugels recht om hoog, en sluiten ze kort aan elkander. 5.) De *Sprieten* of *Voelboornen* van alle *Dagvlinders* zyn zo dun, als een hair, en van boven met knobbeltjes of kolsjes voorzien. 6.) Alle *Dagvlinders* laaten, uit het *Poppe-vlies* gekroopen zynde, een rood, wit- of bruinächtig vocht vallen: en 7.) de *Wyfjes* dezer *Dagvlinders* leggen nooit *Eieren*, zonder dat ze met het *Manntje* vermengd zyn geweest, I. 66 68. en *aanm.*

Eigenschappen en Kenmerken der HOUTKEVERS, behoorende tot de *Tweede Classe der Aardkevers*. De *Sprieten* bestaan aan den *Houtkever* uit louter knobbelige leden, welke meestal 10 in getal zyn, II. 103. en *aanm.* Het *Tanggebit* is hard en scherp, en sterk genoeg, om 'er mede door het hout heen te byten. Het *geluid* maaken de houtkevers niet alleen voor zich zelve, maar ook, wanneer men ze aanraakt, of drukt, mitsgaders wanneer ze by het lyf vastgehouden worden. Aan het middelste gedeelte der *Voorpooten* ziet men geene zodanige haakvormige, groote en scherpe punten, als de byzonderlyk zo genaemde *Aardkevers* hebben. *ald.* 104. 105. De *Kenmerken van de Wormen der Houtkevers*, zie *Wormen der Houtkevers*.

Eigenschappen en Kenmerken, (algemeene,) van de NACHTVLINDERS der EERSTE CLASSE. 1.) De meeste der *Rupsen* dezer *Classè* zyn, van achteren, op den laatste ring of lid van 't lyf met een spits toeloopenden, en vleesigen *hoorn* of *Straart* voorzien. 2.) Geene *rupsen* dezer *Classè* zyn met eenige haren op het lyf bezet. 3.) Men viadt

deze *Rupsen* eerst in den Herfst, en meest als ze reeds volwassèn zyn. 4.) Alle deze *rupsen* zyn zeer langzaam en traag in het kruipen. De *Naschuivers* zyn aan geene andere soort zo dik, breed en stomp, als aan deze. 5.) De tyd der veranderinge naderende, kruipen alle deze *rupsen* op den grond, en verbergen zich onder de aarde, of onder de struiken. De *Poppen* der *Nachtvlinders* onderscheiden zich door haar *voorsle-* of *hoofddeel*, het welk veel ronder van gestalte is, en waaraan men geene zo spitze hoogzels of hoekige bulten ziet, I. 118. 119. en *aanm.* De *Hoorn* zit op den rug aan 't einde. De *Vleugels* van den *Vlinder* zyn tamelyk smal, mitsgaders styf; en de *Bovenvleugels* zyn by de meeste aardig uitgerond. De *Sprieten* zyn meerendeels beitelvormig; en het *Vederstof* op de vleugels en het gansche *lyf* is niet zo wollig of donzig, als dat van andere nachtvoegels, *ald.* 120.

Eigenschappen en Kenmerken van de NACHTVLINDERS der TWEEDE CLASSE. De meeste *rupsen* dezer *Classè* zyn met haren bezet; en, schoon eenige derzelve, by haare verandering, geen spinzel maaken, andere echter zyn 'er, die een hard en styf, en wederom andere, die een week en zagt spinzel om zich heen bereiden, eer ze in *Poppen* veranderen, I. 179. De meeste *Poppen* dezer *Classè* zyn van vooren, wegens het tegen de borst geboogen hoofd stomp en rond. Eenige zyn dunner; andere dikker: veele hebben van achteren een staartpunt, of etlyke styve haren; andere hebben die geen van beiden, en zyn daarom gansch rond en stomp van *achterlyf*. De *Vlinders* zyn van anderen voornaamlyk onderscheiden door de wy-

ze, cp welke zy hunne *Vleugels* draagen, want zy houden dezelve meer of min in die gedaalte, dat ze altoos het *achterlyf* van boven bedekken, *ald.* 180. Ter oorzaake van hunnen ronden, boogswyzen en hairigen *Rug*, houden zy het *Hoofd* wat nederwaarts; en aan het middelste en achterste paar *Pooten* hebben zy doornachtige punten. Zy hebben hair-dunne of vedervormige *Sprieten*, en by de geenene, die ze vedervormig hebben, zyn die der Mannetjes in de breedte doorgaans grooter, dan die der Wyfjes, *ald.* 181.

Eigenschappen en Kentekenen van de NACHTVLINDERS der DERDE CLASSE. De meeste *Rupsen* dezer Classe, hebben slechts 10, en eenige 12 *Pooten*. Drie paar dezer *Pooten* staan, gelyk by alle *Rupsen*, onder de 3 voorste ringen; de overige 2 of 3 paar, zynde stompe, staan onder de laatste ringen. En deze stand der *Pooten* brengt te wege, dat hy het voornaamste Kenteken is, waar door deze *Rupsen* van alle andere worden onderscheiden, I. 461. 462. De *Vlinders* houden, in het zitten, hunne *Vleugels* nooit zo dicht aan 't lyf geslooten, maar draagen ze gansch vlak uitgebreid, en hechten ze aan de plaats, waarop ze zitten, zo vast, als of ze 'er in 't uitbreiden aan gelymd waren. Hun *Lyf* is ook nooit zo dik, als dat der overige *Nachtvlinders*, maar altoos veel ranker, *ald.* 465.

Eigenschappen en Kentekenen van de NACHTVLINDERS der VIERDE CLASSE. Deze zyn onder alle *Nachtvlinders* de kleinste. Als *Rupsen* spinnen ze zich, meerendeels, in dezelfde stof, of op dezelfde plaats in, daar zy haar voedsel of onderhoud vinden, en worden tot *Poppen* en *Vlinders*, I. 515. en aann.

Eigenschappen en Kentekens der SPRINGKHAANEN. Een der voornaamsten bestaat hierin, dat doorgaande alle de *Insecten*, in hunne vleesch-gelykende zelfstandigheid, geene beenderen of graaten hebben, maar in eene harde schaale beslooten zyn; en dat het ook mer de *Springkbaanen* zo gelegen zy, leert ons de dagelyksche ondervinding. Gelyk voorts alle *Insecten*, welke niet met *Zuiger* of *Steekängel* zyn voorzien, hun vreet-werktuig, of eigenlyk den *bek*, niet van onderen, na boven, maar overdwars openen en sluiten; zo is ook diezelfde eigenschap aan de *Springkbaanen* te bespeuren, II. 254.

Eigenschappen en kentekens van de WATER INSECTEN der EERSTE CLASSE. De *Wormen der Water-insecten* zyn te kennen door hunnen platten *Kop*, door hun vooruitsteekend *Tanggebit*, en door de tusschen hetzelfde staande vier voelspitzen. De beide achterste breede en dikke *Roei pooten*, die inzonderheid tot het zwemmen geschikt zyn, toonen het onderscheid tusschen de *water- en land kevers*, II. 144. De *Water-insecten der tweede Classe* leven wel als *Wormen* in het water, maar veranderen vervolgens in *Insecten* met doorzichtige vleugels; onthouden zich dan buiten het water, zweeven in de vrye lucht, paaren en geneeren zich zo lang, tot dat ze sterven, II. 174.

Eiken-rups, (de blinkende, bleek-groene en ranke,) met gele streepen, benevens haare verandering tot in een *NACHTVLINDER der TWEDE CLASSE*, I. 421. enz. Wanneer deze *Rups* volwassen is, strekt haare lengte zich uit tot over de 2 duimen. Derzelver grondverwe is, in het algemeen blaauwachtig-bleek-groen, inzonderheid over den

H

Rug,

Rug, en voor het overige is ze zo blinkend, als of ze met een Lak-vernis ware overtoogen. De *Buik*, deszelfs *ondervlakte*, als mede de *Pooten* zyn iets gras-groener. Vier zwavel-geele linien loopen in de lengte over alle de ringen heen. By haare verandering in de aarde, vervaardigt zy een dun, graauw *Spinzel*. Naa verloop van 8 dagen verandert zy in eene *Pop*, die van eene blinkende zwart-bruine koleur, en met een kort staartpunt voorzien is. De *bovenvleugels* van den *Vlinder* hebben, meerendeels, eene graauwe grondverwe; zyn aan den buitenrand met een bruin boordzel voorzien; na 't midden toe loopen 2 golfswyze streepen dwars door, met een donkeren zoom. De *Ondervleugels* zyn helder-graauw, met een smal boordzel aan den uitgeschulpten buitenrand. Het dikke *Achterlyf* vertoont zich aschgrauw, een weinig in het bruine vallende, en het *Voorlyf* is veel bruiner. De *Spieten* zyn bruin en hairvormig. De *Pooten* zyn, van onderen, met zwarte en witte reepjes, maar de *bovenschenkels* met graauwachtige hairtjes bezet, *ald.* 422. 423.

Eikenrups, (de ongemeen schoon getekende, groen en witgestreepte,) met geele en roode zyde-streepen. Haare lengte is, wanneer ze kruipt, even of om trent $1\frac{1}{2}$ duim. De *Kop* heeft eene bleeke, blaauwachtig-groene grondverwe, en is met eene witte linie doortoogen, welke bykans eene *Latynsche W* formeert. Aan ieder zyde van den *bek* vertoont zich een langwerpig-geel, en een hoog-rood vlakje. Over den *Rug* loopen 2 digt by elkander staande witte linien. De wederzydsche 9 *luchtgaten* zyn wit, en behalve dezen ziet men nog eene andere rei tedere witte puntjes.

De 6 voorste spitze *klaauwpooten* hebben eene eenigzins hoog-roode koleur; maar de overige 10 stompe *pooten* zyn schoon geelachtig-groen, en van onderen rood bezoomd, III. 240 — 242.

Elephant, zo noemen de liefhebbers der Insecten den *Vlinder*, uit de groote *Wynstok-rups* voortkomende, I. 151.

Elephant, (de bonte,) dezen naam draagt by de verzamelaars der Insecten, de *Vlinder*, die uit de groote, fraai getekende *Wolfsmel-rups* voorkomt, I. 144.

Elfenwikkeler, zo wordt genoemd de *Vlinder* uit de uitneemend. schoone geelachtig groene. *Boekeboomen-rups*, IV. 121. *aanm.*

Entrociten worden de *verseende lichaa-men* genoemd, welke op elkander zitten, en men te samenhangende vindt, III. 513.

Eremiet, Jonge liefhebbers der Insecten-verzameling geeven dezen naam aan den grooten, bruinen *Woud-vlinder*, IV. 150. *aanm.*

Erpelstaart, (de kleine,) zo wordt de *Vlinder* uit de kleine, bruin- en graauw gestreepte *Eschenrups*, door LINNÆUS genoemd, IV. 62. *aanm.*

Eschen-rups, (de kleine, bruin- en graauw gestreepte,) met het geele boordzel aan de zyden, beneyens baare veranderinge in een *Vlinder*, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVOGELS, IV. 61. *enz.* De grootste lengte dezer *rups* belooft zelden meer, dan drie vierde van een duim. Haar *Kop* is blinkend zwart, en op de voorste vlakke met eene heldere, tedere linie voorzien, welke na genoeg een driehoek uitmaakt. De grondverwe der beide *zyvlaktens* is over het geheel donkerbruin, waarin men een goudgeelen streep

streep ziet, die een boordzel, of wel een gouden keten vertoont, met zo veele schakels, als de Rups leden of ringen heeft. De 8 stompe *buikpooten* zyn bruin, en de 6 voorste *klaauwpooten* zwart. Haar *Spinzel* in de Eschebladeren is wit, doch niet zeer dicht en vast. De koleur der *Pop* is blinkend rood-bruin, inzonderheid aan 't achterste deel. Naa verloop van ongeveer 3 weeken, komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn. De hoofd- en grondverwe zyner 4 *vleugelen*, zo wel, als die van 't *lyf*, is bruinachtig-afschgrauw; door de 2 *bovenvleugelen* zyn alleenlyk eenighe heldere, gestingerde, onregelmaatige dwarslinien getoogen; en aan den voorsten rand ziet men ettelyke, verdwynende, bleke, geel-roodachtig-bruine vlakken. De *Ondervleugels* zyn byna eenverwig graauw. De *Sprieten*, die zich aan 't Mannetje meer vederachtig vertoonen, zyn, even als de staartfransjes, geel-roodachtig-bruin. De *Eieren* hebben eene schoone purperroode koleur, en eene kogelronde gestalte, IV. 61 — 63.

F.

Fluweel zwarte Doornrups, zie *Gezellige*, *fluweel zwarte Doornrups*.

Formicaleo, zie *Mieren-roover*.

Nachtvlinder met oranje-geele en zwart getekende Ondervleugelen, by de liefhebbers der Insecten bekend, IV. 102.

Fortillaria crassa, een zeker *Africaansch Gewas* in verscheide Planthoven, het welk vooräl aan de *Kaap de goede Hoop* van natuure groeit. Deze plant bezit, behalve haare zeldsaame gedaante ook die byzonderheid, dat ze een zeer

walgelyken reuk van zich geeft, die zo volkomen met den reuk van verrottend vleesch overeenkomt, dat iemand, dien men dit Gewas laat ruiken, zonder dat hy het ziet, hetzelfde altoos bystinkende dingen zal vergelyken. Daar zyn *drieërlei soorten* van bekend, waar onder een, uit hoofde van haare grootte, *Major* genoemd wordt, die wel voornaamlyk dezen reuk heeft. Op de bloem van dit Gewas, zo dra ze zich opent, legt de *Aasvlieg* haare *Eieren*, en daartoe beweegt haar de Reuk, II. 570.

G.

Gaffelpuntige Rups, zie *Rups*, (de *Zee-groene*.)

Galäppels, } dat deze aan de *Eikeboog-*
Gallen, } *men* groeien, doch geene
wezenlyke vrugten derzelve zyn, is een iegelyk bekend; doch waaruit zy hunnen oorsprong neemen, bleef eene verborge zaak, tot dat MALPICIUS ook deze gewassen naauwkeuriger onderzocht. De *Wesp* is alleen de oorzaak dezer uitwassen, als welke een *Ei* in het eikeblad legt, en uit het *Ei* komt de *Worm* te voorschyn, II. 511. Daar zyn *zevenerelei soorten van Gallen des Eikenbooms*

- 1.) De *eerste* dezer soorten is de groote en ronde, die doorgaans voorkomt in den hoek, welken het Eikeblad en het takje, daar het aan zit, uitmaaken. 2.) De *tweede* is eene iets kleiner soort, altoos zittende aan de ondervlakte van het blad. 3.) De *derde* groeit ook aan de ondervlakte, en is t'eenemaal rond, maar niet wel zo groot, als eene *Erwt*. 4.) De *vierde* is eene half kogelronde, of eenigzins ingedrukte *Galle*, welke met haare platte vlakte aan de onderzyde des blads zit. Haare grootte even

maart die van eene halve Zuiker-Erwt, of van een klein knoopje. 5.) De *vyfde* is eene soort, welker getalte en gedaante veel overeenkomst heeft met eene Hoppendruiſ, of met den Zaadknop van eenen vlierboom, wordende meestal aan het uiterſte einde van een takje, zomwylen enkel, en ook wel 2 of 3 voudig te zamen zittende gezien. 6.) De zo genoemde Knoppen, by de Verwers wel bekend, is de *zesde* soort. 7.) *Eindelyk* is 'er nog aan de tedere takjes of uitspruitzels van den Eikenboom een zwamachtig gewas, het welk ruuw en bruin van koleur, doch week op het gevoel, en niets anders is, dan eene soort van Gallen, III. 182. 183 Doch de Galäppels der Eikeboomen zyn de eenigſte Gewaſſen niet, wier oorsprong aan de Inſecten toe te ſchryven is; men vind 'er meer, die aan verſcheide planten groejen, zo wel in koleur als gedaante verſchillen, en ook nog andere eigenschappen hebben. Zommige zien 'er uit als bloemen, en anderen zyn den vruchten zo gelyk, dat men zich niet ontzien hebbe, dezelve te eeten. Alle deze Gewaſſen worden *Gallen* genoemd II. 512.

Gakwespe, (de,) *aan de Eikeboomen, benevens haare verandering en andere eigenschappen*, III. 182. De *Worm* van deze, in zyne volkomen grootte, heeft eene witte koleur, maar op den rug draagt hy een zwart-grauwen ſtreep, die aan het einde op zyn breedſte is. Ter plaatze van den *bek* is een bruin puntje, het welk in een ten naaſten by ſtomp Tanzgebit beſtaat, het welk de *Worm* overdwars opent en weder ſluit, *ald.* 186. Hy is eene *Made*, die in 't geheel geene pooten heeft, en echter is hy aan de verandering onderworpen

Het *lyf* dezer *Made* is volkomen overal even dik, en men kan het voorite deel niet gemaklyk van 't achterſte onderscheiden. Het eene is niet ſpitzer, dan het ander; ze zyn beide even dik en rond. De *Poppen*, nog jong zynde, vertoonen zich geelachtig wit; maar naa verloop van 8 dagen is haare koleur al veel donkerer. Het *achterlyf*, dat altoos het grootſte deel uitmaakt, is zeer dik en rond, en heeft eene oranje gele koleur. Het *borſſtuk* zo wel, als de *Kop*, is zeer inwaarts geboogen, en bruinachtiger, de 6 *pooten* liggen aan de ondervlakte, en ſtrekken zich uit tot aan 't einde van 't lyf. Naby haare verandering zynde, wanneer zy op het punt ſtaat, van eene *Wesp* te worden, dan is het *voorlyf* veel helderer, en 't *achterlyf* wordt bruiner, *ald.* 187. Wanneer de *Wesp* de Poppenhuid heeft afgelegd, is ze bleek van koleur, en haar 4 *vleugels* zyn nog geheel geſchrongeld. Zy verlaat dan ook haare wooning niet ten eerſten, maar blyft 'er zo lang in, tot dat haare huid en gebitang de noodige hardheid hebben verkreegen, waartoe ze, zomtyds, 2 of 3 en meer dagen noodig heeft. Den buitenſten baſt des galäppels eindelyk doorgebeeten hebbende, bevindt zy zich in volkomen vryheid; en haar eerſte werk is, de nog eenigzins te zamen gevouwen vleugelen met haare pooten te reinigen, die uit te breiden, en in behoorelyke orde te ſchikken, *ald.* 188. Wat betreft het *geſlachts-kenmerk der Wespe*; daar is geen ander uiterlyk kenteken, dan dat het *achterlyf* aan 't *Wyſje* dikker is, dan aan het *Mannetje*. Gelykerwys de *Gakwespen* in 't algemeen, door haare uiterlyke gedaante en koleur, van elander verſchillen, zo is ook de tegen-

genwoordige van de overigen onderscheiden. Deze heeft een kleinen, helder-bruinen *Kop*, waaraan 2 tedere en korte *Sprietjes*, zonder kolfjes zitten. Het *voorlyf* of *borststuk* is zeer verheven en tamelyk stomp; heeft eene helder-bruine grondverwe, in de lengte met tedere linien doortoogen. De 6 *pooten* zyn oranje-geel. Het *achterlyf* is blinkend glad, en de koleur valt meerendeels in 't oranje-geele, dat van boven in 't zwarte verdwynt, *ald.* 189. De 4 *vleugels* zyn zeer helder en doórzichtig. De *Bovenvleugels* steeken verre over het *achterlyf* uit, en de *onderste* worden zo veel te korter bevonden. Het *Wyfje* dezer soort van Wespen is met een *Angel* begaafd, welke lang is; *ald.* 190. vertrouwt haare *Eieren* aan de knopjes der uitgesprooten en tedere takjes van de *Eikenboomen*, *ald.* 191. en dan loopt haar *Leven* ten einde, *ald.* Deze *Eieren* zyn weekachtig, en hebben eene peervormige gedaante, II. 472. *aann.* Zie verder *Galwespen*.

Galwespe, (de,) door welke de *Gallen*, aan de ondervlakte der bladeren zittende, worden voortgebragt; benevens haare verandering, III. 253. enz. De *Made* dezer *Galwespe*, heeft wel, als de voorgaande, eenerleie dikte, en genoegzaam eenerleie geelachtig-witte koleur; maar aan den *Kop* bespeurt men terstond aan beiden een merkelyk onderscheid. Aan de *Made* des *Galappels*, die tusschen de takjes en den steel des blads te voorschyn komt, ziet men aan het voorste deel een bruin *Tanggebit*, zonder eenige andere verhooging of uitwasping, die men den *Kop* zou kunnen noemen. Maar aan de andere *Made* ontdekt men in tegendeel niets van zulk een *Tanggebit*; die heeft, in plaats van

dat, een verheven *Wratje*, het welk dezelfde koleur van 't *Lyf* heeft, en voor een byzonder kenteken gehouden kan worden, *ald.* 256. De *Pop* is in het eerst wit; maar, eenige dagen onder zynde, begint zy al van koleur te veranderen. De *Oogen* en *Schubben* van het *achterlyf* worden eer donker, dan de andere deelen, tot dat de *Pop* allengskens een donker aanzien krygt, waartoe 3 weeken worden vereischt, *ald.* De *Wesp* komt eerst te voorschyn in de daarop volgende Lente, als de *Eikeboomen* beginnen uit te loopen, *ald.* 257. Het *Voorlyf* en de *Kop* dezer Wespen hebben wel veel gelykheid met die zelfde deelen van de andere; maar aan het *achterlyf* verschillen ze grootlyks in koleur. Aan deze is zulks blinkend zwart bruin, daar 't aan de andere eene oranje-geele koleur heeft. Zy is ook kleiner, dan de voorige, en heeft veel langer *vleugels*; daarby heeft het *Wyfje* geen *Legangel*; maar heeft aan de ondervlakte een klein spleetje, daar eenige hairtjes rondom staan. De *Sprietten*, benevens 6 *Pooten* zyn aan de tegenwoordige ook langer, *ald.* 258.

Galwespe, (de basterd,) die uit de half-ronde, rood en geel gestreepte *galappelen* voortkomt, II. 346. enz. De *Made* van deze verschilt alleen in grootte van de andere, *ald.* 347. Hy blyft doorgaans den ganschen winter over in zyne Celle liggen, *ald.* 348. In eene *Pop* veranderd zynde, is het *Mannetje* onderscheiden van het *Wyfje* door de dikte en grootte, zynde dit laatste bovendien met eene lange legpyp beedeeld. Haare koleur is in het begin wit, en wordt eerst, ten tyde wanneer de *Wesp* 'er uitkomen zal, donkerer, *ald.* 342. Uit dezelve komt eene *Sluipe-
wespe*

wesp voort van eene geheel andere soort, vertoonende zich de *Sprieten* kolfachtiger; en de *Legpyp* zit op eene gansch andere plaats. By anderen hegt deze haare inleding voor aan de ondervlakte des achterlyfs; maar hier komt zy uit de buitenste spits van het laatste lid, *ald.* 350.

Galwespen, worden die Wespen genoemd, dewyl ze de *Gallen* of *Galappels* veroorzaaken, II. 472. Zodanige *Galwespen* hebben een kleinen *Kop*, een hoog verwulfd *borststuk*, een kort, zakvormig, en een zeer dik *Achterlyf*; waarāan by zommige Wyfjes eene *Legpyp* wordt gevonden. Zy hebben ten deele dunne *Sprieten*, en langer *vleugelen*, dan 't achterlyf. Haare *Eieren* zyn weekāchtig, en hebben eene peervormige gedaante; en de *Wormen*, daaruit voortkomende, zyn meestal dikke, te zamen gekrompe, witgeele *Maaden*, zonder pooten; men vindt ze aan 't eene en andere einde bykans even dik; en ze zyn, aan haare spits, of met een slomp naauwkenneelyk Tanggebit, of, in plaats van dat, slechts met eene verheve *Wrat* voorzien. Deze *Wormen* veranderen in dezelfde Cellen der *Galappelen*, die met hunne geboorte ontstaan, en van welker binnenste zy zich voeden, en wanneer zy in dezelve tot volkomen *Galwespen* zyn verānderd, moeten ze 'er door heen byten. Dan, 'er is nog eene andere soort van *Galwespen*, welker *wormen* geene *Maaden* zonder pooten, maar veelēer met veele pooten zyn, gelyk de *Basterd rupsen* der *Bladwespen*. Van deze ontstaan, by haare geboorte, op de bladeren van verscheide boomen, allerhande bulāchtige *Galgewassen*, waarin ze zich onthouden, en zich van haare *Gallen-woo-*

ning zo lang geneeren, tot dat ze in *Poppen* moeten verānderen, wanneer eenige binnen dezelve, en andere buiten dezelve, onder de aarde, verānderen, II. 472. *aanm.*

Galwespen-worm, (de kleine,) der *Teenwilgebladeren*, benevens zyne verāndering, II. 516. *enz.* De *Kop* is, als het overige *Lyf*, geelachtig; hy geneert zich, in zyne besloote woning, aanvānglyk van het toevloeyend sap, en vervolgens met de inwendige tederste en weekste deelen. Hy omspint zich, in zyn geweezen *Spysvertrek*; blyft 'er tot het voorjaar in liggen, en verschynt in de maand *Mai*, in de gedaante eener *Wespe*. De *Sprietjes* zo wel van 't Manneje, als van het Wyfje, zyn zonder kolfjes, *ald.* 517. 518.

Gamma-vlinder, zo heeft LINNÆUS, in zyne *Fauna Suecica*, den *Vlinder*, uit de dikke, gras-groene en witgestreepte *Spaanrups* voortkomende, genoemd, om dat zyn merk best met de *Grieksche Gamma* van het klein Alphabet overeenkomt, I. 491. *aanm.*

Garnaal, (de kleine) onzer rivieren, *beschryving van dezelve*, III. 305. *enz.* Deze vindt men, den ganschen Zomer door, in de rivier *Pegnitz*, aan de ondiepe oevers. Haare grootste lengte is nooit boven één duim. Ten aanzien der koleure zyn ze altoos verschillende; want eenige zyn zomtyds gansch wit. Gewoonlyk komen ze ons donkerer voor, en dan zyn zommige bleek groenāchtig-graauw, of olyfkleurig; *ald.* 305. of iets meer okergeel; doch alle hebben, wegens haare gladde schubden, een helderen glans, met roode buitenspitzen, *ald.* 306. Dit Insect komt ook uit het *Ei* te voorschyn, en verāndert doorgaans 4 of meermaals in een

een jaar van huid, naar maate de aangroei zulks vereischt; leevende niet veel langer, dan een jaar, *ald.* 307. Deze *Garnaal* is tamelyk smal of rank van *Lyf*, en bedekt met 14 *schubben*. De *Kop* heeft eene eenigzins ongeschikte gestalte, en ter wederzyde een graauw oog, dat met zwarte slippen besprenkeld is. Vooraan den *Kop* hebben 2 paar *Spieten* haare inleding. Het *bovenste* paar loopt recht uit, ongelyk in dikte, en ook niet even lang. De 2 *onderste Spieten* staan eenigzins nederwaarts gebogen, en zyn, aan de beide uiterste leden, met zeer tedere hairtjes bezet. De 2 kleine *vreespunten* bestaan niet alleen uit 3 of 4 leden, maar zyn ook vooraan met een teder en scherp klawwtje voorzien. Op deze volgen 2 paar dikke *vangpooten*, overtreffende de overige pooten in dikte en sterkte, *ald.* 308. Behalven deze 4 *Voorpooten*, heeft deze *Garnaal* nog 5 paar andere, waarvan de 2 eerste paaren elkander tamelyk gelyk, en de overige 3 langer paaren elkander in maakzel en groote volkomen gelyk zyn. Aan 't uiterste einde hebben ze een recht uitstaanden *klaauw*; en aan het uiterste van ieder lid ontdekt men eene scherpe spits. De *Staart* wordt allengskens tot aan het einde dunner. Aan dezen heeft zy van onderen 3 paar *vederpooten*. Aan 't laatste lid van den staart zitten, in plaats van de *Vlotschubben*, 6 byzonder, beweegelyke lange spitzen, en ieder van deze heeft nog eene beweegelyke byspits, *ald.* 309.

Garnaal, (de Zee-) zie *Zee-garnaal*. *Geaderd Witje*; zo wordt de *Vlinder* uit de *schadelyke* gezellige *Oranje-geele Rups*, met de *zwarte streepen* over

den *rug* en op de *zyden*, genoemd, I. 86.

Geele, gezellige *Motruys*, zie *Motruys*, *geele*, gezellige.

Geheel zwarte, *geboornde* en *gezellige Doornruysje*, benevens zyne *verandering tot in een DAGVLINDER* der EERSTE CLASSE, I. 51. enz. De koleur van deze *Rups* is gelyk aan die van het *gezellige*, *zwarte*, *bruin-gestreepte* en *geboornde Doornruysje*, zie *aldaar*; uitgezonderd den *bruinen* streep, welke het eenigste kenteken is, waardoor beide soorten van elkander kunnen onderscheiden worden, *ald.* 51. als welke haar op zyde ontbreekt. En zo is het mede omtrent de *Pop* gelegen, bestaande het onderscheid meerendeels daarin, dat deze iets kleiner, en op de *Vleugelscheden* niet zo donker bruin is, de *Gryns* zwartachtig is, en dat aan ieder zyde, na beneden, nevens de spitze uitsteekzels, nog 2 reien donkere stippen staan, *ald.* 52. De grondverwe van de 4 *vleugels* is by den *Vlinder* hoog *Oranje-geel*. De buitenste rand is wit, en omringd met 2 gelsingerde uitgeschulpte zwarte linien, welker halve maansvormige tusschenruimten aan den *voorsten vleugel* geel, en aan den *Achtervleugel* schoon *Hemelblauw* gevuld zyn. In den *Oranje-geelen* grond staan overdwars een paar reien zwarte vlakjes. Na den *voorsten rand* der *Voorvleugelen* versimelt de *Oranje-geele* grondverwe in het bleek-geele. In de *onderzyde der Vleugelen* zyn de *violet-roozenverwige vlakken*, de *streepen* en *linien* door elkander gelsingerd, *ald.* 53. 54.

Geslachten der Insecten, zie *Insectengeslachten*.

Gest-worm, zie *Schuimworm*.

Geveugelde Mol, zie de zeer schadelijke groote Veldkrekel.

Gevoelens, raakende de voortteeling der *Insecten*, door de vermenging van een Manneke met een Wyfje van tweeërleie foort, om 'er eene nieuwe en derde foort uit voort te brengen, even als men voorbeelden daarvan ziet onder de viervoetige dieren en de vogelen. De mogelykheid der teelingen van Bastarden by de *Insecten* is niet tegen te spreken; maar het zal bezwaarlyk vallen, om de daadelykheid daarvan te bewyzen, I. 96. enz. Het *gevoelen*, dat by veele menschen nog hedendaags volkomen geloof vindt, „ dat, zoo niet alle, nogtans de „ meeste *Insecten* uit de Sappen en „ overvloedige, zomwylen bedorve „ vochtigheden van zodanig een Dier of „ plant, waarop ze zich onthouden, „ als van zelf en by geval voortkomen, „ en dat God reeds in de Schepping „ allen en ieder Schepzel die eigenschap „ en dat vermogen heeft ingefchapen, „ om uit zich zelve kleine *Insecten* „ voort te kunnen brengen;” wordt daar door weêrlegd, dat alle leevende schepzelen, door hunne vermenging, uit kracht van hun eigen Zaad, hun geslacht voorplanten, en dat 'er buiten dit, op geenerlei wyze, een ander ontstaan konne, *ald.* 97. 98. Het *gevoelen* raakende de oorzaak van de *verscheidenheid der koleuren op de vlinders*, als of de *verscheidenheid van het voedzel der Rupsen* de oorzaak ware van de *verscheide koleuren der Vlinders*, wordt door de ondervinding tegengesproken, *ald.* 98.

Gezellige, (de,) Fluweel zwarte Doornrups, benevens haare verandering tot in een DAGVLINDER der EERSTE CLASSE, I. 19. enz. Deze vindt men, ge-

meenlyk, in de Maand Juny, op de groote brandnetels; is in haare eerste huid glanzig-bruin. In haaren volwasen staat is zy ruim $1\frac{1}{2}$ duim lang; de koleur is fluweel zwart, en haar gansche lyf is met zwarte en eenigzins lange Doortpunten bezet. De 3 paar spitze voorpoten zyn zwart; de overige 5 paar stompe bruin rood, *ald.* 19. De *Pop* heeft eene aanzichtvormige Gryns, en de koleur is meest helder-groen; de 2 boorpunten zyn bruin geel met een smal donker-bruin randje. De neus is geel, en van boven bruin. Aan deze *Pop* ziet men eenige goude blinkende stippen, zo wel aan den *bals*, als hier en daar aan 't hoofd. Uit deze *Pop* komt; by warm Weêr, binnen 14 dagen, de *Vlinder*, welke onder de schoonste en prachtigste zyner Classe gesteld mag worden, draagende den naam van *Paauwen-Spiegel-Vlinder*. Deszelfs *onderste zyde* is meestal glanzig donker bruin. In het midden van ieder *ondervleugel* is een helder stipje. De randen der beide *vooren* en *achtervleugels* zyn met verscheide korte en lange spitze tandjes voorzien. De hoofdgrond der *bovenvleugelen* is bruin-rood of kaneel-koleurig, en als fluweel; maar de buitenste rand aan alle vleugels olyf-koleur. Kort aan het omboordzel, na den voorsten hoek toe, ziet men een grooten en ronden Spiegel, wiens grond fraai geel, en na de buitenzyde blaauw is. In den violet-blaauwen grond staan 3 bleek-blaauwe ovaal ronde vlakjes, en in het midden van den Spiegel eene byna half-rood-bruine, half zwarte, en grooter vlak. Kort aan de *Voorvleugels* staat wederom een schoone zwarte ronde Spiegel, voorzien met 4 byna violet-blaauwe vlakken. De overige ruimte des *Onder-*
vleu-

*o*lgergels is, na de lyfzyde, met geelachtige stippen in een donkeren grond besprenkeld, waarover veele blinkend bruine hairtjes zitten. Het *Hoofd* heeft bruine *Oogen*, *Sprietten*, en 2 gekromde hairige spitzen om de oogen, *ald.* 20. 21. Het *Lyf* is bruin. Aan het *Voorlyf* zitten 4 geele *pooten*, en voor dezelve een paar stompige hairige *Pootjes* zonder klaauwtjes, *ald.* 22.

Gezellige, (de geel- en zwartgestreepte) Doornrups, met baare verandering tot in een DAGVLINDER der EERSTE CLASSE, I. 22. enz. Deze vindt men ook op de groote *Brandnetels*. In den beginne ziet zy 'er zwartachtig bruin en blinkend uit, en in haare volwassen grootte is zy omtrent 1 en een vierde duim lang, *ald.* 22. 23. Het *Hoofd* is zwart, en de *hals* of eerste ring zonder doornen. Op den 2den en 3den ring ziet men doorgaans 6, op de volgende meerendeels 7, doch op den laafsten nu eens 6, dan weer 4 doornachtige spitzen. Het getal en de gedaante der *Pooten* is als by andere rupsen dezer *Classe*, *ald.* 24. De *Pop* heeft eene aanzichtvormige Gyns, in wier midden de *Neus*, en ter wederzyde de *Oogknopjes* worden gevonden. Op den *Rug* ziet men 6 of 7 paar uitsteekzels, en tusschen deze niet weinig kleine verheve pukkeltjes. De voorzyde der *Pop* is roodachtig-bruin; de achterzyde merkelyk geel bruiner; en tusschen alle hoogtens met donker-graauwe verdiepingen afgezet, pronkende het hals-cieraad met eenige goud-blinkende puntjes of vlakjes. Deze *Pop* geen spadeling zynde, sluipt de *Vlinder* 'er binnen 14 dagen uit. Zo wel de *voor-* als *achtervleugels* der *onderzyde* zyn, aan den buitensten rand, met eenigzins takkige en uitge-

schulpte punten voorzien, langs welke een okergeel boordzel loopt, midden door met een golvenden zwartachtigen streep versierd. De *achtervleugel* is, van het lid af, tot over de helft graauwachtig zwart gevuld, en aan den rand met eene zwarte dunne linie omtoogen. De grond van den *Voorvleugel* is helder okergeel, en tegen den voorsten rand aan met veele dwarsstreepen gerekend, die aan het voorste einde byna eene vlak uitmaaken, *ald.* 25. Het geheele *Lyf* is zwart-bruin en hairig. De 2 paar lange *Pooten* zyn, by hunne helder bruine koleur, donker besprenkeld. De grondverwe der *bovenvleugelen* is een weinig rooder, dan Oranje-geel. In den voorsten rand des *bovenvleugels* staan 3 groote zwarte vlakken, wier tusschenruimte Citroen-geel is. Aan de achterzyde dezes vleugels ziet men nog eene byna vierkante zwarte vlak, aan wier een-einde een helder geele streep tot niet loopt, *ald.* 26.

Gezellige, (de,) schadelyke Oranje-geele Rups, zie schadelyke Oranje-geele Rups.

Gezellige, (de,) zwartachtige Doornrups, met geele doornpunten, benevens baare veranderingen tot in een DAGVLINDER der EERSTE CLASSE, I. 15. enz. Deze Rups nog jong zynde ziet 'er bruinachtig uit, maar wordt na ieder vervelling zwarter, zynde omtrent anderhalf duim lang in haare waare grootte. Haare *huid* is met tedere hairtjes bezet; het *Hoofd* hartvormig, en even als de hals met zeer kleine en naauwlyks zichtbaare punten voorzien, *ald.* 15. Midden over den *Rug* loopt een smalle zwarte streep in de lengte, en na den buik toe nog een dergelyke geele streep. De spitze *Voorpooten* zyn zwart,

de overige bruin geel. De *Pop* heeft maar 6 paar punten op den *Rug*, die, boven aan, een in zwart ingezoomd geel knopje, en hier en daar, eene rei donkere puntjes hebben. De *Pop* zelve is doorgaans bleek-roodachtig-bruin, zynde onder het gezicht aan den hals met 2 paar goude vlakjes of stippen versierd, *ald.* 16. By warm weer komt 'er de *Vlinder*, binnen 14 dagen, uit te voorschyn. De *buitenste rand der Vleugelen* is getand, en met eenige spitze takken voorzien. De *achtervleugels* der onderzyde zyn door 't midden overdwars verdeeld, waarvan het gedeelte na den buitenkant, na 't bruin-geel trekkende, met donker-bruine dwarsstreepen, of vlammen als Nooteboomen hout, als gewaterd is; en de andere helft na den lyf kant is donker-bruin, maar zwart gevlamd. De *voorstevleugels* zyn insgelyks zodanig gekoleurd, behalve dat in het bovenste gedeelte aan den voorsten rand eene donker-bruine, en beneden nog andere donkere zwarte ingevoegde vlakken zyn. Alle de 4 *bovenvleugels* zyn Oranje-geel van koleur. Ieder *voorstevleugel* is, aan den voorsten rand, na het lyf toe, smal Oker-geel geboord, en met zwartachtig langwerpige stippen besprengd tot omtrent aan de helft. De *achtervleugels* hebben dezelfde grondverwe als de voorste, doch maar een enkel vlakje. De *buitenste rand* is insgelyks zwart, smal verdeeld, en de verdeeling oker-geel gevuld, *ald.* 17. Na den kant van het lyf zyn de *vleugels* hairig, en blinkend geel van koleur, en helderer, dan de hairtjes aan het lyf. Deze *Vlinder* heeft bruine *Oogen*, 2 paar bruine *pooten*, en een paar stompe zonder klauwen, *ald.* 26.

Gezellige, (het,) zwarte, bruin-geestreepte en gehoornde *Doornrupsje*, en deszelfs verandering tot in een *Dagvlinder der EERSTE CLASSE*, I. 47. enz. Deze *Rups* is in haare soort zo klein, dat ze naauwlyks een duim in de lengte kan haalen. Aan den hals zyn geene doornen te bespeuren; *ald.* 49. maar boven op het hoofd heeft zy een paar doornen, hebbende veel overeenkomst met de hoornen van een hart. Op de 2 eerste ringen na den hals staan 4, op de andere, behalven den laatsten, 7, en op den laatsten, 4 doornen. De *Kop* en de zo genaamde *Hartsboornen* zyn zwart; en tusschen de ringen, in de leden, ziet men kleine blinkende knopjes, van dezelfde koleur, als de overige grondverwe der huid, *ald.* 49. De koleur der *Poppe* is helder roodachtig-bruin, maar de *Vleugelscheden*, en alle hoeken en verheve punten donkerzwart-bruin. Tusschen de 2 reien spitzten op den buik ziet men, in 't midden, eene rei zwarte met wit omringde punten of stippen. Omtrent den *hals* ziet men slechts wit blinkende stippen. Naa verloop van 14 dagen komt daaruit de *Vlinder*, wiens *bovenzyde* der 4 *vleugelen* recht bruin-zwart, en meereen ingetanden buitenrand versierd is. In 't midden van den *voorsten vleugel* staan 2 groote geelachtige witte vlakken, en tusschen beide een klein wit stipje: kort aan den buitensten hoek nog 2 dergelyke witte stippen, en na den buitenrand toe 4 kromme dwarsstreepjes, waarvan de 2 aan den achterhoek Oranje-geel, en de 2 andere helder-geel zyn. In den *Achtervleugel* ziet men eene breede witte dwars-vlak, en niet verre van den rand eene geboogen Oranje-geele linie, doch beide zyn met zwarte aderen doorsneden.

den. Het *Voor-* en *Achterlyf* is, op de *bovenzyde*, als de grondverwe der vleugelen. De *Pooten* met de *onderzyde* van het lyf, en de hairige baardspitzen zyn in 't geheel van eene bleek-geel-bruinachtige koleur, *ald.* 50. De grond der *onderzyde* is met een schoon bruin-rood geverwd, de buitenste rand met een witten ingetanden zoom, zwarte vlakken, en geele geboogen linien gevuld, en het overige der vleugelen met witte slingerende streepen, met witte stippen, blaauwe Spiegels en dwarslinien begaafd, *ald.* 51.

Gezicht der Rupsen. RÖSEL tracht te bewyzen, dat de *Rupsen* geen gezicht hebben, I. 269. *enz.* maar KLEEMANN heeft ontdekt, dat ze *oogen*, en wel 12 in getal aan den Kop hebben. Van deze staan 'er aan ieder Rups, ter wederzyde van den *Kop*, tegen over en benevens den *bek* zes, die 'er uitzien als zo veele kleine, verheven, gladde en blinkende knopjes, welke by allerlei *Rupsen*, die in een Vlinder veranderen, eenerleie plaats aan den Kop hebben, en altoos in de gedaante van een halven Cirkel nevens elkander staan, I. 488. *aanm.*

Gods koetje, }
Gods schaapje, } zie *Marien-kever.*

Goudboordzel, zo wordt de *grootte hoog Citroen- en Oranje-geele Dagvlinder* by LINNÆUS genoemd, IV. 21. *aanm.*
Goudkever, (de bekende groene en bruine,) of zo genaamde GOUD TORRE, benevens zyne voortteeling en verandering, II. 42. *enz.* De *Worm*, die in een *Goudkever* verandert, onthoudt zich, zomwylen, in de hollen der Eikenboomen, die van onderen verrot, en met aarde gevuld zyn; verkiezende insgelyks wel eens andere dorre en verrotte houthoo-

pen tot zyne wooning. De *Eieren*, waaruit zy voortkomen, gelyken volkomen aan die der *Mai-kevers*, komende het jonge broedzel eerst, naa 3 of 4 weeken uit, en verschillende, naa de de geboorte, in niets van de volwasfen wormen, dan in de grootte, *ald.* 44. Deze *Worm* heeft meer dan 2 of 3 jaaren noodig, eer hy in een *Ke-
 ver* verandert, *ald.* 45. Het grootste gedeelte van 't *lyf* is naar geraade veel dikker en ronder. De koleur van den *zak*, waarin de spyze en drek liggen, toont weinig verschil aan. De grondverwe van het gansche *Lyf* is witachtig-okergeel. De *Kop* is tamelyk klein, geelachtig-rood; en deze koleur hebben ook de beide uit kleine leden bestaande *Sprietten* of *Voel-armen*. De *Gebit-tang* is donker-bruin. De 6 *Pooten*, welker voorste Paar het kortste is, hebben aan het uiteinde een kleinen klauw. De *Worm* volwasfen zynde, kruipt dieper in de aarde, en vervaardigt zich aldaar eene holligheid, welke van anderen ook by eene pille vergeleeken wordt, niet alleen uit aarde, maar mengt 'er ook eenig verrot hout onder, *ald.* 46. In deze *Pille* brengt hy nog meer dan 8 dagen door, eer hy in eene *Pop* verandert. De koleur van deze is, in 't begin, even zo helder, als die van den *Worm*, maar naa eenige dagen verandert ze, en alsdan wordt het *lyf* helder-geel; maar de *Kop*, de *Vleugelscheden* en de *Pooten* zyn iets donkerer, en meer roodachtig-geel. Het donker *Achterlyf* is op den *rug* met ploojen voorzien, en op zyde vertoont zich een helder-geele wrong, waarin de luchtgaten staan. Naa 4 of 5 weeken liggens verandert zy in een *Ke-
 ver*, *ald.* 47. doch blyft

nog wel 14 dagen onder de aarde, eer hy te voorschyn komt; want eerst is hy nog week en witachtig. Hy pronkt met een buitengemeen kostbaaren Goudglans, welke zeer fraai door zyne groene koleur heen speelt, terwyl zyn gansche *Lyf* nergens eenig punt of dwarsstreep van eene andere koleur laat blyken, *ald.* 48.

Goud-kevers, (de tweede soort der,) benevens derzelver worm en deszelfs verandering, II. 51. enz. De *Worm* van deze is, by zyn volkomen wasdom, niet veel meer, dan een duim lang. Het *Lyf*, schoon het van dezelfde geelachtig witte koleur, en op zyne gansche bovenvlakte met korte, rood-bruine hairtjes bezet zy, is merkelyk dunner. De *Kop* heeft ook eene iets donkerer bruine koleur. De met zwarte oogen bezette *Kop der Poppe* legt binnenwaarts geboogen tegen den buik, en is, benevens de *borst* en den *rug*, geelachtig bruin-rood; *ald.* 52. maar het *Achterlyf* met zyne leden heeft eene heldere Okergeele koleur, uitgenomen het laatste lid op een na, dat van koleur is, als het voorste deel. De *Pooten* zyn bruin. Het *halschild* aan deze soort van *Goud kevers* is noch zo groot, noch zo breed, als mede veel dunner, dan by den voorheen beschrevenen: de *Vleugeldekkzels* zyn ook veel korter; wier schoone groene koleur tot aan het einde van het *Achterlyf* gaat. De *Kop* is ook groen, maar de *Oogen* zyn zwart, en de *Sprieten*, welke geene, al te groote bladen hebben, zyn, benevens de *Pooten*, bruin; doch alle deze schynen hier naar gerade iets langer te wezen, dan aan de vooriger. Op de vleugel-dekkzels, en op het achterste ontblootte

gedeelte van het lyf heeft hy eenige goudgeele vlakken, *ald.* 53. Zyne doorzichtige *Ondervleugels* zyn veel langer, dan de *bovenvleugels*; dezelve zyn bruinachtig van koleur, en met donker-bruine aderen en ribben voorzien. Het gedeelte der bovenvlakte van het *achterlyf*, is by dezen *Goud kever* blinkend staalblaauw, *ald.* 54.

Goud torre, zie *Goud-kever*, de bekende groene en bruine.

Graauwe, gezellige *Motruys*, zie *Motruys*, de graauwe gezellige.

Gras-kever, (de dof-zwarte,) benevens zynen *Worm*, en deszelfs verandering in een *GRASKEVER*, behoorende tot de DERDE CLASSE der AARDKEVERS, II. 138. enz. De *Worm*, waaruit hy voortkomt, beloopt doorgaans een halven duim, alhoewel 'er ook, zomwylen, grooter gevonden worden. De dikte van zyn *lyf* loopt van vooren en van achteren smaller toe, zynde het, met den kleinen *Kop*, en de 6 *Pooten* zwart, en met veele spitzen bezet. Hy maakt zich aan het kruid, dat hem tot voedsel heeft gediend, het *Gras*, dat men *Schaapsgarve* noemt, by zyne verandering, door een bruin *Spinzel* vast, en naa een dag te hebben gehangen, wordt hy eene *Pop*, die schoon geel, en met eenige zeer tedere punten, en ettelyke hairige spitzen bezet is. Ondertusschen wordt zy hoe langer hoe zwarter, en na 14 dagen ziet men den *Kever*, hebbende dezelfde dof-zwarte koleur, als de *Worm*. Op zyne *vleugeldekkzels* heeft hy veele ingedrukte punten; de *Sprieten* zyn weder en lang, zonder kolsjes, hebbende, met de 6 *Pooten*, dezelfde koleur van den *Kever*, *ald.*

Gras-rups, (de groote, bruinhairige, geborduurde, en van vooren en van achteren

teren met eene hairige kuif begroeide,) benevens haare verandering tot in een NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE, I. 191. enz. De lengte dezer *Rups*, in den volwassen staat, is omtrent 3 duim. De *Kop* is rond, donker-geel, en overlans met graauwe streepen getekend, *ald.* 193. Wederzyds op den eersten ring, die op den *Kop* volgt, ziet men een zwart knobbeltje, waarop veele geelachtig-roode en graauwe haren zitten, *ald.* *aanm.* Op den eersten ring vertoont zich eene groote, van boven spits toeloopende, en uit louter styve haren bestaande kuif of borstel, voorwaarts na den *Kop* geboogen, aan de voorzyde zwart, en van achteren geelachtig rood, *ald.* 193. Ter wederzyde van den rug loopt eene rei kleiner, afgestompte hairige kuifjes, welke van buiten op zyde met smal geel geboord zyn. Het *lyf* is, op de zyde, wat zwarter, dan op den rug. Uit ieder ring komen, beneden op zyde, 4 of 5 vederpunten te voorschyn, langwerpig en wit, bestaande uit dicht byeen gevoegde haren. Tusschen deze ziet men, in den donkeren grond, veele geele puntjes. En de gansche *Rups* is, overal, met tedere zwart-bruine hairtjes begroeid. De *Pooten* zyn gezamentlyk ros-bruin, *ald.* 194. De tyd haarer veranderinge naderende, houdt ze zich onder aan de heggen of struiken verborgen, maakende een langwerpig, geelachtig-graauw *Spinzel* over zich heen, en blyft daarin liggen, tot dat de *Pop* haare volkomen gestalte heeft verkreegen, *ald.* 195. Deze ziet 'er zwart bruin en glanzig uit, zynde wel $1\frac{1}{2}$ duim lang. Op ieder der 8 ringen van het *achterlyf* is een zwart puntje. Zy heeft geen staartpunt, maar loopt rond toe, *ald.* 195. Naar maate

het Weer warm of koel is, blyft de *Pop* eene maand of ook langer liggen, voor dat de *Vlinder* ter wereld komt, *ald.* De grondverwe van deze soort der *Vlinders* is zeer verscheiden. De *Mannetjes* zyn altoos donkerer van koleur, dan de *Wyfjes*, alhoewel 'er onder beide geslachten wederom eenige helderer, en andere donkerer zyn. Het mannelyk geslacht aan dezen *Vlinder* is zo wel uit de kleinte van het lyf en de breedte der *Sprieten*, als inzonderheid uit de donkere grondverwe te kennen. Het *Mannetje* is rood-bruin. De *boven-* en *onder-vleugelen* zyn aan den buitenrand cierlyk uitgeschulpt. Niet verre van den buitenrand loopt eene smalle zaagvormige linie dwars door den ganschen Voorvleugel. Van den uitersten hoek des *Vleugels* loopt 'er eene rechte linie schuins na het lyf toe door heen, terwyl men nog eene andere kortere linie aan het lid ziet, *ald.* 196. Tusschen beide linien staat, naby den voorsten rand, eene zeer kleine, en kort daarna eene veel grooter witte vlak. In den *Achter-* of *Onder-vleugel* ziet men eene enkele bruine midden doorlopende dwars-linie, die den *Vleugel* in het heldere en donkere deel onderscheidt. Het *Voor-* en *Achterlyf* is, benevens den *Kop*, rood-bruin en hairig. De boven de zwarte *Oogen* staande *Sprieten* zyn als een paar pennevederen, *ald.* 197. Het gansche onderscheid tusschen dit *Mannetje* en *Wyfje* bestaat ten deele in de grondverwe, die by het *Wyfje* schoon Oker-geel is, en ten deele dar de kronkellinie slechts tot in het midden des *vleugels*, van den binnenrand af, uitsteekt. De 6 *Pooten* zyn tamenlyk hairig, en van koleur, als de *Vlinder* in 't algemeen. De *Sprieten* zyn hier

hier insgelyks vedervormig, maar zo breed niet als aan het Mannetje, *ald.* De bevruchte *Wyfjes* leggen hunne *Eieren* in den Herfst, welke niet volkomen rond, groenachtig van koleur, en van onderen met eene kronkelige linie vercierd zyn, *ald.* 198.

Gras-rups, (de groote hairige,) die veele wratten en punten heeft, met baare verandering tot in een NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE, I. 392. enz. Deze *Rups* wordt omtrent het begin van den Herfst uit het Ei gebooren; *ald.* 393. doch in verscheide jaaren gebeurt het, dat ze eerder voorkome; *ald. aanm.* en in *Mai* van het volgende jaar, erlangt zy haaren vollen wasdom, zynde haare lengte byna 4 duim. Zy is gansch bruin, hoewel ook eenige volkomen aschgrauw zyn. Ieder ring is, van vooren tot achteren, ter wederzyde, met een pinächtigen langen Wrat voorzien. Deze wratten zyn met slyve hairen begroeid, en haare lengte is verscheiden. Boven de lange zydwratten staan nog kleiner en vlakker wratjes. De gansche *buid* is alom met korte en redere hairen bezet. Deze *Rups* heeft een paar groote fluweelzwarte, en eenigzins in 't blaauwe vallende *Spiegelvlakken*, die alleenlyk zichtbaar zyn, wanneer zy uitgestrekt zit of kruipt. Over het midden van den *Rug* loopt eene dubbele donkerbruine linie in de lengte, *ald.* 394. 395. De grauwe grond der *buid* is byzonder teder zwart bestippeld, en de *hairen* zyn helderbruin. Het *Spinzel* is niet anders, dan eene taaije, slymachtige vochtigheid, welke de *Rups* uit haaren bek trekt. *ald.* 396. waaronder zy alle de hairen van haar lyf mengt. In deze behuizing veran-

dert zy, binnen 3 dagen, in eene *Pop*, welke niets ongemeens heeft, *ald.* 397. Na 3 weeken komt 'er de *Vlinder* uit voort. De beide *Bovenvleugels* zyn, zoo verre als hun uitgeholde rand gaat, doch de *Ondervleugels* geheel tot aan het lid, rosachtig, of kaneel-bruin geboord. Aan de laatste is de overige grond, doch aan de eersten alleen de helft daarvan, roodachtig-grauw, of gelyk verlept violet. Van dergelyke koleur is ook het *Achterlyf*; maar de *Kop*, het *Voorlyf* en de helft der *bovenvleugelen* zyn van eene kaneel-bruine koleur. Deze kaneel-bruine zo wel, als de violetgrauwe grond is doorgaande teder bestippeld, en in den *bovenvleugel* loopen een paar donkere gekronkelde linien, en dergelyk eene ziet men ook naar den kant van 't lid. De *Kop* is met een paar pik-zwarte *Oogen*, breede, vedervormige bruine *Sprietten*, en van vooren boven den bek met een gekromden langen *Snuit* begaafd, welke by de *Wyfjes* altoos langer is, dan by de *Mannetjes*, *ald.* 398. De *bovenschenkels* der 3 paar *Pooten* zyn zeer hairig; de koleur is eenerlei met die van 't *Voorlyf*, en het voorste paar is gemeenlyk iets donkerer, dan de overige 2 paaren. De *Eieren* zyn ovaal rond, en hebbeneene witachtige, met grauwwachtig-groene reepjes verciende koleur, *ald.* 399. en *aanm.*

Gras-rups, (de helder-bruine, gladde,) met donkerbruine schubachtige dwarsvlakken, en heldere afgebroken streepen, benevens baare verandering in een NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE, IV. 113. enz. Deze ziet 'er over het gansche lyf bleek of helder bruin uit, en heeft een roodachtigen weerschy. De donkerbruine dwarsvlakken der ringen

gen zyn, voorwaarts na den Kop, zeer scherp, doch eenigzins gedwongen, *ald.*

114. De *Staarklep* en de 2 *Naschuivers* zyn, even als ook de *Kop*, kaneel-bruin. In de donkere dwarsvlakken nevens de rug- of middellinie ziet men, op de 7 ringen, naa de 3 eerste volgende, 2 kleine witte punten, en op den Kop 2 zwarte. De beide *vreespitzen* zyn geheel wit, doch de *bovenlip* van den bek heeft eene zwarte koleur. De 6 voorste en spitze *klaauwpooten* zyn zo wel, als de 8 stompe *buikpooten*, helder-geelachtig-bruin, *ald.* 115.

De koleur der *Pop* is helder bruinrood; haare gestalte dik en stomp, en heeft van achteren eene nederwaarts geboogen staartspitse. In 't volgende voorjaar komt 'er eerst de *Vlinder* uit te voorschyn, *ald.* 116. Deszelfs *voorlyf* is dik, en de 2 *bovenvleugels* hebben eene slechte bruinachtig-grauwe grondverwe, die aan den kant der inleidinge iets meer in 't donkerbruine valt. Dierzelfer buitenrand is met een breeden, donker okergeelen zoom voorzien. De *Ondervleugels* hebben eene heldere, of bleek-grauwe grondverwe, eenigzins met okergeel vermengd, en de aderen, door dezen grond loopende, zyn, zo wel als haare takken, zwart. Deze *ondervleugels* zyn, even als de bovenste, aan den buitenrand, met een breeden okergeelen zoom voorzien, welke echter iets helderer is. Het *Achterlyf* heeft meestal eene donker okergeele koleur, en de wederzydsche lidswyze verheven vederstofsjes, gelyk ook de *Sprietten*, zyn bruinrood, *ald.* 117.

Gras-rups, (de kleine,) enz. zie *Queerups*.

Groene Schildpadde, zie *Schildkever*.

Groote Witje, zo noemt men den *DAG-VLINDER* uit de *schadelyke geele*, en *grauwe Koolrups*, I. 92.

Grunling, (de kleine witte gebandeerde,) zo noemen eenige Liefhebbers der Insecten-verzameling den kleinen *Spanmeeter-vlinder*, IV. 104. *aanm.* §.

Grunling, (de stoutte,) dezen naam draagt, by eenige liefhebbers, de *Spanmeeter-vlinder*, IV. 104. *aanm.* †.

H.

Hast, zie *Oeveräas*.

Hagal, } zie by *Arbe*.

Hargol, }

Hart kever, (de,) of het zo genoemd vliegend Hart, benevens zynen oorsprong uit den grooten Houtworm, II. 57. Tot de benaaminge van het vliegend Hart hebben zo wel zyne hoornen, als grootte aanleiding gegeven, hebbende zyne hoornen veel overeenkomst met die van een Hart, schoon ze niet zo veel uitspruitzels of takken bezitten. Deze *Kever* onthoudt zich meest en lieft in de Eike-wouden, komende, als een Maand-Kever, in *Juny* en *July* te voorschyn, *ald.* 57. zynde in *Duitschland* voornaamlyk bekend by den naam van *Schroter*, *ald.* Hy wordt uit een *Ei* geboren, zynde langwerpig rond van gedaante, en hebbende een donkere, blinkende, stroo of zeemleer-geele koleur, *ald.* 60. De *Worm*, daaruit voortkomende, heeft wel 6 jaaren noodig, eer hy zynen volkomen wasdom bereikt. De *Kop* van den volwassenen is rooder van koleur, dan de worm der *Mai*- en *Goud*-kevers; de leden van het lyf zyn meer geplooid, en op het lyf heeft hy geene haren, maar op het laatste lid eene hartvormige vlak, *ald.*

61. Aan den grooten, rond verwulften *Kop* heeft hy eene sterke, scherpe en zeer harde *byttang*, welke binnenwaarts, ter wederzyde, met nog eenige bytakken bezet is, en benevens de middellip eene donkere zwart-bruine kleur heeft. Onder deze tang ziet men nog een paar leenige, en uit verscheide leden bestaande *vreespizzen*, en tusschen deze nog een paar kortere. De 6 *Pooten*, die elk uit 5 leden bestaan, hebben aan het uiterste einde een kleinen klaauw, en zyn Oranje-geel van kleur. Op de bobbel van een opgeworpen wrong ziet men de 9 *Spiegelpunten*, die niet zeer groot en bruin van kleur zyn. Hy kan in de grootte wel 4 duim haalen, *ald.* 62. Deze worm, naa etelyke reizen van huid veranderd te zyn, te zyn, de volkomen groote bereikt hebbende, zoekt onder de aarde, een niet zo zeer zandigen, als wel lymächtigen grond, en vervaardigt daarin een ovaal ronden Bal, die van binnen gansch glad en gepolyst, en altoos veel harder en vaster is, dan de aarde, waarin hy wordt gevonden, *ald.* 63. De Ballen der Mannejes hebben eene veel langere holligheid, dan die der Wyfjes. In dezen beslooten Bal behoudt de Worm zyne worm-gestalte nog wel 4 weeken lang, en hy wordt hoe langer, hoe dikker; waarop eindelyk de verborgen *Pop* te voorschyn komt, *ald.* 64. De spitzen aan de *manlyke Pop* zyn wel 3 maal zo lang, als aan het wyfje. Deze *Pop* is in 't begin, op het afleggen van de wormen-huid, genoegzaam gansch wit, maar wordt, naa etelyke dagen, iets geeler, en aan het *achterlyf* byna Oranje-geel. De kleur van de wyfjes *pop* is iets bleeker ros-geel. De *Pop* behoudt haare gedaante wel 2 of 3 maan-

den, en dan ontwikkelt zich de *Kever* van de Poppenhuid. Deze heeft in het begin eene geelachtig witte en zeer tedere huid; de *Kop* en de *Hals* beginnen het eerst zwartachtig-graauw te worden, maar de *boornen* en *dekvleugels* blyven nog, een tyd lang, schoon geelachtig-hoogrood. Doch hy komt niet voor den dag, ten zy hy de volkomen kleur en hardigheid hebbe verkreegen, waartoe hy byna 3 maanden noodig heeft, *ald.* 65. Zyn breede en groote *Kop*, benevens de *Hals*, schynt met eene soort van helm bedekt te zyn, en de *Hoornen* bestaan in 2 stangen, aan ieder van welken 3 spitze punten of *takken* zitten, waarvan de 2 uiterste een gaffel verbeelden, en de derde binnenwaarts staat. Tusschen dezen middentak en den uitersten gaffel ziet men, aan den binnensten scherpen kant van den Hoorn, eene rei kleine *tanden*. Agter de *Hoornen* heeft de *Kever*, aan ieder zyde, nog eene dunne *Spriet* of *Voelarm*. Deze voelarmen kan hy ter zyde onder den *Kop* leggen of verbergen. Voorwaards tusschen de *Knykboornen* ziet men nog 2 andere, die korter zyn, onder den *Kop* uitsteeken, en naast den *Bek* is 'er nog een korter paar te zien, welke alle vier den naam van *Vreespunten* verdienen. Hy heeft geene *byttang*; maar 4 tongenvormige, by een staande, gele deelen, elk uit een tederen steel bestaande, die ter wederzyde, als eene penneschacht, met hairige vezelen bezet is, *ald.* 67. De beide *Oogen* zyn, behalve dat ze hard zyn, door den scherpen rand van den *Kop* bedekt. Daar de *Kop* met den *hals*, en deze met het *achterlyf* vereenigd is, zyn de leden met flyve en gele hairen bezet. Aan de *onderulakte* ziet men, ter zelfder plaats.

plaatze, ook dergelyke hairtjes, en aan den *Kop* is eene zo gepolyfte vlak, dat men 'er zich byna als in een Spiegel in beschouwen konne. De 2 voorste *Pooten* hebben hunne inleding onder den hals, en de 4 overige aan de onder-vlakte van het achterlyf. De doorzichtige *Ondervleugelen* zyn geel-bruin, met grove zo wel, als tedere aderen doorvlochten, *ald.* 68. De *Wyfjes-schröter* is door den kleinen *kop* en *bals* van 't Mannetje onderscheiden, en de korte *hoornen* van 't zelve zyn gansch anders gesteld, gelykende meer na eene Knyp tang. Ieder gedeelte dezer tange heeft, behalve zyn middelste spits, nog 2 korter spitzen. Voor 't overige zyn de overige deelen even als die van 't Mannetje gesteld, uitgenomen dat ze iets korter zyn, *ald.* 69. en dat het achterlyf van 't Wyfje voorwaarts, na het hals of borstchild toe, niet zo breed, noch zo spitshoekig is, *ald.* *aanm.*

Hartworm, dezen naam geeven de Hoveniers en landlieden aan de schadelyke, gladde, bruine *kool- en kruid-rups*, om haare schadelyke eigenschap uit te drukken, I. 335.

Hazelaar-rups, zie *Eenboorn-rups*.

Hazelnoot-worm, zie vervolgers by *Snuitkever*, die uit den *Hazelnootworm* voortkomt, II. 333. enz.

Hebe, zie *Weduwe*.

Heggen-mot, zie *Mot-rups*.

Heremiet, zie *Slakken-kreeft*.

Hermaphroditen, indien 'er al zodanige onder de *Insecten* te vinden waren, dan konnen het niet anders dan *Misgeboorten* zyn, en geen schepzelen, welke van de teel leden der beide geslachten, die men zegt dat ze bezitten, zodanig een gebruik konnen maaken, dat zy

hun geslacht voortplanten, I. *Voorrede van den Schryver*, ****.

Hermelyn vlinder, zo zou de Schryver den *Vlinder* noemen, welke uit de *schoone, diklyvige, groene Wilgen-rups* voortkomt, indien hy hem een eigen naam moest geeven, I. 298.

Hoekspinnen, zie *Classe der Landspinnen*.

Hommelen hebben hunnen naam van het *hommen*, brommen of suizen, als maakende zodanig een brommend geluid, II. 464. Zy voeden hunne *Jongen* met honing, tot dat ze in *Poppen* veranderen; doch enkele soorten vullen de Cellen met zo veel honing, als de *Jongen* van hunne geboorte uit het Ei af, tot aan hunne verandering in *Poppen*, tot hun onderhoud en voedsel noodig hebben. Zy bouwen hunne nesten meestal onder de aarde, waarom zy ook, van eenige Schryvers, wilde *Aard-byen* worden genoemd. Hunne gestalte is veel diklyviger, plomper, en zy zyn ruiger van hairen, dan de tamme byen. Zy hebben eene *gebit-tang*, en eene *Zuig-tong*. De *sprietjes* zyn meer kort, dan lang, *ald.* *aanm.* 465. meerendeels kolfachtig, en hoekig gebroken; doch van eenige soorten zyn de *sprietjes* niet alleen langer, maar ook niet hoekig gebroken. Zy hebben aan het voorste deel des *voets* 5 leden, waarvan de 4 voorste zeer klein zyn. Uit de schikking, 't getal der aderen, en ribben in de vleugelen kan men naauwkeurig genoeg bepaalen, tot welk geslacht of soort ieder Hommel behoore. De *Ondervleugels* zyn altoos kleiner, dan de *Bovenvleugelen*. De *Eieren* ziet men meerendeels helder van koleur, *ald.* 466. *aanm.*

Hommel-made wordt genoemd de *Nachtvlinder*, die uit de *gespikkelde groene Rups* voortkomt, IV. 184. *aann.*

Hoofdsoorten der Springbaanen zyn twee, te weeten de eigenlyk genoemde *Springbaanen* zelve, en de *Krekels*, II. 256.

Hooi-spinnen, zie by *Classen der Land-spinnen*.

Hoorn-rupsen worden de *rupsen der eerste Classe*, ter oorzaake van de uitsteeken- de hoornen, van veele liefhebbers der Insecten genoemd, I. 118. *aann.*

Hout-bokken, zie *Hout-Kevers*.

Hout-Kever, (*de kleine zwarte, dunlyvi- ge*, zie by *Hout-worm*, (*de kleine Oranje-geele.*)

Houtkever, (*de zwart bruine,*) uit den *Eikenhoorn* of *ander hard hout voortkomende*, II. 117. *enz.* De *Worm* van dezen *Houtkever* belooft in de lengte omtrent 2 duimen. De *Kop* van dezen is eenigzins breed en Kastanje-bruin; van vooren met eene scherpe overdwars staande *gebittang*, en onder deze met 4 korte *vreetpunten* voorzien; waar boven de *bovenlip* als eene halfronde, helder-geele vlak, en achter dezelve een graauwächtige dwarsstreep zich ver- toont, *ald.* 120. 121. De *Kop* met het eerste lid zyn beide helder Oker-geel, waar regen de overige leden of ringen witter zyn, dan de eerste. Aan ieder zyde heeft deze worm 9 tamelyk kleine *luchtgaten*. De 3 paar *Pooten* zitten aan de 3 eerste leden, en, dewyl de overige leden geene pooten hebben, zo beweegt zich de Worm, of kruipt, door de zamentrekking en uitsteeking der overige leden, in het hout voort. Over het midden van den *Rug* loopt eene donker-groene linie, welke op de 2 laatste leden rood-bruin wordt. By

zyne veranderinge maakt hy eene be- slooten, ovaal-ronde, en van binnen glad gepolyfte wooning, waarin hy nog omtrent 8 dagen als worm blyft liggen, en wordt dan eene *Pop*. In het begin is deze geelachtig-wit, wordt naderhand bruiner en donkerer; doch naa 3 of 4 weken komt 'er de *Ke- ver* uit voort. Deze is in het begin insgelyks wit, maar naa 8 dagen krygt hy de noodige hardigheid, en eene donker-bruine koleur, *ald.* 121. Het *Mannetje* is merkelyk smaller, dan het *Wyfje*. De *Sprieten* aan het eerste zyn veel zwaarer en dikker, dan aan het laatste, alhoewel ze aan beide uit knob- belige leden bestaan, *ald.* 117. De 4 kleine *Vreetpunten* zyn okergeel. De *Oogen* zyn tamelyk groot en ver- wulfd. De 6 *Pooten*, die alle even lang zyn, hebben aan hunne kleinste en uiterste deelen eene helderer of meer rood-bruine koleur, dan aan de grootere leden, *ald.* 118. De *Eieren* zyn, in het begin, stroogeel, maar worden naa eenige minuten bruiner, *ald.* 119.

Houtkevers, kenmerken derzelve, zie *Ei- genschappen en Kenmerken der Hout- kevers*.

Hout-rups, (*de groote, roode en vleesch- verwige,*) *benevens hare verandering tot in een NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE*, I. 281. *enz.* De grootste van deze soort van *Rupsen* is omtrent 4 duimen lang. De *Kop* is blinkend zwart bruin van koleur, *ald.* 283. en ten aanzien van het *lyf* niet heel groot. De *Bek* is met een sterk gebit, na eene Knyptang gelykende, voorzien. De groote en breede *Hals* heeft eene ko- leur, die uit het vleeschverwige in 't geelachtige valt, van boven met een zwart-bruin blinkend schild voorzien. De

De Grondverwe des *buiks* en der *zyden* is gelyk die van den Hals. De groote breede *Rugstreep*, die schoon rood van koleur is, ziet men wederzyds uitgerond. Op de *huid* ziet men, ter wederzyde, eenige korte en tedere hairtjes. De 8 paar *Pooten* hebben de grondverwe van het *lyf*, behalve dat de klauwen der spitze *voorpooten* bruin, en de stompe *buikpooten* onder aan met een bruin reepje bezoomd zyn, *ald.* 284. Haar *Spinzel*, by de verandering, is gansch glad, rond verwulfd, blinkend en graauw van koleur. Het *Voorlyf* der *Pop* is tamelyk hard; de *Rug* van boven zwart, en de *vleugelscheden* met den *Kop* donker- of bruin-rood. Het *Achterlyf* is, van onderen, schoon goud-geel, doch van boven wat rooder of Oranje-geel, *ald.* 286. Na 3 weken komt 'er de *Vlinder* uit, *ald.* 287. Deszelfs *Kop* is bruin, en met een paar groote zwart-bruine *Oogen* begaafd, die zich op donkere plaatzen vuurig vertoonen. De *Zuiger* is niet zeer lang. De *zyden* van het *Voorlyf* zyn bruin; het kort hairig *Achterlyf* bruinachtig graauw. De buitenste randen der 4 *vleugelen* zyn wel niet uitgeschulpt, maar met een breed graauw boordzel verciert. De *Ondervleugels* zyn iets graauwer van koleur, dan de *bovenvleugels*. Door deze laatste loopt een donker-bruine dwarsstreep; binnenwaarts in denzelven ziet men eene groote witte vlak, en buitenwaarts na den rand nog verscheide ongelyke vlakjes van die koleur, *ald.* 289. De *Pooten* zyn, mitsgaders het ganfche *onderlyf*, sterk met donker-bruine haren begroeid. De *Eieren* zyn langwerpig rond, helder-bruin van koleur, en tusschen beide zwart gestreept, *ald.* 290.

Hout-rups, (de *schoone* hoog-geele,) die zich in de *Appelboomen* onthoudt, en tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS behoort, III. 343. enz. Deze *Rups*, in haare volkomenheid, be loopt $1\frac{1}{2}$ duim, en haare grondverwe is schoon blinkend hoog-geel, *ald.* 244. Elk der ringen vertoont 10 zwartblinkende, verheve punten. Het *Tanggebit* is zwart, en aan den *Kop* ziet men 2 zwarte *Oogen*. Boven op het eerste lid staat eene iets verheven, zwart-bruine, groote, schildvormige harde vlak. De 6 spitze *voorpooten* hebben, gelyk mede de 8 *stompe* aan den buik, de grondverwe van het *lyf*, maar de *naschuiwer*, met de kleine *achterpooten*, zyn gansch zwart. Haar *Spinzel* maakt ze in den tak, waarin ze zit, verandert in eene *Pop*, waaruit in het begin van *Augustus* de *Vlinder* te voorschyn komt, die korrelachtige *Sprieten* heeft. Hy draagt zyne *vleugels* dakvormig, welke, naar geraade van hunne lengte, smal zyn. De *bovenvleugels* vallen, hier en daar, wat in 't geelachtige, en de zwarte puntjes zyn donker groen. Het ganfche *Lyf* is, op eene andere wyze, donker-groen, speelende teffens eenigzins in 't blaauwe. De vlakken van het *borststuk* vertoonen zich zwart, en de *Pooten* hebben dezelfde koleur, *ald.* 245.

Hout-wesp, (de grootste,) behoorende tot de eerste soort der WIPPER-WESPEN, nevens haare voorplanting, en andere eigenschappen, II. 504. enz. De *Worm*, waaruit deze *Hout-wesp* voortkomt, woont meestal in week hout, doch nooit in hard hout. Hy verandert ettelijke reizen van huid. Zyne koleur is bleek en helder Okergeel, en de *Kop*, welke niet zeer groot is, heef cener

eenerleie koleur met het *lyf*, en is nagenoeg kogelrond, hebbende van onderen eene kleine bruine *Gebittang*, 505. Hy heeft slechts 6 korte *Pooten*, welke aan de 3 eerste ringen zitten. Hy spint, in 't hout, een dun witachtig *Weefzel* om zich heen, en naa eenige dagen ziet men de gansch weeke *Pop*, welke aanvangelijk meer wit, dan geel uitziet, maar naa weinig uren eene frissche koleur krygt. In den zomer heeft deze *Pop* niet meer dan 3 weeken tot haare rypwording noodig; maar, die in den Herfst veranderen, blyven menigmaal den ganschen Winter over, eer 'er de *Wesp* uit voortkome, *ald.* 506. De *Kop* van deze, die tamelyk groot, en zwart van koleur is, heeft rer wederzyde eene groote geele vlak. De *Oogen* hebben een donker-bruinen glans. Tusschen deze en gemelde vlakken, staan 3 kleine, blinkende, verheven en half kogelronde knoppen van gelyke grootte. De *Sprieten* zyn Oranje-geel, en bestaan uit veele leden. Het *Voorlyf* is volkomen zwart; maar het *Achterlyf* is meestal schoon Oranje-geel. Het *Lyf* is met veel korte hairen bezet, *ald.* 507. De *Vleugels* zyn wel tusschen hunne grove aderen doorzichtig, maar hebben eene blaauwachtig-geele verwe, welke allengskens donker wordt. De *Pooten* zyn tamelyk lang, met geene bypunten bezet, en Oranje-geel; en aan het uiterste einde met een dubbelen haakvormigen klaauw voorzien. Het *Mannetje* is altoos kleiner, dan het *Wyfje*; de *Eieren* zyn spilvormig bleek van koleur, doch aan beide de eindspitzen bruin, *a'd.* 508.

Hout-wespen, worden zo genoemd, om dat zy haare Eieren meestal in 't ver-

dorde of vermolmd hout leggen, en dat de daaruit voortkomende *Wormen* insgelyks in het hout huisvesten, hun voedsel daaruit trekken, en ook eindelyk in hetzelfde de veranderinge ondergaan, II. 470. 471.

Hout-worm, (de groote,) zie by *Hart-Kever*.

Houtworm, (de kleine Oranje-geele,) welke zich in de verdorde takken van den *Hazelaar* onthoudt, benevens zyne verandering in een kleinen, zwarten dunlyvoigen *Houtkever*, II. 122. enz. Hy is, in zyn volwassen staat, byna $\frac{1}{2}$ duim lang: schoon hy eenerleie blinkende, heldere Oranje-geele koleur hebbe, valt die op de bovenvlakte nogtans eenigzins in het donkere. Op die *bovenvlakte* is ook nog een bruine overdwars staande hoekstreef te zien, die uit louter kleine puntjes bestaat. De *Gebittang*, als mede de *Kop* is zwart-bruin; *ald.* 124 de *lip* is geel, en de *Pooten* zyn zo klein en teder, dat men ze, zonder een vergrootglas, niet kan ontdekken. Wanneer de tyd zyner veranderinge gebooren is; dan maakt hy zyn lyf nog dunner, en keert zich om, zo dat zyn *Kop* na boven komt te staan, en naa eenige dagen verschynt hy in de *Poppen*-gestalte. Deze *Pop* is in 't begin helder-geel, maar eindelyk wordt het *voorlyf* en de *vleugelscheden* gansch zwart. Zy blyft 3 weeken liggen, voor dat 'er de *Kever* uit komt, wiens *bovenvlakte*, en tamelyk lange, doch zeer tedere *Sprieten* zwart, maar de 6 *Pooten* oranje-geel zyn. De *vleugels* zyn eenigzins doorzichtig, en vallen by hunne inleding in 't geelachtig-bruin, doch deze koleur wordt na 't uiterste einde zwartachtig. Het *achterlyf* heeft eene Oranje-geele grondverwe. De grond is.

na:

na achteren toe zwart bezoomd; *ald.* 125. en de spits van 't laatste lid, mitsgaders het kenteken van 't Wyfje, zwart. De *Eieren* zyn langwerpig, en geelachtig-wit, *ald.* 126.

Huiskrekel, (de,) *benevens zyn oorsprong en voortplanting*, II. 336. enz. Deze wordt *Huiskrekel* genoemd, om dat hy zich, gewoonlyk, in de huizen of achter de haardsteden onthoudt, en men hem nooit in de velden ontmoet, *ald.* 337. Het *Ei*, waaruit hy wordt gebooren, is geelachtig wit, en de gestalte is langwerpig. De *Eieren* liggen meest in de aarde, lynrecht, en 10 of 12 dagen gelegen, en eene genoegzaame warmte gehad hebbende, komen de jonge *Krekelijes* daaruit te voorschyn. Driemaal van huid verwisseld hebbende, kan men al zien of een *Krekel* een *Wyfje* of *Mannetje* zy; want het eerste is dan reeds met eene legpyl voorzien, *ald.* 338. De *Krekel* den ouderdom van 6 weken of 2 maanden bereikt hebbende, vervelt voor de vierde en laatste maal, naa welke vervelling zyne 4 *vleugels* eindelyk te voorschyn komen, en verkrygt, binnen een halfuur, zo wel in de lengte, als in de breedte, zyne volkomen grootte, *ald.* 339. Hy heeft een rondom blinkenden *Kop*, waaraan, op ieder zyde, een rond zwart-bruin *Oog* staat, en dwars over den *Kop* is een bruine streep getoogen; hoedanig een men ook nog aan den hals, en een iets kleineren over den *bek* ziet. Voor aan de *Oogen* hebben de hairvormige *Sprietjes* hunne inleding. De *Bek* is met 4 *vreetspunten* voorzien. Het *Voorlyf* heeft van boven een schild of platte vlakte, die even zo breed is als de *Kop*, en in den geelen grond 3 groote bruine vlakken vertoont. De

Vleugeldekkzels zyn by de wyfjes blinkend bruin en geheel glad, hebbende aan het halschild een helderen streep. Het eerste en middelste paar *Pooten* is veel tederer en korter, dan het achterste paar, aan 't welke inzonderheid de *bovenschenkels* zeer sterk en dik zyn, hebbende eene heldere geel-bruine koleur, en met een iets donkerer dwarsstreep schuins doortoogen. Het middelste gedeelte der *pooten* is wel veel dunner, maar aan het einde wordt het allengs dikker, alwaar ook de grootste van de 2 reien der *steekelspizen* staan, *ald.* 340. Met den voorvoet der overige paaren is het even zo gelegen. Het laatste en grootste paar *pooten* dient den *Krekel* ook tot het springen. De *Ondervleugels* zyn grooter, dan de *Bovenvleugels*, en kunnen zich als een *Waaier* toeven. De *Ondervleugels* zyn bykans wit en doorzichtig, behalve vooraan, daar ze wat bruin worden. De *bovenvleugels* zyn wel geelachtig; maar, dewyl zy eenigzins doorzichtig zyn, en de *Ondervleugels* 'er door heen schynen, vertoonen zy zich graauwachtig, *ald.* 341. Het *geluid*, *gekriek* of *gezag* wordt alleen van de *Mannetjes* gemaakt. Daar door lokt het *Mannetje* 't *Wyfje* tot zich, en dit geeft het zyne tegenwoordigheid te kennen, door middel van zyne lange *Sprieten*, waarmede het-zelve 't *Mannetje* aanraakt. Dit bukt daarop reder, en het *Wyfje* geklimt, gelyk by de *Springkhaanen* geschiedt, zyn aangenaamen *Zanger*, *ald.* 342. en daarop wordt de paaring binnen eenige minuten zonder gezang en merklyke beweeging, volbragt. Deze paaring herhaalen zy eenige volgende dagen, tot dat de tyd van het eierleggen verschynt, wanneer het wyfje de bevruchte *Eie*.

ren, door de in de aarde gestoken Legpyp, die zich alsdan opent, laat vallen, *ald.* 343.

Huismoeder, of *Looper*, zo wordt de *Vlinder uit de groenächtig geel rups*, by LINNÆUS genoemd, IV. 176. *aann.*

Huisvlinder, dezen naam hebben eenige liefhebbers den *Vlinder* gegeven, die uit de gladde, *schoon geelächtig-groene Rups* voorkomt, om dat hy dikwyls in bewoonde huizen wordt gevangen, IV. 112. *aann.*

Hammers of *Zeekreeften*; daar is, uitgenomen de grootheid van 't stuk, bykans geen het minste onderscheid tusschen hen en de *Rivier-kreeften*, III. 293. Zie verder *Rivier-kreeft*.

I.

Jasmyn-rups, (de ongemeen groote, en met geel en blaauw zeer fraai verciende,) benevens haare verandering in den zo genoemden DOODSHOOFD-VLINDER, behoorende tot de EERSTE CLASSE der NACHTVLINDERS, III. 5. enz. Zy heeft de lengte van byna 5 duimen; haare grondverwe is, op de bovenvlakte van het lyf, schoon hoog Citroen-geel, doch na onderen wordt ze fraai groenächtig. De *Kop* is geel van kleur, en heeft aan ieder zyde een evenredigen zwarten streep; onder aan den *Bek* ziet men een paar groote, en een paar kleine *vreespitsen*, die insgelyks zwart zyn. De 3 eerste leden van het lyf hebben eene byna gansch geele kleur. Onder deze 3 leden zitten de 3 paar voorste *klaauwpooten*, van eene zwarte kleur, en met witte punten besprenkeld, *ald.* 8. De *Staartspits* hangt, gelyk een hondestaart, nederwaarts af, in voege dat ze byna de gedaante eener S vertoone,

en haar uiterst einde is gedraaid als een slakkenhuisje. De 2 achterste *pooten*, of *Naschuivers*, zyn veel grooter en stomper, dan de 4 paar *buikpooten*, en, gelyk deze, groenachtig-geel van kleur, *ald.* 9. De *Pop* is over 't algemeen schoon donkerrood-bruin, welke kleur echter, voor aan den *Kop*, en achter aan het *staarceinde*, eenigermate in 't zwarte valt. Aan ieder zyde ontdekt men 5 groote, zwarte, langwerpig *luchtgaten*, en aan het laatste lid heeft zy eene harde en knobbelige *steelspits*, *ald.* 11. Na dat die 6 weken in rust heeft gelegen, komt 'er de *Vlinder* uit voort, die den naam van *Doodsboofdlinder* draagt. De vermenging van ontelbaare zwarte, donker- en heldergrauwe punten maakt, dat de grondverwe der *bovenvleugelen* van den *Kop*, en de 6 *Pooten* zwart-grauw in 't oog valle, *ald.* 12. In dezen grond vertoonen zich, op de *bovenvleugelen*, verscheide heldere en donkere Oranje-geele vlakken, mitsgaders eenige gansch zwarte, ook okergeele, gekronkelde dwarsstreepen, en in het midden van ieder *vleugel* wordt men eene andere, kleine, ronde en gansch witte vlak gewaar. De *Kop* is tamelyk groot, en de *Oogen* hebben een bruinen glans. De *Sprieten* zyn niet zeer lang, en verliezen aan het uiterst einde haare zwartgrauwe grondverwe; worden spierwit, en eindigen met een teder zwart spitsje. De *Zuiger* is niet veel langer, dan een der *Sprieten*. Het dunste en laatste deel van de 6 *Pooten* is met Okergeele reepjes omringd, en aan elk derzelve ziet men een haakvormig *klaauwtje*. Boven op het *borststuk* ontdekt men de vlak, na genoeg volkomen gelyk aan een *Doodsboofd*. Zy bestaat uit okergeele

vederftof. De 2 daarin zynde zwarte vlakken vertoonen de holte der oogen van een doodshoofd zeer natuurlyk, en het eenigzins meer donker wordende vederftof vertoont het voorhoofds been van een wezenlyk doodshoofd. De Grondverwe der *Ondervleugelen* is oranje geel, en door ieder derzelve loopen 2 zwarte dwarsstreepen. Het *Achterlyf* heeft eene dergelyke oranje-geele grondverwe, en op deszelfs midden loopt 'er, in de lengte, een breede graauwachtig-blaauwe streep overheen, *ald.* 13.

Achneumon is een viervoetig Dier, ter grootte van eene Kat, dat zich aan den *Nyl* onthoudt, en by de *Egyptenaars* geëerbiedigd wordt, om dat het of de Krokodils-eieren vernielt, of wel dat Dier zelve aanvalt, en 'er zich meester van maakt, door deszelfs ingewand te doorknaagen, *Il.* 487.

Indiaanfche Dagvlinders, zie by *Dagvlinder* en *Nachtvlinder*.

Indiaanfche Neusboorn-kever, zie *Neusboorn-kever*, (de grootte.)

Indiaanfche Springkbaanen, zie *Springkbaanen*, (*Indiaanfche*.)

Indiaanfche Vlinders, zie *Vlinders*, (zevenlei zeldfaame *Indiaanfche*.)

Infecten, dit woord geeft wel zodanige dieren te kennen, die gekorven zyn, dat is, wier lighaam uit verſcheide, als van elkander afgezonderde of ingekorven leden beſtaat; maar is niet genoegzaam, om alle ſchepzelen, die voor Infecten gehouden worden, aan te duiden. Daar worden andere Kentekenen gevorderd; welke deze kenrekken zyn, zie by *Kenmerken van alle Infecten*, I. Voorred. * 2.

Infecten, het getal der Infecten-geſlachten, die 'er in de waereld zyn, is zo groot;

en oneindig, dat, tot derzelve onderzoeeking, beſchryving en afbeelding, de langſte Leevenſtyd van een menſch niet toereiken zoude, onderſteld, dat iemand geneigd ware, om enkel door middel van eigen ondervinding, gepaard met de onvermoeidſte vlyt, een geheel volkomen en volledig werk van de Hiftorie der Infecten voor den dag te brengen, I. 366.

Infecten, (*Kenmerken van alle*), zie *Kenmerken*.

Infecten-verzamelingen, vernielers van deze zyn, buiten de *Mot-uiten*, I. 557. ook inzonderheid die *kleine wormen*, waaruit de zo genaamde kleine Spekkevertjes en andere meer ontſtaan, die van het Aas van deze Infecten leeven. Dan ook zyn de zeer kleine *papierluizen*, de *kleinfte Scorpionen* zonder ſtaart, met de *Muizen* ſchadelyke gaſten voor de Infecten-verzamelaars, *ald.* 557. *aanm.* *Glazen bewaarplaatzen* zyn wel het beſte ter bewaaringe van gedroogde Infecten: maar men dient in acht te neemen, dat men geene zodanige Infecten, waarvan men denken kan, dat ze met de Eieren der gemelde papierluizen, kevertjes enz. reeds belegd zyn, in die verzamelingen bringe; nademaal alle de anderen, door het uitkomend broedzel, ook aangeftoken en vernield kunnen worden, *ald.* 558. en *aanm.*

Italiaanfche Scorpioen, zie *Scorpioen* (*Italiaanfche*.)

Julius kever, (*de geprikkelde grootte*), behoorende tot de EERSTE CLASSE der AARDKEVERS, IV. 163. enz. Deze wordt zo genoemd, om dat hy zich voornaamlyk in de maand *July* vertoont. Het kenteken des geſlachts beſtaat in de grootte der Sprieten, welke by de wyf.

wyfjes veel kleiner zyn, dan by de mannetjes. De harde *bovenvleugels* zyn, doorgaande, in hunnen nu helderer, dan donkerer roodbruinen grond, met veel onregelmaatige geelachtige witte trekken, vlakken en punten, van onderscheide grootte en vorm, besprenkeld, *ald.* 164. Maar de voorste sluithoek, tusschen de 2 vleugels, aan het halschild staande, heeft meest altoos eene witte koleur. De stompe *Kop*, die voorään schoffelvormig en scherp van rand is, heeft een helderen zoom, ter wederzyde van welken de beide schitterende oogten te voorschyn komen. De *Bek* is met 2 of 3 reien te zamen gevoegde vreespitzen voorzien, en achter deze staat nog een kleiner paar. De *Sprieten* onderscheiden zich in 2 hoofddeelen. Het *achterlyf*, door de vleugels niet bedekt, heeft, even als de gansche ondervlakte, eene geelachtig witgrauwe grondverwe, van een dof aanzien, en is met eene zeer tedere wolachtige stof van dezelfde koleur genoegzaam digt bestrooid. Aan de zyden is het overige deel van 't achterlyf meer geelachtig van koleur, en digt met blinkende en merkelyk langer pelshairen bezet. De 6 *Pooten* hebben eene glanzige donkere roodbruine koleur, *ald.* 165. Elke poot is aan het voorste lid, 't welk met 2 klauwen of spooren voorzien is, van onderen, allernaast aan deze 2 spooren, met eenen derden *agterspoor* bezet, *ald.* 165. *aanm.* De dunne en doorzichtige *Ondervleugels* zyn, even als by de meeste andere soorten dezer Klasse, gesteld. De blinkende koleur is echter zo geel niet, als aan den *Schroter* of het *vliegende Hart*; noch zo graauw, als aan den *Maikever*, en de hoofdadereen zyn hoog oranje-geel, *ald.*

166. Het Wyfje zal zich, onseilbaar, naa de paaring, onder de aarde begeeven, en 'er zyne *Eieren* in leggen, *ald.* 167. welke redelyk groot, en grooter zyn, dan een gierstekorl, eenigzins langwerpig rond, glad en witgeel van koleur, aan het eene einde iets stomper, dan aan het andere, *ald.* *aanm.* Uit deze Eieren zal dan ook een *Worm* voortkomen, genoegzaam gelyk aan alle andere Wormen dezer Klasse, welke zich ruim 3 jaaren onder de aarde met de wortelen der plantgewassen voeden; hierop zich besluiten in een, uit lym en aarde, door hem zelf toe bereiden bal, en in eene *Pop* veranderen, en de daaruit voortkomende *Kever*, schoon hy reeds in *January* of *February* zyne volmaaktheid bekomen mogt hebben, zal in de maand *July* eerst uit de aarde te voorschyn komen, *ald.* 167.

K.

Kameelrups, (de,) *benevens haare verandering tot in een NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE*, I. 299. enz. Deze benaming is genomen van de uiterlyke gedaante der *Rups*, welke, zo ten opzichte van haaren dunnen en gekromden hals, als uit hoofde van de 2 bulten of bochels op den rug, tamelyk veel overeenkomst heeft met de gedaante van een *Kameel*, *ald.* 299. Anders zou men haar ook den naam van *Zadelrups* kunnen geeven, wegens de beide hoogten van den rug. De *Eieren*, waaruit deze Rupsen voortkomen, zyn klein, rond en groen, *ald.* 300. Van den middelbaaren ouderdom tot de verandering dezer rups in eene *Pop*, verandert zy, ten opzichte der gedaante en koleur, nergens anders in, dan dat ze grooteren schoo-

schooner werde. In haare volkomen grootte is zy $1\frac{1}{2}$ duim lang. De bovenvlakte van den *Kop* is gansch plat, bruin van koleur, en door middel van eene smalle heldere linie, die midden door den bruinen grond loopt, in 2 ovaale deelen verdeeld. De *Hals* is zeer dun en buigzaam; maar het *Voorlyf* wordt allengs dikker. Van den *Kop* af tot aan den eersten bult ziet men van boven een bruinen streep, die tegen de hoogte blaauwachtig eindigt. Beneven dezen is 'er, op ieder zyde, nog een blaauwachtige streep, en de ondervlakte van het *voorlyf* is bruinachtig. Roozenverwige streepen loopen, op de ringen, overdwars, schuins opwaarts. van den eenen tot aan den anderen. De beide scherp oplopende *Bulten* zyn van vooren donker-rood-bruin, en de bovenranden met een roozenverwig boordzel voorzien; hoewel aan zommige dezer rupsen de eerste bult van vooren eene bruine koleur, en de volgende eene blaauwachtig-grauwe koleur heeft, *ald.* 301. en *aanm.* Aan de 4 ringen, die op de buikpooten rusten, ziet men, ter wederzyde, de gewoone *Spiegelpunten*. De *Pooten* zyn bruin van koleur. De 2 laatste ringen zyn uitneemend schoon geelachtig-rood, en wederzyds met oranje-geele vlakken verciert. Ten tyde haarer veranderinge verliest zy haare schoone koleur, en maakt in de afgevallen bladeren een wit *Spinzel*, *ald.* 302. De *Pop* blyft den winter over liggen, en in de maand *Mai* van 't volgende jaar komt eerst de *Vlinder* te voorschyn. Het *manneke* en *wyffe* verschillen alleen in de dikte van het achterlyf, en de breedte der *Sprieten*. De *buitenrand van alle vleugelen* is cierlyk rond uitgeschulpt,

en de halve rondjes aan den bovenvleugel zyn bruin, waar langs, inwendig, eene nog donkerer-bruine linie loopt. De grondverwe der *Bovenvleugelen* is geelachtig-bruin, en valt naden voorsten rand in 't bruinachtig-grauw. De grondverwe der *Ondervleugels* is bleek-grauw, doch na den buitenrand bruiner. De uitgeschulpte buitenrand is bruinachtig-grauw, en inwendig met eene donkere linie omgeeven. Het *Achterlyf* is bruinachtig, maar de grondverwe van het *Voorlyf* nog iets helderer. Dit laatste heeft, van boven op den rug, een helder-grauw, zwart en wit bezoomd uitgehold vierkant. De *Sprieten* zyn geel-bruin, *ald.* 303. De *Voorpooten* zyn donkerer of bruiner, dan de overige 2 paaren, wier koleur grauwwachtiger is, *ald.* 304.

Kameleon, van dezen zegt men, dat hy van de lucht leeeve, zonder dat hem eenig voedsel wordt gegeven, maar ook eindelyk sterft, III. 151. *aanm.*

Kamillen rups, (de byzonder schoone, groene,) met roode doornachtige spitzen, behoorende tot de TWEEDE CLASSE der NACHTVLINDERS. De *Kop* is bleek-groen van koleur, en heeft van vooren een winkelhoek, die door eene witte linie wordt geformeerd. De grondverwe zo aan het *lyf*, als aan de 16 *pooten* is schoon groen. Over het midden van den *rug* loopt eene witte linie, in de lengte, en ieder lid is met eenige doornachtige spitzen bezet, behalve het geen den *hals* uitmaakt. Dit gedeelte heeft een paar bruinroode verheve vlakken, en ter wederzyde staat nog een roodbruin punt in 't zelve. De spitzen der overige ringen zyn ook bruinrood, staande paarswyze op byzondere geelachtige hoogzels, te zamen, en de

spitzen van het achterste lid zyn grooter, dan die der voorste leden. Deze *Rups* was op de Kamille, in de maand *Augustus*, gevonden, doch men wil, dat ze zich ook op de *Averone* onthoudt, III. 252. In haaren volwassen staat beloopt haare lengte weinig meer, dan $1\frac{1}{2}$ duim. By haare verandering kruipt ze in de aarde, en mengt onder haar *Spinzel* iets van haar verwelkt voeder. De *Pop* heeft in den beginne doorzichtige groenachtige vleugeltcheden, doch ze worden naderhand donkerer. Het overige *lyf* is roodachtig-bruin, en aan het laatste lid zit een staartpunt. Deze *Pop* viel den Schryver uit de hand op den grond; zy kreeg eene wonde aan den Kop, en was bedorven, zo dat hy den *Vlinder* niet kon beschryven, *ald.* 253.

Kegel rups, zie *Pinnen rups*.

Keizers, zie *Besmet vlieg*.

Kemel-rups, zie *Kameel-rups*.

Kenmerken, zie *Eigenschappen*.

Kenmerken van alle Insecten. Deze zyn vier in getal. Het eerste is, dat zy geene ribben of graaten hebben, gelyk men in andere dieren bespeurt. Het tweede bestaat daarin, dat de Insecten of met een Zuiger of Angel voorzien zyn, of met een Bek, die niet, gelyk by andere Dieren, van onder na boven, maar altoos overdwars, of van de rechte na de linke, en van de linke na de rechte zyden gefooten en geopend wordt. Het derde kenneken is, dat de *Oogen* altoos onbedekt worden bevonden, dewyl hen de oogleden ontbreken. Het vierde kenneken bestaat daarin, dat de Insecten niet, gelyk andere Dieren, ademhaalen door den mond of de neus, maar of door het laatste lid, of door de openingen aan beide de

zyden van het lyf, die Spiegeelpunten of Adem- en luchtgaten worden genoemd, waardoor ze de lucht inhaalen en uitblaazen, I. * 2. en III. 267. 268.

Kever, (een schoone dof-groene,) met eene Oranje-geele bezooming, II. 27. enz. Deze *Kever* heeft geen den minsten glans, maar is over het geheel dof-groen, en schynt als met fluweel overtoogen. Zyne vleugeldeksels hebben een cicrlyken Oranje-geelen zoom, die ook wel om het borststuk heen loopt. Hy heeft zeer dunne en tedere pooten, die alle zes, benevens de gansche ondervlakte van het lyf, schoon groen, maar iets glanziger van koleur zyn, *ald.* 27. De ringen van het achterlyf vertoonen, ter wederzyde, heldere Oker geele vlakken, en vooraan is een helder hoekpunt te zien, *ald.* 28.

Kever, (een buitengemeen schoone goud-en rood-koleurige, blinkende, drieversfgeboornde) II. 29. enz. De *Kop* is plat en breed, en met een scherpen rand voorzien. Midden op dien staat een lange spits toeloopende *Hoorn*, byna recht opgaande, en zwart van koleur. De 2 kleine *Oogen* zyn bruin. Het *Borststuk* is zeer dik. Ter wederzyde van dit ziet men, na vooren, een *boorn*, die van onderen-breed, van boven spits toeloopend, aan de zyden scherp en zwart-koleurig is. De *Vleugeldeksels* zyn hoog-rood, mer veele verhoogde en verdiepte streepen doortoogen. De gansche ondervlakte is, benevens het achterlyf, zwart-bruin, en die koleur hebben insgelyks de 6 eenigzins korte pooten, *ald.* 30. 31.

Kever, (een donker-roode,) wiens boven-vleugels met zwarte vlakken en punten zyn besprenkeld, II. 27. Deze *Kever* is geheel dof-rood, zonder eenigen glans,

glans, en zo ziet 'er ook de *ondervlakte van het lyf* uit, maar de 6 *Pooten* zyn iets donkerer. By de gewrichen van de met zwarte vlakken besprenkelde *vleugeldeksels* ziet men, van vooren, ter wederzyde van het achterlyf, eene harde spits, tot aan den laatsten poot voortlopende, *ald.*

Kever, (de groote zwart-bruine,) II. 55. De gansche *bovenvlakte van zyn lyf* is, benevens de 6 *Pooten*, blinkend zwart-bruin van kleur; maar de ringen van zyn *achterlyf* wat helderer bruin, en zo vertoonen zich ook de haren, waarmede de *onderolakte* van de borst bezet is: de eenigzins kleine *Sprietten* hebben maar kleine blaadjes of kolfjes, *ald.*

Kever, (de kleine, blinkende, zwarte, met witte punten besprenkelde) II. 28. Deze is juist niet recht zwart, maar zyne kleur valt, wegens haaren glans eenigzins in 't koperverwige, en is, zo wel op de *dekvlugels*, als op het *borststuk*, met witte punten, van ongelijke grootte, versierd. Het gansche *lyf* is aan de *ondervlakte* met tedere haitjes bezet. De voorste *Pooten*, even als de overige, zyn pik-zwart, *ald.*

Kever, (de kleine zwart-blinkende gladde,) met oker-bruine versierzelen, II. 29. De gansche *bovenvlakte* van zyn *lyf*, en de *Kop*, benevens de 6 *Pooten*, zyn zwart-blinkend. Door het midden van den kop en het halschild loopt eene tedere line, die zich tot in den sluithoek der beide *vleugeldeksels* uitstrekt, en het schild van den hals is oker-geel bezoomd. Het *achterlyf* heeft eene oker-bruine kleur, die echter eenigzins in 't roode valt. Het achterste lid is met 3 zwarte vlakjes

versierd, waarvan het middelste het grootste is. Aan de achterste *Pooten* heeft hy een dubbelen haakvormigen klauw, *ald.*

Kever, (de rood-bruine,) met witachtige punten besprenkeld, en met roodachtig-geele bairen begroeid, II. 28. De *Kop*, het *Borststuk* en de *Dekvlugels* zyn eenigzins dofbruin-rood; en deze zo wel, als geene, is met veele bleeke okergeele punten, van onderscheiden grootte, versierd. Op zyne *boven- en onderolakte*, is hy met bleeke oker-geele haren begroeid; de *Oogen* zyn zwart, en de 6 *Pooten* zwart-bruin, alle met veele okergeele haren bezet, *ald.*

Kevers, zyn die Insecten, welke harde *dekvlugels* en 6 *Pooten* hebben, en uit een zespootigen *Worm* voortkomen, die in eene *Pop* verandert, II. 1. Zy worden verdeeld in 2 geslachten, *Aard- en Water-kevers, ald. 2.* *Classen* derzelve zie by *Classen*.

Keur worm, die op de Wilgebladeren aalt, benevens den daaruit voortkomenden blaauwen BLAD-KEVER, met een groenen weerschyen, behoorende tot de DERDE CLASSE der AARDKEVERS, II. 131. Deze *Worm* verandert tot viermaal toe van huid, en zyne lengte zal omtrent een vierde van een duim uitmaken. Het *Lyf* is spoelvormig, meer breed, dan rond verwulsd, en van vooren en van achteren puntig. De *kop*, de *bals* en de 6 korte *pooten* zyn zwart; het grootste gedeelte van het *lyf* oker- of stroo-geel, en met veele tedere zwarte stipjes versierd, maar de achterste spits is gansch zwart. De tyd der veranderinge naderende, kruipt hy onder de struiken, en wordt, zonder zich in te spinnen,

eene bleek-geele kleine *Pop*, die met zeer tedere, naauwlyks zichtbaare, zwarte puntjes is besprenkeld. Het *Kevertje*, daaruit te voorschyn komende, is langwerpig rond, donker blaauw van kleur, met een groenen weerschyn, zyne gansche ondervlakte is zwart, welke kleur ook de 6 tedere *pooten*, en de met kleine kolfjes voorziene *Spieten* hebben. Het bevruchte Wyfje legt zyne Eieren aan de Wilgebladeren of derzelver steelen, en naa verloop van 8 dagen komen de jonge Wormen al weder te voorschyn. Het *Kevertje* is, onder zyne harde vleugeldekzels, met dunne doorzichtige vleugelen voorzien; *ald.*

Klapperman, of

Klapper-Springbaan, met 2 *hoogroode ondervleugelen*, II. 390. *enz.* Deze heeft, gemeenlyk, eene bruine zwart-besprenkelde grondverwe, maar aan de *Springpooten* ziet men etelyke heldere vlakken, en het gansche *lyf* is gemeenlyk het donkerste. Wanneer men hem te na komt, zal hy niet alleen zyne schoon roode *Ondervleugelen* laten zien, maar ook een ratelend geluid maaken, het welk aanleiding geeft, om hem den *Klapperman* te noemen. De *Bovenvleugels* zyn Oker-bruin, en met donkere vlakken besprenkeld; het *Lyf* is iets donkerer, en meestal cenkleurig. De *Springpooten* zyn het helderste, maar hebben aan de bovenschenkel zeer donkere vlakken, en hun langer dunne deel is aan het einde half zwart-graauw, *ald.* 391. De *Eieren* zyn bleek-groen, en blyven den ganschen winter door, in de gaten en spleeten der aarde, tot in het naastkomend voorjaar liggen, *ald.* 392.

Kleef-spinnen, zyn zodanige, welke gemeenlyk aan de muuren of wanden, als

mede aan de boomen of andere gewassen, met uitgestrekte pooten, zo vast zitten, als of ze 'er aan gekleefd waren. en in die gestalte op haaren buit loeren. Zy behooren tot de *vyfde Classe*, zie by *Classen der Landspinnen*.

Kleine, (het,) *groene, bultige Rupsje*, benevens deszelfs verandering tot in een *DAGVLINDER der TWEEDE CLASSE*, I. 102. *enz.* Dit *Rupsje* houdt zich aan de Sleën- en Pruimeboomen op, welker bladeren hetzelfde tot spyze verstreken. Op ieder van de 6 middelste ringen bespeurt men een paar spitze hoogzels of bulten, tegen over elkander staande. Het zeer klein, rond en blinkend geel van kleur *hoofd* heeft een paar zwarte punten; die de *Oogen* zyn, en boven den mond ziet men nog een klein zwart vlakje. De kleur van het *Lyf* en de 8 paar *pooten* is bleek grasgroen, *ald.* 102. Haare volkomen grootte is omtrent een halve duim, of iets meer. De gedaante der *Poppe* is ongemeen dik. Voor aan haar *hoofd* is eene groote hoogte, die zich in 2 kleine knopjes verdeelt, en van boven wit is. De overige grondverwe is zwart-achtig-bruin. Naa 14 dagen komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn, wiens onderste zyde olyf-bruin is. De buitenrand der *vleugelen* is cierlyk uitgeschulpt, en met een helder graauw boordzel belegd, *ald.* 103. langs het welke, binnenwaarts, eene tedere zwarte linie loopt. De *Voorvleugel* heeft, behalve een smallen blaauwen dwarsstreep, en 3 aan den buitenrand naast elkander staande Oranje-geele, kleine ronde vlakjes, geen ander cieraad; maar in den *achtervleugel* ziet men nog een byzonder blaauw boordzel. Hierop volgt een breede Oranje-geele dwarsstreep, die na den Voorvleugel wat smaller toeloopt.

Door

Door het midden van dezen vleugel loopt ook een helder blaauwe dwarsstreep. Het *Lyf*, de 6 *Pooten* en het *Hoofd*, (uitgenomen de zwarte *Oogen*,) zyn aan de onderzyde helder-graauw, en van boven donker olyf-bruin, zo als de *Vleugels*, *ald.* 104.

Kleine, (het dikke,) en van boven ronde roozenverwige Schildrupsje, dat op de Eikebladeren aaf, benevens deszelfs verandering tot in een DAGVLINDER der TWEEDE CLASSE, I. 110. enz. Deze *Rups* zeldoort, in haare volwasfen groote, belden meer dan een halven duim. Op den ronden *Rug* is ze, tot aan den hals, roozenverwig, welke koleur, op de zyden en ondervlakte, in eene iets bleeker en groenächtig-geele verandert. Op het midden van den *Rug* ziet men zo veele donkere, langwerpighe, en iets verheven pukkeltjes, als 'er ringen aan het lyf zyn, en aan ieder zyde ook even zo veel driekantige groenächtige vlakjes in eene rechte lyn. Het *Kopje* is klein, zwart-blinkend en iets ingetrokken. De 3 paar *voorpooten* zyn spits en zwart, en de 4 paar andere graauw en stomp, *ald.* 110. De tyd haarer veranderinge naderende, verandert ze niet alleen van koleur, maar trekt ook een band, uit veele tedere draadjes bestaande, om het lyf. De *Pop* is bruin-rood, en de vlakken, die te vooren groen waren, zyn nu zwart-bruin. Na 16 dagen komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn, zynde de grondverwe des *Lyfs* en der 4 *vleugelen* zwariächtig-bruin, maar de *Voorvleugels* wat donkerer, dan de *Achtervleugels*. In de eersten ziet men eene zeer schoone hoog-blaauwe vlak, met een violet-kleurigen weerschyn, *ald.* 111. De *buitenrand* der *vleugelen* is met een wit

randje bezoomd, en de 2 achterste hebben 2 uitsteekende spitzen. De *Ondervleugels* hebben een geel-blinkenden, helder-groenen grond. In den *Achtervleugel* ziet men, kort aan den rand, eene tedere zwarte linie rondom. Naast deze is eene witte linie, en aan den punt staan 2 ronde, schyfvormige, oranje-geele vlakken, waarvan de grootste met een zwart puntje in het midden is voorzien. De zwarte *Oogen* zyn met een witten ring omzet; de kolfjes der *Sprieten* zyn geel-bruin, en de 6 *Pooten* hebben eene byna nog helderer koleur, dan de *vleugels* van onderen, *ald.* 112.

Kogeldier, (het zo genaamde) III. 566. enz. Zodanig een dier bestaat uit eene soort van eene geelächtige, kogelronde en doorzichtige Blaas; wier *buitenhuid* overal, met tedere, en insgelijks doorschynende wratjes, doch niet al te dicht by een, bezet is. In 't binnenste van dien Kogel is noch hart, noch maag te bemerken, noch iets, dat men voor eenig ingewand kan houden; maar in dien Kogel ziet men weer andere kogels, van de eiganste gestalte, als de groote, maar wel 5 maal kleiner in den ontrek. Deze zyn veeleer donker-geel, dan zwart, en worden voor Jongen gehouden, *ald.* 567. Deze *Jongere* worden, binnen 8 dagen, zo groot, als het oude Kogeldier was, *ald.* 568. Dit *Kogeldier* kan, naar maate het op deze of geene zyde, een of meer zynner kleine pypjes opent, en lucht of water uitspuut, naar deze of geene zyde om zyn As draajen; zich teffens voor- of achterover, na boven of na onderen beweegen, *ald.* 569.

Koolrups, (geele en graauwe,) zie Schadelijke geele en graauwe Koolrups.

Koolrups, de kleine dof-groene Kool- en Kruidrups, benevens baare verandering tot in een DAGVLINDER der TWEEDE CLASSE, I. 92. enz. De Eieren waaruit deze rupfen voortkomen, hebben eene kegelvormige gedaante en geele koleur; zyn niet glad, maar met veele inkervingen, vooren en verheve ribben, alle naar de lengte van het Ei staande, van rondom voorzien, *ald.* en *aanm.* Binnen 14 dagen komen 'er de kleine groene rupsjes uit te voorschyn, welke zeer spoedig groejen, en zyn, in haaren volwassen staat, niet veel meer, dan een duim lang. Deze *Rups* is in 't geheel groen van koleur, over den Rug en op de zyden donker dof-groen, van anderen en na den buik wat helderer of bleeker. Het *Hoofd* is klein en rond, loepende van het zelve tot aan het einde van 't laatste lid een helder geelachtige streep over den Rug. De spitze voor- en stompe buikpooten hebben dezelfde groene koleur als het *Lyf*; het welk alom met tedere en korte haartjes is bewaflen, *ald.* 93. De grondverwe der *Poppen* dezer soorte is by alle niet eveneens. Deze is groenachtig graauw. Van de voorste punt tot aan het spits achtereinde loopt eene geele linie, in dezelve staan, voer aan op 't hoofd, op ieder zyde, 2 zwarte stippen. De *Poppen*, in den Zomer uitkomende, hebben zelden meer, dan 14 dagen ter veranderinge noodig. De *Achtervleugel* van den *Vlinder* is, op de onderzyde, bleek of zwavel-geel, en met veele donker-grauwe stipjes besprenkeld. De *Voorvleugel* is wit, maar aan den buitenkant werd men eene breedte, helder geele vulling, en naast deze,

na beneden, eene meer hoekige, dan ronde donker-grauwe vlak gewaar, welker wedergade aan den rand des Achtervleugels staat. Het *Lyf*, als mede de 3 paar *Pooten*, zyn wit, en tamelyk hairig. De *Oogen* zyn blinkend groen, en de *Sprieten* wit, maar de kolfjes graauwachtig, *ald.* 94. 95.

Koolrups, de schadelijke, gladde, bruine Kool- en Kruidrups, benevens baare verandering tot in een NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE, I. 335. enz. De Eieren, waaruit deze Rupfen voortkomen, zyn in 't begin meer geelachtig, dan groen, mitsgaders van anderen, daar ze vast zitten, iets plat, en rondom met veele tedere ribbetjes versierd; doch krygen, vervolgens, eene bruinachtig-grauwe koleur, *ald.* 337. *aanm.* Als eene dezer Rupfen haare uiterste grootte heeft bereikt, die omtrent 1½ duim beloopt, dan is de koleur van haare huid graauwachtig-bruin. De *Kop* is blinkend geelachtig-bruin: over den *Rug* loopt een donkere breedte streep. De *Spiegelpunten* zyn wit, en de *Pooten* hebben eene bruine koleur, *ald.* 338. Zich onder de aarde tot haare verandering bereidende, verandert zy, naa verloop van 12 of 14 dagen, in eene *Pop*, waaruit de *Vlinder* eerst in de maand *Juny* des volgenden jaars voorkomt. De grondverwe van deszelfs *Voorlyf*, der *Pooten* en *bovenvleugelen* is geel-bruin. In de laatste ziet men veele graauwe, zwarte witte en geele linien, vlakken en streepen. Midden in den Vleugel staat eene witte en zwart geboorde vlak. Het *Voorlyf* is digt met hairen begroeid, *ald.* 339. De *Sprieten* zyn lang en hairvormig; en de *Oogen* schitterend bruin. De *Ondervleugelen* zyn blinkend helder-grauw,

en het *Achterlyf* is geelachtig bruin. De *Vleugels* zyn aan den buitenrand Oker-geel bezoomd; en het *achterlyf* is alom met hairen bezet, waarvan die op de bovenvlakte iets donkerer zyn, dan de overige, *ald.* 240.

Koolrupsje, het kleine Kool- en Salade-rupsje, met deszelfs verandering tot in een Motvlindertje van de vierde CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 539. enz. Deszelfs grootte komt zelden boven $\frac{1}{2}$ duim. Het heeft eene groene koleur, en is met het gewoon getal van Pooten voorzien. Schoon het veelal met een wit *Spinzel* bedekt zy, verandert het in eene ranke, beweegelyke en okergeele *Pop*, zonder staartpunt. Uit dezelve komt, naa 2 of 3 weeken, een *Nachtvlindertje* te voorschyn; waarvan de smalle *Bovenvleugels*, aan den achterrand, naar de lengte graauw zyn, doch het grootste en voorste deel derzelven is bruin. De *Ondervleugels* zyn, even als het gansche *Lyf*, graauw; en de *Sprieten* hairvormig. De 6 *Pooten* zyn bruinachtig van koleur, en zonder hairen aan de bovenschakels. De *Kop* is met donkere *Oogen* voorzien, en heeft van vooren een klein baardje, *ald.* 539.

Koolzwarte, (eenzaame Doornrups,) zie, Doornrups, (eenzaame Koolzwarte.)

Koornbyters, zo worden de groote soorten van Waternimphen genoemd, om dat veelen van gedachten zyn, dat deze Insecten hun voedsel trekken uit de Koorn-aren. Doch deze naam wordt hen ten onrechte gegeven, nademaal zy noch het Koorn, noch de dorre rysjes tot spyze gebruiken, maar die verkiezen, wanneer ze willen rusten, II. 187.

Koornwolven, zo worden de Koornwormen op eenige plaatzen genoemd, ter

oorzaake van de schade, die zy het graan toebrengen, I. 542. *aann.* zie verder *Koornworm.*

Koornworm, (de schadelijke, welbekende witte,) benevens zyne verandering tot in een NACHTVLINDERTJE der vierde CLASSE, I. 541. enz. De *Eieren*, waaruit deze *Koornwormen* voortkomen, zyn ovaal of eirond, dat is, aan het een einde een weinig spitzer, dan aan het andere, *ald.* 541. *aann.* De uiterste grootte van dezen *Koornworm* beloopt in de lengte 4 of 5 linien, of omtrent een halven duim. Deszelfs koleur is helder Oker- of leder-geel, en de 8 paar *Pooten* hebben ook die koleur. De *Kop* is bruin-rood, en op den *Hals* zyn een paar voorwaards gekromde dwarsstreepjes te zien. In de maand *Augustus* of *September* zoekt hy eene bekwaame plaats, om zich in te spinnen, het zy tusschen de sparren, balken, of planken der zolders, wier hout hy onder zyn *Spinzel* vermengt, *ald.* 414. In dit *Spinzel* blyft de *Worm*, zonder van gedaante te veranderen, en zonder eenig voedsel tot in den volgenden maand *Maart* of *April*, ja zelfs wel tot in *Mai*: maar verandert naderhand in eene *Pop*, wier voorste deel, met de *Vleugelscheden*, donker-bruin, doch het achterste deel met zyne ringen veel helderder is. Het laatste lid heeft een paar spitze punten. Drie weeken daarna komt de *Vlinder* voor den dag, welke met smalle *bovenvleugels* is voorzien, die een witten grond hebben, met zwarte en geelachtig-bruine vlakken besprenkeld, en van achteren met een als uit franje bestaanden zoom versierd, *ald.* 515. De *Kop* is rondom de *Oogen* met hairstof begroeid; de *Sprieten* zyn hairvormig. De 6 *Pooten* zyn
bruin.

bruin en wit besprenkeld. De *Onder-vleugels* hebben eene bleeke graauw-bruine koleur, en zyn aan den achter-rand met een breed vederächtig boordzel van meestal dezelfde grondverwe voorzien, *ald.* 515.

Krabbe, zie *Zee garnaal*.

Kreeften behooren, wegens alle kenten, onder de *Insecten*, III. 267. *enz.* Zy leeven allen voornaamlyk in het water, al is het, dat ze ook buiten het zelve, zoo 't niet te warm zy, nog een tyd lang kunnen leeven, *ald.* 268.

Kreeftslakken, zie *Slakken-kreeft*.

Kreefts oogen, } deze vindt men niet al-
Kreeft steenen, } toos in de *Kreeften*,
maar de rechte tyd, om ze te vinden, is de Zomer, vooral in de 3 maanden *Juny*, *July* en *Augustus*, III. 293. Altoos zyn 'er dan in ieder *Kreeft* 2 steenen, en leggen ordentelyk aan de zyden der maage, niet verre van de groene stof. In het begin zyn ze tamelyk klein, hebbende naauwlyks de grootte eener Linze, en geen grooter dikte, dan van een dun plaatje. Zy neemen gestadig toe in grootte, en als de nieuwe schaafe volkomen hard is, dan hebben ook de steenen hunne volkomen grootte bereikt, *ald.* 296. Waartoe deze steenen den *Kreeften* dienen, en van waar zy hunnen oorsprong hebben, hierop kan nog niets waarschynlyks worden voorgedraagen, *ald.* 268. 269.

Krekels, deze worden by de *Springhaanen* gerekend, om dat ze voornaamlyk drieërleie eigenschappen met elkander gemeen hebben. 1.) Beide zyn ze van achteren met *Springpooten* voorzien. 2.) Zo dra het mannetje zo wel der *Springhaanen*, als der *Krekels*, zyn volkomen wasdom heeft bereikt, zoekt het

zich te paaren, en maakt, om het wyfje te lokken, met zyne vleugelen een scherp en trillend geluid. 3.) Deze tweederleie schepzels gebruiken ook eenerlei *voedzel*, gras, loof, graan, schorsen, wortelen *enz.* II. 256. Zie verder *Huiskrekkel*.

Kruidrups, (de kleine dof-groene,) zie *Koolrups*, (de kleine dof-groene.)

Kruidrups, (de schadelyke,) zie *Koolrups*, (de schadelyke,) *enz.*

Kruispinnen, worden zo genoemd, om dat zy op de oppervlakte met verscheidene witte vlakken versierd zyn, die in zodanig eene orde staan, dat ze in het midden verscheidene *Kruisen* formeeren, IV. 195. Zie verder by *Classen der Landspinnen*.

L.

Land- en Nacht-nimph wordt dat gevleugelde schepzel genoemd, het welk door de verandering uit den *Mieren-roover* voortkomt, om dat het niet alleen eene *Libelle*, of zo genaamde *Water-nimph* gelyk is, maar ook uit een *Aardworm* gebooren wordt, en dat dezelve slechts by nacht, en niet by dag gewoon is te vliegen, III. 96.

Land-insecten worden genoemd in tegenstelling van *Water-insecten*. Daar zyn *Land-insecten*, die veranderen, en niet veranderen. Onder de *Land-insecten*, die de verandering ondergaan, hebben zommige 6 *Pooten*; andere 10 en 16 *Pooten*; wederom andere, die 18, 20, en 22 *Pooten* hebben. Onder de *Land-insecten*, die niet veranderen, hebben eenige 6 *Pooten*, gelykerwys de *Springhaanen*, *Krekels*, *Weegluizen* en *Luisen*; acht *Pooten* hebben de *Spinnen* en *Ziertjes*; tien de *Scorpioenen*; meer dan

Van tien de *Veelvoeten* of *Polyphen*, de *Oxeltworm* enz. *Geene Pooten* hebben eindelyk de *Pieren*, *Lindwormen*, *Aardflakken* enz. I. *Voorrede* * 3.

Landkaart-vlinder, zo zou men den *Vlinder*, uit de *gladde*, *bruin-roode Rups* voortkomende, uit aanmerking zyner bovenvleugels, gevoeglyk kunnen noemen, I. 458.

Landkreeften, zie *Aardkreeften*.

Landmeesters, zo noemt REAUMUR (Tom. I. Mem. 2. pag. 71.) de *Spanrupfen*, doordien ze, by ieder schrede van haaren zonderlingen gang, haar lyf even zo op den grond voortzetten, als een Landmeester zyne Ketting doet, I. 514.

Landmyten, daarvan zyn *verscheide soorten*: als 1.) de in 't gemeen zogenaamde *langbeenige Spin*; 2.) de hoogroode *Aardmyt*, die men in 't voorjaar des zomers op de Akkers en velden vernemt; 3.) de *Kaas-myt* of *Maaï*; 4.) de *Insecten-myt*, welke aan de Hommelen, Kevers, enz. gevonden, en voor eene soort van Luizen wordt gehouden; 5.) de *Myt der planten en kruiden*, en 6.) de *kleine Myt*, die zich in de aarde onthoudt, III. 145.

Land-nimph, (de *grootste Inlandsche*;) III. 117. is aan die uit den Mierenroover in meest alles gelyk, uitgenomen de grootte en vleugelen. In deze *vleugels* naamlyk zyn geen bruine vlakken; ze zyn zo doorzichtig, als glas, en hebben, nevens de 2 hoofdadereu, welke met veele korte zwarte streepjes verciert zyn, ontelbaare andere kleine adertjes, *ald.*

Land-nimph, (de *kleine*;) met *breede bruin-gevlakte vleugelen*, III. 117. enz. De *Kop*, zo wel als de ter zyde uitpuilende *Oogen* zyn bruinrood; maar het lange en buigzaame *Achterlyf*, mitsga-

ders het *borststuk*, donker-bruin. De *Bovenvleugels* zyn breeder en grooter, dan de *onderste*, en met meer Oker-bruine vlakken verciert, *ald.*

Land-nimph, de *tweede soort*, of de *grootste*, *bruine*, *buitenlandsche Land-nimph*, III. 116. enz. Deze is eene *Indiassche* soort, en is aan die uit den Mierenroover gelyk, uitgezonderd de *Vleugelen*. Deze zyn niet zo doorzichtig, maar over 't algemeen Oker-bruin, met donkere vlakken besprenkeld, en daarenboven veel breeder. Haar *Kop* is met gansch andere Sprieten voorzien. 6 *Pooten* dezer Nimphie zyn leenig en bruin; de *ondervlakte van het lyf* is met veele geelachtig-bruine haren begroeid, en aan het *borststuk* en den *kop* ziet men eenige dergelyke donkere haren, *ald.*

Land-nimph, (de *kleine*;) met den *langen bals*, III. 121. enz. De *Kop* is wat langwerpig; heeft aan de zyden 2 verre uitpuilende *Oogen*; en van voren 2, niet zeer lange, tedere en haïrvormige *Sprieten*. De *bals* is met den *Kop* bykans zo lang, als het gansche achterlyf. Zy heeft over het geheel eene blinkende, donker-bruine koleur, welke ook de 6 *Pooten* hebben. De 4 niet zeer smalle *Vleugels* zyn doorzichtig, vallen eenigzins in 't bleekbruine, en hebben aan den voorsten rand, kort aan het einde, een donker-bruin vlakje, *ald.*

Land-nimphen, de *vyfde en zesde soort* dezer *Gewesten*. Deze beide soorten zyn over het geheel groen, en men vindt ze van verscheiden grootte. De 4 *Vleugels*, zo wel, als het buigzaam *achterlyf*, zyn, benevens het *borststuk* en de *Kop*, van een aangenaam groen; maar de beide *oogen* hebben een schoo-

nen goudkoleurigen glans. De *Spriet*en zyn niet kolfachtig, maar teder, lang en hairvormig, III. 113.

Landspinnen. Van deze is 'er eene groote menigte; maar ze kunnen nogtans in 5 *Classen* geschikt worden, III. 138. Zie verder by *Classen der Landspinnen.*

Lantaarn-draager, (de groote *Westindische of Americaansche*.) II. 441. enz. Bericht van Mejaoff. *Merian* daarom-trent, *ald.* 441. 442. Deszelfs grond-verwe is blinkend, bleek olyf-geel, vermengd met verscheide donkere punten, streepen en vlakken. Onder de voornaamste cieraaden telt men de frische roode vlakken, waarvan 'er 2, op de eerste verhooging aan den *Kop*, worden gezien, die de grootste zyn; en op de tweede verhooging bespeurt men nog 2 andere, eenigzins kleiner, langwerpige en ovaal-ronde vlakken; aan den *onderkant* wordt men, ter wederzyde, ook 2 reien even eens gekoleurde vlakken, in den donkeren grond, gewaar, die kleiner, doch mede rond zyn, en 2 reien van knopjes verbeelden. Door het midden der *bovenvlak*te is, in de lengte, eene zwarte linie getoogen. Aan het blaasachtige deel is nergens eenige opening te vinden, en 't is gansch hol, *ald.* 444. Dit heeft hen den naam van *Lantaarndraager* doen verkrygen, aan-gezien het, by nacht, een helder licht verspreidt. Ter *wederzyde* is deze *Lantaarn*, by de 2 reien knopvormige vlakjes, eenigzins takkig; achter den eersten en grootsten tak ziet men eene holigheid, waarin de *Oogen* liggen, *ald.* 445. Het *halschild* is bleek-groen. Het *borststuk* of *Voorlyf*, het welk meereendeels geel is, heeft, boven in het midden, eene in de lengte verdeelde donker-bruin roode, en groote vlak, en

ter wederzyde is het met een paar kleiner vlakken, van dezelfde koleur, voorzien. De 4 *Vleugels* hebben eene verschooten geele grondverwe, die na den buitenrand eenigzins bleeker wordt: voorts zyn ze met donkere, rood-bruine Aderen doortoogen, die eindelyk in veele tedere Adertjes te niet loopen. En men bespeurt in dezelve, hier en daar, veele kleine en groote, donkere, bruin-roode dwarsstreepen en vlakken, doch in de 2 bovenste ziet men alleen, aan den buitenrand, veele dwarsstreepjes, die meer zwart-groenachtig, dan donker-roodbruin zyn. De *Ondervleugels* pronken daarenboven, aan hunne uiterste einde, met groote, schoone, geele Paauwen- of Oogenspiegels, rondom met eene ongelyk breede, rood-bruine bezooming. Deze 4 *vleugels* zyn nog met veele witte punten besprenkeld, die zich als glimhout vertoonen. Het *Achterlyf* is tamelyk dik, en bestaat uit 8 geele leden, *ald.* 447. die elk met eenige groote en kleine, rood-bruine vlakken en punten pronken, doch de 2 laatste zien 'er meer wit uit. De *Kop* heeft, *van onderen*, eene trapswyze, spits toeloopende verhooging, geel van koleur; de rechthoekige *Voedzel angel* is rood-bruin van koleur, heeft aan het einde van zyne spits eene heldere vlak; en deze Angel vertoont zich, als ware hy ingekorven en gespouwen, *ald.* 448. De 6 *Pooten* zyn bleek Oker-geel, en met bruine vlakken besprenkeld. Het uiterste deel des Poots bestaat in 3 leden, waarvan het laatste met een dubbelen haakvormigen klauw voorzien is. Het *Lyf* is, *op zyne Ondervlak*te, insgelyks Oker-geel, welke koleur echter, tusschen de middelste en achterste Pooten, eenigzins in

in 't groene, en aan de zyden na het einde toe in 't roode valt. Op het 4de lid ziet men een paar donkerer, vierkan- te vlakken, *ald.* 449.

Lantaarn-draager, (de *kleine Aziatische of Chinesche*.) II. 450. enz. Zyn snuitvormig deel heeft byna de lengte van het overige geheele lyf, zynde meer vierkant, dan rond, en zo byzonder op- waarts gekromd, dat het 2 niet zeer merkelyke hoeken uitmaake. Her heeft eene blinkende roodächtigt geel-bruine koleur. Aan dit snuitvormig deel zitten de 2 rond uitpuilende *Oogen*, en onder ieder een klein gelykvormig donker knop- je, tusschen dit en 't wezenlyk Oog een derde knopje, dat wederom kleiner uit- valt, en nader by het Oog zit. Het *Borststuk* of *Voorlyf* heeft, op zyne *bo- venvlakte*, eene blinkende, rood-brui- ne koleur, met eenige zwart-bruine vlakken. De grondverwe der 2 *boven- vleugelen* is schoon-groen, en ze zyn met veele heldere, zo wel overdwars, als in de lengte uitlopende linien doortoog- gen. In den groenen grond ziet men ver- scheide Oranje-geele vlakken, van ver- schillende grootte en gedaante, *ald.* 451. De *Ondervleugels* hebben eene recht schoone hooge Oranje-geele koleur, en aan den buitenrand eene zwarte bezoom- ing, welke aan den achterkant allengs smaller wordt, en te niet loopt. Het *Achterlyf* heeft dezelfde koleur, als de Ondervleugels; maar het eerste lid is zwart-graauw, en het laatste lid heeft een groen deelje. De *ondervlakte* van het snuitvormig deel is van eene veel helderer geele koleur, dan de boven- vlakte. Aan het eerste 2 paar *Pooten* is het *scheen-been*, nevens het eigenlyk *voet deel*, zwart; maar de *bovenschen- kels* zyn oranje-geel, welke koleur ook

het laatste paar in het geheel heeft. De laatste *pooten* zyn niet alleen de dikste en langste, maar derzelver scheenbeen is daarenboven, aan de buiten-zyde, met zaagvormige tanden bezet, *ald.* 452.

Lelien steenen worden eigenlyk also ge- noemd, om dat ze eene op haare sten- gel staande, en nog niet volkomen open zynde Lelie vertoonen, III. 514.

Lente vliegen, zo worden de *Vlinders*, uit de *Water-rupsen* voortkomende, by veele liefhebbers der Insecten genoemd, II. 243. *aann.*

Libellen, zie *Water-nimphen*.

Lieven-Heers-wormje, zie *Marien-Ke- ver*.

Liguster-rups, of *schoone, groene staart- rups*, benevens baare verandering in een *NACHTVLINDER*, behoorende tot de EERSTE CLASSE. De *Eieren*, waaruit deze Rupsen voortkomen, zyn wat langwerpig of eirond, bleek of helder- groen van koleur, en van eene gladde gedaante, III. 25. *aann.* Na 14 of 16 dagen komen 'er de jonge Rupsen uit te voorschyn, die helder bleek-groen zyn, doch allengs groener worden. Na verloop van 6 tot 6 dagen vervellen ze viermaal, en naa de 4de vervelling groe- jen ze nog omtrent 10 dagen, *ald.* 26. *aann.* In haaren volwasen staat is de- ze *Rups* 3 duimen en eenige linien lang. De grondverwe is over 't geheel schoon- groen, *ald.* 27. De platte en ovaal- ronde *Kop*, heeft, ter wederzyde, een purper-rooden streep, of eigenlyk zo- danig eene bezooming. Na de 3 eer- ste leden, waar onder de 6 *klaauwpoo- ten* staan, ziet men op alle de overige, wederzyds, 7 evenwydig loopende schuinse streepen. Deze zyd-streepen zyn, in de lengte, van vooren half pur- per-

per-rood, en in de achterste helft wit, en van onderen eindigt ieder derzelve met eenige witte punten. De 9 *lucht-gaten* zyn Oranje-geel, en zo zyn ook de 6 *Klaauwpooten* geel, maar zwart aan de uiterste spitzen. De 8 stompe *buikpooten* hebben, als het *lyf*, eene groene koleur, en zo ook de 2 *nachtschuivers*. Het laatste lid is met een echter over geboogen stevig hoorn, of eene stekelvormige *staartspits*, van eene tamelyke lengte, voorzien, van boven half purperrood, van onderen, geelachtig, en aan het einde donker, *ald.* 28. De tyd der veranderinge naderende, veranderen ook haare koleuren. Zy begint te zweeten, gebruikt geen voedsel meer, en kruipt in de aarde, alwaar zy eene holligheid of verblyf maakt, en verandert in eene *Pop*, *ald.* 29. en 26. *aanm.* Deze bezit, tot een byzonder kenteken, eene korte *snuitschede*, van de borst zo ver af staande, dat 'er tus-schen door gezien kan worden. Het *Stut*, of *Staartpunt* heeft veele bypun-tjes, *ald.* 29. De koleur der *Poppe* valt uit het koper-roode in 't zwart-bruine. De *Vlinder* komt, gemeenlyk, in de maand *July* des volgende jaars daaruit te voorschyn. Deszelfs *Achter-lyf* pronkt, ter wederzyde, met 6 roo-zen-koleurige, en zo veele donkere dwarsstreepen. Het *Voorlyf* is, op zyne gansche bovenvlakte, tot aan den *Kop*, volkomen donker zwart-bruin, doch aan de zyden helder-bruinachtig, gelyk de *Kop*. De *Oogen* zyn tamelyk groot, bruin en blinkend; en de 6 *Pooten* zyn mede bruin van koleur. De *Bovenvleu-gels* zyn eenigzins smal, en hunne koleur is nu helderer, dan donkerer bruin. Aan den achtersten rand hebben ze eene smalle bruine bezooming, en zyn met

verscheide zwarte aderen doortoogen. De grond der *Ondervleugels* is roozen-verwig, en door denzelven loopen 3 breede, zwart-bruine dwarsstreepen, *ald.* 30.

Lindebooms-Pylstaart, wordt de *Vlinder* genoemd, uit de groene, blaauwstaartige *Linden-rups* voortkomende, I. 138.

Linden-rups, (de groene, blaauwstaartige,) met schuinse roode en gele zyd-streepen, benevens haare verandering tot in een *NACHTVLINDER* der EERSTE CLASSE, I. 131. enz. De *Eieren* dezer rups zyn blinkend-helder-groen-achtig van koleur, en aan den eenen kant stomper, dan aan den anderen, *ald.* 132. en *aanm.* De *Kop* dezer volwassen *Rups* is van vooren vlak, steekt iets boven den hals uit, van boven spits en eenigzins verdeeld, en de scherpe rand is met eene gele linie voorzien, *ald.* 132. Haare geheele grondverwe is aangenaam groen, maar de *buik* en de 5 paar *stompe Pooten* zyn wat bleeker of blaauw-achtiger. Ieder *ring* heeft een *Car-myn rood Spiegelpunt*, met een teder geel randje, behalve de 2de en 3de van het hoofd af. Het op den laatste ring uitsteekend en eenigzins gekromd *hoornje* is week, en blaauw, maar 't uiterste spits geel. De 3 paar spitse *voorposten* zyn schoonrood. Deze rups haaren volkomen wasdom bereikt hebbende, en naby haare verandering zynde, beginnen haare schoonste koleuren allengs te verdwynen; *ald.* 133. uitgenomen het hoofd, hoornje en schildje op de staartklep. Zy bereidt alsdan in de aarde, op eene zekere plaats, daar de grond niet al te vast is, haare woning, en na eenige dagen

dagen vindt men haar veranderd in eene *Pop*. Deze is byna $1\frac{1}{2}$ duim lang, en eene der grootste van deze soort. Haare koleur is dof-bruin, doch het *voortlyf* en de *vleugelscheden* wat donkerer, dan 't *achterlyf*. De *Pop* blyft onder de aarde, tot in het midden van de volgende lente, komende de *Vlinder* daaruit voort, wanneer de boomen in het volle blad staan, *ald.* 135. 136. Deszelfs *Kop* is ros-bruin by de *Oogen*, en deze zyn groot en blinkend zwart. De steel der *Sprieten* is wit, en de daaraan zittende korte *Veder-vezelen* zyn ros-bruin. De gansche grondverwe des *Vlinders* is bleek-groen, en zo ook het grootste gedeelte van het *Voortlyf*; maar het *achterlyf* is overal groen, behalve dat het laatste lid een roodachtig-bruine punt hebbe. Het eerste paar *Pooten* is ros-bruin, en de 2 volgende paaren zyn of helderer, of geheel witachtig. De *Bovenvleugels* zyn, aan den buitenrand, zeer sierlyk uitgeschulpt, en met een smallen rood-bruinen zoom voorzien. In den breedten, en aan het einde wit geboorden dof groenen dwarsstreep staat, aan den voorsten hoek des vleugels, eene groote witte vlak, die inwendig bleek-groen gestippeld is, *ald.* 137. De *Ondervleugels* zyn desgelyks uitgeschulpt, en wit geboord. De gansche overige grond is geelachtig-rood-bruin. Niet verre van den buitensten rand ziet men een zwarten, diep ingesneeden dwarsstreep, zynde zo veel als een scheimuur tusschen den bleeker en rooder grond. Aan den rooden raakt hy scherp, terwyl hy in den bleeker alengskens verdwynt, *ald.* 138.

Looper, zie *Huismoeder*.

Luchtigaten, zie *Ademhaaling*.

Luizen, met welken de *Aardkever*, de

Doodgraaver, kort voor zyn dood, zo sterk bezet is, en daar hy zo geweldig door geplaagd wordt, *IV.* 15. *enz.* Deze zyn van eene oranje-geele koleur, hebben 8 *pooten*, waarvan het voorste en achterste paar langer is, dan de andere tusschen beide zittende paaren. Alle zyn ze uit veele leden te zamen gesteld, en hier en daar met enkele hairtjes bezet, even als het eivormig *lyf*, en de 2 van de 4 *Kopspitzen*. Deze spitzen zyn de *Sprieten*, die verscheide gewrichten hebben, en langer zyn, dan de 2 andere daar tusschen staande *vreetpunten*. Aan de laatste en dunste deelen der *pooten* hebben deze *Myten* geene klauwen, maar 'er schynen ronde knopjes aan te zitten, *ald.* 15. Haare *Eieren* zyn langwerpig rond, *ald.* 16.

Luizen aan de Polypen, *III.* 455. *enz.*

Deze zyn van ongelyke grootte, en doorzichtig van *lyf*, behalven dat men 'er eenige zwarte puntjes in ontdekt. In het water zwemmende, vertoonen ze zich eivormig rond, en haare beweging is zeer snel. Wanneer ze zich aan den *Polyp* vast zetten, dan veranderen zy hunne eivormige gestalte, en worden spoelvormig, van vooren en van achteren spits toeloope, *ald.* 456.

Lyonnet heeft de *Houtrups*, in zyn tractaat, *Traité anatomique de la Chenille &c.* niet alleen naar de uiterlyke, maar ook innerlyke gesteltenis, met eene onbeschryvelyke opmerkzaamheid en geduld, beschreeven en afgebeeld, *I.* 281. *aann.*

M.

Made, (de in de *Kampernoeljen* of *Paddestoelen* levende, kleine, geelachtig-witte,) en haare verandering in eene.

eene vlieg, II. 565. *enz.* De Paddestoelen niet alleen, maar ook andere zwam- of sponsachtige aardgewassen worden met Eieren belegd, waaruit in 't kort kleine *Maden* ontstaan; *ald.* 565. welke binnen 10 of 12 dagen haaren vollen wasdom bereiken, en ongeveer een halve duim lang zyn. Het *lyf* eener dergelyke *Made* is tamelyk dun, en haare koleur geelachtig wit; maar van vooren op den rug ziet men een donkeren of bruinen streep; en de *Kop* heeft eene blinkende zwarte koleur. Volwasfen zynde wordt ze geheel wit, en zoekt de aarde, waarin ze, binnen weinig tyds, eene blinkende, bruine, eivormige *Pop* wordt; en binnen 12 dagen komt 'er eene vlieg uit voort, die een helder graauw *voorlyf*, en een bruin *achterlyf* heeft. Haare bruine *Oogen* worden door 2 witte streepen, van achteren wyd van elkander staande, en van vooren spits te zamen loopende, van elkanderen afgezonderd, en de kleine *Vleugels* zyn doorzichtig, maar de 6 *Pooten* zwart, *ald.* 566.

Maden, waaruit de *Aardmuggen* voortkomen, zie by *Aardmugge*.

Maden-schyter, zie *Besmet-vlieg*.

Mai-kever, (de alom bekende) *benevens* deszelfs voortbrenging, wasdom en veranderinge van het *Ei* af aan, II. 33. *enz.* Het geslacht der Mannetjes en Wyfjes dezer soort is daar door te onderscheiden, dat de bladerige *Sprietten* der Mannetjes lang, en die der Wyfjes kort zyn, en dit bladerig bosje bestaat by de eersten uit 7, en by de Wyfjes maar uit 6 blaadjes, *ald.* 34. en *aann.* De *onderste vleugels* zyn doorzichtig, en op de bovenvlakte van het achterlyf is deze Kever met *lichtgaten* voorzien. Onder de 6 *Pooten*

is het middelste lid der 2 voorsten, die korter zyn, dikker, dan de andere, en 't heeft aan zynen scherpen rand, 2 of 3 scherpe uitgetande punten. De overige 2 paar *Pooten* zyn elkander gansch gelyk, en hebben aan het einde, na den klauw toe, 2 spitze doornen. Tusschen de *Pooten* is de *ondervlakte van het lyf* dicht met geel-graauwe hairen bezet, en op den *Kop* en het *Halfschild* staan verscheide, hoewel korter hairtjes, *ald.* 35. Na de paaring kruipt het Wyfje een span diep in de aarde, en ontlast zich van zyne *Eieren*, welke eene eenigzins langwerpige ronde gedaante, en helder-geele koleur hebben. Omtrent den Herft komen de *wormen* daaruit te voorschyn, en in het vierde jaar de Worm zynen wasdom bereikt hebbende, beloopt deszelfs grootte ruim $1\frac{1}{2}$ duim. De koleur van zyn *lyf* is meest bleek-geel, maar tusschen de rimpels van den rug iets graauwachtig. Aan ieder zyde van het *lyf* loopt, over alle de ringen, een verheven lyft of wrong, waarin men 9 *Spiegelpunten* gewaar word, die zo veele luchtgaten, en dus een getal van 18 uitmaaken. De 6 *Pooten*, onder de 3 eerste ringen zittende, zyn geelachtigrood, en hebben 4 of 5 leden, welke leden met veele tedere hairen, van dezelfde koleur, begroeid zyn. De *Kop* is platronde van gedaante, blinkend en geel-bruin, *ald.* 36. 37. en van vooren met eene sterke donker-bruine *byttang* voorzien. Achter deze byttang heeft hy 2 *sprietten* of *voelärmen*, die geel-bruin zyn, en 5 leden hebben. Wanneer deze Worm zyn 4de jaar byna ten einde heeft gebracht, is de tyd zyner veranderinge gebooren. Hy graaft zich, in den Herft, menigmaal ter diepte van een vadem in de

de aarde; *ald.* 38. wordt kort daarna dikker en korter, en krygt de Poppen-ge-daante. De *Kop* dezer *Poppe* is, benevens het halschild, tegen de ondervlakte van den buik geboogen. Aan het *Achterslyf* en de scherpe zyden ziet men donkere *Spiegelpunten*, en aan het laatste lid een achterwaarts omgeboogen *rippe* of *flepje*. Uit deze *Pop* komt in de volgende maand *January* of *February* een *Maikever* te voorschyn, die in 't begin zeer week en wiachtig geel is, en eerst naa 10 of 12 dagen zyne hardigheid of rechte koleur erlangt. Hy blyft nog 2 of 3 maanden in de aarde; *ald.* 39. en komt eerst in de Maand *May*, of wel wat vroeger of laater, voor den dag, *ald.* 40.

Mai-mugge, zo wordt ook het *Haft* of *Oeverdâs* genoemd, II. 230.

Mai-worm. (de zo genoemde,) Eene soort van *Houtwespen*, welke eenen kleinen dekvleugel schynt te hebben, moet, volgens de meening van zommigen, ook onder de *Kevers* worden gerekend; maar de Schryver telt dezen onder die *Insecten*, welke, doordien ze nu iets van deze, dan iets van eene andere soort bezitten, onder geene Hoofd-classe zyn te brengen, maar tusschen-lassen uitmaaken, II. 2.

Mamei boom, door MILLER, in zyn *Tuin-Lexicon*, beschreeven, heeft eene ros-achtige bloem, uit verscheide bladeren bestaande, die in een kring groejen, uit welker kelk een stamper of styl voortkomt, die naderhand verandert in eene byna ronde vleesige vrucht, waarin 2 of 3 zaadkorrels zyn, die in harde ruwe schalen zitten. Deze boom groeit in de *Westindien* tot 60 à 70 voeten hoog. De vrucht is zo groot als eens mans

vuist, heeft eene geelachtig-groene koleur, en een aangenaamen smaak, II. 13.

Manwyf-vlinder, deze zou uit de *schadelyke haitrige, bruine Rups*, met den grooten *Kop*, en met roode en blaauwe bulijes, zyn voortgekomen, II. 204. *aanm.*

Manwyven, zie *Hermaphroditen*.

Marien-kever, (de ronde, hoogroode,) met zwarte punten, benevens zyn worm en deszelfs verandering, II. 133. Deze *Kever* noemt men ook *Gods Koetje*, *Gods Schaapje*, *lieven-Heers Wormtje*; en *Marien-kever* wordt hy genoemd, om dat hy zich alreeds op het eerste *Marien-feest*, naamlyk dat van *Maria-reiniging*, laat zien, *ald.* 133. De *Worm*, waaruit deze ronde, hoogroode enz. *Kever* voortkomt, vindt men in het voorjaar en den ganschen Zomer door, op de bladeren van verscheide gewassen, alwaar hy de bladluizen zoekt en verteert. Zyne grootste lengte zal omtrent een halven duim uitmaaken. De grondverwe van zyn *lyfen kop* is blaauw-achtig-graauw, maar de laatste heeft een zwarten zoom, en eene kleine gebittang. De 11 of 12 leden des lyfs zyn met veele verheve hoekige spitzen bezet, en meerendeels zwart, doch ook ten deele oranje-geel. De 6 tedere en iets lange *Pooten* zyn zwart. Ter verandering overgaande, maakt hy zyn achterste gedeelte aan een blad of takje vast, door eene lymachtige stof, en naa een dag ziet men de *Pop*, *ald.* 134. wier grondverwe oranje-geel is, waarin dikwyls zwarte punten en vlakken te zien zyn. Naa 14 dagen komt 'er de *Marien-kever* uit te voorschyn. Deszelfs *bals*, *borststuk*, *kop*, *sprieten*, mitsgaders de gansche ondervlakte zyn zwart, hoewel men aan het halschild en naby den kop 2

witte

witte punten ziet. Op de helder-roode *vleugeldekkzels* staan 7 zwarte, ruitvormige vlakken, 3 op ieder vleugel, en de 7de vereenigt beide vleugels van vooren. Doch menigmaal ziet men op eene soort dezer Kevertjes 9 zodanige vlakken. Hy behoort tot de 3de *klasse der Aardkevers*. De *Eieren*, welke het bevruchte Wyfje altoos hoopswyze op of tusschen de schors der takken van de pruime-, perstke-, en andere ooftboomen legt, zyn glad, zeer blinkend en spoelvormig, zynde de koleur, in het begin, helder geel, maar zy worden allengskens oranje geeler, *ald.* 135. en *aanm.*

Mars, zo wordt de *Vlinder*, voortkomen- de uit de *eenzaame, diklyvige Doornrups*, van zommigen genoemd, uit hoofde zyner zwarte, vuur- en bloedroode vlakken, en veelerleie cierlyke tekeningen, onder welke zy kogels, bomben, cirkassen en ander Oorlogsgereedschap weeten te vinden, l. 40. *aanm.*

Meer grunling, (de groote,) zo noemen eenige liefhebbers den *ongemeen schoonen Celadon-groenen Vlinder*, IV. 114. *aanm.* *

Melden rups, (de groote, gladde, groene, en op verscheide wyze getekende,) benevens haare verandering tot in een *NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE*, l. 313. *enz.* Deze *Rups* is, in haaren volwasen staat, niet volkomen 3 duim lang, maar zeer dun en spichtig. De *huid* is glad, en dof-gras-groen van koleur. Die van den *Kop* valt eenigzins in 't geelachtige. De *hals* is, van vooren, aan het hoofd, wit geboord, en van daar tot aan de naschuivers loopt, wederzyds, eene rechte witté linie van onderen langs den buik, boven welke linie de 9 *Spiegelpunten* oranje-geel, en

met een zwart kringetje zyn omgeeven. Op ieder *ring* staan 2 zwarte streepjes, en in ieder dezer streepjes 2 punten, *ald.* 315. De *naschuivers* zyn groen; de 4 paar *buikpooten* hebben eene geelachtig-bruine, en de spitze *Voorpooten* eene gansch geele koleur, *ald.* 316. Als de tyd der veranderinge nadert, kruipt zy redelyk diep in de aarde, en vervaardigt aldaar een soort van ketel of verwulfsel, het welk ze, van binnen, met haar spinzel bekleedt. Na byna 3 weken, verandert zy in eene rood-bruine *Pop*, *ald.* 317. De *Kop* van den *Vlinder* is met een hoog verheven, en aardig uitgeronden *balskraag* verciërd. De koleur is helder Oker-geel; maar van de groote zwarte *oogen* af, tot aan het *voorlyf* loopen, ertelyke donker-geele streepjes, ter wederzyde, door den halskraag, *ald.* 318. De *Sprieten* zyn geel. De bovenzyde of *Rug* van het voorlyf is donker-bruin-graauw; het *Achterlyf* is wat roodachtiger-bruin, dan het *voorlyf*. Ieder lid is van boven, in het midden, met een spits toeloozend zwart vlakje getekend. De *Boven-vleugels* zyn met graauwe, bruine Oker-geele, en rosächtig-witte vlakken en streepen door elkander gemarmerd; de *buitenrand* is donker-graauw bezoomd; en teder uitgeschulpt. De *Onder-vleugels* hebben desgelyks een breed boordzel, maar dat oker-geel is. De overige grond is blinkend donker-graauw, *ald.* 319.

Merian, (*Mejuffr.*) heeft het *wandelend Blad* beschreeven, II. 263. als mede den *Surinaamschen Springbaan*, II. 271. 274.

Merklin, (*Abr.*) *Med. Doct.* te Neurenberg, zegt, dat de *Schröter-boornen*, aan den hals gehangen en gedraagen, goed

goed zouden zyn voor allerhande Kinderziekten; en wel voornaamlyk om het water op te houden, en te maaken, dat de Kinderen niet zo veel in het bed waten, II. 101. *aanm.*

Merkuur-slangetje, zo noemt de Schryver een Water-slangetje, III. 526.

Merveille de Peru, zo noemen de liefhebbers der Insecten-verzamelingen den *Vlinder*, voortkomende uit de *grootte Staart-rups*, I. 170.

Meft. en Aard-made, (de kleine graauw-achtige,) benevens *baare verandering in eene vlieg*, II. 564. Deze *Made*, volwassen zynde, is zelden boven een halven duim lang. De *Kop* is klein en zwart bruin. De 2 voorste leden vallen in het Oker-geele; maar de overige leden zyn meer graauw, dan geel. Van boven ziet men een zwartachtigen streep, welke midden door den Rug loopt. Het achterste lid is eenigzins stomp, maar met eenige tedere spitzen bezet. Zulke Maden veranderen in geene eivormige *Poppen*, maar in zodanige, als de *Muggen* gewoon zyn te maaken. De *Pop* heeft eene bleeke oker-geele koleur, maar wordt eindelyk gansch graauw. Ter plaatze van den *Kop* ziet men 2 zeer korte, en tedere hairtjes of pypjes, *ald.* 564. het overige deel van 't *Lyf*, uit 8 of 9 leden bestaande, loopt in 't geheel, na achteren spits toe. Na verloop van 14 dagen komt 'er de *Vlieg* uit voort. De grondverwe van het *lyf* is zwart, en zo zyn ook de 6 *Pooten*. De 2 doorzichtige smalle *Vleugels* liggen op het achterlyf over malkander, en voor aan den *Kop* zit een paar korte Spriethairtjes, *ald.* 565.

Middel, om de *grootte veldkrekels* uit te rooijen. Dit bestaat in hunne wooningen met kookend water te begieten,

N.

het welk gedaen moet worden, wanneer deze schepzels voor de eerste maal van huid veranderen, en de grootte hebben van grootte Mieren; het welk plaats heeft in *Augustus en September*, II. 367.

Middelen, om de *Insecten* uit het *peltwerk* te verdryven. Veelen denken dit genoegzaam bewaard te zyn, wanneer ze 'er een stuk pynboomen-hout by leggen; anderen slaan 'er linnen doeken om heen: doch men doet beter als men de vochtige doeken met poejer van zwavel bestrooid, of door en door met zwavel berookt; en de *Campber* is mede een heilzaam middel, I. 563. en *aanm.*

Middelen, om de *Koornwormen* te doden. Ter uitroojinge van dit ongedierte, is het *zout* beter, dan de *peper*; I. 547. maar anders zyn 'er *verscheide middelen*. Het *eerste* is, dat men de wormen verniele, wanneer ze, ter veranderinge, tegen de wanden en sparren der Koornzolders opkruipen: het *tweede*, dat men de *Vlinderijs* ten ryde, wanneer ze zich op het Koorn zetten, om 'er hunne *Eieren* op te leggen, met zakken doodslaat. Het *derde*, dat men alle de openingen der Koornzolders wel digt toemaake, en alsdan op eene gloejende panne eenige zwavel of spaansche peper doe branden: het *vierde*, dat men gestooten *Sal amoniac*, met wat kalk vermengd, in heet water onbinde, de Koornschoppen daarin nat maake, en dan het Koorn daarmede omschoffele, *ald.* 548. *aanm.*

Middelen, om de *Rupsen* te vernielen. Men zuivere de boomen, en leere de rechte *Eieren* kennen, en deze kennende breekte men het takje af, waaraan ze zitten. Men doorzoeken vlytig, de stammen en dikke takken der boomen, waar

waar.

waaraan de jonge rupsen met gansche nesten en klompen te zamen zitten, en verplettere het gansche broedzel met een stok, van boven met eenige lappen en lompen omwonden. De *rook* doet de *Rupsen* wel ter aarde vallen, maar zy kruipen welhaast weer tegen den stam op. Eindelyk doet men wél, wanneer men de *Poppen* geenszins verschoont, I. 22.

Middel-insecten, zyn dergelyke *rupsen*, welke, uit hoofde van 't gebrek aan 2 stompe buikpooten, niet onder de 16 pootigen, maar onder de 14 pootigen behooren, I. 532. *aanm.*

Mieren-roover, (de *listige en behendige*.) die in eene land- en nacht-nimph verandert, benevens zyne wonderbaare eigenschappen, III. 95. enz. Dit Insect is in grootte zeer gelyk aan eene aschgrauwe Spin, en heeft eene spitze Knyp- of Vangtang vooraan den Kop. Het graaft den kuil, waarin het op den roof loert, voornaamlyk voor de Mieren, *ald.* 95. Het gevleugeld schepzel, uit dezen worm voortkomende, wordt eene *Land- en Nachtnimph* genoemd, om dat het niet alleen eene Libelle, of zo genaamde Waternimph gelyk is, maar ook uit een *Aardworm* wordt geboren, en zy daar benevens slechts by nacht gewoon is te vliegen, *ald.* 96. Deze *worm* vervaardigt reeds, in de eerste jeugd, een kuiltje, evenredig aan zyne grootte, *ald.* 98. en, volwassen zynde, vormt hy een kuil, wiens middellyn van boven de lengte heeft van 2 en 3 duimen; aldaar zit de *mieren-roover* aan de zyden, onder het zand verborgen, maar 's nachts in het midden; komt 'er eene Mier of eenig ander Insect zynen kuil te na, dan keert hy zich eensklaps om, en werpt met zynen

iets breedten Kop het zand verre uit, en vangt het Insect, zuigende daaruit al het sap, zonder iets van 't lichaam te verteeren, *ald.* 99. De grondverwe zyns *lyfs* is, over de gansche bovenvlakte, meestal bruinächtig ros en aschgrauw, doch op de ondervlakte iets helderer. Zyne cieraaden bestaan in donker-bruine, regelmaatige vlakken, en veelvuldige korte hairtjes. Voor 't overige is zyn gansche *lyf*, meer plat, dan rond, en van onderen is het byna effen. Zyne 6 tedere *Pooten* zyn doorzichtig, en ligtgeel. Het lang *tanggebit* is veelal roodächtig geel-bruin. De 2 korte en dunne *Sprietjes* bestaan uit verscheide leden, hebbende haare inleding boven die van de vangtang. De *Kop* is breed. Vlak achter de inleding der *Sprieten* bespeurt men 2 zwarte vlakken, en in ieder van deze 6 blinkende korreltjes, welke niet anders, dan zo veele *Oogen* kunnen zyn, *ald.* 104. Aan den *Hals* ziet men eenige donkere vlakken en eenige hairtjes. Het *achterlyf* is van voren tamelyk breed, loopt van achteren spits toe, en bestaat uit 10 onderscheide leden. Aan den eersten ring of afdeeling zit, ter wederzyde, een boschje zwarte, styve haren, niet ongelyk aan een Pen-ceel, en zodanige boschjes ziet men aan alle de afdeelingen, *ald.* 105. Op het voltoojen der behuizinge verandert dit Insect niet ten eersten, maar blyft 'er nog wel of 3 of 4 dagen onveranderd in liggen. Na 12 of 14 dagen vindt men het in eene *Pop* veranderd, *ald.* 110. welke aan de ondervlakte, benevens aan de 6 korte *pooten* eene bruinächtige, eenigzins Oranje-geele koleur draagt, maar het overige is donker-bruin, en de afhangende Vleugelscheden zyn graauw. Binnen 4 weeken vertoont zich de Mieren-

ren-

ren-roover, in eene gevleugelde gestalte, als eene *Landnymph*, *ald.* 111. De *Kop* van deze heeft zeer veel overeenkomst met dien der kleine Water-nimphen, maar nog meer met dien van 't 20 genaamde wandelend blad. De 2 *Oogen* staan als een paar ronde kogels aan de zyden. De *Sprieten* zyn niet zeer lang, aan de einden gekromd. Ten aanzien der koleure is de *Kop*, even als het *Voorlyf*, zwart-bruin, en met okergeele vlakken verciert; welke koleur ook de 6 tedere en niet zeer lange *pooten* hebben, *ald.* 112. De koleur der *Eieren* is blinkend, roodächtig, zaadverwig; doch aan het voorste en dikste deel valt ze in het roozenverwige; en daar ziet men ook een breed donker-rooden streep, die het Ei als een hoepel omvat, *ald.* 115.

Moerbezien-rups, of *Zy-worm*, benevens deszelfs eigenschappen en verandering in een NACHTVLINDER der EERSTE CLASSE. De *Eieren*, waaruit de *Moerbezien-rupsen* of *Zy-wormen* voortkomen, zyn in 't begin helder-geel, maar worden wel haast bruin, en eindelyk graauw. Derzelver figuur is meest geheel kogelrond, maar een weinig langwerpig rond. Al die bevrucht zyn, krygen eene blaauwachtig-graauwe koleur; maar de onvruchtbare worden helder oker geel. Zy kunnen, denganschen winter door, zonder eenig letzel, worden bewaard, III. 39. en *aann.* In de maand *Mai* des volgenden jaars worden ze in den omtrek iets helderder, maar behouden, in het midden, hunne voorige koleur. De jonge en tedere *Moerbezien-bladeren* zyn voor de jonge *Rupsen*, uit die eieren voortgekomen, het beste voedsel, *ald.* 40. De grondverwe van een volwassen *Zy-worm*, wiens

lergte ruim 3 duinen belooft, en viermaal de verandering ondergaan heeft, is witachtig-geel, graauw, en met veel lerleie graauwe hoekstrepen verciert: doch van boven op den *Rug*, inzonderheid na achteren toe, heeft hy nog eenige donkere, langwerpige, ruitvormige vlakken, welke met diergelyke strepen omzoomd zyn, *ald.* 47. Drie ringen achterwaarts ziet men op het derde lid een paar vlakken, die kleiner zyn. Het laatste lid is met eene *Staart*- of *Hoornspits* voorzien, welke okergeel is. De *ondervlakte* van den *Zy-worm* is gemeenlyk iets geelachtiger, dan de *bovenvlakte*; en de 3 paar *Klaauw*-, nevens de overige *Buikpooten* en de *Naschuiers* vallen geheel in 't Okergeele. De *Kop* is blinkend bruin, en meer rond, dan kantig, *ald.* 48. Wanneer hy zynen hoogsten ouderdom heeft bereikt, en de tyd nadert, van zich in te spinnen, verkrygt hy, gemeenlyk op de *bovenvlakte* van de achterste leden, eene geele koleur; hy zoekt geene spyze meer, en men zal zien, dat hy reeds een draad uit den mond laat gaan, *ald.* 52. Het *Spinzel* is niet van eenelerleie koleur: zomtyds is dit geelachtig wit, zomwylen oranje-geel, *ald.* 53. De *Rups* haar spinzel voltooid hebbende, verandert niet ten eersten in eene *Pop*; maar blyft nog wel 4 of 5 dagen in hare behuizing liggen: doch juist 3 weken naa den aanvang der spinninge komt de *Vlinder* te voorschyn. De *Pop* is over het algemeen okergeel, en van achteren gansch stomp, *ald.* 54. De grondverwe van den *Vlinder* is wit, met okergeel en bruin doormengd; doch deze koleur valt wel eens wat helderder, of wat donkerer: want men ziet eenigen, die een breed bruinächtigen

dwarsstreep, met eene donkere bezooming, in de *bovenvleugels* hebben, en de *bovenvleugels* van anderen zyn, van de inleding af tot bykans over de helft, geelachtig bruin. De *Ondervleugels* zyn, aan den binnenrand, met eene zwarte vlak voorzien, die aan het Manneje grooter is, dan aan het Wyfje; de *Oogen* zyn ook zwart, en de 6 *Pooten*, tot aan het uiterste einde, met vederstof bezet, *ald.* 56.

Mol. zo noemen eenige liefhebbers den *Vlinder*, uit de *belder-bruine, gladde Gras-rups*, met *donker-bruine schubachtige dwarsvlakken* voortkomende, IV. 113. *aanm.*

Mol. Veel en zyn van gevoelen, dat de *Mol* geene *oogen* zoude hebben; maar eene naauwkeurige beschouwing van hem toont, dat hy 2 zeer kleine *oogen* heeft, die zo diep in den *Kop* zitten, dat hy 'er niet ligt letzel aan kan krygen. Daar is geen grooter vervolger der *Keverwormen*, dan de *Mol*, II. 54. en *aanm.*

Mol. (de *gevlugelde*,) zie *Veldkrekkel*, (de *zeer schadelijke groote*.)

Molensteentjes, zie *Trochiten*.

Molinet, (*Pater du*,) geloofde, dat de *Kevers* grooter konnen worden, II. 15.

Mol-krekkel, zie *Veldkrekkel*, (de *zeer schadelijke groote*.)

Mollen-begraaver, zie *Dood-graaver*.

Mosdissel-rups, (de *gebochelde*,) benevens *haare verandering tot in een NACHT-VLINDER der TWEEDE CLASSE*, I. 355. enz. De *Eieren* dezer *Rups* zyn met veele ribbetjes vercierd, die van boven in een knobbeltje te zamen loopen: zy zyn niet gansch kogelrond, maar van onderen eenigzins plat. De grootste lengte van deze *Rups* bedraagt weinig meer, dan 1 duim. Haare grondverwe is gras-groen. De *Kop* is bruin, en

van vooren met een groenen driehoek vercierd. De 4de en 5de ring, van den *Kop* af, zyn beide eenigzins boven de anderen verheven, en de *Rups* schynt daar een dubbelen *Bochel* te draagen. Deze *Bochel* is, van boven, met zwarte, met gele randjes bezoomde schildjes vercierd, van welker voorste tot aan den *Kop* een witte streep loopt. De achterste ring is, insgelyks, met eene zwarte hoogte voorzien. De *Buik* is, wederzyds, met een smallen witachtigen rand geboord, *ald.* 355. en *aanm.* Midden over den *Rug* is, in de lengte, eene tedere zwarte linie, en nevens dezelve ziet men, ter wederzyde, eenige witte puntjes. De 3 paar spitze *Pooten* zyn graauw, maar de overige groen, even als het *Lyf*. Zy mengt, by haare verandering, bladeren, steelen, hout enz. onder haar *Spinzel*, dat ze uit geelachtig-witte draaden te zamen vlecht. Eenige dagen daarna verandert zy in eene *Pop*, welke donker-bruin is. Haar *achterlyf* is zeer diep ingekorven, en het laatste lid met een kort *staartpunt* voorzien. Aan den *Vlinder* zyn de *Ondervleugels* graauw; naar het lid toe wordt deze koleur in 't Oker-geele verdreeven, en de uitgeronde buitenrand is okergeel geboord. Van dez. lste koleur is ook het *Achterlyf* en de 6 *Pooten*, *ald.* 356. Het *Voorlyf* is digt bewaflen met okergeele hairen. De *Spriet*en zyn hairvormig, en de *Oogen* glinsterend bruin. De *Bovenvleugels* zyn asch-grauw. Aan het lid zo wel, als achterwaarts na den buitenrand, ver-toont zich een, breede, roodachtig-bruine, en donker bezoomde dwarsstreep, *ald.* 357.

Mot-rups, (de *voor de Insecten-verzamelingen zo schadelijke*,) benevens *haare ver-*

verandering tot in een Mot-vl., I. 556. enz. Deze belooft, in haare natuurlijke grootte, omtrent een derde van een duim in de lengte. De grondverwe van het *Lyf* is Oker-geel, en met veele zwarte puntjes besprenkeld, waarop redere hairtjes staan. De *Kop* is rood-bruin, *ald.* 556. en de *Hals* is met 2 blaauwe vlakjes verciërd. Wanneer ze ter veranderinge staat over te gaan; dan bekleedt ze zich met een bruin-graauw *Spinzel*, waarin ze blyft tot in *Maart*, of *April*, en daarna verandert zy in eene *Pop*, welke blinkend geelachtig-bruin van koleur is. Zy blyft 3 of 4 weken liggen, en dan komt 'er het *Mot-vlindertje* uit te voorschyn. Het heeft 4 afchgraauwe *Vleugelen*, in welker bovenste men zomwylen, na den kant van den buitenrand, een paar donkere bestippelde dwarsstreepen ziet. Het *Voorlyf* is, benevens de *Kop*, even zo afchgraauw, doch het *Achterlyf* is iets bruiner, en de *Spriet*en zyn hairvormig, *ald.* 557.

Mot-rups, (de voor de Bont- of Peltwerken zo schadelijke,) benevens haare verandering tot in een *Mot-vlindertje*, I. 561. enz. Haare wasdom duurt van *Mai* of *Juny* tot in *November* en *December*. De grootste lengte, die ze bereikt, maakt naauwlyks het derde deel van een duim uit. Haar *lyf* is rank, geelachtig-wit, en met kleine hairtjes bezet. Midden over den *Rug* loopt een donker-roode bruinachtige streep, die na den *Kop* in een rood vlakje eindigt. De *Hals* is met een in het midden naar de lengte verdeeld zwart-bruin schild voorzien, en de *Kop* heeft insgelyks eene blinkende zwart-bruine koleur. Zy heeft 6 spitze, en aan den buik 4 paar van onderen in 't rond donker bezoomde *Pooten*, en van achteren 2, meer

bruine, dan witte *Nafschuivers*. Zy verandert in *Mai*, zomtyds reeds in *April*, in eene *Pop*, die aanvanglyk gansch wit is, en naderhand geelachtig-bruin wordr. Zy heeft geen staartpunt, *ald.* 562. Na 14 dagen komt 'er een *Mot-vlindertje* uit te voorschyn. Deszelfs *Kop* is hairig en Oker-bruin, met 2 zwarte *Oogen* en hairvormige *Sprietjes* voorzien. Het *Voorlyf* is blinkend graauw, en 't *Achterlyf* bruin, met heldere streepjes verciërd. De *Bovenvleugels* zyn aardig uitgeschulpt, van achteren verheven, en aan den buitenrand met een soort van franje bezoomd. De smalle *Ondervleugels* zyn ook met hairachtige franjes bezet, en blinkend helder-graauw van koleur. De 6 zeer tedere *Pootjes* zyn zwart, *ald.* 563.

Mot-rups, die zich in de barstbuiten van den Pynboom onthoudt, met baare verandering tot in een *Mot-vlinder* van de 4de CLASSE der NACHTVLINDERS, I. 559. enz. Deze *Rups* verkrygt haare volkomen grootte, naa verscheide veranderingen van huid, in den Herfst. Derzelver geheele lengte belooft niet boven een derde van een duim. De koleur is meestal schoon Oker-geel; en de *kop* en *bals* bruin-rood. Wanneer ze den Winter in haare woning doorgebracht heeft, zonder eenig voedsel, bedekt ze zich met een wit *spinzel*, en verandert in *April*, of menigmaal eerst in *Mai*, in eene *Pop*, die in het begin wit is, naderhand bruin, en eindelyk zwart wordr, maar haar *achterlyf* blyft bruinachtig. Veertien dagen gelegen hebbende, komt het *Mot-vlindertje* daaruit voort. De grondverwe der *bovenvleugelen* is graauw, zo als ook die van den *Kop* en

en het *Voorlyf*. De *Ondervleugels* zyn bruin, en met een witten zoom of boordzel voorzien, *ald.* 560. Het *Achterlyf* is ook bruin, maar de leden zyn met heldere dwarsstreepen van elkander gescheiden. De 6 zeer tedere *Pooten* zyn graauw, en de *Sprietten* teder, *ald.* 561.

Motrups, (de geele gezellige,) benevens haare verandering tot in een NACHTVLINDER der VIERDE CLASSE, I. 536. Deze *Motrups* is okergeel. De *Kop* en *Hals* zyn als die der *Heggen-mot*. Wanneer ze ter verandering zal overgaan, begeeft ze zich aan den onderkant van haar grof en dik weefzel, en verandert binnen 2 dagen in eene *Pop*, welke meer bruin, dan geel is, *ald.* 536. De *Vlinder*, daaruit voortgekomen, heeft in de *bovenvleugels*, eene groote menigte zwarte puntjes. De *Ondervleugels* zyn graauw-bruin, *ald.* 537.

Motrups, (de graauwe gezellige,) of *Heggen-mot*, in het groote weefzel, benevens haare verandering tot in een *Motvlindertje*, I. 533. enz. Deze *Motrups*, volwassen zynde, belooft haare grootte nooit veel meer, dan een halven duim. De koleur van 't gansche *lyf* is graauw, maar valt eenigzins in 't bruin-geele. De *Kop* is blinkend zwart, en de *hals* heeft, in het midden, een verdeeld zwart halscieraad, *ald.* 534. De 8 paar *Pooten* zyn 'er in de gewoone orde, doch de 4 paar stompe *buikpooten*, en de 2 achterste, zyn zeer kort. Wanneer de tyd haarer veranderinge nadert, begeeft ze zich na de ondervlakte van haar gesponnen verblyf, waarin ze, binnen 2 dagen, in eene *Pop* verandert. Deze heeft, meerendeels, eene bruinachtig geele koleur. De *Nachtvlinder* komt binnen 3 weken daaruit

voort. Deszel's grondverwe is eenigzins blaauwachtig-wit, en de *Bovenvleugels* zyn met zwarte punten besprenkeld. De *Oogen* zyn zwart, en de *Sprietten* haairvormig, *ald.* 535.

Mot-uil, zie by *Motrups*.

Muggen, (beschryvinge der) II. 530. enz.

De *Eieren* der *Muggen* zyn meestal langwerpig rond, ten deele glad, ten deele niet, en van onderscheide koleuren, zo wel donkerer, als helderer. De *Wormen* of *Maden*, waaruit de *Muggen* voortkomen, zyn doorgaans van eene lange spilvormige, en byna evengelyk ronde, gladlyvige gestalte, doch van vooren tamelyk spits, met een kleinen *Kop* voorzien, en van achteren vlak afgestompt, en is met ettelyke straalswyze stekels bezet. Zy zyn meest van eene blinkende, en veeltyds van eene bruine in 't groene vallende koleur, en aan zommige weinige soorten ziet men eenige enkelvoudige hairtjes. Zommige voeden zich onder de aarde, andere boven dezelve, met allerhande verrottende stoffen. Veele veranderen op de plaats, alwaar zy haar verblyf en voedsel hebben gevonden, wordende langwerpige *Poppen*. Derzelver dikte is meerendeels doorgaans overal even gelyk: het voorste deel heeft veelal 2 korte *Vleugelscheden*, en op den *Kop* staan 2 kleine hoornvormige luchtpypjes, by zommige naauwlyks zichtbaar. Haar *Achterlyf* bestaat, gemeenlyk, uit duidelyke ringen of leden, welke by zommige, op den rand, inzonderheid aan 't laatste lid, met eenige spitzen bezet zyn, *ald.* 532.

aanm. Het *Achterlyf* der *Muggen* loopt, inzonderheid by de Wyfjes, uit hoofde van hunne tweevoudige Legpyp, waarmede zy meest alle voorzien zyn,

spitzer toe, dan by de vliegen, *ald.*
531. *aann.* Zie verder *Vliegen*.

Muisje, zie *Onrust*.

Munt, zo heeten cenige Liefhebbers der
Insecten-verzamelingen, den *Vlinder*,
welke uit de *bultige bruine Rups met*
den verdeelden Kop, en een paar uit-
stekende toppen of punten voortkomt,
IV. 144. *aann.*

Mylius, (*Chr.*) was een Geneesheer, en yverig
natuur-onderzoeker, wiens liefde tot de
Natuurkunde hem eene reis na *America*
deed ondernemen, maar hy is onderweg,
te *Londen*, 7 *Maart* 1754. gestorven,
II. 245. *aann.*

Myi, zyn zodanige Insecten, welke in den
eersten opslag spinnen schynen; maar,
by eene nadere beschouwing, merkelyk
van dezelve verschillen. Want, schoon
zy, even als de Spinnen, met 8 *pooten*
zyn voorzien, deze alle hebben nogtans
hunne inleding niet aan het voorlyf of
borststuk, door dien 'er by deze maar 2
paar aan het zelve, en de verdere 2 paar
aan het achterlyf zitten. Voor 't
overige kunnen ook de *Myten* geene
draaden spinnen; het welk eene eigen-
schap der Spinnen is, III. 144. Zie
verder *Land- en Watermyten*.

N.

Naaktlouers pleegt men die soorten van
Rupen te noemen, welke glad en zon-
der hairen zyn, I. 494. *aann.*

Nacht-nimph, zie *Land- en Nacht-*
nimph.

Nachtvlinder, de bleek blaauwachtig-
groene, wit- en zwartgelschaarde
NACHTVLINDER der TWEEDE CLASSE:
zie de beschryvinge van dezen by de
Rups, (de gladde bruine, met eene

rei beldere ruitvormige vlakken, en
een dergelyken zyd-streep.

Nachtvlinder, (de by uistek schoone,
Indiaansche, geel en blaauwe,) der
tweede Classe, IV. 41. *enz.* De grond-
verwe van deszelfs *lyf*, *Kop*, en ook
veelal der 4 *vleugels* is schoon-geel. In
den geelen grond der *bovenvleugels*
vindt men 6 andere en verscheide vlak-
ken van eene donkere violet-blaauwe
koleur, welke meerendeels met elkan-
der te zamen hangen; en het *voorlyf* of
borststuk is mede met dergelyke vlakken
overdwars getekend. In de *Ondervleu-*
gels zyn de breede slingervlakken, in
den geelen grond staande, alle donker
violet-blaauw; en de eenigzins uitge-
ronde rand is met eene smalle witte linie
bezoomd. De kleine *Oogen* zyn rood-
bruin; en de 2 *Sprieten* graauwachtig-
bruin, *ald.* 42.

Nachtvlinder, (de groote, wit en ka-
neel-bruine,) behoorende tot de *tweede*
Classe der Nachtvinders. Deszelfs
Achterlyf heeft eene graauwe kleur,
en by de inkervingen worden eenige
iets helderer reepen of dwarsstreepen ge-
zien, zynde daarbenevens met langhair-
stof bedekt. Aan het *Voorlyf*, inzonder-
heid aan de *ondervlakte*, is de kleur
meest al kaneel-bruin. Aan den *Kop*,
die in de wolstoffe als verborgen zit,
ziet men eene groote, witte, uitgebrei-
de voorhoofds-tip, met eene donkere
bezooming, die in 't kaneel-kleurige
verdwynt. De *Sprieten* zyn zwart-
bruin, en de 6 *Pooten* hebben deze
zelfde kleur. De *Bovenvleugels* be-
staan in verscheide kaneel-bruine in 't
wit verdreeve vlakken, met veelerleie
donker-bruine gekronkelde dwarslinien.
De *Ondervleugels* zyn smaller, witter,

en met helderer, en minder vercierzelen bedeed, III. 206.

Nachtvlinder, (een zonderling schoone,) met hoog-Karmyn-roode ondervleugelen, enz. IV. 147. De smalle *Bovenvleugels* hebben eene witte grondverwe, welke met 5 of 6 zeer byzondere golf-achtige, brandzwarte dwarsstreepen, van onderscheiden grootte, doortoogen is, ald. 148. Het *Voorlyf*, de *Kop*, de *Spieten*, en de 6 *Pooten* zyn gansch zwart, terwyl de invoeging of verdieping des *Kops* en van den *balskraag* schoon-Karmyn-rood is. De *Ondervleugels* hebben ieder, buiten de smalle franje-achtige bezooming, in hunnen hoog-rooden grond, 3 ongelyk breede dwarsstreepen of vlakken. Op het midden der *bovenvlakte* van het dikke *Achterlyf* ziet men niet alleen eene rei groote aan elkander hangende, en byna driekantige dwarsvlakken; maar ook even zo veel aan ieder zyde, doch niet zo groot. De 2 laatste leden van het *Achterlyf* vindt men volkomen zwart; en het voorste gedeelte van het *borststuk* is, byna tot op de helft, op eene zonderlinge wyze zwart gekoleurd, ald. 149.

Nachtvlinder, (de meer bleekroode, dan *Kaneel-bruine*,) behoorende tot de *tweede Classe*, zie de beschryvinge van dezen by *Rups*, (de groote graauwe,) met den breeden zwart bezoomden, blaauwachtig-graauwen ruggestreep, en roodbruine, bairige vlakken en punten.

Nachtvlinder, met oranje-geele en zwart getekende *Ondervleugelen*, behoorende tot de *tweede Classe* der *Nachtvlinders*. De *Rups*, waaruit hy voortkomt, gelykt, (uitgenomen de groote en de iets hooge rugpen,) veel na de groote, ranke, aardverwige *Pinnerups*. Zy ver-

andert binnen een *Spinzel*, dat zy van zich maakt, in eene *Pop*, en komt, naa 5 of 7 weken, in de gedaante van den *Vlinder* te voorschyn, IV. 102. aanm. De 2 *bovenvleugels* en zo ook het *Voorlyf* hebben, meerendeels, eene aschgrauwe grondverwe, maar zyn, hierbenevens, met veelerleie byzonder fraaje witte, donkerbruine, en zwarte onregelmaaitige vlakken, geslingerde, scherpe winkelhaaken en linien verciert. De *Ondervleugels* hebben eene hoog-oranje-geele grondverwe, waarin men verscheide, koolzwarte dwarsvlakken, van verschillende gedaante en vorm, met zaagswyze omtrekken, als zo veele ongelyke breede streepen ziet, die den oranje-geelen grond des te meer verhoogen, ald. 102. Het *Achterlyf* heeft anders eenerleie koleur met de *ondervleugelen*; maar hier is het roodachtig graauw. Het *Voorlyf* is benevens de *Kop* even zo aschgrauw, als de grondverwe der *bovenvleugelen*; maar de *balskraag* heeft eene dubbele zwarte bezooming. De *Pooten* zyn bruin en wit gevlaakt, ald. 103.

Nachtvlinder, (de okergeele en kaneel-bruine,) met 4 oogvlakken, behoorende tot de *tweede Classe*, IV. 45. enz. Zie de beschryvinge van dezen by *Rups*, (de byzonder gelachtig-groene,) met verbeve ringen, veele kortige punten, en een witachtigen zyd-streep.

Nachtvlinders, worden zo genoemd, om dat ze alleen by den donker en in duisternis omzwerven, zich by dag schuil houdende, I. 124. Zy hebben aan de middelste en achterste *Pooten*, en wel in het midden, 2 of 3 spitze benedenwaarts uitsteekende punten, die na doornen gelyken, I. 482. 483. Eigenschappen en Kenmerken van hunne 4 onderscheide

scheide Classen, zie *Eigenschappen*. Voorbeelden der *eerste Classe*, I. 124. enz. der *tweede Classe*, I. 184. enz. der *derde Classe*, I. 459. enz. der *vierde Classe*, I. 515. enz.

Natuur, (de,) toont zich even zo zorgvuldig, om de schadelijke Insecten te behouden, als die, welke geen schade veroorzaaken. Dus moest iemand zeer verblind en verstokt zyn, die zulk eene voorzichtige schikking der natuure niet aan een Godlyk Wezen zou willen toeschryven, I. 87.

Nest, hoe de Wespen het haare maaken, zie by *Wespen*.

Neusboorn-Kever, benevens deszelfs *Worm en verandering*, II. 71. enz. Dezen zou men ook, ter oorzaake van den Hoorn, den *Eenhoorn-Kever* kunnen noemen, *ald.* 71. Deszelfs *Eieren* zyn eenigzins langwerpig rond en okergeel van kleur, *ald.* 74. De *Worm*, uit zulk een Ei voortkomende, zoude, in den volwassen staat, wel 3 duim kunnen haalen. Zyn *Kop* is blinkend donker-rood-bruin, en daarby vol ingedrukte punten. Zyn *tanggebit* is byna zwart; doch de andere deelen van den *bek*, benevens de *voel- en vreespitzen* komen in gedaante met die van den Maikeworm overeen. De 3 paar *pooten* zyn geel-bruin, en aan het uiterste lid met een enkelvoudigen, haakvormigen, of eenigzins krommen klauw voorzien. De 9 *Luchtgaten* of *Spiegelpunten* zyn gansch rond, en zo donker rood-bruin, als de *Kop*, doch in het midden vertoonen ze zich iets helderer. De grondverwe van het gansche *Lyf* is helder Okergeel, maar aan den darmzak valt die kleur iets in het graauwe, en de worm is, den geheelen rug over, met korte en tedere geelachtig-roode

hairtjes bezet, *ald.* 76. Zyn voedsel bestaat voornaamlyk in run, spaanderen en de schors van Eikeboomen, *ald.* 80. waarin zy ook hunne verandering tot in eene *Pop* volbrengen, *ald.* 81. Deze is in het begin geheel wit, maar haare kleur neemt in donkerheid toe; en zo is ook de *Kever*, die 'er uit voortkomt, als welke wel eene geheele maand noodig heeft, eer dat hy zyne volkome hardheid en kleur heeft. De kleur der *Vleugeldekzels* en der *Pooten* is schoon-blinkend-rood en donker-Castanje-bruin: de *Kop*, het *Halschild* en de *Hoorn* zyn merkelyk donkerer, *ald.* 82. Het overige *Achterlyf* met de gansche *ondervlakte* vertoont zich schoon-bruin-roodachtig-geel; het *gebeele Lyf* is met veele styve rood-geele hairen begroeid, hoedanige men ook aan den *Kop* ziet. Op dezen staart, aan het *Mannetje*, staat de harde en styve *Hoorn*, eenigzins achter over geboogen, en is met eene spitze punt voorzien. Aan den *Bek* ontdekt men 2 korte *vreespunten*. De beide *Vleugeldekzels* zyn tamelyk rond verwulfd, en de *Kever* is op zich zelf in het algemeen stomp en dik. Ter plaatze, daar de *Hoorn* van 't *Mannetje* zit, ziet men aan het *Wyfje* niet dan eene kleine hoogte; anders zyn de overige deelen aan beiden eenerelei, *ald.* 83.

Neusboorn-Kever, (de zeer groote, *Indiaansche*, blinkende, en zwart-bruine) met 2 boven elkander staande lange *Hoornen*, II. 10. enz. Deze *Kever* heeft de lengte van $5\frac{1}{2}$ duim. De *bovenstaande* langste *Hoorn* maakt ruim de helft van den ganschen *Kever* uit. De *onderste Hoorn* is wel een derde korter; zyne kromte gaat na beneden opwaarts. De *Kop* is, van onderen, in het dikke en breede borststuk ingeflooten,

flooten, en met korte Oker-geele hairtjes begroeid. De *Oogen* zyn groot en blinkend, *ald.* 10. De *Sprieten* zyn klein, met korte kolfjes. Het *borststuk* is rondom den buitenrand cierlyk bezoomd. De 2 voorste *Pooten* zyn met eenige groote spitzen of doornen, in 't midden, gewapend, *ald.* 11.

Neusboorn-Kever, (de zeer groote, en met 3 boornen voorzien zynde,) welke anders ook *TAURUS VOLANS*, of de *Vliegende Stier* genoemd wordt, II. 16. *enz.* Deze draagt op zyn *Kop* een vooruitstaanden en krom geboogen *Hoorn*, aan 't einde in 2 spitzen, als eene hooivork, verdeeld. Niet verre van den kop staat nog een ander *Hoorn* voorwaarts uit, een weinig overgeboogen. Het *Borststuk*, dat rond verheven, verwulfd, en van boven, in het midden, met eene vlakke verhooging voorzien is, heeft ter wederzyde een styf vooruitgestrekten *Hoorn*. Dat *Borststuk*, zo wel als het *Achterlyf*, zyn, aan de ondervlakte, met okergeele hairtjes bezet. Het voorste paar *Pooten* is het grootste, en heeft aan zyn middelste gedeelte groote, nederwaarts geboogen, scherpe haaken, *ald.* 16. 17. Het middelste gedeelte der overige *pooten* is, insgelyks, met eenige spitzen bezet; doch die zyn veeleer doornspitzen, dan haaken te noemen. Het onderste deel van alle de 6 *pooten*, met 4 of 5 leden kettingswyze te zamen gevoegd, heeft aan het uiterste einde een dubbelen haakvormigen klauw, in welks midden eene na beneden hairzagte borstelspit wordt gezien, *ald.* 18.

Neusboorn-Kever, (een kleine, donker-bruine,) met 2 kleine schouderpitzen, II. 25. *enz.* Die heeft over het algemeen eene blinkende zwart-bruine kleur.

Zyn *Kop* is tamelyk plat en breed, en op deszelfs midden ziet men een niet al te dikken, maar vry langen, iets achterover geboogen en spitzen *Hoorn*. Het *Borststuk* is verheven opgeworpen. De *Vleugeldeksels* zyn met groen overtoogen. De 6 *Pooten* zyn tamelyk kort; en de ondervlakte van het *lyf* is met roodachtig-geele haren begroeid, *ald.* 26. De *Oogen* zyn, van onderen beschouwd, kogelrond blinkend zwart; de *Sprieten* geelachtig-bruin, en aan het voorste lid met 3 bladerachtige deelen begaafd, *ald.* 25. *aannm.*

Neusboorn-kever, (de groote *Indiaansche*,) met geele vleugeldeksels, IV. 37. *enz.* Deze is den anderen, voorat beschreeven zeer grooten *Indiaanschen*, zo in grootte, als gestalte, volkomen gelyk; alleen maaken de *vleugeldeksels* een onderscheid tusschen hen beiden, vernits dezelve hier eene kleur hebben, niet ongelyk aan rype olyven; daarenboven zyn ze ook met eenige onregelmaatige donkere punten besprenkeld, en hebben eene smalle zwarte bezooming. Anders zyn ook nog de groote en kleine *randspitzen* van den onderhoorn hier niet zo scherphoekig, maar vallen meer stomp uit, *ald.* 37.

Neusboorn-Kevers, deze hebben een styven krommen omgeboogen *boorn* boven op den *Kop*, of dezelve staat recht vooruit, en eindigt, naa eene tamelyke lengte in 2 spitzen, die eene soort van gaffel uitmaaken, doch in het midden nog eenige tandjes hebben. By anderen, die 2 *boornen* hebben, gaat 'er over den gemelden kop-hoorn een, die zomwylen nog grooter en langer is, en uit het *borststuk* voorkomt. Die van 3 *boornen* hebben 'er maar een, welke aan de voorigen gelyk is, voor aan den

Kop;

[Kop; en aan ieder zyde van het borststuk word men een hoornspits gewaar; en sommigen hebben alle 3 de hoornen aan het borststuk, II. 6. 7.

Neushoorn-Kevers, (eene uitbeemsche soort van,) met een enkelen *Hoorn*, II. 22. enz. Deze is een *Aziatische* Kever, welke zich op de *Philippynsche* eilanden, inzonderheid op *Lucon*, onthoudt, *ald.* 22. Zyne *Vleugeldekkzels* zyn niet glad, maar met veele tedere ingedrukte stippen, en met ettelijke, in de lengte loopende gladde streepen verciert. Het *Borststuk* heeft eenige verheve randen. De *Hoorn* op den *Kop* is niet rond, maar heeft van vooren en van achteren eene meer platte, dan ronde vlakke, die tot in de spits van denzelfen uitloopt. De *ondervlakte van het Lyf* en van den *Kop* is met roodachtig-geele haren digt begroeid, welke men ook aan de bovenschenkels der 6 *pooten* ziet, en deze zyn met haaken en klauwen voorzien, *ald.* 23.

Nimphenvogel, zo noemt *Linnaeus* den *Vlinder* van die byzondere soort der *Indiaansche* Dagvlinders, welke lange en smalle vleugels, en een teder smeedig lyf hebben, IV. 20 *aann.*

Nommer-vlinder, zo wordt de *Vlinder*, uit de eenzaame, diklyvige Doornrups voortkomende, van veelen genoemd, om dat zy uit eenige vlakken van deszelfs bovenvleugels aan de onderzyde de gerallen van 98 of 86, met behulp van eene sterke verbeelding, weeten op te maaken, I. 40.

O.

Oevervraas, of *Hast*, benevens zyne verandering en andere eigenschappen, II. 228. enz. Deze *Wormen* zyn tweeder-

lei. De *eerste* is een donker roodbruine soort. De *Kop* is niet zeer groot, en zo ook niet de *Oogen*. Aan den *Kop* zitten twee lange hairvormige spitzen: de 6 tedere *pooten* zyn bruin. Het *Achterlyf* bestaat uit 8 à 9 leden, die na achteren allengs in dikte afneemen. Aan deszelfs beide zyden ziet men 6 der *Visvinnen* gelykende roeivederen, die dezelfde koleur als het *lyf* hebben. Het laatste lid van 't *lyf* is met 3 lange, hairvormige spitzen voorzien, van welken de middelste rechthout, en de 2 andere schuins loopen, *ald.* 229. Volwassen zynde verandert deze *Worm* in een *vliegende schepzel*, dat zich in de vrye lucht onthoudt, hebbende deze byzonder eigenschap, dat het niet langer dan een dag leeft, *ald.* 230. Aan 't einde van het *achterlyf* is het ook met 3 zodanige *bairdraaden* of spitzen voorzien, als de *Worm*, zynde zo lang, als het gansche *lyf*; maar de *Sprieten* zyn veel korter, dan ze aan den *Worm* waren. Het gansche *Lyf* is blinkend-donker-bruin; de *Kop* is tamelyk van het *lyf* afgescheiden; de 4 *vleugels*, waarvan de *eerste* naauwlyks een derde deel van de grootte der bovenste hebben, zyn weerschyndend donker-graauw. De *Worm* zo wel, als het *gevleugeld schepzel* der *andere soort* heeft eene gansch andere gestalte. Deze *Worm* vervelt vier maal; de grondverwe van het *lyf* is doorgaande Oker-bruin, maar hier en daar met donkere punten en stippen verciert, *ald.* 231. De *Kop* is aan deze soort veel grooter, en byna van gedaante, als die der *Springhaanen*. De *Sprieten* zyn kort en zeer dun. Van boven is de *Kop*, in de lengte, met ettelijke dunne streepjes betoogen; en het *Voorlyf* vertoont op zyne bovenvlakte, ter plaatze van

de vleugelscheden, slechts eenige schubbenvormige bladen. De gestalte der 12 *luchtvinnen* of *vederen* zyn den Vischschubben niet ongelijk, en daarby zyn ze zeer dun en doorzichtig. Het overige van het *Lyf* loopt na achteren scherp toe, maar het heeft zulke hairspitzen niet, als by den voorgemelden Worm. By dezen ziet men 3 *roeivederen*; zy loopen voor en achter spits toe; en hebben in het midden, daar ze het breedsten zyn, eene witte koleur, doch de steel is daar zwart, waar tegen al het overige Okergeel is. De tyd hunner veranderinge naderende komen zy, even als de voorige soort, allengskens nader aan de bovenvlakte van het water, doorgaans in *Mat*, zomtyds wat laater, en zelfs eerst wel in den Zomer, *ald.* 232. Meerendeels laat het uitgekroopen *Haft* de ledige Wormen-huid in 't water liggen; maar zomtyds kan hy 'er zich niet geheel van ontdoen, doch dit belet hem niet, zich door de vlucht uit het water te heffen, hier of daar aan te zetten, en dus de huid af te stroopen, *ald.* 233. Deze soort heeft, als het gevleugeld schepzel te voorschyn komt, niet meer dan 2 *staartspitzen*, die hairachtig en langer zyn. Zo dra deze Insecten de wormen-hulze hebben verlaaten, bestaat hunne eerste verrichting, in zich te paaren, doch des anderen dags zyn ze allen dood. Ieder *wyffe* legt een tamelyk aantal van *Eieren*, die ze niet alleen in het water, dat de rechte plaats is, laten vallen, maar ook op alle plaatzen, daar ze zich ter neder zetten, en dus moeten alle die Eieren, welke niet zo na aan waterige plaatzen zyn gevallen, dat ze 'er door den regen kunnen ingespoeld worden, noodwendig bederven, *ald.* 234.

Oleander-rups, (*de groote en schoone*,) benevens *haare verandering in een prachtige NACHTVLINDER der EERSTE CLASSE*, III. 82. *enz.* De *Kop* van deze *Oleander-rups*, in haaren volwassen staat, is zwart, en de *Hals* heeft eene schildvormige vlak van dezelfde koleur. De 2 *spiegelvlakken* zyn gansch donker-blaauw. De grondverwe der eerste ringen is oranje-geel, en de laatste heeft, benevens de *Naschui-vers*, dezelfde koleur. De bovenvlakte van den *Rug* vertoont zich, tot aan de 2 witte zydstreepen, gansch dof en donker, en van anderen loopt 'er, langs die streepen, een zwarte streep. De overige *ondervlakte* heeft, gelyk de 8 stompe *Buikpooten*, eene oker-bruinachtige vleesch-koleur, en de 6 *klauwpooten* zyn bleek-blaauw, *ald.* 87. De *Pop* is eerst gansch zwavelgeel, maar wordt, naa eenige dagen, iets donkerer, en ten laatste krygt ze de koleur van geel Wasch, of donker Oranje-geel. Haare lengte belooft ten naaften by 3 duimen. De 5 laatste leden van haar *Achterlyf* schynen iets donkerer, dan de overige, wordende veroorzaakt door de menigvuldige stippen op dezelve. Het harde *staartpunt* is bruin, en by datzelfde bevindt zich eene langwerpige, donkere spleetvlak, *ald.* 88. Naa ruim 4 weeken komt 'er de *Vlinder* uit voort, *ald.* 89. Deszelfs *bovenvleugels* zyn over het algemeen schoon-gras-groen. De menigvuldige vlakken in dezelve versmelten ten deele in elkander, en hebben ten deele eene heldere, zeer scherpe bezooming, welke nu in de lengte, dan overdwars, nu gedwongen of gekronkeld, dan half cirkelswyze *enz.* door de vleugels heen loopt. Twee andere vlakken zyn

zyn byzonder merkwaardig. De eene is schoon-roozenverwig, en loopt na den achtersten rand des vleugels. De andere vlak is violet-blaauw, en loopt, in de lengte, na den achter- en binnenrand nederwaarts. Dan is 'er nog eene derde vlak by de inleding des vleugels, welke okergeel is, en in het midden een zwarten stip heeft, die haar de gedaante van een oog geeft, *ald.* 90. De *Ondervleugels* pronken insgelyks met eenige groene en zwarte vlakken, tusschen welke zo donkere, als heldere streepen en linien worden gezien; maar hebben in het midden een violet-graauwen grond, en aan de inleding worden ze weer zwart. De *Kop* heeft mede, als 'overige *Lyf*, eene schoone groene koleur. De *Oogen* zyn tamelyk groot en roodbruin; en de 2 dikke *Sprieten* bleek okergeel. De *Halskraag* op den *Kop* heeft eene breede, bleeke, vleeschverwige bezooming, *ald.* 91. De koleur der 6 *Pooten* is bruinachtig-wit; de 2 voorste zyn, aan hunne bovenschenkels, met een dik Vederstof zeer sterk begroeid, en aan de 4 andere ziet men, aan het einde van 't middelste lid, twee steekspitzen aan ieder poot, *ald.* 92.

Onrust, dezen naam draagt de *Vlinder*, voortkomende uit de groene, wit gestreepte *Rups*; in *Duitschland* wordt hy doorgaans het *Muisje* genoemd, I. 175. *aann.*

Oogen, zie *Gezicht*.

Oostindische Scorpioen, zie *Scorpioen*, (*Oostindische*.)

Oranje-geele, kleine *Houtworm*, zie *Houtworm*, (*de kleine Oranje-geele*)

Oranje-geele Schadelyke gezellige Rups, zie *Schadelyke*, gezellige *Oranje-geele Rups*.

Ordens-lind, (*het blaauwe Engelsche*.) zo

wordt de buitengemeen groote *Vlinder*, met graauwe gewaterde bovenvleugelen, en helder-violet-blaauwe en zwarte ondervleugelen, genoemd, IV. 511. *aann.*

Overstrooming des aardkloots; de *Schryvers* der algemeene Historie melden, hoe iemand, daartoe bekwaam zynde, uitgerekend heeft, dat 'er, volgens de allerminste rekening, tot zulk eene *Overstrooming* 22 zo genoemde *Oceaan*s noodig geweest waren, III. 511. *aann.*

P.

Paauwen-spiegel-vlinder, zo wordt de *Vlinder*, uit de gezellige fluweelzwarte *Doornrups*, wegens zyne ongemeen fraaje spiegelvlakken, genoemd, I. 20.

Paauwen-vlinder, de *Eieren*, en de daaruit voortkomende *Rupsen* van den grooten en prachtigen *Paauwen-vlinder*, IV. 22. enz. Deze *Eieren* zyn rond en spilvormig, als roodachtig zand van koleur, zonder rimpels, en aan beide de stompe einden met een iets roodachtig, doch donkerer, en wat verheven punt voorzien, *ald.* 123. De *Rupsen*, daaruit voortkomende, veranderen 4 maal van huid, *ald.* 124. Kort voor de tweede vervelling hebben zy eene zwart-graauwe grondverwe. De grondverwe, by de 2de verandering van huid, is een aangenaam bleek-celadon of bleek-blaauwachtig-groen, *ald.* 125. Na de derde verwisseling is de grondverwe geelachtig-groen. De *Kop* is, tot aan den bruinen bek der *Rups*e, meerendeels geheel groen, doch in het midden door een zwarten streep dermate verdeeld, dat 'er, boven den mond, nog een groene driehoek wordt gezien.

- De 6 *klaauwpooten* zyn rood-bruin, en de 4 paar stompe *buikpooten* hebben de koleur van het *Lyf*, die nu geel-groen is. De wederzyds staande 9 *tuchigaten* zyn sneeuw wit, en met een teder zwart boordzel omringd, maar het *lyf* is, hier en daar tusschen de leden, nog met zwarte puntjes bezet, *ald.* 126. De grootste Rups van deze soort is niet boven de 4 duimen lang, *ald.* 127. Zie verder by *Rups*, de buitengemeen groote, enz. volgens IV. 88. enz.
- Paauw-oog-nacht-kapel*, wordt genoemd de *Vlinder*, uit de *schoone*, groote, groene *Rups*, met ronde, verheve, roode en geele knopjes, voortkomende, I. 216.
- Paauwoog-pylstaart*; dezen naam draagt de *Vlinder* uit de eenzaame blaauwstaartige dikke groene *Rups*, met schuinse witte zydstreepen; by de Hoogduitsche liefhebbers wordt hy genoemd *Snorbok*, I. 130.
- Paerel-vlinder*, worat genoemd de *Vlinder*, uit de eenzaame koolzwarte *Doornrups*, met tegelroode zydlakken voortkomende, IV. 135. aanm.
- Paerlemoer-vlinder*, van de grootste soort, zie de beschryvinge van dezen by *Doornrups*, (de eenzaame koolzwarte,) met tegelroode zydlakken, enz.
- Paerlemoer-vlinders*, noemt men die *vlinders*, wier ondervlakte der ondervleugelen, gemeenlyk, met Paerlemoer schynt ingelegd te wezen: daar zy, welker vlakken noch zilver- noch Paerlemoer-glans hebben, maar evenwel met soortgelyke grondverwe en cieraaden zyn voorzien, den naam draagen van *Paerlemoer-vlinders* zonder *Paerlemoer*, III. 65.
- Page de la Reine*, zo wordt de *Vlinder* uit de eenzaame, *schoone*, groen geestachtige *Venkel-rups* voortkomende, genoemd, I. 76.
- Paquet de feuilles seches*, zo veel als het bosje dorre bladeren, zo noemen de, Franschen den *Vlinder* uit de groote, bairige *Gras-rups*, I. 398.
- Parlemoer-vlinder*, (de kleine,) zie, de beschryving daarvan by *Doornrups* (de kleine helder-bruine, zwart gevlakte, enz.)
- Parlemoer-vlinders* zonder *Parlemoer*, zie by *Paerlemoer-vlinders*.
- Peeren-rups*, zie *Appel- en Peeren-rups*.
- Pees-worm*, zie *Zenuw-worm*.
- Perscaria* (*Persik-kruid*) deze Plant, wordt, veelvuldig, op vochtige en moerasige plaatzen gevonden, en van de gemeene lieden (in Duitschland) *Wilgenkruid* genoemd, waarfchylyk om dat haare bladeren den spitzen *Wilgebladeren* niet ongelyk zyn. In de *Duitsche* gewesten groejen *tweederleie* soorten van dit gewas: de eene heeft iets kleiner bladeren, die groen van koleur en zuurrichtig van smaak zyn, *Perscaria vulgaris*, *acris minor*, sive *Hydropiper*; (gemeen zuur, klein *Persik-kruid* of *Water-peper*.) de andere draagt grooter bruingevlakte, en minder wrange bladeren; *perscaria*, *major*, *mitis*, & *maculosa*, of groot, zegt, gevlakt *Persik-kruid*. Aan de eerste dezer soorten komt, met recht, den naam van *Waterpeper*; uit hoofde van haaren wrangen en brandenden smaak, alleen toe; de laatste is in tegendeel het eigenlyke *Vlooi-kruid*. I. 344.
- Persik-kruid*, zie *Perscaria*.
- Petercely-vlinder*, zo wordt onder de Liefhebbers der Insecten verzamelingen, de *Vlinder* uit de eenzaame dof-groene *Rups* genoemd, I. 109.

Piekenier, onder dezen naam is, by de Liefhebbers, de *Vlinder* uit de *grootte Pinnen-rups*, met den breedten geelen ruggestreep, bekend, I. 227.

Pilofellae, zo wordt de *Dagvlinder*, of *kleine Paerlemoer-Vlinder* zonder *Paerlemoer* by de Liefhebbers genoemd, IV. 105. *aanm.*

Pinna, wordt de *Schulpvisch* genoemd, welke zich, door middel van de fyne zyde, die hy kan spinnen, dermaate aan de Rotzen weet te verknachten, dat noch winden noch baaren dit schepzel liglyk los kunnen maaken, III. 304.

Pinnen-rups, (*de bontverwige en byzonder fraai getekende*,) *benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 324. enz. Wanneer die haare hoogste grootte bereikt heeft, is ze byna $2\frac{3}{4}$ duim lang. Haare grondverwe is bruin, en met veele korte en tedere hairtjes begroeid. Deze bruine grond is, aan beide zyden van het *lyf*, met donkere streepen getekend, *ald.* 324. en tusschen dezelve, op ieder ring, met 3 onder elkander staande bruine knopjes versierd, waaruit graauwe hairtjes voortkomen. Van den hals af tot het achterste lid loopt 'er een breede zwarte streep over den Rug, ter wederzyde met een hoog geel boordzel slangswyze omgeeven. De *Pooten* hebben de kleur van het Onderlyf, maar de voorste zyn zomwylen wat zwarer, *ald.* 325. Het *Spinzel* is doorzwaans meer geelachtig-bruin, dan roodachtig-wit, *ald.* 325. *aanm.* Naa omtrent 2 dagen daarin gelegen te hebben, verandert ze in eene *Pop*, wier voorste zeer korte en stompe deel wel eigenlyk zwart is, maar 't valt, uit hoofde van zyn schoonen glans, veelal in 't blaauwe. Het achter en langste deel van 't *lyf* is donker-bruin, en op

alle deszelfs ringen, behalve op beide de laatste, ziet men, boven op den rug, een paar geelachtig-roode streepjes: en het laatste lid is met een klein *staartpunt* voorzien. Naa 14 dagen komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn. De Mannetjes hebben iets breeder sprieten, en zyn bleeker van kleur, dan de Wyfjes. De grondverwe des *bovenvleugels* is tweeclei, te weeten deels bleek-bruinachtig-geel, deels eenigzins roozen-rood. Door denzelven loopen eenige heen en weder gessingerdelinien, ter wederzyde donker-bruin bezoomd. Aan 't uiterste einde ziet men 3 roozenverwige vlakjes. De *Ondervleugels* en het *Achterlyf* zyn overal bruinachtig-graauw. Boven den *Kop* bespeart men eene breede zwart-bruine vlak. De 2 voorste *Pooten* zyn bruiner van kleur, dan de 4 overige, doch alle zyn ze, tot aan de klauwen, met kort hairig stof bekleed, *ald.* 326. De *Eieren* zyn meestal bleek-aardkleurig-bruin, glad, en van anderen plat, *ald.* 327. *aanm.*

Pinnen rups, (*de grootte*,) *met den breedten geelen ruggestreep, benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 223. enz. Deze Rups wordt niet ligt volkomen 2 duimen lang. De *Kop* is blinkend zwart van kleur, en heeft van vooren een paar smalle geele streepen, die van boven in een spitzen winkelhoek te zamen loopen. Aan den hals zitten veele rood-bruine en zwart-graauwe haren, over den *Kop* hangende. De beide zyden van het *Lyf* hebben eene zwarte grondverwe, en deszelfs onderste deel is witachtig. De *Pin* of *Tap* op den Rug is niets anders, dan een uitwas van den ring, en van diergelyke vleesige vezelen, als waaruit het gansche *lyf* bestaat, zynde

zynde zy van buiten met veele korte, blinkende, graauwachtig-zwarte hairen bezet, *ald.* 224. De koleur der spitze *Voorpooten* is gee'achtig-bruin, maar die der *Naschuiuers* zwart. Wanneer de tyd haarer veranderinge genaakt, veranderen ook de schoone koleuren der huid, zo dat de geele rugstreep gansch wit, en de roode zydstreepen oranjegeel, ja eindelyk geheel bleek worden. Onder haar *spinzel* mengt ze veele kleine stukjes van de schors van een Appel-Peere- of- Pruimboom, zo dat het byna de koleur van het hout krygt, daar het aan zit, *ald.* 225. Naa ruim 8 dagen verandert zy in eene *Pop*, welke in 't geheel rood-bruin, en van achteren met een kort steelpunt voorzien is; en de *Vlinder* komt daaruit eerst in *Juny*, en menigmaal nog laater, van 't volgende jaar te voorschyn. De grondverwe van zyn *Lyf* en de *Bovenvleugels* is helder-graauw; de tekeningen in deze bovenvleugels zyn menigvuldig. Van het lid af loopt een zwarte takkige streep, in de lengte door, tot omtrent in 't midden des vleugels, alwaar dezelve zich in 3 korte spitzen of takken verdeelt. Aan den voorsten rand des Vleugels ziet men een cierlyk zwart teken, de gedaante hebbende van eene *Latynsche F*, of van de uitsnyding eener vioole, *ald.* 226. De *buitenste vleugelrand* is zeer fyn uitgeschalpt, en ieder uitronning is door eene zwarte linie van de naast daaraan staande afgezonderd. De *Oogen* zyn zwart, en de *Sprieten* dun. De *6 Pooten* zyn helder-graauw, met zwarte stippen versierd. De *Ondervleugels* zyn blinkend geelachtig-wit, aan den buitenrand eenigzins uitgerond, en met brune stippen en aderen doorweeven. Het *Achterlyf*, aan het einde wat breeder en

uitgerond, is tamelyk met hairen begroeid, *ald.* 227.

Pinnen rups, (de groote, spichlige, aardkoleurige.) *benevens haare verandering tot in een Nachtvulinder der tweede Classe*, I. 261. enz. De lengte dezer *Rups* belooft 3 duimen. De *Kop* is van achteren aan den hals rond, en van vooren benedenwaarts garsch vlak: van boven is hy in de gedaante van een hart verdeeld. De *vreetpunten* zyn zwart. De meeste, inzonderheid de middelste *ringen*, hebben overdwars eenige rimpels of vouwen. De koleur der rups is doorgaande graauwachtig-bruin, of aan eene verdroogde aarde gelyk, *ald.* 264. De 3 paar spitze *Voor-* en de 4 paar stompe *Buikpooten* zyn geelachtig-bruin, maar de *Naschuiuers* van koleur, als het lyf. Beneden de *Spiegelpunten* is de *buik*, naar de lengte, met veele korte heldere hairtjes begroeid, en daar door als met franje geborduurd. Het *Spinzel* vervaardigt zy tusschen de zamengevoegde bladeren, en is ongeveer van grootte en gedaante als een duiven ei. De *Pop* is over het geheel dof-blaauw; en naa 2 maanden wordt de *Vlinder* geboren, *ald.* 265. De *Kop* is klein, en zit heel diep tusschen de 2 voorpooten, zynde van vooren rond opgeboogen. De *Oogen* zyn blinkend zwart, en de *Sprieten* hairachtig dun, *ald.* 266. Het *Voor-* en *Achterlyf* zyn met korte graauwe hairen begroeid. Over den *Kop* ziet men 2 zwarte dwarsstreepen over elkander, die elk in het midden een tipje hebben, die beide van achteren witachtig omzoomd zyn. De grondverwe der *Bovenvleugelen* verschilt weinig met die van 't *lyf*, maar, in plaats van hairen, zyn 'er louter tedere heldere en zwarte

zwarte stofvederen. De *buitenrand* is met 7 ronde uitschulpingen versierd. De geheele overige vlakke des Vleugels is met veele onregelmaatige heen en weder gekromde, en witte dwarsstreepen of linien doortoogen. Kort aan den voorsten rand, midden in den vleugel, staat eene geelachtige hoekige vlak, met eene tedere donkere linie omringd. De grondverwe der *Ondervleugelen* is donker roozen-rood, en valt uit het vleeschverwige in 't Carmyn-roode. De *buitenste rand* is uitgeschulpt, en breed wit bezoomd. Op dezen witten zoom volgt een nog breeder zwarte dwarsstreep, die met spitze punten in den witten zoom loopt, *ald.* 267. Naa eene breedetusschenruimte volgt, midden in den vleugel, nog een ander, hoewel smaller zwarte dwarsstreep, doch welke niet, gelyk de voorige, van het eene einde des Vleugels tot aan het andere reikt. De *Pooten* zyn als die van alle Nachtvinders van gedaante, *ald.* 268.

Pinnen-rups, (de *kleiner bontkoleurige*), met *haare verandering tot in een Nachtvinder der tweede Classe*, I. 227. enz. Zy onthoudt zich meerendeels aan den witten Hagedoorn, *ald.* 227. en is, in haaren volwassen staat, byna 1½ duim lang. De *Kop* is blinkend zwartachtig-graauw, en met lange zwarte haren als bedekt. De *Hals* en de 3 volgende *ringen* hebben eene gansch zwarte grondverwe. De *Pin* op den derden ring is zwart, en met haren bezet. Van deze *Pin* af tot aan den laatsten ring loopt 'er een saffraan-geele streep midden over den rug, waarin men eene fyne zwarte linie ziet, die hem als in deelen verdeelt. De *buid* dezer rupse is, overal, met lange graauw-blinkende haren bezet. Alle de 8 paar *Pooten* zyn zwart, *ald.* 228. De

Pop is met korte borstel-hairtjes aan het achter einde voorzien. De grond der *bovenvleugelen* des *Vlinders*, en die van het *Voorlyf* is roodachtig-graauw, en die der *Ondervleugelen* en van het *Achterlyf* blinkend wit, *ald.* 229.

Piso, (Guillelmus of Willem,) heeft het *wandelend blad* beschreeven, II. 261. maar had de slechte gewoonte, van niet alleen andere geloofwaardige waarnemingen voor zyn eigen uit te geven, maar ook de onwaarschynlyke berichten voor waar te houden, en zich niet ontzien, zich zelven voor een ooggetuigen van zodanige fabellachtige berichten te verklaren, *ald.* 263. *aanm.*

Pislool-vlinder, zo noemen eenige liefhebbers der Insecten den *Nachtvinder*, uit de *dikke, gras-groene en wit gestreepte Spanrups* voortkomende, I. 491. *aanm.*

Planten, dat deze een zaad voortbrengen, waaruit, als het in de aarde komt, weer andere planten van gelyke natuur te voorschyn komen, is eene bekende zaak; maar dat alle planten zaaden hebben, willen sommigen nog niet toestaan, schoon de voornaamste Kruidkundigen al voorlang duidelyk hebben bewezen, dat veele planten, van welke men oudtyds stelde, dat ze geen zaad voortbrengen, 'er geen gebrek aan hebben, II. 179. 180.

Pleureusen-vlinder, zo wordt de *Vlinder*, uit de *grootte gezellige Doornrups*, met *geel-roode vlakken* voortkomende, van sommige liefhebbers genoemd, ter oorzake van den breedten zoom of rand om zyne vlerken, I. 13.

Polyp, (de *bruine*), met *boornvormige Armen*, die dezelve, onder alle andere soorten, het langste kan uitsprekken. Deszelfs *Kop* heeft van boven, in het midden, een ingedrukt rond punt, dat

eigenlyk den *mond* uitmaakt: rondom den Kop staan de *Armen*, die aan deze soort op zyn hoogst 8, en zelden 9 zyn, welke de *Polyp*, als hy ze ten langsten uitbreidt, op 6 duimen brengt. Van 't midden af opwaarts worden ze aan 't gedeelte, waarmee zy aan den Kop zitten, allengskens dikker, III. 459. en bestaan aldaar uit veel grover, en naby elkander zittende heldere korels. Het *Achterlyf* of de staart is, benevens de *Kop*, buiten de heldere bezooming, meer donker- dan helder-bruin, welke koleur echter menigmaal verandert, *ald.* 460. De *Armen* worden, door de intrekking, niet dikker, maar schynen veeleer hunne gewoone dikte te behouden, *ald.* 460.

Polyp, (de eenigzins bleke, stroogeele,) der zoete wateren, met korte boornvormige Armen, III. 408. enz. Het *lyf* van dezen wordt na achteren of aan 't staarteinde, allengskens dikker, waartegen het voorste deel, of de *Kop* dunner is. De hoornvormige *Armen*, die aan deze en zyne soort, kringwyze rondom den Kop zitten, en waarvan hy 'er zelden 7, maar gemeenlyk 4, 5 of 6 heeft, kan hy nooit langer, dan zyn lichaam uitstrekken, en daarom wordt hy de *Polyp met korte Armen* genoemd. Tusschen deze *Armen*, midden in het deel, dat men den Kop noemt, is de bek of *mond*. Deszelfs *spitze* bestaat eigenlyk in zommige soorten van kleine Waterinsecten, *ald.* 412. De gewoone vermeerdering geschiedt door uitbotting, derwyze, dat het *Jong*, het welk staat uit te komen, in het begin de gedaante heeft van een klein knopje of wratje. Dit knopje groeit allengskens voort, en binnen 5 dagen komen de

Armen, als kleine puntjes, te voorschyn: deze worden vervolgens, naar evenredigheid van 't *lyf*, grooter; tot dat eindelyk de jonge *Polyp*, naa verloop van 8 of 9 dagen, alsdan volwassen zynde, zich ten eenemaal van de moeder afzondert, het welk by andere soorten merkelyk vroeger geschiedt, *ald.* 413.

Polyp, (de gezellige, knodsvormige,) zie by Basterd polyp.

Polyp, (de groene,) met veele Armen, III. 484. enz. De groene koleur is dezen zo eigen, dat hy die tot den dood behoudt: alleen is hierby het onderscheid, dat eenigen iets geelachtig-groen, anderen meer blaauwachtig-groen zyn; en deze groene koleur verandert insgelyks zo weinig aan de armen, dat dezelve, hoe lang de *Polyp* die ook uitstrekke, altoos meer groen, dan witachtig, blyven, en, wanneer ze te zamen getoogen zyn, hebben ze volkomen de koleur van het *lyf*, *ald.* 487. Deze *Polyp* schynt zyne *Armen* zo lang niet te kunnen uitstrekken, dat ze de lengte van zyn *lyf* meer dan 2 maal overtreffen, en hy kan de gestalte zynar armen, op veele en menigerleie wyze, zeer aardig veranderen. Op zyn langst uitgestrekt heeft hy de lengte van drie vierde duim, *ald.* 488.

Polyp, (de Oranje geele,) met lange boornvormige Armen, III. 417. enz. Indien men de Oranje-koleur alleen tot een kenteken dezer *Polypen* wilde stellen, zou men zich menigmaal bedroogen zien. Die koleur is in zo verre veranderlyk, dat ze nu frischer, dan bleeker schynt en zich zomwylen ook roozen-rood voordoet: daarbenevens vindt men, dat de koleur dezer *Polypen*, wanneer ze een tyd lang vasten, of anderszins verzwak-

zwakken, zo dat hun Leeven ten einde loope, gansch en al verbleekt, *ald.* 417. Het *achterste deel* dezer soorten van *Polypen* is zeer dun; maar heeft aan 't einde iets kolfachtigs of bolvormigs, waarmede de *Polyp* zich, gelyk een bloedzuiger, vastzet; vervolgens neemt het *Lyf*, omtrent het midden, allengskens in dikte toe, en wordt na het kop-einde weder dunner. De *Kop* is wel dikker en bolvormiger, dan het achterste deel; maar hy kan dezen zo wel, als het *lyf* en de *Armen*, geduurig van gedaante veranderen, *ald.* 418. Het aantal der aan de *Kop* zittende *hoornen* is niet altoos eveneens; want de meesten hebben 'er 6 of 7, echter zyn 'er ook, waaraan 8 *Armen* worden gezien, *ald.* 419.

Polypen, hiervan zyn 'er *tweeërlei soorten* naamlyk *Zee-polypen* en *Zoet-water-polypen*, III. 383. *Classe der Polypen* zie by *Classe*.

Polypen, *beschryving der geenen die in steenen worden gevonden*, III. 507. Deze *versteende Polypen* hebben voornaamlyk, wegens hunne *Armen*, die uit loutere korrels schynen te bestaan, veel gelykheid met de *Arm-polypen* der zoete wateren, *ald.* 515. Naar maate men van zodanige steenen het boven- of onderdeel, de boven- of onderlage krygt, schynen ook de daarin zynde af-drukzels verheven of verdiept, gelyk altoos te merken is, wanneer de *versteende dingen* nog in haare moeder liggen, *ald.* 516.

Pooten, *beschryvinge der Pooten van een Vlinder*, I. 31. enz. De *Bovenschenkel* is meestal dikker, dan de overige leden. Het daarop volgende lid is het langste van allen, *ald.* 31. en aan zyne achterste deelen, wederzyds, met

kleine doorrchtige punten voorzien. Naa die volgen nog 3 kleiner leden, wier laatste 2 haakjes of klauwtjes hebben, door middel van welke de *Vlinder* zich overal aan vast kan houden. Het *achtefte paar Pooten* heeft nog een lid meer, dan de voorste, *ald.* 32.

Pop, onder deze benaaming wordt, by de *Insecten*, eigenlyk de verandering van een *Insect* verstaan, waarin het roech aan een *Worm*, noch aan een gevleugeld schepzel volkomen gelykt. Schoon eene *Pop* oogschynlyke kenmerken eener beweginge geeve, is ze nochtans dermaatein haar vlies ingewikkeld, dat de *Pooten*, hoewel ze 'er mede voorzien zyn, en dezelve byzommige zeer duidelyk in het oog vallen, haar echter niet het allerminste kunnen dienen, om van de eene plaats tot de andere te komen: ook bevinden wy niet, dat het schepzel, 't welk wy eene *Pop* noemen, ooit eenige spyze gebruike, II. 198. Wanneer men eene *Pop* gezond behouden wil, moet men dezelve niet veel ontruften, slooten of schud-den; want daar door wordt de verandering verhinderd, en men ziet 'er geenen *Vlinder* uit voortkomen. Om te weeten, of eene *Pop* gezond is of niet, en of ze niet door al te groote hitte verdroogd, of door al te veel nattigheid verrot zy; of ze ook geen vreemde gassen by zich hebbe; behoeft men dezelve maar een weinig aan te raaken, en als ze zich dan beweegt, is ze goed; maar zich niet beweevende, is ze reeds bedorven. Als men de *Pop* van haare plaats wil nemen, moet men den draad van het spinzel, ter plaatze daar ze vasthangt, afbreken, en niet aan de *Pop*; want dit laatste geschiedende bedrft men den daarin zittenden *Vlinder*, zo dat hy sterft, I. 14.

Poppen, (de,) der *Nachtvlinders* zyn in het gemeen anders van gedaante, dan die van het geslacht der *Dagvlinders*. Ook komt haar de naam van *Pop* veel natuurlyker toe, dan den anderen, om dat ze niet ongelyk zyn aan een Kind, in de luieren gewonden, I. 127. De rede, *waarom de Poppen, ten aanzien der ganfche Massa, altoos merkelyk, ja zomwylen zeer veel, kleiner worden, dan de Rupsen geweest zyn*, is, om dat 'er niet alleen, ten deele door de zuivering der rupsen voor haare verandering, en ten deele door haare uitwaasfening, door de zweetgaten der huid, veele vochtdeelen uit haar lichaam verlooren gaan; maar ook dat, uit hoofde van dit verlies, het Poppenvlies veel vaster worde, dan de rupsen-huid geweest is, en dat uit alle deze, en de voorengemelde omftandigheden, te zamen genomen; noodwendig volgen moet, dat altoos de *Massa der Poppe* kleiner zy, dan de *Massa der Rupsen* geweest is, zelfs ook by dezulke, die zich in het geheel niet inspinnen, *ald.*

322. 323.

Proeven, door den Schryver genomen, by het in stukken fnyden der *Polypen*, 439. enz.

Proteus, (de kleine) III. 570. enz. Dit diertje beftaat uit louter ongelyk groote, heldere en doorzichtige korrels, welke het onophoudelyk door elkander fchynt te vermengen; doch welke gedaante het ook, door deze vermenging erlangt, de *buitenranden* zyn altoos zo helder, als of zy een byzonderen zoom hadden. Dan vertoont het zich in de gedaante van een klaverblad, dan is het weer in de lengte uitgebreid. Dan heeft hy eens een paar hoornen, als een Hartekop, met ongelyke takken

aan de einden, fttaande op een onregelmatig lichaam, aan welks achtereinde eene lange fpits uitfteekt; dan weer verliest het zyne hoornen, en verandert weer in een kogel met een hals, *ald.*

571.

Pruimgeele Rups, zie *Eenzaame pruimgeele Rups*.

Pylftaart-vlinders, *Pyl vlinders*, worden deswegen van eenige liefhebbers genoemd, om dat veele vlinders van dit geflacht in het ftil zitten, hunne vleugels indiervooge houden, dat ze, tevens met het lyf, de gedaante van een pyl vertoonen, I. 120. *aanm.*

Pylfteert-paauwoog, zie *Paauwoog-pylfteert*.

Pyl-vlinders, zie *Pylftaart vlinders*.

Pynboom- of Woud-rups, (de grootz,) *benevens haare verandering tot in een Nachtvinder der tweede Clafse*, I. 443.

Die heeft de lengte van 4 duim. De *Kop* heeft eene Oker-bruine koleur, en de ringen hebben eene wit graauwe grondverwe, die met veele bruine en graauwe punten befprekeld is, en in dezelve zyn verfcheide groote donker-bruine vlakken. De *huid* fchynt, behalve de lange hairen, waarmede zy bezet is, nog met een viltachtig ftof beftrooid te zyn. Van den *Kop* af loopt 'er wederzyds eene donker bezoomde linie, waarin op ieder cinde der beide zwartachtige dwarsftreepen, eene ronde Kaneel-bruine vlak gezien wordt. Het laafte lid is met een hoog uitwas voorzien, waarop een borftel ftaat, uit korte, zwarte, vederachtige hairen byeen gevoegd. De 6 fpitze *klauwen* zyn donker-bruin, de 8 ftompe *buikpooten* wat helderer, en de 2 laafte breede *nafchuivers*, benevens de *ftaartklep*, hebben eene dergelyke heldere koleur, *ald.*

ald. 444. Haar *Spinzel* is oker-geel, en de *Pop* is tamelyk lang, maar heeft geen staartpunt. Haar *Achterlyf* is met eene zwart-bruine koleur overtoogen; de inkervingen zyn rood-bruin, en boven de luchtgaten ziet men aan de zyden eenige hairtjes. Het *voorlyf*, benevens de *Vleugelscheden* is zwart-graauw, en, even als het *Achterlyf*, dof en zonder glans. Naa verloop van 3 weken komt 'er de *Vlinder* uit te voorfchyn. Deszelfs *bovenvleugels* zyn graauw, met bruine punten besprenkeld, en de buitenrand is donker bezoomd, *ald. 445.* Byna in derzelver midden ziet men eene ongelyk breede, bruin-roode dwarsvlak, wier kanten wederzyds zaagwyze en zwart bezoomd zyn. De *ondervleugels* zyn eenkoleurig, bleek-bruin-rood, en hebben aan den buitenrand een iets donkerer zoom. Byna gelyke koleur hebben ook het *Voor-* en *Achterlyf*, maar die aan het eerste is iets donkerer, dan aan het laatste. De 6 *Pooten* zyn bruin, en aan de *bovenschenkel*s met hairen begroeid. De *Sprieten* aan de *Wyfjes* zyn bruin en hair-dun, maar die der *Mannetjes* vezelig of vedervormig. De *Eieren* hebben eene blinkende geelgroenächtige-bruine koleur. Het wyfje legt dezelve, menigmaal, reeds in *Augustus* aan de pynboomen, en de jonge rupsjes komen, veelal, binnen 8 of 10 dagen daarna, te voorfchyn, die in den volgende Zomer haare gewoone grootte verkrygen, *ald. 446.*

Pynboom-rups, (de *schoone, groen, geel, wit en bruin gestreepte*,) met een *staart* en *Springbaanen-Kop*, benevens *baare verandering tot in een Nachtvlinder der eerste Classe*, I. 153. enz. Zy houdt zich meest aan den *Pynboom* op, *ald. 153.* en haare grootte, in den vol-

wassen staat, is omtrent 3 duim. De *Kop* is helder geelachtig-bruin en blinkend van koleur; en op de voorvlakte staan een paar rood bruine streepen. De *lip* is graauw van koleur, en de *vreespunten* zyn zwart, *ald. 159.* In de lengte van den kop af over het lyf loopen schoone bonte streepen. Midden over den *Rug* loopt een rood-bruine streep van ongelyke breedte. Deze schynt het middelste gedeelte van een anderen, die wit is, te bedekken. Op dezen witten volgt, aan ieder zyde, een schoone groene streep; naast welken men een half zo breedden zwavel-geelen ziet; dan volgt 'er weder een groene, en eindelyk maakt een geele, de smalste van allen, als den laaften zoom uit. De *Spiegelpunten* zyn hoog-rood, en met zwarte kraaltjes omringd, die van boven nog een half wit randje hebben. De *ondervlakte van het lyf* is mede groen van koleur; maar de 6 sptize *Voorpooten* helder-bruin. De 4 paar stompe *buikpooten* hebben eene bleekgroene koleur; de 2 *naschuivers* zyn, by hunne groene koleur, zo zwart bestippeld, dat ze eerder graauw schynen. Het vleeschächtig *boortje* is zwart-bruin, loopt zeer spits toe, en is met kleine pukkeltjes bezet, *ald. 160.* By den tyd haarer veranderinge kruipt ze na den grond onder de struiken, verwaardigende zich aldaar eene ruime holligheid. De koleur der *Pop* is, by de meeste, wat blinkend, donker- en rood-bruin. Op ieder ring ziet men een paar eenigzins vlakke verheve randjes, zynde niets anders, dan de overblyfsels der stompe buikpooten en der 2 naschuivers van de rups. De *Staartspits* is hard en zwart, *ald. 161.* De grondverwe van de *Vleugels* des *Vlinders* is meeren-

deels graauw; aan den buitenrand voorzien, met een witten zoom, en in dezen ter plaatze, daar ieder ader, door den vleugel loopende, eindigt, een bruin vlakje. In de *bovenvleugels* ziet men, van vooren, eene wat helderer dwarsvlak, voorts tusschen de aderen, byna in het midden der vleugels, 3 of 4 langwerpige zwarte vlakken, en eindelijk nog by het lid eenige ros-bruine hoofd-aderen. De grond der *Ondervleugelen* is, by den witten rand, wat donkerer van kleur, *ald.* 162. De aschgrauwe grondverwe van 't gansche *lyf* wordt door de zwarte en witte vlakken merkelyk verdeeld, en midden over den *Rug* is eene zwarte linie getoogen. De *Kop* is, boven de glinsterende zwarte *ogen*, met een paar witte *Sprieten* voorzien. De 6 *Pooten* zyn graauw, *ald.* 163.

Pytworm, zie *Waterrups*.

Pyramiden-rups, (de gladde, bleek-groene,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Klasse*, I. 241. enz. Eene der grootste van deze zal ongeveer $1\frac{1}{2}$ duim lang wezen. Alle de *ringen* zyn niet even dik; want op de 2 laatste staat eene verhevenheid, die eenigermate de gedaante eener *pyramide* heeft, naar welke zy ook den naam draagt. De *Kop* is bleek-groen van kleur, en van vooren tusschen de 2 *vreetpunten* met een geelachtig-bruin vlakje getekend. De kleur van het gansche *lyf* is groen. Eene witte linie loopt 'er, midden over den *Rug*, tot in het spits der *pyramide*. De *Hals* is met 2 kleine regels van witte punten in de lengte voorzien. De 3 paar spitze *Pooten* zyn geelachtig-bruin, maar de *stompe* gras-groen, en van onderen bruin bezoomd. Ten tyde haarer veran-

deringe kruipt de *Rups* onder de stuiken of afgevallen bladen; bereidende, by het zamen wikkelen van een paar van dezelve, een eivormig weefzel, dat niet heel digt is, veranderende, naa eenige dagen, in eene blinkende donker-rood-bruine *Pop*, wier *voorlyf*, benevens de *Vleugelscheden* donkerer van kleur is, dan het *achterlyf*. Naa eene maand komt daaruit de *Vlinder* te voorschyn, *ald.* 244. Deszells *bovenvleugels* zyn in den grond glinsterend bruin; en op dezelve ziet men verscheide geelachtige, smalle, gekronkelde, en zaagvormige linien overdwars getoogen. In de zwarte streepen staat, midden in den vleugel, een ovaal-rond geel ringetje, het welk zommigen voor eene *O* of eene *Nul* houden. De *buitenrand van den Ondervleugel* is oker-geel geboord, en in dit boordzel ziet men eene smalle zwarte linie, die 'er kronkelende doorloopt. De overige grond des *Vleugels* is koper-verwig, of roodachtig-bruin. De *Kop*, benevens het gansche *voorlyf*, is donker-bruin: de *Oogen* zyn zwart, de *Sprieten* bruin, lang en dun. Het *Achterlyf* is zeer helder- of graauwachtig-bruin, ter wederzyde donker of zwartachtig bezoomd, en met streepen over het *lyf* voorzien. Het laatste lid eindigt met zwarte hairen, en is in het midden, gelyk de staart van een visch, verdeeld. De kleur der *Pooten* komt met de *bovenvleugels* en 't *voorlyf* overeen, doch de hairen aan den bovenschenkel zyn iets helderer, *ald.* 245. De *Eieren* zyn geel, niet glad, maar met veele kleine ribbetjes en voortjes omgeeven, en hebben eene meer ronde, dan plat gedrukte gedaante, *ald.* 247. *aamm.*

Q.

Quee-rups, (de kleiner en ranker bruin-geele.) met haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede Clafse, I. 364. enz. In de eerste jeugd hebben deze foorten van rupsen eene veel schooner geele koleur, dan wanneer ze volwassen zyn. Naa dat ze, het voorjaar overleevende, nog eene reis of twee, volgens gewoonte, haar huid afgelegd, en de hoogste grootte bereikt hebben, zyn die, waaruit de *Wyfjes-Vlinders* voortkomen, meestal over de 3 duimen lang, maar, die de *Mannetjes-Vlinders* ter waereld brengen, blyven gemeenlyk een derde korter. De *Kop* der Rups is Oranje-geel en aardig getekend. De rand van den *bals* is van dezelfde koleur, en dit boordzel ziet men met een smal, zwart, en teder ingetand zoomtje verciert. Ter wederzyde van den *Kop* wordt men een graauwe knop of bult, wiens middelpunt zwart is, gewaar, *ald.* 367. De gansche *huid* is met een tederen pels bedekt, welke glinsterend geel is. De *Pooten* zyn gezamenlyk rood-bruin; *ald.* 368. doch de voorste vallen nogtans iets meer in het geelachtig-rood-bruine, *ald.* 368. *aann.* De koleur der *Pop* valt uit het oker-geele in 't bruine, *ald.* 369. De buitenrand der *onderleugelen* van een *mannetjes-vlinder*, uit zulk eene *Pop* voortgekomen, is uitgerond, geel geboord. De *Wyfjes* hebben wel even zulke, maar bleeker *dwaarsstreepen*. Van deze af tot aan het lid is de grondverwe in 't algemeen iets donkerer, dan omtrent den buitenrand. In ieder *bovenvleugel* ziet men een wit bruin-bezoomd vlakje, *ald.* 370. De *Eieren* zyn langwerpig-rond en bleek-

bruin van koleur. Naa 14 dagen komen de jonge rupsjes 'er uit te voorschyn, *ald.* 371.

R.

Radersteentjes, zie *Trochiten*.

Reaumur, noemt de Spanrups *Landmeesters*, om dat ze, by ieder schrede van haaren zonderlingen gang, haar lyf even zo op den grond voortzetten, als een Landmeeter zyne Ketting doet, I. 514.

Reneaume, een Geneesheer te *Parys*, heeft zich in koude en verwisselende koortzen van Galappels bediend, geëvende den *Lyder*, by den aanvang der Koortze, eene halve drachma van een tot poejer gemaakten Galappel in; of by goede dagen, alle vier uren, even zo veel. Doch dit geneesmiddel heeft niet altoos eene even gunstige uitwerking gehad; en hy pryft het inzonderheid aan tegen zodanige Koortzen, die uit verslapte vezelen van de maag ontstaan, III. 195.

Rbeebokje, dezen naam zou men, gevoegelyk aan de *mat- of dofgroene en geboornde Rups* kunnen geeven, om dat ze 2 opstaande hoornen op den *Kop* heeft, die aan het einde in 2 spitzen verdeeld zyn, en dus de gedaante hebben van die van een *Rbeebokje*, IV. 174.

Ridderspoor, deze is het voedzel en de verblyfsplaats der violet-blaauwe, geel gestrepte, en zwart besprenkelde Rups. Daar zyn *tweeërlei hoofdsfoorten van Ridderspooren*, dubbele en enkele. De bloemen hebben, van onderen, aan het steeltje, een lange spoor; en van daar heeft het kruid dien naam ontvangen. De

gemelde *Rups* leeft van alle soorten van Ridderfpooren, I. 247. 248.

Ridderfpooren-rups, (de *ſchoone rood-bruine*;) met 4 gele bandvormige ſtreepen, een vleeschverwigen *Kop*, en dergelyke *Pooten* verciert, benevens *haare verandering tot in een Nachtwinder der tweede Clafſe*, I. 525. enz. Op zyn hoogſt is deze *Rups* 1½ duim larg. De *ronde Kop*, die van vooren verdeeld is, onderscheidt zich inzonderheid door zynen ſchoonen vleeschverwigen glans, en van deze koleur zyn ook de 6 voor- en de 8 *buikpooten*; maar de 2 achterſte zyn rood-bruin, gelyk de grondverwe van 't overige *lyf*. Deze grondverwe is met veele donkere punten beſprenkeld, en heeft 4 zwavelgele ſtreepen. De 4 rood-bruine vlakken zyn byna overal even breed. Ieder geel ſtreep is, van boven, met een teder wit ſtreepje geboord. By *haare verandering* maakt ze eene ruime holligheid in de aarde, bekleedende dezelve met een week ſpinzel; en naa eenige dagen ziet men eene dof-blinkende rood-zwarte *Pop*, *ald.* 426. Deze is tuſſchen de ringen of inkervingen met een iets helderer rood, en overal met donkere punten voorzien. Zy blyft den winter over, tot in de maand *Mai*, in de aarde verborgen liggen, en dan verſchynt de *Vlinder*. Deszelfs grondverwe is meestal rood-bruin: de *bovenvleugels* zyn, omtrent den buitenrand, met een gekronkelden, ſchoonen, ſtroo-geelen dwarsſtreep verciert, en in het midden derzelve vertoonen zich 2 witgrauwe vlakken. Het *Voorlyf* heeft dezelfde grondverwe; maar het *Achterlyf* is helderer, en midden over den *Rug* loopt eene rei verheve en opgeworpe zwarte vlakken. De *Ondervleugels* zyn don-

ker-grauw. Drie van de 6 *Pooten* zyn aan de bovenſchenkels met kleine hairtjes bezet, en voor het overige van dezelfde koleur als de *bovenvleugels*; *ald.* 427.

Ringrups. (de *ſchadelyke, gezellige, en geſtreepte*;) benevens *haare verandering tot in een Nachtwinder der tweede Clafſe*, I. 216. enz. De grootſte wordt niet boven de 2 duimen lang. De *Kop* is van vooren wat vlak, blaauwachtig-grauw van koleur. De *Hals* is van dezelfde koleur; *ald.* 217. en heeft op ieder zyde eene zwarte vlak. Het *Lyf* is met veele rechtsdraads loopende ſtreepen, van onderscheide koleuren, naar de lengte overtoogen. Midden over den *Rug* loopt eene enkelvoudige, witte tedere linie, tuſſchen 2 andere, even breede en geelachtig-roode linien ingeflooten. De *gansche huid* is met tedere, geel-bruine en grauwwachtig-zwarte hairen begroeid. Het *onderlyf*, benevens de 8 paar ſpitze en ſtompe *Pooten* is geelachtig-bruin van koleur, *ald.* 218. By de veranderinge zoekt deze rups een hoek aan eene ſchutting of wand, of een gat in den ſtam van een boom; of trekt eenige bladen van een tak te zamen, en maakt 'er eene wooning van, en in dezelve een *weefzel*, het welk met veel kalkachtig wit en geel ſtof bezet is. Naa eenige dagen komt ze in de gedaante van eene *Pop* te voorschyn, *ald.* 218. Deze is niet wel 1 duim lang. Het *onderſte deel* is vooraan, en aan het ſtompe ſteelpunt, bruin van koleur, en de *bovenvakte* dof-zwart-grauw. Naa ongeveer 3 weken breekt de *Vlinder* door het *Spinzel* heen, *ald.* 219. De grondverwe van beide geſlachten is even eens, en wel bleek-roodachtig-geel. D Oogen

gen (zyn zwart, en de *Spriet*en van het *Mannetje* breed en vedervormig, maar van het *Wyfje* op verre na zo breed niet. De bovenschenkels der 6 *Pooten* zyn ongemeen digt met haren begroeid: door de beide *bovenvleugels* loopt een paar kromme ros-bruine linien; het *Achterlyf* van 't *Mannetje* is wolhairig en flank, en het laatste lid is donkerer van koleur, dan by het *Wyfje*. De *Ondervleugels* zyn van dezelfde grondverwe. De *Eieren* zyn bruinachtig wit, en blinken, of ze met vernis bestreken waren. Midden op de bovenvlakte ziet men een klein en niet zo zeer diep groefje, dat het stipje is, daar de jongen door byten, om 'er uit te komen, *ald.* 220. 221. en *aann.*

Ringrups, (de tweede soort der gezellige, op de Wolfsmelk aazende,) behoorende tot de tweede Klasse der *Nachtvinders*, IV. 82. enz. Deze tweede soort van *Ringrupfen* komt met de eerste niet alleen daarin overeen, dat haar *Vlinder* zyne *Eieren* kringswyze rondom een rys of stengel legt. *ald.* 83. maar dat ook het *Spinzel* zelf van derupsen, wanneer ze willen veranderen, even als dat der andere is vervaardigd, *ald.* 81. Deze *Eieren* zyn piramidaalswyze, often minsten is het eene einde dunner, dan het andere, *ald.* 84. *aann.* Eenige van deze soort van rupfen zyn reeds omtrent het einde der maand *Juny*, doch andere eerst in *July* volwassen, wanneer haare lengte omtrent 2 duimen beloopt, doch de *Mannerjes* zyn veel kleiner. De *Kop* der rupse heeft eene blaauwachtig-groene grondverwe; van vooren ziet men een paar langwerpige *oogvlakken*, en de *bek* is met zyne *vreespijzen* zwart. De *bals* heeft, even als de *Kop*, eene geelle bezooming, benevens een paar by-

zondere zwarte vlakken, waarin men 2 witte puntjes ziet. De *Ondervlakte van het lyf* is zo graauw als de *Kop*; heeft ettelijke tedere zwarte punten. De *zyde-vlakte* bestaat, meerendeels, in een doorgaanden even breedten helderen hemel-blaauwen streep, welke op ieder lid, door eene breede en eene iets smaller vierkante zwarte dwarsvlak, mitsgaders door een paar zwarte punten afgebroken wordt. De *bovenvlakte* heeft eene meer vuurroode, dan oranje-geele grondverwe. De 2 *naschuivers* zyn meer oranje-geel, dan de 4 stompe *buikpooten*, en de 6 voorste *klaauwpooten* zyn zwart, *ald.* 86. Wanneer ze veranderen zal, spint ze zich aan een gras-halm of Wolfsmelk-stengel in; *ald.* en dit *spinzel* is schoon-zwavel-geel. Na verloop van 4 of 5 dagen is zy in eene *Pop* veranderd. De *Mannetjes-pop* is niet alleen de helft dunner, en een derde korter, maar ook haare *bovenvlakte* van 't langer achterdeel is bruinrood, en de *ondervlakte* heeft eene schoone oranje-geele koleur. De *Pop* 4 weken lang gelegen hebbende, breekt de *Vlinder* door de huid en de *spinzels* heen, *ald.* 87. Het *Wyfje* en *Mannetje* hebben over het algemeen eene rood-bruine grondverwe, welke in de *bovenvleugels* met een paar golfvormige en helder okergeele streepen, van ongelijke breedte, schuins overdwars doortoogen is. By het *Mannetje* is de grondverwe veel helderer, en valt ook eenigzins in het geelachtig tegelroode. De koleur der *Spriet*en is als die van het lyf; maar de 6 *pooten* zyn zwart-bruin, *ald.* 88.

Ringrupfen, aan dezen is die naam gegeven, om dat de wyfjes hunne *Eieren* aan de kleine takjes der boomen of strui-

ken, ringswyze in 't ronde, altoos liggen, I. 216.

Rivier-garnaal, zie Garnaal, (de klein-
ne.)

Rivier kreeft, dezer landen, met zyne merkwaardige veranderingen, III. 267.

Deze Kreeften woenen voornaamlyk in rivieren en beeken. 's Winters onthouden ze zich meestal in de holen, aan de oevers, en onder 'r oude hout, dat in en by het water staat; doch 's Zomers, en vooral by zoel Weer, zwerven zy, zo wel by dag als by nacht, in het water rond, om hun voedsel te zoeken, bestaande inzonderheid in andere dieren, ald. 270. Deze Kreeft heeft een spitzen *Kop*, een aflopend rond *lyf*, met een iets dikker *staart*, en teffens 10 *pooten*. De *Kop* gaat tot aan de voore of groeve, die byna dwars door het midden van dat gedeelte loopt, het welke men den *neus* van den Kreeft noemt. De *Sprieten*, welke uit veele leden te zamen gesteld zyn, dienen den Kreeft voornaamlyk daartoe, dat hy, als hy in de holen zit, door dezelve terstond gewaar schouwd wordt, als hem iets vyandlyks nadert. De beide *Oogen* zyn in zo verre beweegelyk, dat ze de *Kreeft*, naar vereisch van zaaken, zo wel intrekken, als weder uitdryven kan, ald. 273. De *staart* heeft 5 breede en harde schaaen of gelederen, die over elkander kunnen schuiven, en aan het einde van dezelve vindt men 5 *vloetschubben*. De *Rivier-kreeft* heeft 10 *pooten*; vyf op elke zyde. De 2 voorste van het *lyf* zyn altoos de dikste, en deze hebben bovendien 2 groote en dikke *Schaaren*. De 2 daarop volgende paaren zyn 'er ook wel mede voorzien, maar behalve dat ze veel dunner zyn, zy hebben ook veel kleiner schaaen. De 2 laatste paaren

vertoonen, in plaats van schaaen, slechts eene enkelvoudige *klaauw-spits*, ald. 274. Niet verre van de plaats, daar de beide lange *Sprieten* hunne inleding hebben, ziet men 2 groote en dikke *tanden*, waarmee de *Kreeft* al zeer harde lichaaen klein byten of vermaalen kan. Achter deze *Tanden* ziet men het *keelgat*. Ter zyde van de *tanden* bespeurt men een paar dikke en lange *vreetspitzzen*, hem dienende ter vermaalinge van de spyze; ieder dierzelfen bestaat uit 4 leden, ald. 275. Van de kleine *pooten* ontdekt men aan het *Wysje* 5 paar, doch aan het *Mannetje* maar drie. Of deze zo paaren, dat de borst van den eenen Kreeft op die van den anderen kome; dan of de een de borst van den anderen met zynen staart bedekke, mogen zy ons leeren, die zulks hebben gezien, ald. 277. De *Eieren* in den *Eiertok* zyn drieerlei; van onderscheiden grootte en kleur. Van *tydige*, welke de grootste en bruin zyn, ziet men 'er slechts weinige; het aantal der geene, die tot het *tweede broedzel* bestemd zyn, is in tegendeel veel grooter, en wegens hunne oranje-kleur, genoegzaam van de overige te onderscheiden. De *kleinste* zyn meest in getal, en geelachtig van kleur, ald. 290.

Roodband, dezen naam draagt by *Linnaeus* de donker-bruine *Dagvlinder*, met lange, doch smalle vleugelen, waarin 2 groote vuurroode vlakken staan, IV. 21. aamm.

Rups, (de aardbruine,) met zwarte schubben-vlakken op den rug, III. 362. enz. Deze heeft byzondere donkere schubachtige vlakken op den rug, en haar laatste lid loopt niet spits toe, maar is rond verheven, en eenigzins opgeworpen. Op die verhooving is eene gele

geele dwarslinie, en op den *bals* vindt men geene zwarte vlakken, *ald.* 363.

Rups, (de aardbruine,) met heldere zyde-streepen, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 434. enz. Deze *Rups* is van de soort der geene, welke haar voedsel aan de Kruiden zoeken; maar zich ook, zo dra zy verzadigd zyn, weer in de aarde verbergen. De volkomen grootte kan niet wel 2 duim haalen, *ald.* 434. Haare grondverwe is recht aardbruin, doch in dezelve zyn ook eenige geelachtig-bruine vlakken en heldere streepen te vinden. Op ieder zyde naamlyk loopt, van vooren tot achteren, een streep als een boordzel: bovendien ziet men nog 2 streepen, van welke die geene, die naast het gemelde boordzel staat, dezelfde koleur heeft, terwyl de andere donker Oker-geel is. De onder aan den buik staande 4 paar stompe *Pooten*, hebben eene heldere koleur; maar de 6 *voorpooten* zyn helder en donker besprenkeld. De holligheid, welke zy, by haare verandering, in de aarde maakt, bekleedt ze met een *spinzel*, zodanig met de aarde vermengd, dat het een *aardbol* schynt, en in dezen verandert ze, na ettelyke dagen, in eene *Pop*. Dezelve is blinkend en bruin-rood van koleur, en van achteren met een klein *staaripunt* voorzien. Na 4 weeken komt 'er de *Vlinder* uit voort. Deze pronkt wel met geen frische en bonte koleuren; maar deszelfs *bovenvleugels* zyn zo schoon en keurlyk, met heldere trekken en linien, in hunnen donker-bruinen grond, gemarmerd en verciord, dat het geene geringe moeite kost, om 'er eene naauwkeurige afbeelding van te voltoojen, *ald.* 435. Alle de heldere linien en trekken in die *bovenvleugels*

hebben ter wederzyde nog eene donkerer bezooming, dan de grondverwe is. Het *Voorlyf*, dat dezelfde koleur heeft, laat ons, zo wel aan den *halskraag*, als aan beide de zo genoemde *schouderbladen*, een helderer boordzel zien, en deze deelen zyn verheven, en hebben om hoog uitstekende punten. Voor aan den *Kop*, tusschen de beide hairvormige *Sprieten*, die aan beide de geslachten eenzelvig zyn, zit nog een paar *snavelspitzen*, en tusschen dezen zit een tame-lyk lange *Zuiger*, die slakvormig te zamen gerold is. De *Ondervleugels*, benevens het *Achterlyf*, hebben eene brui-achtige, zwart-grauwe koleur, en even zo ook de *Pooten*, wier *bovenschenkels*, gemeenlyk, met zo veele haren niet bezet zyn, als men die wel by andere soor-ten vindt, *ald.* 436.

Rups, (de bestippelde blaauwachtig groene,) met den bleek-geelen zyde-streep, en haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 429. enz. Deze zoekt haar voedsel op de *Kerssen-boomen*, en wordt in de maand *Juny* op dezelve enkelvoudig gevonden. Haare grootste lengte is meerendeels 1½ duim; en de grondverwe van haar *lyf* is byna doorgaans blaauwachtig groen; terwyl 'er langs ieder zyde van den buik, van den *Kop* af tot aan de *Naschuiers*, een bleek-geele streep loopt, die overaleven breed is. De *Kop*, en de 8 paar *Pooten* hebben de grondverwe als het *Lyf*; en alle de ringen of leden zyn met veele tedere, verheven en blinkende punten bezet. By eene harde aanraaking spuit ze een geelachtig vocht uit den bek. By haare verandering kruipt ze onder de aarde, vervaardigt daarin eene holligheid; *ald.* 429. en bereidt zich, gelyk de *Kevers*, een harden, en langwerpig-ronden

bol, in wiens binnenste zy in eene donker-bruine *Pop* verandert, welke van achteren een, na den buik toe overgeboogen, donker staartpunt heeft. Naa 3 maanden verschynt daaruit de *Vlinder*. Deszelfs grondverwe is voornaamlyk bleek-okergeel en graauw; doch deze koleuren zyn hier zo aardig vermengd, dat, ter oorzaake van de daaruit ontstaane vlakken, de 4 *vleugels* zo wel, als het *lyf*, ons als gemarmerd voorkomen. Ieder vlak heeft weer een zeer teder en donkerer boordzel, inzonderheid in de *Bovenvleugelen*, waarin ook, onder de groote graauwe vlakken, eenige Oranje-geele punten en trekken vermengd zyn; en deze worden insgelyks omtrent den voorsten rand bespeurd, als mede aan den *Kop*, den *balskraag*, en het *achterste lid*. De *Pooten* hebben de eigenste grondverwe van 't *lyf*, en derzelver *bovenschenkels* zyn met een weinig vederstof bezet, *ald.* 430. De *Eieren* zyn bleek-geel, byna half rond, doch van boven eenigzins spits toeloopende, en van onderen plat gedrukt, *ald.* 431. *aann.*

Rups, (de bleek groene, gladde,) met witte streepen, met haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede *Classe*, I. 253. enz. Deze *Rups* blyft, van het Ei af, tot aan de verandering in eene *Pop*, bestendig groen, behalve dat haare koleur, by toeneemende grootte, geduurig iets bleeker wordt. Men vindt ze in de maand *Augustus*. De grootste lengte is zelden boven de 1½ duim. De *Kop* is middelmaatig groot, plat en gras-groen. De koleur der *buid* is meereendeels groen; *ald.* 253. maar de gansche *Rug* van boven is zeer bleek- of zee-groen, en de beide zyden zyn, tot aan den onderbuik, nevens de 8 paar *Poo-*

ten, gras-groen. De bleek- en donker-groene gronden worden wederzyds, door eene smalle witte linie, van elkanderen gescheiden; en eene dergelyke iets breeder witte linie loopt hier van onderen langs den buik. Wanneer de tyd haarer veranderinge daar is, maakt zy een teder en doorzichtig wit *Spinzel* onder de bladeren of het gras, en verandert haare groene huid met een donker-bruin *Poppevlies*, en naa eene maand komt daaruit de *Vlinder* ter waereld. Alle 4 de *Vleugels* zyn, by beide geslachten, gelykvormig getekend, en rondom uitgeschulpt. Derzelver grondverwe is wit, en in dezelve zyn veele graauwe en zwarte cieraaden. Het voor- en achterlyf, mitsgaders de *bovenschenkels* der *Pooten*, zyn met graauwe hairen bezet; en de overige leden der *Pooten*, nevens de *Sprieten*, zyn insgelyks graauw, *ald.* 254.

Rups, (de bleek bruinachtige, blinkende,) met den zwarten *Kop*, en even zulke naschuivers en wratjes, behoorende tot de tweede *Classe* der *nachtvlinders*, en geneerende zich in 't vermolmde hout, III. 242. enz. Zy was 2 duimen lang; de ringen of leden van haar lyf waren tamelyk diep ingekorven, en op ieder derzelven zag men omtrent 10 verheve, blinkende, kleine, zwarte knopjes of stippen. De *Kop*, benevens de *bals*, de *naschuivers* en de 2 laatste *Pooten* waren git zwart. De 6 *Voorpooten* hadden dezelfde koleur, maar de 8 *buikpooten* eene bleek-bruine koleur, zo als het gansche *Lyf*, *ald.* 243.

Rups, (de bleek-groene,) die zich op de eiken- en lindéboomen, (als mede op de *Kwetzzen*. en *Persiken-boomen*) onthoudt en verciert is met 4 geele en eene witte linie, III. 208. enz. en *aann.* 209. Haare

re lengte is $1\frac{1}{4}$ duim; haar *Kop* is, naar geraade van het lyf gesteld, tamelyk groot; doch het laatste lid overtreft alle de andere, om deszelfs bochelachtige hoogte, in grofste en dikte. De *Kop* is iets blaauwachtig-groener, dan het *Lyf*, en blinkend glad, met een zwart gebit, en, ter zyde van hetzelfde, met 12 kleine knopjes, als zo veele *Oogen*, voorzien. De wederzydsche *luchtigaten* zyn wit en zwart bezoomd, *ald.* 209. en *aanm.* De 6 voorste spitze *klaauwpooten* hebben eene geele koleur, maar de 8 *buikpooten* zyn, als de *naschuivers*, groen, *ald.* 210. Wanneer zy in eene *Pop* verandert, schynt de *Rups* in het begin veel eer groen, dan donker-rood, doch naderhand wordt ze donker aardbruin, *ald.* 209. *aanm.* Alsdan begeeft ze zich in de aarde, maakende daarin eene ruime holligheid, en naa verloop van 10 of 12 dagen verschynt zy in de gedaante eener *Pop*, wier koleur blinkend rood-bruin is, en in de maand *Oktober* komt 'er de *Vlinder* uit voort. Deszelfs *voorlyf*, *kop* en beide *bovenvleugels* hebben eene helder-grauwe grondverwe, die echter in de laatste, aan den buitenrand, in het bruine verdwynt, doch hier en daar met verscheidene zwarte en donker-bruine streepen en stippen, van ongelyke grootte, verciert is; hoedanige 'er ook eenige op de bovenvlakte van het voorlyf worden gezien. Het *Achterlyf* is doorgaande bruin, en de *Ondervleugels* zyn witachtig; *ald.* 210. doch aan de inleding bleek-okergeel, en naby den buitenrand wordt men eene rei witte stippen gewaar, *ald.* 210.

Rups, (de blinkende gladde, bruine,) met een helderen *Kop*, en 5 insgelyks heldere lintvormige streepen, III. 345. *enz.* Deze *Rups* heeft eene schoone

Kastanje-bruine grondverwe, *ald.* 345. haar *lyf* loopt na achteren iets spitzer toe, en zy is verciert met 5 even breede heldere, bruin-geele streepen, die van den *Kop* af tot aan het laatste lid voortloopen, en de 8 paar *pooten* hebben de eigenste koleur. De *Kop* is blinkend-geel, doch het *balslid* is aan deszelfs voorste helft zwart, *ald.* 346.

Rups, (de bleek-groene,) met witte *Lijnen*, dwarsstreepen en stippen, beboorende tot de tweede *Classe der Nachtvinders*, III. 69. *enz.* In haare natuurlijke grootte is zy wel een duim lang. De *Kop* heeft eene bleek-bruine en glanzige koleur, doch de *Bek* eene zwarte. De grondverwe des *Lyfs* is bleek-groen, en in de lengte met 5 witte linien doortoogen; die over den *Rug* loopt, is de breedste, en de onderste by de *Pooten* valt niet sterk in 't oog. Alle de inkervingen zyn ook met witte linien doortoogen. Van onderen wordt de *Rups* wat gras-groener, van welke koleur ook de 8 paar *Pooten* zyn, *ald.* 69. De grondverwe der *Pop* is blinkend bruin-rood, en aan het laatste lid heeft ze een kort *staartpunt*. Naa verloop van 4 weken komt 'er de in haar verborgen zittende *Vlinder* uit te voorschyn. Deszelfs *Ondervleugels* hebben eene blinkende grauwe koleur, die by de inleding helderder wordt, terwyl de buitenrand met een breedten helderen zoom bezoomd is. Het *Achterlyf* heeft wel eene dergelyke koleur, maar is van achteren en aan de zyden met een roodachtig geel hairstof bezet. Het *Voorlyf* heeft eene iets donker-grauwe grondverwe, maar wordt, na vooren, gelyk de *Kop*, okergeel, en is daarnevens met eene zwarte en bruine sleg-linie heel aardig omtoogen. De beide *Oogen* zyn zwart, en de hairvormige

Sprieten okergeel. De *Bovenvleugels* zyn, overdwars, half helder-graauw, en half donker-bruin, mitsgaders met veel-lerleie cieraaden voorzien. Byna in 't midden derzelve ziet men, in den donkeren grond eene heldere ronde vlak; en deze grond is teffens met eenige zwarte gekronkelde dwarsstreepen doortrokken: ook loopt dezelve van vooren langs de graauwe helft nederwaarts, en aldaar is hy met 4 witte stippen besprenkeld. De *Pooten* zyn met een helder-graauw hairstof begroeid, het welk aan de boven-schenkels veelvuldiger en langer is, dan aan de ondersten, alwaar men het met eenige zwarte vlakken doormengd ziet, *ald.* 70.

Rups, (de breedlyvige, witgraauwe,) met zwarte vlakken van onderscheidene gedaante en grootte, benevens haare verandering in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, III. 359. enz. Haare lengte is $2\frac{1}{2}$ duim. De *Kop* is bleek-bruin van koleur, met eenige donkere gevlamde linien, die hem de gedaante van glad nooteboomen-hout geeven, zynde voorts, even als de overige leden van het lyf, met korte haren bezet. Het *Lyf* zelf is met verschillende witte, graauwe en zwarte vlakken en linien versierd; maar de inkervingen ziet men door oker-geele dwarsstreepen onderscheiden, en aan de zyden worden 'er eenige punten van gelyke koleur gevonden. De 2 paar *Pooten* hebben insgelyks eene oker-geele koleur. De *Pop* heeft in 't begin eene groenachtig-witte, en kort daarna, op den *Rug*, eene roode, en aan den *buik* eene groenachtige koleur, en deze beide koleuren vermengen zich aan de zyden gansch ongemerkt met elkander. Naa verloop van 3 weken komt 'er de *Vlinder* uit voort, welke altoorens by de *vilhbairige graau-*

we Rups, I. 447. enz. beschreeven is geworden, III 360.

Rups, (de bruine,) met den witten rug-geestreep, en 2 zwart- en witte ruggeborstels, behoorende tot de tweede Classe der *Nachtvlinders*, III. 239. enz. Haare lengte belooft niet veel minder, dan $1\frac{1}{2}$ duim. De *Kop* heeft 2 groote donker-bruine oogvlakken, en de grondverwe is veelal bleek oker-geel, of geelachtig-bruin. Na den hals of het eerste lid ziet men, van boven, 2 breede, zwarte dwarsvlakken, met een weerschyn, en achter dezelve staat een borstel in de hoogte, die meer breed, dan rond, en uit styve afgestompte haren te zamen gesteld is. Door de 7 volgende ringen loopt, boven over den *Rug*, een breede witte streep, welke aan beide de zyden met een smal zwart streepje bezoomd is. By deze bezooming ziet men nog, op iedere ring, een zwart punt, en, daar de witte streep ten einde loopt, staat weer een zwarte en witte borstel, kleiner, dan de eerstgemelde. De 8 stompe *buikpooten* zyn, benevens de 2 *naschuivers*, helder-bruin; maar de 6 *voorpooten* iets donkerer. Zy vervaardigt, by haare veranderinge, een *Spinzel* van stevige draaden, en naa eenige dagen wordt zy eene *Pop*, welke blinkend donker-bruin-rood, en aan 't einde met eene staartspits voorzien is, *ald.* 240.

Rups, (de bruin-roode gladde,) met byzondere witte vlakken versierde, zwartkoppige,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 456. enz. Haar voedsel bestaat in de *eiken-bladeren*, en ze is omtrent $1\frac{1}{2}$ duim lang. De *kop*, benevens de *balsring*, heeft eene zwarte koleur, en het overige *lyf* eene rood-bruine grondverwe, *ald.* 456. Midden over den *rug*,
loopt,

loopt, in de lengte, eene rei witte vlakken, waarvan sommige de gedaante van een Eikel hebben. Daarenboven ziet men op ieder ring, aan de zyden, 3 witte punten, als in een driehoek, en onder dezen eene van den hals tot aan het achtereinde loopende witte linie. Het *Onderlyf* is wit; de 6 *Voorpooten* zyn volkomen zwart, en de 8 *Buikpooten*, nevens de *Naschuiters*, wit. De *Pop* is eerst gansch helder van koleur, maar wordt wel haast bruin-rood, en is met een uit 2 spitze puntjes bestaande staartpunt voorzien. Na 5 dagen komt de *Vlinder* daaruit te voorschyn. Deszelfs grondverwe is meestal witachtig, maar valt, op verscheide plaatzen van het *lyf*, eenigzins in 't geel-bruine. In het midden der *bovenvleugelen* staan 2 ringetjes naast elkander, welker achterste iets meer ovaal is, dan het voorste; waarby, naar den kant des buitenrands, nog een grooter wordt gezien, byna niervormig, en in het midden met een dwarsstreepje voorzien, *ald.* 457. Alle de tedere aderen dezer vleugelen zyn geelachtig-bruin-rood van koleur; en door dezelve loopen veele gekronkelde dwarsstreepen heen. De *buitenrand* is met een bruin uiterd rond boordzel bezoomd. De *Ondervleugels* zyn gansch wit, en de buitenrand is glad bezoomd. Het gansche *Lyf* is met bruinachtig-wit hairstof bedekt, en het *achterlyf* loopt spits toe. De *Sprieten* zyn haïrvormig; *ald.* 458. de *Zuiger* is bruinachtig-geel; en de *Oogen* zyn geelachtig-groen, *ald.* 458. *aann.* De *Pooten*, inzonderheid de *bovenschenkels*, zyn met wit vederstof bedekt. *ald.* 458. *Rups*, (de buitengemeen groote,) met *Turkoois blaauwe Knoppen* en *zwarte starrepunten* versierd, benevens haare

verandering in den zeer grooten en prachtigen Paauwen-vlinder, behoorende tot de 2de Classe der Nachtvinders, IV. 88. enz. Deze prachtige *Rups*, mitsgaders haare groote en voortreffelyke *Vlinder* laat zich, jaarlyks, onrent *Wenen* en *Moravie* vinden, *ald.* 89. in de maanden *July* en *Augustus* wordt daar de *Rups* volwassen gevonden op de *Peereboomen*. Haare lengte belooft slechts 4 duimen. Haare grondverwe is doorgaande zeer hoog en schoon groenachtig-geel. De *Kop* is van koleur donkerer en glansryker, dan het overige *lyf*. Op de voorvlakte heeft hy een paar bruine streepen, welke van boven en in het midden te zamen loopen, en een spitzen winkelhoek uitmaaken. Het cierlykfte van deze *Rups* bestaat in de schoone helder-blaauwe, half rond verheve vlakken, welke, 76 in getale zynde, als zo veele *Turkoizen* flikkeren, *ald.* 91. en 128. Alle deze *Turkoizen* zyn, ieder op hunne grondvlakte, met 6 donkere zwart-bruine scherpe puntspitzen omzet, die allen eenerleie lengte hebben, en zo ordentelyk geschikt zyn, dat ze zich als loutere sterren vertoonen. Ieder dezer sterren staat op eene gestompte groenachtig-geele pyramidswyze hoogte; en op ieder der 9 leden telt men 6 zodanige pyramiden. De *hals* heeft 'er 4, en op de beide laatste ringen zyn 'er mede niet meer dan vier, *ald.* 91. De *Luchtgaten* vertoonen zich geheel sneeuw-wit, en de randen zyn zwart ingevat. In het midden van ieder blaauwen knop staat nog een lang byzonder hair in de hoogte, dat aan zyn bovereinde een kolfvormig knopje heeft. Op de blaauwe knoppen worden nog veele ingedrukte punten gezien, *ald.* 92 en 128.

De 3 paar voorste spitze *klaauwpooten* zyn rood-bruin, maar de 4 paar *buikpooten* groenachtig, en deze hebben bruine zoolen, die aan den rand met veele insgelyks bruine klishaakjes bezet zyn, het welk men ook aan de 2 *Naschuijvers* bespeurt, *ald.* 93. en 128. Wanneer de tyd haarer veranderinge begint te naderen, zoekt zy een bekwaamen en veiligen oord, en welondereen dikken tak des booms, of onder het afdak van een naby staanden Muur, of eene Schutting. Hierop is zy bezig met het vervaardigen van een syner en digter *Spinzel*, waaraan ze, van vooren, eene opening laat, welke den Vlinder tot een uitgang dienen zal, en eindelyk maakt ze een inwendigen styven *Wand*, benevens de wonderbaare geflooten *deur*, die alles na binnen besluit, en echter tot eene opening van den in haar verborgen Vlinder dienen kan; waarmede zy wel 2 maal 24 uren doorbrengt, *ald.* 94. en 129. In deze behuizing nu ligt de *Pop* altoos derwyze, dat haar Kop aan de binnenste deur geplaatst zy, *ald.* 95. Deze *Popis*, gemeenlyk, ten deele dof rood-bruin van kleur, ten deele ook graauwachtig zwart, en, aan haar achterste en kleinste lid, met een paar korte dunne pinnetjes voorzien. In deze gestalte ligt zy, van de maand *Augustus* of *September* af, den ganschen winter door, tot in de *Lente*; en met de maand *Mai* breekt de daarin zittende prachtige *Vlinder* door de poppen-schaal, en de 2 deuren zyner wooninge, *ald.* 96. De 4 schoone en groote *Paauwenpiegels*, van welken 'er in ieder *vleugel* een staat, byna in het midden, hebben waarschyndlyk aanleiding gegeven, om dezen vogel den *grooien Paauwenvlinder* te noemen. Deze

Paauwenpiegels zyn buiten-om bezoomd, met een eenigzins ingedruken, eivormigen zwarten omtrek; aan dezen ziet men, na het einde der inleding toe, een hoog carmynrooden halven cirkel; welke, gelyk de nieuwe Maan, aan zyne beide einden spits toeloopt. Kort daarby ziet men nog een ander sneeuw-witten halven cirkel, doch wel de helft smaller, zo dat het overige van dezen eivormigen spiegel, met zyne bruin-oker geele grondverwe, byna cirkelrond uitvalle, *ald.* 97. In het midden staat eene byzondere groote zwarte vlak; welke aan den eenen kant driehoekig, en aan den anderen half rond is; en dan volgt nog eene na den kant van den driehoek heen geboogen blaauwe tekening, die aan beide de einden spits toeloopt. De breedte *bezooming* aan den *buitenrand* van ieder *vleugel* heeft eene zeer byzondere gemengde heldere kleur, welke noch graauw, noch geel genoemd kan worden, doch uit beide kleuren, met eenig bruin vermengd, schynt te bestaan. Door de beide *onder-vleugelen* loopt een gekronkelde, breedte, helder bruine, lichtgeele dwarsstreef; hoedanig een 'er ook, doch die spitzer hoeken heeft, door den *boven-vleugel*, eenigzins schuins na den uitersten hoek gaat. Tusschen den gekronkelde dwarsstreef, en den breedten zoom des rands, is de grondverwe der 4 *vleugelen* donker bruinachtig-graauw-zwart; doch deze donkere grond gaat, in de 2 *boven-vleugelen*, niet volkomen tot aan den buitensten stompen hoek. Die is met ettelyke roode zaagstreeken, en even zo veel witte verciert. Het overige van den grond is donker graauw, en, even als Dennehour, overdwers bruin gevamd. De verdere grond, in

den *Ondervleugel*, is, rondom den Paauwenspiegel, ongelyk in breedte, oker-geelachtig; *ald.* 98. Het *achterlyf* van dezen Vlinder is met zo veele heldere en donkere dwarsringen voorzien, als hy leden heeft. Het is donker roodachtig zwart-bruin; en deze koleur heeft ook het *voorlyf* op zyne bovenvlakte. De kleine *Kop* is genoegzaam geheel zwart, en de *Sprieten* zyn oranje-geel. De *Mannetjes* alleen hebben breede *Sprieten*, daar die der *Wyfjes* veel dunner en smaller zyn. Alle de cierraaden, vlakken, koleuren en tekeningen zyn aan het *Wyfje* eveneens, als aan het *Mannetje*; doch de achter- of ondervleugels, van den slangachtigen dwarsstreep af, tot aan hunne inleding, vallen by de *wyfjes* veel helder uit, dan by het *mannetje*, en zo is het ook met de bovenvleugelen gelegen. De *ondervlakte*, zo wel aan het *Mannetje*, als aan het *Wyfje*, is zeer donker bruin zwart; en de *Pooten* zyn van gelyke koleur tot aan hun dunste deel. Het gansche *lyf* is, zo wel van boven, als van onderen, met eene wolachtige pelsstof bezet, *ald.* 99. De *Eieren* zyn rond en spilvormig; als roodachtig zand van koleur, zonder rimpels; en aan beide de stompe einden met een iets roodachtig, doch donkerer, en wat verheven punt voorzien, *ald.* 123. waaruit naa 20 dagen de jonge rupsjes voortkomen, *ald.*

Rups, (de bulige bruine,) met den verdeelden Kop, en een paar uitsteekende toppen of punten, benevens haare verandering in een zeer cizelyken Nachtvlinder der tweede Classe, IV. 144. enz. Deze wordt op de struiken der braambessen en bondskerffen gevonden. Haare grootste lengte is een en twee

derde duim, en doorgaande bruin van koleur. De *Kop* schynt, uit hoofde der 2 afgestompte, en in de hoogte staande wratten of pinnen, verdeeld te wezen, *ald.* 144. De *Hals* heeft een paar kleine wraties. De met stompe hoekspitzen bekleede *ringen* zyn alle, aan den bovensten hoek, op het donkerste, en na genoeg gansch zwart. Haare 6 spitze *klaauwpooten*, en de 8 stompe *buikpooten* zyn, gelyk de beide laatste, alle bruin van koleur. By de veranderinge maakt en omhult ze zich met een zilver-koleurig wydgatig *Spinzel*, tusschen de bladen van de *framboizen-struiken*, op het veld staande; en de *Pop* is bruin van koleur, waaruit haar *Vlinder* eerst in de maand *Mai* der volgende Lente te voorschyn komt, *ald.* 145. en *aanm.* In deszelfs *bovenvleugels* staan verstrooide groote witte vlakken in een bruinen grond, en ze zyn, ten deele, omtrent het midden, in 't roozenverwige verdreeven; doch dit roozenverwige verliest zich ten deele weder in het bruine. In ieder der bovenvleugelen telt men 5 zodanige vlakken, de kleine, aan den buitenrand staande, niet mede gerekend, verschillende in vorm of gedaante. De vlak, by de inleding staande, is onder alle de grootste, maar de vyfde vlak, die aan den achterrand staat, is de smalste. Het *voorlyf* van deezzen Vlinder heeft van vooren byna dezelfde grondverwe als de boyenvleugels; maar na het einde wordt die koleur in het roodachtige verdreeven. Het *achterlyf* staartegen, is, als de *Ondervleugels*, bleek of helderbruin olyfkoleurig, met eene donkerer verdieping of belommering, en deze vleugels hebben, aan den achterrand, eene iets helderder be-

zooming. De beide bruine *Sprieten* zyn tamelyk dun en hairvormig, *ald.* 146.

Rups, (eene byzonder geelachtig-groene,) met verheven ringen, veel kortige punten, en een witachtigen zyden-streep, met haare verandering in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, III. 338. *enz. en aanm.* Deze was aan een *Woltenwilligeboom* gevonden, *ald.* 338. Zy is, in haare volkomen grootte, wel 2 en een halven duim lang, *ald.* De *Kop* en de *Bek* zyn geel van koleur. Het *hals-lid* is van vooren wat scherp opgeworpen, en heeft aldaar, gelyk ook aan beide de zyden, eene hooggeele bezooming; hoedanig eene 'er mede aan den *Staartklep*, over de beide *Naschuivers* te zien is. Van deze geele bezooming aan den hals af, loopt 'er van onderen, ter wederzyde van het lyf, een witachtige zoom. Alle de ringen hebben van boven, in 't midden, eene byzondere, voorwaarts gespleeten of ingediepte verhooging, *ald.* 340. De 6 voorste *klaauwpooten* zyn schoon oranje-geel, en de 18 *luchtgaten* okergeel. By den tyd der veranderinge boort zy in de aarde. Eene holligheid daarin gemaakt hebbende, overtrekt zy die met een weinig *Spinzel*, en verandert, binnen 5 of 6 dagen, in eene *Pop*. Op het dikke en donkere roodbruine lyf, aan alle de ringen van het achterlyf, vertoont zich eene menigte van tedere hairtjes, die veelal gelyken na de haakjes der kliffen, *ald.* 341. *enz.* heeft, van onderen, zo wel aan het laatste lid, als aan het lyf, ertelyke wrachtige uitsteekzels, en van vooren, ter plaatze van den *Kop*, een paar na oogen gelykende punten, *ald.* 342. Het *Wyfje*, daaruit voortkomende, heeft eene okergee-

le grondverwe; het *Mannetje* is daarentegen donkerer van grondverwe, en schoon Oranje-geel-bruin. Het schoonste, aan beide gemeen zynde kenteken bestaat in 4 grootte, donker violet-blaauwe oogspiegels; welke eene breede gansch zwarte, en byna ronde bezooming, en in het midden een byzonder wit punt of teken hebben. In ieder der 4 *vleugelen* staat zulk een oogspiegel. Deze *vleugelen* hebben, by het *Mannetje*, eene breede en donker geel-bruine bezooming, met zwarte stippels, eindigende met een smal, eenigzins fyn gekronkeld, en veel helderer omboordzel. De *vleugels van het Wyfje* zyn niet alleen in de grondverwe, maar ook in de daarin zynde cieraaden bleeker van koleur, de *bovenvleugels* hebben by datzelve, aan hunnen buitensten rand, geen byzonderen zoom. De *Pooten* zyn geelachtig-wit, en de *Sprieten*, welke hier merkelyk dunner zyn, dan aan het *Mannetje*, vertoonen zich aan het buiteneinde bruinrood, en by de inleding aan den *Kop* wit, IV. 46.

Rups, (de dikke, helder-geele en zwartgevlakte,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 436. *enz.* Deze houdt zich, meerendeels, in het gras op, en verkieft voornaamlyk tot haare spyze het zo genaamde *Honds- of Quekken-gras*, *ald.* 436. Haare *Eieren* zien 'er uit als helder-geele paarlen, en zyn gansch rond; naa 8 dagen komen 'er de jonge rupsjes uit te voorschyn, welke alsdan helder Oker-geel zyn, maar geene zwarte vlakken hebben. Vervolgens krygen ze, by ieder vervelling, eene fraajer gedaante. Omtrent de helft van haare gewoone grootte bereikt hebben, de, zoeken ze veilige schuilhoeken,

waar-

waarin ze den ganschen winter door, zonder eenig voedsel, blyven liggen. In de aankomende Lente groeijen ze dermaate in grootte, dat men ze in *Mai* en *Junius* reeds volwassen vindt. Haare lengte is nooit boven een duim. Het *Lyf* dezer *Rups* bestaat uit 12 diep ingekorve leden; doch de *Kop* is zeer klein. Deze *Kop* is zwart, maar de grondverwe van het gansche *Lyf* is zwavel-geel. Alle de *ringen*, uitgenomen de laatste, zyn met wrattenvormige verhoogingen of bultjes bezet, die te zamen 4 reien uitmaaken. Alle deze verhoogingen zyn met zwarte vlakken, doch van onderscheiden gedaante, getekend. De 6 *voorpooten* zyn zwart, en de 8 *buikpooten*, gelyk ook de 2 *Naschuivers*, zo geel, als de grondverwe van het *Lyf*, *ald.* 437. Deze *Rups* is met korte en graauwe hairtjes bezet, die echter meestal alleen op de bulten staan. De tyd haarer veranderinge naderende, begeeft ze zich aan 't gras, of omhoog aan de heggen, en begint een langwerpig, altoos in de hoogte opgezeten *Spinzel* om het lichaam heen te trekken. Dit vervaardigd zynde bevochtigt zy het overal met een waterachtig slym, dat een glans krygt, als of het met een Vernis bestreken ware. Na 3 of 4 dagen vindt men in deze behuizing de *Pop*, *ald.* 438. die altoos met den *Kop* na boven staat. Derzelver *voorst* deel is zwart-bruin, maar het *achterlyf* schoon-geel, en ter wederzyde van dit *achterlyf* ziet men 5 of 6 *Spiegelpunten*. Na 14 dagen komt 'er de kleine *Vlinder* uit voort. De schoonste donker-groene en met roode vlakken besprengde *Jaspis* moet voor de prachtige schakeering van het Wyfje wyken. De donker-groene, en tevens daarby

smalle *Bovenvleugels*, dergelyke men, ten aanzien der koleure, zomwylen ook aan 't Mannetje ziet, zyn met 3 paar schoone hoog Carmyn-roode vlakken bezet, waarvan 'er altoos 2 te zamen staan. Het eerste paar is langwerpig, en naaft aan 't lid, en het daarop volgende paar heeft, even als het laatste, eene hoekige ronde gedaante. De *Ondervleugels* zyn ten eenemaale hoog Carmyn-rood, en hebben een cierlyk zwarten zoom aan den rand, die nu eens breeder, dan weer smaller is. Het *Lyf* is donker-blaauw. De 6 *Pooten* hebben eene donkere blinkende koleur, en hunne *bovenschenkels* zyn met geene haiten bezet; de *Sprieten* zyn insgelyks donker, en eindigen byna als langwerpige kolfjes, *ald.* 439.

Rups, (de dikke, zee-groene, geel gestreepte en zwart bestippelde,) *benevens* haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede Classe, I. 268. enz. Deze wordt op allerlei gewassen, als aan *Appel-Peere-Prui-me-Kersfen*- en andere *Ooftboomen* gevonden. In *Juny* vindt men haar reeds volwassen, en ze is ongeveer 1½ duim lang, *ald.* 268. In allen ouderdom is ze eveneens van koleur. Haare grondverwe is zee-groen, doch by zommige zo bleek, dat ze veel eer wit schyne. In de koleur van den *Kop* ziet men een glans, die op de overige huid niet wordt bespeurd, *ald.* 269. De *Hals* heeft, van boven, 2 bleek-geele vlakken, in ieder van welke 4 zwarte verheve punten, in 't vierkant, staan. Van den hals af tot over den laatste ring loopt een breede bleek-geele streep over den *Rug*, waarop aan beide zyden, op ieder

ring, 2 zwarte stippen staan, en ter wederzyde van het *Lyf* ziet men insgelyks een dergelyken geelen streep, doch zo breed niet, die van den hals tot aan den staart loopt. De *buik* met de stompe *Pooten* is geeler, en ook met veele zwarte puntjes besprenkeld, *ald.* 270. De 3 paar spitze *Voorpooten* en de *Naschuivers* zyn zwart. De tyd haarer veranderinge verscheenen zynde, mengt ze eenige spaandertjes onder haar *spinzel*, en heeft gemeenlyk zo veele weeken, als de andere soort dagen, noodig, voor dat ze in de gedaante van *Pop* verschynt. Deze is dof-rood-bruin van koleur, en blyft meer dan 3 maanden in het *Spinzel* beslooten, waarna de *Vlinder* eindelyk te voorschyn komt, *ald.* 271. Aan deszelfs hairig, stomp en dik *Voorlyf* ziet men een kleinen zwart-graauwen *Kop*, met donkere blinkende *Oogen*, hairvormige *Sprieten* en een korten te zamen gerolden *Zuiger* voorzien. Het *Voorlyf* is na den *Kop* toe met een donker bruinen streep of kraag, die dubbelvoudig zwart geboord is, vercierd; het overige deel is graauw, en heeft een slegje of tipje aan 't einde. Het hairig *Achterlyf* is helder-bruin, doch alle de leden zyn met donkere reepjes omgeeven. In den donker bruinen grond der *bovenvleugelen* staat, in het midden, een breede graauwe streep, en daarin, onder anderen, eene groote witte vlak van eene zeldzaame gedaante, die buitengemeen teder graauw bestippeld is. By den *buitenrand des vleugels* ziet men nogmaals een breedten graauwen streep. De buitenste rand zelf is niet alleen cierlyk uitgeschulpt, maar heeft binnenwaarts nog eene zwarte getande linie. De *Ondervleugels* zyn helder-blinkend-graauw, ook uitgeschulpt, en

kort aan den buitenrand met eene smalle schulpswyze linie omtoogen, waar uit eenige zwartespitzen na den buitenrand gaan, welker laatste kort aan den achterrand binnenwaarts in den vleugel loopt. Het *Mannetje* is, in tekening, van het *Wyfje* nergens in onderscheiden, dan in de grondverwe der *ondervleugelen*, die by het eerste iets donkerer is, dan by het laatste, *ald.* 272. De koleur der *Pooten* is graauwachtig-bruin; de *bovenschenkel*s zyn tamelyk hairig, en de overige leden donker besprenkeld. De *Eieren* blyven een winter overliggen; *ald.* 273. zyn zeer klein, helder bruinachtig-groen van koleur, en vol kleine groefjes, *ald.* 271. *aanm.*

Rups, (de donkere, kaneelbruine, of bruinroode,) met 3 hooggeele, lintvormige streepen, bruinen Kop, en zodanige pooten, III. 360. Haare lengte beliep omtrent een duim; maar de Schryver kon ze tot aan de verandering niet opvoeden, *ald.* 361.

Rups, (de fluweel-zwarte,) met oranje-roode vlakken, IV. 22. enz. Deze *Rups*, in haare volkomenheid, heeft omtrent de lengte van 2 duimen. Gelyk ze over het geheel met tedere zwarte haitjes, als fluweel, bezet is; zo heeft zy ook eene fluweel-zwarte grondverwe. Hier en daar staan eenige te zamen gevoegde haitjes, welke, doordien ze op wratjes of pukkeltjes zitten, eenigzins boven de andere uitsteeken. In de zwarte grondverwe zyn hoog-oranje-roode vlakken. Dezelve bestaan uit 2 reien, die wederzyds, langs de beide zyden der bovenvlakte, heenloopen. Tusschen deze oranje-roode vlakken ziet men ook nog, op den bovenkant, veele kleine blaauwachtig graauwe wratjes, waarvan 'er altyd 6 op ieder ring worden geteld.

De

De niet zeer groote *Kop* dezer *Rups* is, benevens de 8 paar *Pooten*, insgelijks zwart van koleur, en op den eersten ring wordt, menigmaal, een blinkend oranje-geel dwarspunt gezien, *ald.* 24. Wanneer de tyd haarer veranderinge nadert; zoekt zy een overdekten schuilhoek, en maakt eenige verwarde draaden in haare legerstede, herwaarts en derwaarts getoogen, veranderende, naa 3 of 4 dagen, in eene *Pop*. Deze is in het begin gansch week en groenachtig-geel van koleur; op den volgenden dag wordt ze rood-bruin, en met den derden dag violet; maar eindelyk komt 'er op dezelve een blaauwachtig graauw stof te voorschyn. De *Poppen* schaal is vol kleine openingen. Zommige van deze *Poppen* blyven 23, andere 28 dagen liggen, eer de daarin verborgen zittende *Vlinder* te voorschyn komt, *ald.* 27. De beschryving van dezen *Vlinder* zie by *Witte Vlinder*, de groote en byzonder schoone, met roode oogspiegels en zwarte vlakken, volgens *Deel III.* 228. *enz.*

Rups, (de geelachtig-groene, met 3 gele streepen verciende en gladde,) die op de *Kerfsenboomen*, (*Kwetzenboomen*, als mede op de *Hazelnootstruiken*) aasf, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede *Classe*, *I.* 427. *enz.* en *aann.* Wanneer ze volkomen uitgestrekt is, beloopt haare lengte $1\frac{3}{4}$ duim. De *Kop* heeft een blaauwachtig groenen glans, en de *bek* is geelachtig. Het *Lyf* is meest al schoon geelachtig-groen; en bovendien met veele verheve geele punten besprenkeld, maar kort aan den hals, zo als ook de *bals* zelf, is't blaauwachtig-groen. Van den *Kop* af loopt 'er, midden over den *rug*, eene helder-geele linie, en van

onderen, langs den *buik*, is 'er op ieder zyde nog eene te zien, die ook beide recht door loopen. Van vooren heeft deze *Rups* 6 spitze, aan den *buik* 8 stompe *Pooten*, en van achteren 2 *Naschuivers*: de 6 eerste zyn geelachtig, en de overige groenachtig. By haare verandering kruipt ze onder de aarde, maakt aldaar eene bekwaame, doch met geen *Spinzel* bekleede holligheid, en verandert in eene *Pop*; welke blinkend rood bruin van koleur is; ze heeft aan haar achterste 2 korte spitze puntjes. Deze blyft den winter over, tot in de maand van *April* onveranderd liggen, maar dan komt 'er de *Vlinder* uit voort. In deszelfs *Bovenvleugels* staan, omtrent in 't midden, 2 heldere ringetjes, waarvan het een ovaal, en 't ander cirkel-rond is. De buitenrand is bruin bezoomd. De *Ondervleugels* zyn van eene helder bruinachtige koleur, die in het graauwe valt; en hun boordzel is bleek oker-geel; welke koleur ook het *Achterlyf* heeft dat met bruin roode dwarsstreepen overtoogen is, *ald.* 428.

Rups, (de gespikkelde groene,) met eene oranje-geele staartspits, en 2 witte zyde-linien, waaruit de kleine *Vlinder*, met doorzichtige vleugelen voortkomt, *IV.* 184. *enz.* By de derde of vierde verwisseling wordt haare koleur, die aanvanglyk gansch zeegroen, zonder eenige tekening op de huid, was, bladgroen, en by zommige geelachtig. De *Kop* is langwerpig rond, blaauwachtig-groen, en van het eerste lid tot aan den staart loopen, ter wederzyde, 2 witte trekken of streepen; en even zo ontdekt men een donker groenen streep over den *rug*, tusschen de beide witte. De *luchtgaten* ziet men geel, gelyk ook

ook de *Pooten*, welke echter aan zom-
mige purperverwig zyn, *ald.* 185. Het
onderlyf is geel en purper van koleur.
De *staart* vertoont zich achter rood-
achtig, van vooren witachtig-geel, en,
zo als de gansche Rups, gespikkeld.
Eene ontelbaare menigte witte vlakjes
bedekken den groenen grond. By ha-
re verandering, die in het laatst van
hooimaand voorvalt, krygt ze eene le-
verkoleurige grondverwe, *ald.* 186. en
vervaardigt een glad, blinkend styf en
perkametachtig *spinzel*, wiens koleur
in het schoon stroogeel valt, verande-
rende naa 6 of 7 dagen, in eene *Pop*,
die dof-zwart van verwe is. Deze heeft,
tusschen haare ringen, aan het *achter-
lyf*, eenige diepzels, welke een oranje-
geel of bruinrood voorkomen hebben,
en het laatste lid is met eene groote staart-
spits voorzien, *ald.* 186. De beschry-
ving van den *Vlinder*, uit zulkeene *Pop*
voortkomende, zie by *Vlinder*, (*de
kleine, met doorzichtige vleugelen.*)

*Rups, (de gladde bruine,) met eene rei
heldere ruitvormige vlakken, en een
dergelyken zyde-streep, welke zich
aan de Eikebladeren ontboudt, III. 342.
enz.* De *Kep* dezer *Rups* heeft eene
blinkende helder-bruine koleur; boven
den *bek* is zy met eene zwarte vlak ge-
tekend; en boven deze ziet men nog een
paar ongelijk breedte, iets van elkander
wykende, zwarte streepen. De gansche
breedte der *bovenvlakte van het lyf*
heeft een donkeren grond. De derde
ring heeft, zo als de volgende tot den
twaalfden toe, van boven eene heldere
ruitvormige vlak; en alle die vlakken
zyn aan de 4 hoeken, met een wit punt
als met een diamant, bezet. Op ieder
zyde is de donkere grondverwe daar be-
nevens met een helderen zyde-streep

bezoomd, en boven denzelven staat, in
ieder lid, een helder punt. De gansche
ondervlakte van het lyf heeft, zo als
de *Pooten*, insgelyks eene helder-bruine
koleur, en is teffens met donkere stree-
pen in de lengte doortoogen, *ald.* 343.
Zy verandert in het einde van *Mai* of
het begin van *Juny*, in eene *Pop*, wel-
ke aanvanglyk groenachtig wit is, en na-
derhand bruin wordr. In den *Herfst*
komt daaruit de *bleek-blaauwachtig
groene, wit en zwart geschakeerde
Nachtvlinder der tweede Classe* voort
ald. 343. *aanm.* Deszelfs *borststuk* of
voorlyf, benevens de *Kep* en de beide
Bovenvleugelen, is alleenlyk met deze
groene koleur voorzien. Dit groen ver-
toont zich wat bleek, en valt in 't
blaauwachtige, III. 207. Men ziet 'er
veelerleie, verscheidenlyk gevormde
zwarte en wit bezoomde vlakken in.
De grondverwe der *Ondervleugelen* is
donker-grauw; doch deze koleur ver-
dwynt, by de inleding, in 't okergeele;
en, behalve den ingekorven buitenrand,
is 'er nog eene dubbele witte borduuring
in. Kort aan dien ingekorven rand wordt
men een breede donkerer streep ge-
waar, die met een zeer schoon wit door-
toogen is. Het *Achterlyf* is eenigzins
grauwachtig Oker-geel, en de beide
Sprieten zyn hairvormig, III. 208.
*Rups, (de gladde, dof-groene geschubde,) benevens haare verandering tot in een
Nachtvlinder der tweede Classe, I.
340. enz.* Deze *Rups* vindt men op
allerhande *moeskruiden, andere gewas-
sen en planten, ald.* 343. en *aanm.* †.
Wanneer ze volwassen is, valt de eene
altoos meer in het dof- en bleek-groene,
of in het grauwe en bruine, dan de
andere, *ald.* 342. *aanm.* Zy wordt de
geschubde genoemd, om dat de leden of

of *ringen* van haar *lyf* niet alleen, gewoonlyker wyze, onder elkander zelve verdeeld zyn, maar daamevens ook, wederzyds en boven op den *rug*, veele scheeve te niet loopende zwarte streepen en schaduwen hebben, waar door de Rups genoegzaam als met schubben bedekt schynt. De eerstgemelde streepen zyn aan beide de soorten regelmatig, iets donkerer, dan de overige koleur van 't *lyf*. Boven op den hals staat een vierkant, zwarten wit bezoomd schildje, en van den *Kop* af tot op de kleine spitze hoogte van het laatste lid, loopt 'er eene tedere witte linie over den *rug*. De spitze *Voorpooten* zyn geelachtig-bruin; doch de *stompe* hebben eene zelfde koleur, als het *lyf*, *ald.* 343. By haare verandering besluit ze zich in eenen met eenig *Spinzel* vermengden aardbal, en wordt daarin eene *Pop*, *ald.* 343. *aann.* welke roodbruin is; en aan het laatste lid staan een paar styve, op het einde toegekromde haakjes, *ald.* 343. en *aann.* In deze Poppen-gedaante blyft ze den ganschen winter over; en zelden krygt men den *Vlinder* daar uit voor de maand *Juny* te zien; veele komen zelfs in de maand *July* eerst voor den dag, *ald.* 343. De grondverwe dezes *Vlinders* is over het geheel, (uitgezonderd de *Ondervleugels*.) blinkend-bruinachtig-zwart. In de *Bovenvleugelen* ziet men eenige geringe cieraaden, te weeten ettelyke oker-geele vlakjes en dwarslinien. De *buitenrand* der 4 *vleugelen* is uitgeschulpr. De *Ondervleugels* zyn donker-graauw; na het lid toe vallen ze in 't geelachtige, en aan den *buitenrand* zyn ze bleek-geelachtig bezoomd. De *Kop*, *Sprieten* en *Pooten* zyn donker-bruin-graauw van koleur; en deze laatste vindt men aan de voorste

leden met oker geele reepjes verciend. De *Zuiger* is bruinachtig-geel, *ald.* 344. en *aann.*

Rups, (de gladde en vleeschverwige,) met groene en zwarte afgebroken linien, die op de zuuring leeft, benevens haare *Pop*, behoorende tot de tweede *Classe der Nachtvinders*, III. 361. enz. Haare grondverwe is over het geheel vleeschkoleurig; de *Kop* alleen is blinkend; en, gelyk deze met donkere of zwartachtige linien doortoogen is, zo ziet men ook aan 't *lyf* verscheide in de lengte uitloopende linien. De *boven-vlakte* van den *Rug* heeft, op ieder zyde, een zwarten streep, en deze beide zyn grover, dan de andere. In het midden tusschen dezelve ziet men eene bleeke en tedere graauwe linie, benevens welke men zo veele paaren zwarte stipjes bespeurd, als 'er ringen aan het *lyf* zyn. By haare verandering kruipt ze in de aarde, en legt zich, zonder eenig spinzel, in een verwulfd kuiltje, en wordt eene *Pop*, welke eene schoone oranje-geele koleur heeft, en aan het einde van 't laatste lid, met 2 hair-dunne spitzen bedeed is. De *Pop* was te vroeg gestorven, *ald.* 362.

Rups, (de gladde, groene,) met 5 witte linien getekend, benevens haare verandering in eene *Pop*, behoorende tot de tweede *Classe der Nachtvinders*, III. 358. enz. Zy wierdt ontdekt op een *Pruimenboom*, en op een *Wilgen-struik*, eetende mede greetig van de bladeren der *Kwetzeboomen*. Haare grootste lengte beloopt na genoeg 1½ duim. Het gansche *Lyf* is over het geheel, benevens de *Kop* en de *Pooten*, schoon groen, ten eenemaal glad, zonder eenige hairen, *ald.* 358. Onder een witgrauw, doorzichtg en eivormig

mig weefzel verandert zy in eene *Pop*, wier koleur schoon-glanfig, bruinrood, en van vooren iets donkerer, dan van achteren is, *ald.* 359.

Rups, (de gladde, groene,) met den *bruinen Kop*, met eene witte afgebroken ruglinie, geele punten, endergelyke zydelinie, die op verscheide gewassen aaft, benevens haare verandering in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, IV. 51. enz. Haare 6 spitze en klauwvormige *voorpooten* zyn bruinachtig van koleur, maar de 8 stompe *buikpooten*, benevens de *nafschuivers*, even als het *Lyf*, geelachtig groen, *ald.* 55. Over den ganfchen *Rug* is ze met schuinslopende streepen gerekend, *ald.* 51. *aann.* Het *Lyf* zelf is van vooren ongelyk dunner, dan van achteren, en de volkomen lengte beloopt op zyn hoogft anderhalven duim. Wanneer de tyd genaakt, dat zy haare rupsenhuid tegen een ander gewaad verwisselen moet; omkleedt ze zich met een wit *Spinzel*, en weeft gemeenlyk eenige afgeknaagde deeltjes van haar voeder tusfchen de draaden in, blyft nog ettelyke dagen, als eene volkomen *Rups*, daarin liggen, maar verandert eindelyk in eene *Pop*. Deze is, in het begin, ganfch week, geelachtig groen van koleur; maar naa 2 of 3 dagen wordt ze harder, en donkerer van koleur. Op alle de ringen van het *achterlyf* is ze fchoon bruinrood, maar aan het *voorlyf* veel bruiner, *ald.* 55. De *Pooten* van den *Vlinder* zyn bleek-bruin-graauw, en zyn verheven borftftuk, achter den dubbelen kraag, heeft eene byzondere, dubbele, opgeheven verhooging. De *Oogenftaan* in een fluweelbruinen grond, en zyn van eene dergelyke, doch bleeker koleur, en zonder glans. De *Sprieten*

vertoonen zich roodachtig-bruingeel. De beide *bovenvleugels* hebben, aan den buitenften of achterften rand, eene uifchulping. Aan dezen rand ziet men een bruinachtig oranje-geelen zoom, die met eene tedere, zwarte linie, zo binnen- als buitenwaarts, gehoord is, *ald.* 254. Op dezen zoom volgt een breede, heldere grond, die ten deele in 't roodachtige, en ten deele in 't oker-geele valt. In denzelven ziet men verscheide olyfkoleurige streepen, die nu slangvormig, dan tandvormig, dwars door den vleugel loopen. Aan den helder oker-geelen en als geflingerden grond grenft eene koperroode vlak, die na genoeg een driehoek vertoont. Naaft deze driekantige vlak is de overige grond, naar den kant der inleding, meerendeels bleekrood, of genoegzaam roozenrood; en daaraan hecht zich, aan den binnenrand, eene byzondere donkere hoekvlak. Van daar af loopen 'er eenige geflingerde dwarslinien door den roozenverwigen grond, en midden tusfchen die linien staat een klein donker puntje. In de *Ondervleugels* is de witte en roodachtig blinkende grond flechts met ettelyke doorlopende en vlak geflingerde dwarslinien van eene graauwe koleur, en met eenige in de lengte getrokken aderen doortoogen. Het *borftftuk* is wat donkerer, en aan dezelfs beide zyden ziet men een iets verheven *wrong* van eene roode koleur, waarin zo veele afdeelingen worden gevonden, als het *achterlyf* leden of ringen heeft, *ald.* 55.

Rups, (de gladde, helder bruine, donker geftrepte, en wit gefprenkelde,) die op het *Vlooiikruid* of de *Wattrpeper aaft*, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 344. enz. Deze is, in haare volkomen groot-

te en geheel volwassen, ruim 2 duim lang, en tamelyk dik. Haare koleur is helder-roodachtig-bruin. De *Kop* is eenigzins blinkend. Ieder zyde is van onderen langs den *buit* met een breeden okergeelen streep geboord. Alle de streepen, zo wel die op den *rug*, als die ter wederzyde, zyn met witte-zwart geboorde punten verciert. Tusschen deze streepen is de grond der *buid* met zeer redere zwarte stippen besprenkeld, *ald.*

346. De *Pooten* zyn gezamenlyk eenkoleurig met het lyf. By haare verandering maakt ze geen *Spinzel*, maar vertrouwt zich op den blooten grond. Al laat in den *Herfst* kruipt ze eerst in de aarde, en wordt eerst eene *Pop*, als de winter reeds naakende is. Deze is blinkend rood-bruin van koleur. Haar *voorst* de *de*el is, rewers de *vleugelscheden*, met zeer veele kleine, ingedrukte puntjes getekend, en het laatste lid met een staartpunt voorzien. In *Mai* of *Juny* des volgenden jaars komt 'er de *Nachtvlinder* uit voort. De grondverwe van deszelfs *voorlyf* en *bovenvleugelen* kan men niet wel anders, dan violet-bruin noemen. In den grond ziet men, hier en daar, geel-groene vlakken en streepen, inigelyks veelerleie helder-bruine zaagen golfswyze dwarslinien. Onder de overige, hier en daar verstrooide vlakken, bespeurt men inzonderheid eene groote, helder-oker-geele, midden in den vleugel. De buitenste rand des *vleugels* is uitgerond, getand, en aardig geborduurd. De *Kop* en *Pooten* zyn van koleur, als de grondverwe der *bovenvleugelen* is: doch de *Sprieten* zyn geel, en zo dun als een hair, *ald.*

346. Het *Achterlyf* en de beide *Ondervleugels* hebben eene bruinachtig-grauwe koleur. De laatste zyn, aan

aan den buitenrand, bleek-geel bezoomd, en na het lid toe valt hunne graauwe koleur eenigzins in 't geele, *ald.* 347.

Rups, (de gladde zwart-bruine, en met Oranje-geele vlakken besprenkelde,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der 2de *Classe*, I. 320. enz. Deze eet zo wel de *Salade-bladeren*, als de *Mosdissel* of *melkweide* *ald.* 320, en *aanm.* Haar *Kop* is blinkend zwart-grauw, en de voorste vlakke met eene driehoekige insneede verciert. De 10 stompe *Pooten* zyn van dezelfde koleur als de *Kop*. Boven op den *Rug* heeft ieder ring 2 hoog Oranje-geele vlakken, maar van onderen zyn de 2 eerste ringen alleen met 2, en de overige slechts met eene enkele vlak bedeed. De *Staartklep* wordt, in het midden, door een Oranje-geelen streep verdeeld, en is ter wederzyde met een boordzel van dezelfde koleur omgeeven. By haare veranderinge vervaardigt zy haar onderaardsch verblyf. Na eenige dagen komt de *Pop* te voorschyn, *ald.* 322. welker geelroode koleur donker is. In de maand *Mai* des volgenden jaars komt daaruit eerst de *Vlinder* voort. Deszelfs gansche grondverwe, zo van den *Kop* en de *Vleugelen*, als van het *Lyf* en de *Pooten*, is blinkend-grauw. De *Kop* is met zwarte *Oogen*, en hairvormige, geel-bruine *Sprieten* voorzien. Achter den *Kop* ziet men, in de gedaante van een halskraag, een verheven wrong, wiens onderste helft helderer graauw is, dan de bovenste, en door een zwarten streep afgescheiden. De *Bovenvleugels* vallen, in het midden, iets in 't bruinachtige, komen na den buitenrand in 't witte uit, en zyn aldaar met eenige zwarten aderen en punten verciert. De overige grond is overdwars met spar-

renvormige graauw-zwarte trekken door-
golfd. De *Ondervleugels* zyn gansch een-
koleurig, *ald.* 323. Doch het *Lyf*, be-
nevens de *bovenschenkels* der 6 *Pooten*,
is met hairstof digt bewassen, en de voor-
ste leden der *Pooten* zyn met zwarte rin-
getjes omgeeven, *ald.* 324.

Rups, (*de graauwe, bruingeelakte*), met
een staart als een visch, benevens ha-
re verandering tot in een *Nachtvlinder*
der tweede Classe, I. 371. enz. Deze
Rups onthoudt zich op de *Pruimen*-en
Kwetzeboomen, en behoort onder die
geene, welke den winter over in het
leeven blyven. Zy wordt by de 3 dui-
men lang; is niet zo rond van lyf, als
andere soorten, maar veel meer vlak
over den rug verwulfd, en van anderen
volkomen plat. Dewyl ieder ring van
boven op den *rug* 4 of 5 dwarsvouwen
of ploojen heeft; zo ziet 'er het gansche
Lyf rimpelig uit. Ik heb deze *Rups*
omschreeven met een staart als een visch,
dewyl naamlyk haar achterste lid in de
gedaante van een vischenstaart gevormd
en verdeeld is. Maar, wanneer men
de *Rups* omkeert, en op den rug legt,
zo blykt het, dat deze Vischen-staart
niet anders is, dan de *Naschuivers*,
welke hier, even als alle de overige
Pooten gezamenlyk, zeer kort zyn, en
eenigzins verder van elkander staan, dan
by andere soorten, *ald.* 372. Van bo-
ven op het midden van het laatste lid
staat een ronde knop, wiens bovenvlak-
te met 2 zwarte halve cirkels omringd
is. Alle de overige ringen zyn, weder-
zyds, met een ronden knop of wrat
voorzien. Aan beide zyden van den *hals*
staat een breed bosje haren, waar door
de *Rups* als met groote Ooren schynt be-
gaafd te wezen. Dergelyke hairbosjes,
doch kleiner, ziet men ter wederzyde

langs den ganschen rand des buiks. De
koleur dezer haren is helder-bruinachtig.
De *Kop* is helder-bruin van koleur, met
zulke haren, als het lyf, bezet. De
grondverwe haarer *buid* is, gemeenlyk,
bleek-roodachtig bruin, maar op den *Rug*
altoos iets donkerer, dan op de zyden.
Over deszelfs vouwen loopen, in de
lengte, schoone helder-blaauwe streepen
en punten. De eerste en de 2 laatste
ringen zyn met eene groote donker-brui-
ne vlak verciert. De *Pooten* zyn ge-
zamenlyk bruin; *ald.* 373. By haare
veranderinge begint ze zich, of onder
een grooten tak van den boom, of aan
den nauten wand, of wel in een gat of
holligheid van den stam, in te spinnen,
en maakt een graauwachtig wit verblyf,
en wordt naa eenige dagen eene *Pop*.
Het voorste deel van deze is dof-zwart,
en het achterste donker-bruin, hebbende
geen staartpunt. Naa 18 of 20 dagen
komt 'er de *Vlinder* uit voort, zynde
doorgaans in *Hooimaand*. Onder deze
Vlinders is een groot onderscheid tus-
schen het manlyk en vrouwlyk geslacht,
ald. 377. Het *Mannetje* heeft breedte,
korte en vedervormige *Sprieten*, en een
rank *Achterlyf*, aan het einde verdeeld;
maar het *Wyfje* finale en hairvormige
Sprieten, en een dik *Achterlyf*,
en deszelfs koleur is, gemeenlyk, iets hoo-
ger, (of rooder,) dan die van 't Man-
netje. De koleur der *Ondervleugelen*
is hoog vleeschverwig, en valt eenigzins
in 't oranje-geel. De buitenrand is re-
gelmaatig uitgerond, en met 2 even-
wydige donkere linien aardig geboord.
Midden in ieder vleugel ziet men eene
korte donkere dwarslinie. De koleur
van 't *Achterlyf* komt overeen met die
der *Ondervleugelen*. De *Bovenvleugels*
en het *Voorlyf* hebben eene recht-schoo-
ne

ne, hoog Oranje-geele koleur. Dwars door ieder loopen 2 donker-bruine linien en tusschen deze ziet men een wit vlakje, donker-bruin bezoomd. De *Kop* is eenigzins rooder, dan Oranje-geel, maar de *Sprieten* vallen in 't bruinachtige. De *Oogen* zyn zwart. Voor aan het midden van den *Kop* zit een spits uitsteekzel, gelyk een snavel, zynde de schede van den Zuiger, *ald.* 375. Het Wyfje legt, weinig dagen naa de vermenging, zyne *Eieren*, welke kogelrond en witachtig-graauw van koleur zyn, *ald.* 374.

Raps, (de gladde, schoon geelachtig-groene,) aazende op den *Wilgeboom*, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, IV. 110. enz. Deze is in haare volkomen grootte niet boven anderhalven duim lang. Haare grondverwe is, over het algemeen, schoon geel-dof groen. Over het midden van den *Rug*, en ook aan beide de zyden, loopt van den *Kop* af tot aan het achtereinde, door alle de ringen heen, een donkerer streep, dan de grondverwe. De *luchtgaten* gelyken zo veele bruine punten. Achter den *Kop* staat een zwarte dwarsstreep; boven in dezen staan twee zwarte oogvormige punten, en daar, tusschen staat een streep van gelyke koleur, *ald.* 111. die den *Kop* ter helfte schynt te verdeelen. De *Pooten* zyn geelachtig. By haare inspinning omhult ze zich met een dun, wit en doorzichtig *Spinzel*, en op den derden dag is ze eene *Pop*. Haare koleur is gansch zwart, en ze is met eene dikke staartspits voorzien, waarin nog eene andere zit, die dunner en korter is. Naa verloop van 3 weeken komt daaruit de *Vlinder*, door wiens *bovenvleugels* 2 witte en eenigzins gedwongen linien overdwars loopen, die dezelve in 3 velden

verdeelen. De langste dezer linien, welke door het breedste deel des vleugels gaat, is breeder, dan de andere, ja genoegzaam als dubbeld. Dan ook is ieder vleugel met 2 sneeuw witte punten voorzien, *ald.* 112. het eene naby het voorlyf, en 't andere in het middelste veld. De grondverwe dezer *vleugelen* is ten deele schoon oranje-geel, gelyk de *Kop* en 't gansche *Voorlyf*, ten deele ook bruinrood; en in het middelste veld ontdekt men, behalve verscheide donkere en heldere punten, aan den voorsten rand een breeden graauwen streep. De achterste rand dezer vleugelen is zo ingetand, dat 'er verscheide scherpe spitzen, van ongelyke lengte, aan worden gezien. De *Ondervleugels* zyn bleek bruinrood, en met een breeden zoom voorzien, omtrent welken de bruinroode grond in een zwart graauwen verandert. De *Oogen* zyn wit. Het *Achterlyf* is voorwaarts graauw, maar na achteren loopt het meer en meer in 't helder rood-bruine; en de *Sprieten* zyn geelachtig, *ald.* 113.

Rups, (de graauwe, geel- en zwart gestreepte, bairige,) met roode knopjes; benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 273. enz. Deze aakt op de bladeren of naalden van den *Pynboom*, en wordt niet boven de $1\frac{1}{2}$ duim lang. De *Kop* is zeer klein, blinkend zwart, en van boven verdeeld. De grondverwe der gansche *buid* is graauw. Aan den *bals* staan eenige tedere geele dwarsstreepjes. Over den ganschen *Rug*, in de lengte, loopen 2 dubbele, smalle, geele linien, die overal met eene breede zwarte linie zyn omgeeven. Aan beide zyden van het lyf staat, op ieder ring, een graauwe knop, met lange en tedere hairen bezet.

bézet. De *Pooten* zyn mede graauw, even als het *Lyf*, *ald.* 274. Ten tyde haarer verandering, bekleedt ze zich met een teder wit *Spinzel*, waarin ze, naa een paar dagen, de Rupsen-huid afstrookt, en zich in eene blinkende zwart-bruine *Pop*, zonder staartpunt, vertoont. Als dit in den Herfst geschiedt, dan blyft de *Pop* naauwlyks 3 weeken liggen; anders blyft ze den geheelen winter over, en zo komt daaruit of in den herfst nog, of eerst in het volgende voorjaar, de *Vlinder* ter waereld. De *Kop* zo wel, als het gansche *Lyf*, en de 4 *vleugels*, hebben eene blinkende Okergeele grondverwe. De *Oogen* en *Sprieten* zyn zwart, en deze hairvormig. Op ieder *bovenvleugel* staan 2 zwart-blaauwe ruitvormige vlakken, de eene aan den voorsten, en de andere omtrent aan den achtersten rand. De *Pooten* zyn zeer glinsterend zwart-blaauw, zonder hairige bovenschakels, *ald.* 275.

Rups, (de groenachtig-geele,) met afgescheide zwarte streepjes, benevens haare verandering in een Nachtvlinder der tweede Classe, IV. 176. enz. Deze *Rups* vindt men zelden by den dag buiten de aarde; ze ligt da gemeenlyk gansch stil in dezelve; komt 'er eerst uit te voorschyn, naa dat de zon ondergegaan is, en begeeft zich dan op verscheide planten, met welker bladen ze zich geneert. In het begin van den Herfst is ze nog klein, maar op het einde bykans volwassen. Den winter over verborgt ze zich in de aarde, en komt dan in het volgende voorjaar in de schemering te voorschyn, tot dat ze in eenen *Vlinder* verandert, *ald.* 176. *aanm.* De ringen van haar lyf hebben, over het geheel, eene schoone geele grondverwe, die hier en daar eenigzins in 't groene

valt; maar de *Kop* en de 6 voorste *klaauwpooten* zyn helder bruin. De *staartklep*, de 2 *naschuivers* of *achterposten*, en de 4 paar stompe *buikpooten* schynen meer bleek oranje-geel te zyn, *ald.* 178. De *Pop*, waarin deze Rups verandert, is donker-rood, en schoon van koleur, hebbende van achteren een klein uitstekend puntje of staartspitse. Naa verloop van 4 weeken komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn, *ald.* 177. De grondverwe van deszelfs *bovenvleugels*, en van het *borststuk* is niet altoos eenerlei. By zommigen is ze volstrekt donker-bruin, by anderen gansch bleek of vaal; vallende zelfs wel eens geheel in 't graauwe. Naar maate van dit onderscheid der grondverwe, zyn ook de donkere en heldere dwarslijnen, vlakken en punten in deze *bovenvleugels* verschillende, van waar ze by zommigen duidelyk, by anderen in tegendeel bleeker en naauwlyks zyn te merken, *ald.* 178. De *Ondervleugels* zyn schoon oranje-geel; hebbende, naar den achterrand, een ongelyk breedten zwarten streep, die aan den binnenkant, naar den kant van 't achterlyf, smal toeloopt; en daarop volgt eene smaller randbezooming, van eene oranje-geele grondverwe. De *Sprieten* zyn dun en hairvormig, *ald.* 179.

Rups, (de groenachtig graauw en oranje-geel gekoleurde,) benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der tweede Classe, I. 423. enz. Deze *Rups* wordt in de maand *Mai*, veelal, reeds volwassen gevonden. Haare grootste lengte zal iets meer, dan $1\frac{1}{2}$ duim belopen. De *Kop*, is blinkend helder-bruin van koleur, maar de *bek* tusschen de vreetpunten wit-grauw, en van hier loopen 2 korte zwarte streepjes voor den

Kop,

Kop opwaards. De *bals* is witachtig, van boven met 2 zwarte streepen, en op ieder zyde met drie punten voorzien, *ald.* 423. Alle de ringen of leden zyn met eene oranje-geele, groenachtige, en helder-graauwe koleur verciërd. Mid-den over den *Rug* loopt een dunne helder-graauwe streep, die, nu breeder, dan smaller, zich uitsprekt tot aan het laatste lid, en ter wederzyde een donker-graauw, of zwartachtig boordzel heeft. Het achterste lid, en de daaraan zittende 2 *naschuiuers* zyn groenachtig-graauw, en deze koleur hebben ook de 6 *voor-pooten*, maar de 8 *buikpooten* zyn bruin-geel. By haare veranderinge begraaft ze zich onder de aarde, maakt eene ruime holligheid in den grond, krygen-de aldaar, zonder eenig Spinzel te maaken, de gedaante eener *Poppe*. Derzel-ver koleur is helder roodachtig bruin, en ze is met een tamelyk groot staartpunt voorzien. In de maand *July* komt 'er de *Vlinder* uit voort. De grondverwe zy-ner 2 *bovenvleugelen* en van het *Voor-lyf* is graauwachtig; maar aan het *Onderlyf* en de *Ondervleugelen* is ze zwart-achtig graauw. In de *bovenvleugels* is de buitenrand met een dubbel uitgeschulpt witachtig boordzel bezoomd; in den uitersten hoek staat eene heldere vlak, en daarop volgt een bruine dwarsstreep, die aan beide de kanten witachtig is. In het midden dezer vleugelen zyn 2 vlakken, waarvan de eene, naar het lid staande, rond, en de andere grooter, en van gedaante is, als of ze van 2 kleine geformeed ware, *ald.* 424. De *boven-schenkels der Pooten* zyn met tedere haaren begroeid, en de onderste met zwarte vlakken verciërd. De *Sprieten* zyn aan 't Mannetje en Wyfje hairvormig, *ald.*

425.

Rups, (de groene, op de Maluwe aazen-de,) met 7 paar schuinse, geelachtig-witte streepen, een rechten zyde-streep, en spits toeloopenden Kop, benevens haare verandering in een Nachtvlinder der tweede Classe, III. 161. enz. Deze *Rups* wordt meest, in den Herfst, volwassen, op de witte maluwe gevonden, hoewel ze, misschien, ook nog andere gewassen tot voedsel gebruike. Zy verkrygt de lengte van ongeveer 3 duim, *ald.* 163. Aan de onderolvlakte valt zy in het grasgroene, en de 8 *buik-pooten* hebben dezelfde koleur, waartegen de 6 *kladwypooten* meer bruin zyn. De *huid* is te eenemaal met ontelbare kleine, verheven witte puntjes bezet, en als een teder Chagryneer op 't gevoel, *ald.* 164. De *Kop* is groen en spits. By haare verandering, verbleekt haare groene grondverwe ten eenemaal, en de witte streepen, die ter wederzyde in het lange doorloopen, verdwynen insgelyks. Zy graaft in de aarde eene ruime holte uit, die ze met haar spinzel bekleedt. Na 2 of 3 dagen verschynt ze in de gedaante eener *Pop*, wier *voorst* dikke deel zwartachtig graauw is, terwyl het *achterste* eene rood-bruine koleur heeft, en de *staartspits* geboogen of gekromd staat, *ald.* 165. Het hoofd-kenteken der *Vlinders* bestaat in eene groote kaneele roode vlak op de *ondervleugels*, welke zich, van de inleding af, tot over de helft des vleugels uitsprekt. Deze vlak is aan het mannetje en wyfje eigen. De *buitenrand aller vleugelen* is sierlyk uiteromd, en aan het uiterste einde met eene witte bezooming voorzien, achter welke eene bruine linie loopt. In den middelsten en breedsten bruinen dwarsstreep der 2 *bovenvleugelen* is, naar den voorsten rand

toe, een half langwerpig, en overdwars staande hoekvlakje te zien, dat aan de mannetjes spierwit, en aan de wyfjes bleek okergeel is. De overige cierraaden dezer *bovenvleugelen* loopen meestal golvende overdwars; zyn deels breeder, deels snaller, en vallen nu helderer, dan donkerer, nu graauwachtig, dan bruinachtig uit, *ald.* 166. De 6 *Pooten* zyn okergeel, en de *Sprieten* vallen iets bleeker, en de *Zuiger* is kort, *ald.* 167.

Rups, (de groene wit gestreepte,) met een blaauw en geel staartpunt, en met witte verheve stippen, benevens kaare verandering tot in een Nachtwinder der eerste Classe, I. 170. enz. De *Eieren*, waaruit zodanige Rupsen voortkomen, hebben eene ovaal ronde, gladde gedaante, en eene schoone geelachtig-groene koleur, *ald.* 171. *aann.* Het *hoofd* dezer *Rups* is rond en zeer klein. Haare grondverwe is geelachtig-groen, met ontelbaare verheven stippen of kleine bultjes bezet. Van den eersten ring af ziet men, ter wederzyde, 2 tamelyk breede streepen, *ald.* 171. waarvan de bovenste, die geheel wit is, tot in het staartpunt toe loopt, maar de onderste, die wat geelachtig is, houdt by den laatsten ring op. Op beide de zyden ziet men donker-geele en byna roode *luchtgaten*: de 6 *voorpooten* zyn donker-geel, de 8 *buikpooten* daarentegen groen, die ieder met een zwart slipje verciert, en van onderen met donker-geele haren begroeid zyn; en de 2 achterste *Pooten* of *Naschuivers* zyn mede groen. Ten tyde haarer veranderinge wordt de *Kop* donker-grauw, de grondverwe grauw-rood, en de zydstreepen nog wat lichter grauw-rood, *ald.* 172. Dan maakt ze onder eenige te

zamen getrokken bladeren een *grof spinzel*, waarin ze zich verbergt, en wordt binnen 4 of 5 dagen eene *Pop*. Deze is aanvangelijk byna geheel witachtig okergeel, inzonderheid op de vleugelscheden; maar wordt vervolgens bruiner, en eindelyk zwart-bruin. Na 4 weken komt daaruit de *Vlinder*, *ald.* 173. Deszelfs *bovenvleugels* zo wel, als het dikke *Voorlyf*, en de *Kop*, hebben van boven eene zwartachtig-bruin-grauwe grondverwe. In ieder dezer *bovenvleugelen* ziet men overdwars 2 winkelhoekachtige streepen, tusschen welke een klein kromloopend streepje staat, als de helft van een ringetje. Dan zyn 'er nog 2 andere streepen of vlakken in deze vleugelen, iets donkerer, dan de grondverwe. De 2 *Ondervleugels* zyn, aan den buitenrand, en na het lid toe, wat bruinachtig, doch deze bruinigheid verdwynt allengskens in het heldere, zo dat ze in 't midden volkomen Oranje-geel worden. Het *Achterlyf* is, van boven in het midden, ook donker-grauw; maar 't heeft aan de zyden heldere Okergeele vlakjes; en descherpte der zyden is met eenige kleine zwarte en witte vlakjes zeer aardig verciert. De *staart* is uit zwart vederstof zamengesteld, zeer wel gelykende na dien van een vogeltje. De knodsartige *Sprieten* zyn grauw van koleur; *ald.* 174. de *bovenschenkels* der 6 *Pooten* zyn met helder okergeel stof bezet; en de *Oogen* slikkeren met een rood-bruinen glans, *ald.* 175.

Rups, (de groote grauwe,) met den breedten zwart bezoomden, blaauwachtig-grauwen ruggestreep, en rood-bruine, hairige vlakken en punten, benevens kaare verandering tot in een Nachtwinder der tweede Classe, III.

356. enz. en IV. 189. enz. Deze *Rups* is, in de maanden van *Mai* en *Juny*, aan de *eikenboomen* te vinden, III. 356. Haare grootste lengte belooft byna 2½ duim. De blinkende zwarte *Kop* is rond van vorm. Het grootste gedeelte van het *Lyf* heeft eene aschgrauwe grondverwe; en aan den *bals* ziet men, van boven, een klein driekantig zwart vlakje. Midden over den *rug* loopt, in de lengte, een breede blaauwachtig-grauwe streep. Alle de *ringen* zyn met eene soort van bruin-grauwachtige hairen bezet; en de 8 paar *Pooten* hebben eene oker- of roodachtig geele koleur, *ald.* 357. Ten tyde haarer veranderinge omspint ze zich in een hoek, met een hardchalig, glad, eivormig weefzel, 357. en wordt eene *Pop*, wier voorste deel zwart bruinrood, en 't achterdeel, met zyne ringen, schoon blinkend geelrood is, *ald.* 358. Uit deze komt de *meer bleekroode*, dan *kaneelbruine Nachtwinder* voort, IV. 189. enz. Deszelfs 4 *vleugels* hebben, benevens het dikke *borststuk* en de *Kop*, byna doorgaande, eene roodachtige kaneelbruine koleur, die allengskens, naar den uitersten rand toe, veel bleeker en helderder wordt, en na genoeg in 't roode valt. De *Oogen* zyn zwart, en de *Sprietten* hairvormig. Het dikke *Achterlyf* heeft, tot aan het derde lid, eene gemeene bruine koleur; en de overige leden zyn zeer digt met een lang wolachtig stof overstrooid, *ald.* 190. Het *Mannetje* ziet 'er, meestal, iets kaneelbruiner uit, dan het wyfje; de *voelboornen* hebben een sterken vederbaard; het *lyf* is veel kleiner, en achter aan hetzelfde ziet men ook zulke wollenbosjes-stof, als het wyfje heeft. Het wyfje legt kleine, bykans naar eene *Ton* ge-

lykende, langwerpig ronde witte *Eieren*, die het met een kleverig vocht vast aan lynt, en met wollenstof overdekt, *ald.* 190. *aann.*

Rups, (de groote *zwartbairige*,) zie *Velvraat*.

Rups, (de kleine, *bairige*, zwarte, roodgestreepte, en wit geolakte,) benevens *baare verandering tot in een Nachtwinder der tweede Classe*, I. 304. enz. Deze *Rups* is op allerhande *Ooefboomen* en allerlei soorten van *Wilgen* in het voorjaar en den zomer te vinden. Naa verscheide veranderingen van huid geraakt zy tot de grootte van omtrent een duim lang, *ald.* 304. De grondverwe der *huid* is zwart, en met korte wolle, gelyk een teder vilt, digt begroeid. De derde ring naast den *Kop* is op den *rug* met een rond knopje of bultje voorzien, waarop men doorgaans een paar kleine, witte, ook zomwylen roode vlakjes bespeurt. Van den kop af, tot aan den laatsten knop, loopt een breede kaneelroode streep midden over den rug, en ter wederzyde eene rei witte vlakjes. Van onderen langs den buik is 'er van gelyke eene kaneelroode linie, van den *Kop* af tot aan de Nafschuivers, getoogen. De *Hals* is wederzyds met een rood knopje voorzien, en de *Pooten* zyn zwart. Het *Spinzel*, waarmede zich deze *Rups*, by haare verandering, omkleedt, is langwerpig rond, en geheel doorzichtig, eenigzins bruinachtig wit van koleur. De *Pop* is zwartachtig van koleur, doch het *achterdeel* heeft ter zyde eenige geelachtige streepen, in de lengte getoogen. Naa dat ze omtrent 3 weken heeft gelegen, komt 'er de *Vlinder*, reeds in *July*, of omtrent den herfst uit te voorschyn, *ald.* 305. en *aann.* Deszelfs koleur is blinkend wit,

wit, behalven dat de 3 laatste leden van het *Achterlyf* en de *Sprieten* helder oranje-geel zyn. De *Vleugels* zyn aan den buitenrand blaauw uitgerond, en hier zo wel, als aan den binnenrand, met franje bezoomd. De *Kop* en de *Pooten*, mitsgaders de *vleugels* aan het lid, en boven al het *Voorlyf*, zyn met lange haren begroeid, *ald.* 306.

Rups, (de groote, viltbairige, geel bruine,) die op de Sleefstruiken en Queereboomen aeft, benevens haare verandering tot in een Nachtvoller der tweede Classe, l. 357. enz. In haare eerste jeugd heeft deze soort van rupsen, een merkelyk prachtiger en schooner aanzien, dan wanneer ze ouder geworden is. De *Kop* is dan nog gansch zwart, en achter dezen ziet men, ter wederzyde, op den eersten ring, 2 groote met lange haren begroeide wratten of pukkels, derwyze, dat ze byna een paar ooren vertoonen. De grondverwe van haar *lyf* is dan donker blaauwachtig-graauw, en alle de ringen zyn op den *rug* met schoone oranje-geele vlakjes en bultjes versierd. Voorts zyn dan haare 6 *voorpoeten* zwartachtig bruin, de *buikpoeten* helder bruin, en de 2 *naschuijvers* alleen bruin bezoomd, *ald.* 358. *aann.* In haaren volwassen staat is zy over de 3 duimen lang. De gansche *huid* is met een teder, digt Vilt van bruin-geele, blinkende en vlak liggende hairtjes overtoogen. De gansche oppervlakte van het *Lyf*, benevens de 8 paar *Pooten*, is bruinrood. De rond verwulfdde voorvlakte van den *Kop* is met tedere geel-bruine hairtjes bezet. De *Hals* is, naar den kant van den *Kop*, oranje-geel, en deze geele streep ver- toont zich van vooren en van achter zwart geboord. Van den 2den ring af tot aan

den laatste loopt 'er, wederzyds, langs den *buik* een witte streep, en uit den- zelve komt, op ieder ring, een spits toeloopend wit streepje, dat schuins achterwaarts na beneden gaat. Op beide zyden van het *lyf* staan, op ieder ring, nog 2 byzondere vlakjes van korte vilt- hairtjes, *ald.* 360. Haare uiterste grootte bereikt hebbende, en veranderen willende, trekt zy een taai slym, in de gedaante van een draad, uit den bek, en windt hem rondom zich heen, waar- by ze, geduurig, eenige der korte vilt- hairtjes van haar *lyf* daar onder vlecht; en dit *Spinzel*, vaardig zynde, is eier- vormig van gedaante, en uitwendig bruin van koleur, maar van binnen gansch glad, en blinkend graauw, *ald.* 361. Twee dagen daarna is dit Insect eene *Pop*, wier koleur aanvangeljk zeer hel- der groenachtig, maar binnen eenige dagen bruinachtig is. Deze *Pop* blyft ruim 5 weeken in haare behuizing be- slooten; *ald.* 362. doch het gebeurt ook menigmaal, onder deze soort, dat de *Vlinder* eerst in *Juny* des volgenden jaars ter waereld kome, *ald.* 362. *aann.* Hier is een groot onderscheid tusschen het manlyk en vrouwlyk geslacht dezer soorten van Vlinders. Het *Mannetje* is niet alleen 3 maal zo groot, als het *wyffe*, maar dit heeft ook lange, geele, hairvormige *Sprieten*, waar tegen het *mannetje* met breede, bruine en veder- vormige *Sprieten* voorzien is. De grondverwe van het gansche *Lyf* is aan beiden rood-bruin, doch aan het man- netje veel donkerer. De buitenrand van alle de *vleugels* is uitgeschulpt. Midden door ieder *vleugel* loopt, by de *wyffjes*, een heldere, na buiten verdwynende, en van binnen donker geboorde dwars- streep; doch deze dwarsstreep is aan het man-

manneetje niet donker bezoomd. In den *bovenvleugel*, genoegzaam in het midden, ziet men een wit vlakje in een donkeren rood-bruinen grond. De *Kop* is met een paar zwart-bruine *Oogen* verciërd: aan het manneetje is het *achterlyf*, aan 't einde, gelyk de staart van een visch verdeeld, en de 6 *Pooten* zyn, in beide geslachten, aan de bovenschakels, met rood-bruine hairen begroeid, *ald.* 363.

Rups, (de kleine bleekgroene,) met hoog-carmynroode Doornspitzen, die zich op de berkeboomen ontboudt. Deze is, in haare volkomen grootte, dezelfde, welke vooraf beschreeven is als de *Rups*, (eene byzonder geelachtige groene, met verheve ringen,) enz. zie aldaar, III. 353. en *aann.* alwaar mede de *Vlinder*, daaruit voortkomende, is beschreeven.

Rups, (de kleine geelgroene,) met den vleeschverwigen rondon *Kop*, en 2 spitzen van gelyke koleur op het laatste lid, III. 355. enz. Haare lengte beloopt bykans drie vierde van een duim. Het *Lyf*, zo wel als de 8 paar *Pooten*, hebben eene schoone en aangename geel-groene koleur. In de lengte zyn, rechuit, 5 zeer tedere linien getoogen, 2 aan ieder zyde, en eene midden over den rug. Het gansche *lyf* is met nog zeer vele tedere en korre haitjes bezet, en even dergelyke haitjes vertoonen zich ook aan den kogelronden *Kop*, die eene bruinachtige vleeschkoleur, en aan ieder zyde een zwart oogpunt heeft. Het byzonderste aan deze *Rups* bestaat in 2 heldere vleeschverwige spitzen, welke van boven een bruin streepje hebben, naauwlyks eene linie lang, en op het laatste lid staan, *ald.* 356.

Rups, (de kleine roodachtig-graauwe,) met een geelen *Kop*, en diergelyke be-

zooming aan de zyden, die zich op den *Lindeboom* ontboudt, III. 344. enz. Haare lengte beloopt naauwlyks een duim. Haare grondverwe is roodachtig graauw, en op ieder ring ziet men 2 langwerpige zwarte punten, die op den *rug*, in de lengte, 2 reien uitnaaken. Daarenboven heeft ze nog ontelbaar veel tedere witte puntjes of stipjes, en aan ieder zyde eene helder-geele bezooming. De *Kop* is geel, en heeft een zwarten *bek*, De 10 stompe *buikpooten* zyn bleek-geelachtig, maar de 6 *voorst* zwart, *ald.* 345.

Rups, (de kleine zwartbruine en kort-hairige,) met den roodgeelen rugge-streep, en witte bezooming ter weder-zyde, benevens haare verandering in een *Nachtvlinder* der tweede klasse, IV. 117. enz. Deze *Rups* wordt in de maand *Mai* gevonden, en haar voedzel bestaat in verscheidenerle loof en kruid. Haare grootste lengte beloopt naauwlyks een duim, *ald.* 117. Haare grondverwe is meerendeels bruinachtig zwart. Midden over den *rug* loopt, in de lengte, een roodgeele streep, en ter weder-zyde van onderen is eene witte bezooming. Op alle de *ringen* staan rood-bruine knoppen, welke met korte styve hairen bezet zyn. De *Kop* is, benevens de 6 spitze *voorpooten*, blinkend zwart; waartegen de 8 stompe *buikpooten*; en de 2 *naschuiers* roodbruin zyn. Als de tyd haarer verandering is gebooren, bekleedt ze zich met een wit graauw *Spinzel*, waarin ze, naa eenige dagen, in eene rood-bruine *Pop* verandert, welke van achteren stomp is, en geen staartspits voert. Naa verloop van 3 weken komt 'er de *Vlinder* uit voort. Deszelfs dunne *Achterlyf* heeft, nevens de 2 *Ondervleugels* eene schoone oranje-geele

geele grondverwe, en in het eerste zyn zo veele zwarte dwarsvlakken, te tellen, als 'er ringen zyn. Aan de breede ondervleugels wordt men, aan den voorsten rand, een breede koolzwarte streep gewaar, die na de inleding toe allengskens snaller wordt. De snalle *Boven-vleugels* zyn ook, zo wel aan den voorsten, als aan den achtersten rand, met een oranje-geelen zoom voorzien, langs welken, binnenwaarts, eene zwarte linie loopt, *ald.* 118. Maar de grondverwe dezer vleugelen is veel helderer, dan die der ondervleugelen. Deze *bovenvleugels* zyn bovendien met veele grove zwarte aderen, in de lengte, doortoogen. Omtrent in 't midden ziet men een zwart dwarsvlakje. Het korte *voorlyf* is helder-geel, en met 3 zwarte strecken getekend. De *Kop* is klein, van gelyke geele koleur, met zwarte strecken en zodanige *Oogen* voorzien. De *Sprieten* zyn ook zwart, en tamelyk smal, maar die van 't Manneke vallen iets breeder. De 6 *Pooten* hebben insgelyks eene geele koleur, en de *bovenschenkels* zyn glad en dun, *ald.* 119.

Rups, (de mat- of dofgr enz en geboornede,) van eene zonderlinge gedaante, genaamd het Rbeebokje, behoorende tot de tweede Classe der Dagvlinders, IV. 173. enz. Deze trekt haar voedsel van de *wilgebladeren*: haare lengte is anderhalve duim. De *Kop* is verdeeld, en heeft 2 opstaande hoornen. Hy is blinkend groen van koleur, en van onderen, ter wederzyde, met een zwart punt verciert. Van achteren aan den rand is hy schoon-geel bezoomd, en deze bezooming loopt tot aan de als een gaffel verdeelde hoornspitzen, welke bruinrood, en van onderen nog met tedere en donkere punten bezet zyn.

Het gansche *Lyf* is van eene schoone dof-groene koleur, en gelykt na fluweel. Op de *bovenvlakte* is 't op zyn donkerste, op de zyden wordt het helderer, en eindelyk versmelt de groene koleur byna geheel in de witte. De *Pooten* hebben eene groene koleur, *ald.* 175.

Rups, (de mat- of dofgroene,) van den elzenboom, benevens haare Pop, IV. 140. enz. Deze wordt mede op den *vuilboom* gevonden, *ald.* 140. *aann.* zo wel in het voorjaar, als in den zomer. De *Eieren*, waaruit deze soort van rupsen voortkomen, zyn schoon-geel van koleur, en langwerpig rond van vorm, vertoonende zich, in de lengte, met veele ribben en vooren, *ald.* 141. en *aann.* Als de Rups volwasfen is, belooft haare lengte wel anderhalven duim. De *Kop* is rond, en niet heel groot; haar lange *Lyf* is met een zoom voorzien, en deszelfs *ondervlakte* schynt gansch plat te wezen. Van koleur is de Rups doorgaande mat- of dof-groen. Over den *rug* loopt eene eenigzins donkerer linie, en de *luchtgaten* zyn mede donkerer, dan de grondverwe. De *Pooten* zien 'er groen uit, *ald.* 142. Wanneer deze Rups tot de verandering wil overgaan; dan zwelt haar lichaam dermaate op, dat het bykans eene Cylindrische gedaante kryge. Zy maakt zich aan een horizontaal liggend lichaam vast, en beweest de plek, waarop haar buik zal komen te liggen, met een fyn *Spinzel*. Hierop draait zy het hoofd geheel na beneden, en gaat voort, met een klein heuveltje van zyde te spinnen, waaraan ze zich met de achterpooten hecht. Vervolgens begint zy haare draaden om zich herom te slingeren, trekkende dezelve over den rug tusschen

den

den vyfden en zesden ring. De beide einden dezer draaden worden op eene plek, daar het lichaam van de rupslig, op de vlakke vast gemaakt. Hierop trekt zy alle haare Pooten, buiten de laatste, van haare veranderings-plek af, en blyft zo, door middel van dien gordel, als zweevende in de lucht hangen. Eindelijk kromt zy het lichaam dermaate, dat de Rug van tyd tot tyd hooger, en op 't laaft zo hoog werde, dat haar lichaam een halven cirkel vormeere. Dan schuift zy, door verscheide zamentrekkingen en uitduwingen der leden, alles achterwaarts. Hierdoor wordt de voorste huid van het lichaam, al zoetjes, na den staart toe geschooven, en zo moet zy, op het laatste, door het opblazen van het voorste deel zichtbaar barften. Dit geschied zynde, maakt zich de *Pop* verder, door verscheide beweegingen, ten vollen van de huid los, en blyft in den zyden gordel hangen. Zulk eene *Pop* is in den beginne iets slenk, en daarby met eene vochtige stof, als met een vernis, overtrokken, te gelyk doorzichtig, doch het glinsterend vernis verdroogt schielyk. De *Pop* trekt zich voorts te zaam; de huid wordt harder; de punten en hoogtens vertoenen zich grooter, dan in den beginne; de huid wordt geheel bleek, en is niet zo bevallig hooggroen, als zy te vooren was. Na een dag of 14 komt de *Vlinder* daaruit te voorschyn, *ald.* 142. *enz. aanm.* welke *Vlinder* beschreeven is by *Dagvlinder*, (de byzonder schoone zwavelgeele,) volgens III. 233. *enz.* zie aldaar.

Rups, (de nu witachtig, dan helder- of donker-bruin gekoleurde hairige,) met knoppen en streepen voorzien, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede Classe, I. 413. *enz.*

De *Eieren*, waaruit deze Rupfen worden geboren, zyn blinkend, en vertoonen zich, in het begin, helder geelachtig, en hunne koleur verliest zich eenigzins in 't groene, byna als Baille-koleur, *ald.* 413. *aann.* Deze Rupfen hebben, zo dikwyls zy van huid veranderen, by ieder aanwas eene andere koleur, als zynde nu donkerer, en dan helderer, of ook wel gansch wit; maar ze komen echter meereendeels in de koleur van den *Kop* overeen, die by de meeste geel-bruin is. De grootte der volwassene beloopt 1½ duim. De *Kop* is blinkend bruin-geel, en op den bleek-geelachtig-bruinen grond des *lyfs* vertoonen zich de rug- en zyde-streepen wit, en zyn met een graauw boordzel bezoomd. De knoppen tusschen beide de linien, en die op den buikstreep staan, zyn geelachtig. De *Naschuiwer* met zyne beide *Achterpooten* is graauw, en op denzelven bespeurt men eene Oker-geele vlak. De overige *Pooten* hebben altoos de grondverwe van het lyf, en de hairen, rondom ieder knopje zittende, zyn rosachtig bruin, *ald.* 414. Als de tyd haarer veranderinge nadert, kruipt ze na den grond onder de struiken, verbergende zich in een eiervormig *Spinzel*, dat 'er, dewyl zy 'er haare hairen onder mengt, bruin uitziet. Naa etelyke dagen verandert ze in eene rood-bruine *Pop*, welke van vooren gansch stomp is, maar van achteren een staartpunt heeft. Deze *Pop* blyft den winter over tot in de maand *Mai* onveranderd liggen, maar alsdan komt 'er de *Vlinder* uit voort. Deszelfs onder- en bovenvleugels zyn bleek-oker-geel; doch de bovenste zyn doorgaande iets donkerer, dan de onderste, beider buitenrand oranje-geel bezoomd zynde. In de *Bovenvleugelen* ziet men

zwarte punten en vlakken van ongelijke grootte. In de *Ondervleugelen* ontdekt men een veel minder getal van vlakken, en menigmaal maar twee. Het *Achterlyf* is schoon Oranje-geel, en van boven, in 't midden en aan de zyden, met een regel zwarte vlakken versierd. Het *Voorlyf*, benevens de *Kop*, is helder-geel; de *Oogen* zyn zwart; en de *Sprietten* van den wortel af tot aan de helft zwart, en het overige deel is witachtig-graauw, *ald.* 415.

Rups, (de ranke, gladde, gras-groene,) met den geelen zyde-streep, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 431. *enz.* Deze *Rups* wordt in het laatst van *Mai*, en ook nog wel in *Juny*, reeds volwassen, op de *Kruisbesien-struik* en andere gewassen gevonden, beloopende haare lengte ruim $1\frac{1}{4}$ duim. Haare grondverwe is schoon dof-geel-groen, doch de inkervingen zyn iets geeler. De *Kop* is geelachtig-groen, zo als het *Lyf*, *ald.* 431. en *aanm.* Ter wederzyde van den *buik* loopt 'er, van den kop af tot aan den staart, eene smalle hoog-geele linie, die echter aan zommigen gansch wit bevonden wordt, *ald.* 431. Boven deze linie ziet men, op ieder zyde, 9 hoog-geele *Spiegelpunten*, met een tederen zwarten ring omgeeven, en midden over den *Rug* loopt eene tedere donkere linie. De *Pooten* zyn van dezelfde koleur als het lyf. In *Juny* verbergt ze zich onder de aarde, vermengende de beknabbelde dorre bladeren en steelen onder haar dun en doorzichtige *Spinzel*, het welk eivormig is. Na 5 dagen verandert zy in eene *Pop*, welke eene blinkende rood-bruine koleur heeft, en met een kort staartpunt voorzien is. Na verloop van 3 wee-

ken (by zommigen eerst in *September*) komt de *Vlinder* te voorschyn, *ald.* 432. en *aanm.* De *Ondervleugelen* zyn oker-geel, en de *Bovenvleugels* met Oranje-geele trekken en punten versierd. De *Kop* is bruin, en de zydestreep smal en hoog-geel. Het *Manneke* heeft niet alleen een langer en leeniger *Achterlyf*, maar ook eenigzins sterker *Sprietten*, dan het *Wyfje*. De *Eieren* zyn rond, helder-geel, van onderen en van boven iets ingedrukt, en met veele ribbeken en voortjes omgeeven, *ald.* 433. en *aanm.*

Rups, (de schadelyke, bairige, bruine,) met den grooten *Kop*, en met roode en blaauwe bultjes, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 198. *enz.* In de eerste jeugd zyn deze *Rupsen* van eene zwart-bruine koleur. Wanneer zy eerst uit de eierschaal komen, zyn ze nog helderder en ros-bruin, met lange graauw-bruine haren voorzien, die alle uit loutere wratjes voortkomen, maar na een tyd lang worden ze donkerer van koleur; doch de *Kop* is reeds te vooren blinkend zwart, *ald.* 199. en *aanm.* De allergrootste wordt zelden boven de 2 duimen lang. De *Kop* is oker-geel-bruin van koleur, en men ziet 'er ontelbaar veel donker-bruine zeer tedere puntjes of slippen op, die van vooren, ter plaatze van de oogen, alwaar ze dicht byeen staan, een paar groote bruine vlakken uitmaaken, en van onderen in 't heldere verdwynen. De *vreetpunten* zyn zwart. De grondverwe van 't gansche *lyf* is donker-graauw, en overal met langwerpige zwarte slippen besprenkeld. De 5 voerste paaren knobbels op de ringen zyn donker-blaauw, en de 6 volgende donker-rood. De spitze en stompe

Stompe Pooten zyn geelachtig bruin, *ald.* 200. De tyd, ter veranderinge geschikt, is doorgaans in *July* of *Augustus*. Zy maakt een bruinachtig wydgaat *Spinzel*, om zich heen, en daarin wordt ze tot eene dikke en donker-bruine *Pop*, welke meer dan een duim lang is. Daar de *Kop* verborgen zit, staat een paar dof zwarte ronde vlakken, die wel een paar oogen gelyken. Rondom deze, en op verscheide plaatsen van het *Voor-* en *Achterlyf*, zitten gansche bosjes van witachtige Oker-geele hairen. Zo dra men deze *Pop* aanraakt, draait ze zich een geruimen tyd lang, en wel zeer schielyk in 't rond, gelyk een *Tol*. Naa verloop van naauwlyks eene maand, komt de *Vlinder* te voorschyn, *ald.* 201. doorgaans in *September*. De grondverwe van het *Wyfje* is overal geel-bruinachtig-wit. In den *Voor-* of *Bovenvleugel* ziet men verscheide kronkelende dwarsstreepen, welke alle aan den voorsten rand iets breeder en donkerer zyn. Omtrent den uitersten hoek wordt men, aan den voorsten rand, eenige bruine stippen gewaar, en de geheele buitenrand, zo wel van den boven- als ondervleugel, is met dergelyke stippen versierd. De *Ondervleugel* zelf is naar den kant van 't lid iets bruinachtig-geel, en in eenige ziet men eene bleek-bruine gekronkelde linie, kort aan den buitenrand. Alle 4 de *vleugels* zyn sterk met vederstof belegd, doch het groote en dikke *lyf* nog meer. De *Oogen* zyn zwart, de *Sprietten* bruin, smal en vederachtig. Het *Achterlyf* is iets geeler of bruiner. De 6 *Pooten* zyn aan de *bovenschenkels* met lange bleek-bruine hairen digt bezet, maar de overige leden hebben kortere en donker-bruine hairtjes. Het *Mannetje* heeft een paar breede vedervormige

Sprietten, *ald.* 202. Aan het hoofd, het welk, even als de hairige *Rug*, bruinachtig-graauw van koleur is, zitten 2 kleine zwarte *Oogen*. De *Bovenvleugels* zyn bruin geel, en overdwars bruin-graauw gevland. Door dezen grond loopen, in de breedte, verscheide bruine en zwarte kronkelstreepen. De *Ondervleugels* zyn bruin-geel, met bruine aderen doorweeven. Het *Achterlyf* is geel-bruin. De 6 *Pooten* hebben hairige *bovenschenkels*, doch hunne koleur is overal geelachtig-wit-graauw, *ald.* 203. Het *Wyfje* legt gemeenlyk zyne *Eieren* in *September* en *Oktober*, dikwyls meer dan 500 in getal, *ald.* 203. *aanm.* Deze *Eieren* zyn wel rond, maar op 2 zyden eenigzins ingedrukt; en aanvangeljk geelachtig, vervolgens roodachtig, en eindelyk, als de repfen daarin tydig worden, bruinachtig graauw, *ald.* 204. *aanm.* *

Rups, (de *schoone*, *groote*, *groene*,) met *ronde en geele knopjes*, benevens *baare verandering tot in een Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 205. enz. De *Eieren* dezer *Rups* zyn rond en groenachtig, die, in de maand *Mai*, zeer digt by elkander aan de struiken en boomen gelegd worden, en waaruit binnen 14 dagen de jongen te voorschyn komen, *ald.* 205. De grootste dezer rupsen, volwassen zynde, heeft de lengte van byna 3 duim, *ald.* 206. De grondverwe der gansche *Rups* is schoon gras-groen. Ieder *ring* is met een breeden zwarten streep, als met een bandje, omgeeven, waarop *schoone geele en ronde knopjes* zitten, *ald.* 207. De *Kop* is klein; de 3 paar spitze *Voorpooten* zyn gemeenlyk bruin; de 4 paar *stompe buikpooten* en de *Naschuijvers* hebben altoos dezelfde grondverwe als het

het *lyf*, *ald.* 208. Het *Spinzel*, dat deze rups maakt, en waarin zy in eene *Pop* verandert, heeft de gedaante als eene vlees, of als een glazen Retort met een korten en wyden hals. Deszelfs koleur is zeer verscheiden; eenige zyn roodachtig-bruin, andere witachtig, *ald.* 209. In dit haar verblyf blyft ze, met een geboogen lyf, nog een paar dagen, en wordt ondertusschen allengskens korter en dikker. Vervolgens barst de rupsenhuid aan stukken, krimpt in een, en valt eindelyk geheel weg; waarop de in haar verborgen geweest zynde *Pop* te voorschyn komt, *ald.* 211. Deze is in het begin groenachtig, maar wordt van tyd tot tyd geduurig zwarter. Aan den laatsten en kort toegespitsten ring zitten veele stompe hairjes, als kleine borstels, *ald.* 212. Daaruit komt de *Vlinder* doorgaans eerst in het voorjaar ter wereld. Het onderscheid tusschen het mannelyk en vrouwelyk geslacht bestaat voornaamlyk in de grootte; hoewel 'er ook, buiten dat, in de koleuren en tekeningen zeer veel verscheidenheid te vinden zy, *ald.* 213. Het *Wyfje* heeft op ieder *vleugel*, in het midden, een in een witachtig veld staande Oogspiegel. De grond dezer spiegels is zwart, met een geelachtigen ring daarin, die een wit middenpunt heeft, en van buiten op de zyde nog met een witten halven cirkel omgeeven is. De *buitenste rand der Boven- en Ondervleugelen* is rondom evenredig uitgeschulpt, en olyfgraauw bezoomd. De overige grondverwe der *vleugelen* is rood-bruinachtig-graauw. Op den buitenrand des bovenvleugels volgt, naa eene breede bruinachtig-graauwe tusschenruimte, eene ongelijke, gekronkelde, geelachtige linie. Op deze volgt de groote grond-ruimte,

waarin behalve het ruime witte veld, versierd met den schonen spiegel, nog 2 à 3 kleine witte vlakjes staan. De *Hals* des *Vlinders* is door een witten streep, loopende tot over het lid van den voorvleugel, van het lyf onderscheiden. Het veld van den *Ondervleugel*, waarin de Spiegel staat, is zo wit niet als in den bovenvleugel, maar meer geelachtig-bruin. Het dikke *Achterlyf* is bleek graauw, en in de leden of inkervingen iets helderer. Het *Voorlyf* is bruin koleurig; de *Kop* insgelyks bruin, en de *Sprieten* zyn smal en geel. De *Pooten* zyn mede bruin, *ald.* 214. Aan het *Mannetje* zyn het *voor- en achterlyf*, benevens de *Kop* en de *Sprieten*, in het geheel bruin, maar de *hals* is, gelijk aan 't wyfje, wit bezoomd. In den *bovenvleugel* is de ruimte, tusschen den buitensten olyfkoleurigen en uitgeschulpten rand en de gele gekronkelde dwarslinie, rood-bruin; de volgende breede ruimte, waarin de spiegels staan, is ook iets donkerer, en het rood-bruine boordzel van den witten dwarsstreep is hier wat breeder, dan aan het wyfje. De overige grond, tot aan het lid, valt meer in 't donker-bruine. De *Ondervleugel* is bruinachtig-rood; en verdwynt in het vleeschverwige. De streep, daarop volgende, is insgelyks bruin-rood, en wel zeer donker. Van hier af is de gansche overige grond des *Vleugels* oranje-geel, en ongeveer aan 't lid met dergelyke bruine haren bedekt, waarmee het geheele lyf des *Vlinders* dicht begroeid is, *ald.* 215.

Rups, (de schoon getekende, en met oranje gele en witte doornpunten bezette,) benevens baare verandering in een *Dagvlinder der eerste Clasfe*, IV. 77. enz. Deze wordt van *Mai* af tot in *July*, doch

doch zelden tot in *Augustus*, op de *Dyvoet*, mitsgaders op de *Weegbrée*, gevonden, en haare lengte beloopt nauwlyks een duim. Haare grondverwe is helder blaauwachtig graauw, en onder langs het lyf loopt, ter wederzyde, van den *Kop* af tot aan het laatste lid, een besmulde witte streep. Wyders vertoont zich aan den breeden middelstreep, na den achterkant, eene rei witte punten, die de gedaante van een paelenlnoer heeft; nevens deze slaan nog 2 andere reien, welker punten kleiner zyn, en in den breeden zwarten streep wordt men ook eenige enkele dergelyke witte puntjes gewaar. De *Doornspitzen* zyn deels oranje-geel, deels wit; en, gelyk ze in koleur verschillen, zo verschillen ze ook in gedaante of vorm, *ald. 77*. De hairvormige *Kop* dezer rupse heeft eenerleie koleur met de oranje geele doornspitzen; maar dezelve valt echter iets meer in 't roode. De *bovenlip* van den mond is, benevens de 2 kleine *vreetspitzen*, zwart; gelyk ook de beide oogenvlakken, en verscheide andere tedere, verheve, en in den oranje-geelen grond staande punten. De achterste *staariklep* is graauw, de daaronder staande *Naschuiwers* ook, nevens de *buikpooten*, geelachtig rood-bruin, en de 3 paar voorste *klauwpooten* zyn geheel zwart. By haare verandering hecht ze zich aan eene steel of een blad, met haar achterdeel, lynrecht vast, en verandert dus hangende in eene *Pop*, welke stomp en dik is, maar haare grondverwe mag men eer wit, dan graauw noemen, *ald. 78*. zynde haar achterdeel met meestal verheve zwarte punten bezet, van welke echter zommige spits oploopen, zynde allen met een oranje-geel zoomtje voor-

zien. In de *vleugelscheden* ontdekken zich weder andere linien en vlakken, en aan ieder zyde van het *achterlyf* wordt men een zaagvormige streep, in de lengte, benevens nog eenige punten aan de ondervlakte gewaar. Hieruit komt, binnen 14 dagen, de *Vlinder* te voorschyn *ald. 79*. De grondverwe zyner 4 *vleugelen* is meer rood, dan oranje-geel, *ald. 80*. en in dezelve ziet men veele onregelmaatige, ten deele enkele, ten deele te zamenhangende vierkantige zwarte vlakken en punten, van onderscheiden grootte en vorm. Het zwarte *Lyf* is van vooren ter wederzyde geel, en aan het achterdeel graauw bezoomd. De *Kop* en de *Sprieten* zyn aan dezen Vlinder, even als aan alle soorten der eerste *Classè*. De *ondervlakten der voorste Vleugelen* hebben wel een oranje-geelen grond, maar zyn veel bleeker, en met veele kleine zwarte vlakjes bezet. De rand zelf is bleek-blaauwachtig-groen, en breidt zich uit tot aan den rand van de hoekspits, alwaar hy 2 maal zo breed is, als aan zyn begin, *ald. 81*. De grond der *achtervleugelen* is genoegzaam doorgaans blaauw-groenachtig wit; behalve dat hy met 2 breede en geboogen streepen overdwars doortoogen is, die even zo oranje-geel zyn, als de grond der bovenvleugelen. Aan beide de zyden hebben ze eene witte langwerpige, en in den omtrek sikkelvormige punten bestaande bezooming. Ook zyn 'er in den overigen grond nog veele andere verstrooide zwarte punten en vlakken van veelerleie gedaante. Het *Voorlyf* vertoont zich met de beide paar *Pooten*, en de 2 *voorpooten*, benevens de *baardspitzen*, en de halve ondervlakte des achterlyfs bleek oranje-geel, *ald. 82*.

Rups, (de snel kruipende, belder- en rood-geele hairige,) met witte vlakken, benevens haare verandering in een *Nachtvlinder* der tweede *Classe*, I. 236. enz. De *Eieren*, waaruit deze soort van *rupsen* voortkomen, zyn, ten aanzien der koleure en gedaante, by de allerfynste kleine paerlen te vergelyken. In het einde van *Augustus* komen deze jonge *rupsen* te voorschyn. Zy blyven den winter over, spinnende zy den ingang van haare legerstede toe, *ald.* 236. Geduurende dien tyd, wanneer ze 2 maal verveld zyn, ondergaan ze geene de minste verandering; maar ten derden en laatsten maale haare oude huid afgelegd hebbende, zo bereiken zy haare volkomen grootte; zynde de lengte van omtrent 2 duimen, *ald.* 237. De *Kop* dezer *rupse* is blinkend zwart, en voor aan den bek met eene witte vlak getekend. De grondverwe der *buid* is dof-zwart, maar onder aan omtrent den buik is dezelve iets graauwer. Boven op den *rug* staat in ieder lid, uitgenomen het eerste en laatste, een wit vlakje. Op beide zyden is ieder ring voorzien met een ovaal-ronden en verheven knop, welke rondom bezoomd, en wiens gansche rand met hairen bezet is. Aan den geelen zoom dezer knoppen raaken voortwaarts even zulke witte knoppen, als 'er op den *rug* staan, en beneden dezelve, of wat meer na den buik toe, loopt 'er eene geele linie langs het gansche lyf heen. De 3 paar spitze, en het achterste paar *Pooten* zyn zwart, en de 4 paar *buikpooten* helder bruin, *ald.* 238. De *Pop*, waarin deze *Rups* verandert, is ruim 1 duim lang, zeer dik, en van eene blinkende rood-bruine koleur. Naa dat ze 3 weken in haar *Spinzel* heeft gelegen,

wordt de regtschapen *Vlinder* uit dezelve geboren, *ald.* 239. Deszelfs *Kop*, *Voorlyf* en *Bovenvleugels* zyn zwavelgeel, doch deze laatste zyn met veele zwart-graauwe vlakken getekend, die aan sommige helderder, aan andere donkerer worden bevonden. De koleur der *Ondervleugelen* is zo hoog Carmyn-rood, dat ze de oogen doet schemeren, en in dien grond staan eenige vlakken, wier zwartigheid by niets te vergelyken is. Het getal dezer vlakken is ordentlyk vyf, maar ze zyn onregelmatig van figuur. De buitenste vleugelrand is zeer teder uitgeschulpt, en met een schoon goud-geel boordzel versierd. Aan het *Achterlyf* is de grondverwe altoos iets donkerer, dan die van het *Voorlyf* en de *bovenvleugelen*, en valt meer in 't Oranje-geele. Ieder lid of ring is met 3 zwarte vlakjes voorzien, naamlyk een boven op den *rug*, en een op ieder zyde, *ald.* 240. De koleur der *Sprieten* is, by 't Wyfje zwavel-geel, maar by het *Mannetje* iets bruiner: beide hebben zwarte *Oogen*. De *Pooten* zyn aan de *bovenschenkels* roshairig, en de overige leden geel, *ald.* 241.

Rups, (de styfshairige, bruine,) met baare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede *Classe*, I. 401. enz. Deze is in haare volkomen en natuurlyke grootte omtrent $1\frac{1}{2}$ duim lang. Haar *Kop* is zeer klein, en blinkend zwart. Op ieder *ring*, den eersten en laatsten uitgezonderd, ziet men, ter wederzyde, 3 of 4 ronde knopjes, welke rondom met styve bruine, zomtyds roode, en dikwyls zwarte hairen bezet zyn. Tusschen deze styve hairen staan nog veele zwarte en korte vilthairtjes, zo dat deze *Rups* met een recht warmen pels voor den winter voorzien is. De 3 paar spitze

spitze *Voorpooten* zyn zwart, en de 5 paar *stompe* bruin. By invallende winter-koude verschuilt ze zich onder allerhande struiken. In het voorjaar is ze eene van de eerste, die haare winterkwartieren verlaat, zo dat men ze dikwyls reeds in *April* ingesponnen vinde, *ald.* 403. en *aann.* Op den tweeden of derden dag, is ze reeds in eene *Pop* veranderd, welke van vooren dik en rond, maar van achteren stomptoegepunt is. Het *Achterlyf* is tusschen de leden met eenige roodachtige, by zommige oranje-geele dwarsstreepen getekend; maar voor het overige is de gansche grondverwe zwart. Naa verloop van 14 dagen, op zyn hoogst 3 weeken, komt daaruit de *Vlinder* ter waereld. Deszelfs *Ondervleugels* hebben eene schoone roozenroode kleur, die echter, na het lid toe, eenigzins in 't graauwe uitloopt. In den rooden grond ziet men, aan den buitenrand, eenige zwarte vlakken, en meer binnenwaarts een paar kleine zwarte stippen. Het *Achterlyf* heeft eene dergelyke roozenkleur; en is, van boven op den rug, met eenige helder-grauwe vlakken versierd, tusschen welke, zo wel op den rug, als ter zyde, zwarte ruitvormige vlakken staan. By zommigen dezer *Vlinders*, valt de kleur van den *Kop* en het *Voorlyf* eenigzins in 't roodachtige; doch gemeenlyk is ze bruin. In den bruinen grond des *Bovenvleugels* staat, niet verre van den buitenrand, een zwart stipje, doch de binnen- of achterste rand is doorgaande rood geboord, *ald.* 404. en *aann.* De *Bieren* zyn helder-groen van kleur, maar worden allengskens donker-grauw *ald.* 402. *aann.* zynde half rond, en

van onderen, daar ze vast zitten, plat gedrukt, *ald.* 405. *aann.*

Rups, (de *vilthairige graauwe*,) met *bruine vlakken en Oranje-geele punten*, die zich op de *appelboomen* onthoudt, benevens baare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede Klasse, I. 447, enz. Deze wordt in het laatst van *Mai* en *Juny* gevonden. Zy blyft den winter door in 't Leeven, en verkrijgt de grootte van $1\frac{1}{4}$ duim. De grondverwe van haar *lyf*, over het geheel met vilthairen bedekt, is helder-grauw. De *Kop* is bruinachtig. Boven op den rug zyn alle de ringen met byzondere, vierkante, donker-bruine, bestippelde vlakken versierd. In dezelve ziet men weêr andere, die oranje-geel, doch kleiner zyn, en dus veeleer punten genoemd kunnen worden. Op ieder zyde van het *lyf* wordt insgelyks eene rei donker-bruine vlakken gezien, die echter veel kleiner zyn, dan de voorgige, en maar 2 of 3 oranje-geele punten hebben. Van de 8 paar *pooten* zyn de spitze *voorpooten* geelachtig, maar de 8 *stompe buikpooten*, benevens de *Naschuivers*, bruiner van kleur. By haare verandering kaauidt ze de schors fyn, en mengt de gekaaude deeltjes onder haar weefzel, *ald.* 447. het welk nu graauw, dan bruin is. Naa verloop van 8 dagen ontdekt men daarin de *Pop*, die korten tamelyk dik is, en de vleugelscheden met het voorste deel zyn zwart bruin, maar het achterdeel heeft eene bruin-roode kleur. Naa verloop van 8 dagen is de *Vlinder* reeds gebooren. De grondverwe van deszelfs *bovenvleugelen* is bruinachtig-groen, en wordt, door een ingevonden oker-geelen buitenrand, in 7 of 8 takjes verdeeld. Byna midden door

den vleugel loopt een gedwongen, ongelijk getakte, okergeele dwarsstreep, tusschen welken en den ingeronden zoom, aan den voorsten rand, een klein vlakje, van dergelyk eene kleur, gezien wordt. De *Ondervleugels* hebben een helder-graauwen grond, door welker midden men een breeder, iets helderer dwarsstreep getoogen bespeurt, en derzelver buitenrand is donkerer bezoomd, dan die der bovenvleugelen. Het *Achterlyf* heeft omtrent dezelfde kleur, als deze zoom, maar het *Voorlyf* is donker-graauw, en de *Kop*, die even zo van kleur is, heeft een okergeelen halskraag, welke zich van vooren iets donkerer vertoont. De 6 *Pooten*, wier bovenschenkels hairig zyn, mitsgaders de hairvormige *Sprieten* van 't wyfje hebben eene graauwe kleur. De *Eieren* zyn langwerpig, en eenigzins plat; hunne kleur is graauw, en alom met donkere stippen besprenkeld, *ald.* 448.

Rups, (de violet blaauwe, geel gestreepte en zwart besprenkelde,) op de Ridder-spooren aazende, benevens haare verandering tot in een Nachtvlinde der tweede Classe, I. 247. enz. In Juny en July wordt deze Rups ontdekt, ald. 248. en op het aller grootfte is ze niet meer, dan 1½ duim lang. De grondverwe is tusschen graauw en violet-blaauw, welke kleur alleen aan de eene iets bleeker is, dan aan de andere. De buid is zo glad, dat men 'er geen het minste hairtje op bespeure. De Kop is middelmaatig groot, en boven op denzelven ziet men, kort aan den hals, 2 zwarte vlakjes; meer voorwaarts na den bek toe, staan 3 andere dergelyke nevens elkander; en geheel onder aan den bek is 'er nog een paar te zien. Van den Kop af tot aan de achterste pooten is

'er, op ieder zyde, eene zwavel-geele iets breede linie of streep, *ald.* 249. Onder deze linie staan 'er nog even zo veel, zoo niet meer, als op den rug, 5 op ieder zyde. Tusschen deze zydevlakjes ziet men, aan eenige dezer rupsen, nog verscheide zeer kleine zwarte stipjes, waarmede ook dikwyls de buikpooten besprenkeld zyn. Alle de *Pooten* zyn helder-graauw van kleur. De verandering dezer rups geschiedt onder de aarde. Haare legerstede in een verwulzel voltooid hebbende, begeeft ze zich daarin ter ruste. Na 5 of 6 dagen heeft ze de gedaante eener *Poppe* aangenomen, welker kleur roodachtig bruin is, hoewel het *Voorlyf*, en inzonderheid de plaats der vleugelscheden iets helderder zy, dan het *Achterlyf*. Aan het einde van het laatste lid zit een klein spits uitsteeksel. Zy blyft, gedurende den winter, onder de aarde liggen, *ald.* 250. en in *Mai*, of eerst in *Juny*, komt de *Vlinde* op den bovengrond, *ald.* 251. De purper- en roozenverwige grondverwe der *bovenvleugelen* verwisselen zich derwyze met elkander, dat 'er, van 't lid af tot aan den buitensten rand, geduurig een purper- en een roozen-kleurige dwarsstreep op elkander volgen. De breede purpervervige streep is aan den eenen rand, alwaar hy met eene smalle witte kronkel-linie bezoomd is, geheel zwartachtig-rood, en aan het ander einde is dezelve veel bleeker; desgelyks is de roozenkolorige streep, die aan den buitensten vleugel-rand staat, iets rooder, dan die in het midden des vleugels is. De *Ondervleugel* is met een dergelyk geel boordzel voorzien, als de bovenvleugel. De overige grond is donker-graauw. De *Kop* is, nevens het hairige *Voor- en Achterlyf*, helder okergeel.

geel. Dit laatste loopt van achteren tamelyk spits toe, en heeft ter wederzyde een zo genaamd verlooren Carmin-rooden streep. De bovenschenkels der *Pooten* zyn met geele, zomwylen ook met roozen-roode hairen begroeid. De *Eieren* zyn klein, rond verwulfd, geel van koleur, maar worden van tyd tot tyd bruiner, en naa 12 of 14 dagen gansch loodkoleurig, *ald.* 252, en *aanm.*

Rups, (de violet-zwarte,) met baare geel-roode hairborstels, benevens baare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 451. Deze is in *Juny*, en reeds volwassen, in *July*, op de Lindeboomen, Wolle-wilgen, en zomwylen ook aan de Sleetdoornstruiken te vinden, beloopende haare lengte byna $1\frac{1}{2}$ duim. Haare *bovenvlakke* heeft eene violet-zwarte, en de onderste daarentegen, benevens de *Kop*, eene meer zwart-grauwe grondverwe. Haar voornaamste kenteken bestaat daarin, dat ze aan de zyden der 10 dikste ringen, in den violet-zwarten grond, met even zo veel paar, of 20 geelachtig roode afgestompte borstels voorzien is, die alle even groot zyn. De grauwe grond onder deze borstels vertoont, ter wederzyde, eene rei witte langwerpige punten, *ald.* 451. Voor 't overige is het gansche *Lyf* dezer rupse met geel-bruine, tamelyk lange, doch weinige hairen begroeid. De 3 paar spitze *Voorpooten* zyn zwart, de 4 paar stompe *Buikpooten* en de *Naschuivers* bruin-rood. Wanneer de tyd haarer veranderinge nadert, maakt zy een *Spinzel*, het welk veeleer een klein Ei gelykt, dan een uit draaden vervaardigd Poppehuisje, waarin zich de rups dubbel te zamen legt, *ald.* 452. Daarin blyft de Rups nog 4 of 5 dagen liggen,

waar na ze in de gedaante eener *Poppe* verschynt, welker koleur voornaamlyk oker-geel is, maar echter iets in 't oran-je-geele valt, *ald.* 454. In deze befloote woning blyft ze tot in het voorjaar, en in *April* of *Mai* komt 'er de *Vlinder* uit. Deszelfs grondverwe is, zo wel aan de 4 vleugels, als aan het gansche lyf, rood-bruin, doch valt, op zommige plaatsen, eenigzins in 't grauwe. De *bovenvleugels* hebben 2 witte vlakken; tusschen deze en den buitenrand ziet men een helderen dwarsstreep, en ook een dergelyken in de ondervleugelen. Het *Achterlyf* is met iets helderer streepjes voorzien. De *Pooten*, en wel voornaamlyk de bovenschenkels, zyn met bruin stof begroeid, *ald.* 455. De *Eieren* zyn met eene wollige stof ten eenemaal bedekt, zynde geel, en eenigzins plat-rond, *ald.* 456.

Rups, wanneer eene rups uit het Ei gekomen is, zyn alle haare deelen nog tender en week; doch de huid, welke haar ter beschuttinge dezer deelen is gegeven, wordt, met den toeneemenden wasdom der rupse, allengskens harder, zo dat zich dezelve eindelyk niet verder laate uitzetten. Overmits nu de Rups, wanneer die eerste huid haare hardigheid heeft verkreegen, haaren volkomen wasdom nog niet bereikt, zo doet zy deze huid, die haaren groei verhinderen zou, aan stukken breeken. Daarop verschynt zy in een nieuw gewaad, het welk, doordien het van tyd tot tyd harder wordt, insgelyks in stukken barst; zulks gebeurt tot drie à viermaal toe, en daarna wordt de Rups niet grooter, III. 294.

Rups, (de witachtig grauwe, en bruin gevlakke,) die met vleeschachtige spitzen en wratten verciert is, zich voedt met eikenloof, en in een *Nachtvlinder*

der tweede Classe verandert IV. 106. enz. Haare lengte beloopt 2 duimen. De *Kop* is, van boven, hartvormig verdeeld, en van onderen geheel plat, blaauwachtig-graauw van kleur. De grondverve van hêt *Lyf* bestaat uiteenveel geelachtig-witte, graauwe en bruine byzondere vlakken. Op ieder ring ziet men eene dezer vlakken, uitgenomen de 2 eerste ringen, welke van boven met 2 bruine streepen, in de lengte, getekend zyn. De 6 voorste *klaauwpooten* zyn geel, en met zwarte vlakjes besprenkeld; maar de 8 stompe *buikpooten*, benevens de tamelyk lang achter uit steekende *naschuiwers* hebben eene graauwe koleur, ald. 108. Haar *weefzel*, by haare verandering, is wit doorzichtig, en de *Pop* blaauwachtig, met een graauwachtig stof bestrooid. Naa verloop van 18 dagen komt daaruit de *Vlinder* voort, ald. 109. De breede uitgeschulpte rand der hoog carnyen-roode *ondervleugelen* met zwarte vlakjes is witachtig, met nog eene afgebroken kronkel-linie doortoogen. De *Bovenvleugels* hebben slangwyze linien en vlekken, van deels geele, deels witte, deels graauwe, deels zwarte en bruine koleuren, die verscheide trekken, figuren en cieraaden formeeren. De *Sprieten* zyn tamelyk lang en hairvormig, ald. 110.

Rups, (de zec-groene,) die op het achterste lid met 2 uitsteekende doornen voorzien is, benevens haare verandering in een Nachtvoller der tweede Classe, I. 330. enz. De *Eieren*, waaruit deze soort van rupsen voortkomt, worden van den Wyfjes vlinder, gemeenlyk, in de maand *Juny*, aan de onderzyde der boombladeren gelegd. Deze *Eieren*, zo wel, als de daaruit voortkomende rupsen, vindt men op *Eiken*-, *Elzen*-,

Essen-, en *Wilgeboomen* enz. Deze *Rups* ten vierden maale verveld zynde, bereikt haare volkomen grootte, ald. 332. *aann.* Zy heeft een aanzienlyken rond verwulfd schoon-groenen *Kop*, die van boven af tot aan den geelen *bek*, welke roode gebitknevels heeft, door eene driehoekige tusschenruimte verdeeld, ook van onderen wederzyds breeder is, dan van boven. De 12 *ringen* zyn niet zeer diep ingekorven, maar wat plooiig en week van gesteltenis. Op den *Rug* is ze met een paar roode, hoewel niet harde, maar buigzaam doornen bezet, waarop tedere hairtjes zitten; en in het midden met eene blaauwe linie doortoogen; nevens welke, op ieder zyde, nog eene andere, die echter niet zo duidelyk is, gezien wordt. De 18 *Spiegelpunten* zyn zwart. De *Pooten* zyn meestal bruinachtig-rood, en alle de ringen, op den rug en aan de zyden, met witte verheve puntjes bezet, waarop tedere hairtjes zitten. Haar *Spinsel*, by de verandering, heeft eene graauwe koleur, en is doorzichtig. Naa 4 dagen wordt zy in dit *Spinsel* tot eene *Pop*, welker voorste deel des lyfs blinkend groenachtig zwart, en het achterdeel rood-bruin is; maar eindelyk wordt de *Pop* byna geheel zwart, en heeft aan 't laatste lid een kort staartpunt, ald. 333. *en aann.* Zy blyft tot in *Juny* van 't volgende jaar liggen, en dan komt 'er de *Vlinder* uit voort. Deszelfs *Voorlyf* is kort toegestompt; de *Kop* zit diep; de *Zuiger* is kort, en helder bleek-bruin van koleur; en de *Sprieten* zyn smal vezelig. De grond der *bovenvleugelen* is geelachtig-ros bruin. De buitenrand van dezelve is cierlyk zeer diep uitgetand, en de tanden zyn aan de punten zwart bezoomd. In gemelden ros-bruinen grond

ziet

ziet men eenige heldere en byna Oker-geele streepen van verschillende breedte en grootte. Tusschen dezelve loopen 'er eenige gekronkelde golfswyze linien overdwars door. De *Ondervleugels* zyn helder Oker-geel, en langs den even uitgeschulpten buitenrand loopt eene bleek rood-bruine verdieping rondom. Het *Achterlyf* is ook helder oker-geel, maar valt aan 't einde eenigzins in 't bruinachtige. De *bovenschenkels* zyn hairig, en hebben de koleur der bovenvleugelen, *ald.* 334. en *aann.*

Rups, (de zwarte,) met oranje-geele haren en knoppen, aazende op de beide-bezien-struik, benevens haare verandering tot in een Nachvlinder der tweede Classe, I. 405. enz. Haare grootte is, zelden, of nooit, meer dan een duim. De *Kop* is blinkend-bruin van koleur, en de grondverwe der huid zwart. Op ieder *ring* van het *Lyf* staat eene rei overdwars loopende, verheve, geel-roode, ronde knoppen, waarvan 'er, op de middelste ringen des *lyfs*, wederzyds 4 worden geteld; doch op de 2 voorste en den laatste staat een paar minder. Alle deze knoppen zyn met niet zeer lange, maar veele, styve en geelachtig-roode haren bezet; en dergelyk eene koleur hebben ook de 8 paar *Pooten*. Als de tyd haarer veranderinge nadert, trekt ze, door behulp van haare draaden, eenige bladen van den heide-bezien-struik byeen, en maakt een wit-graauw, doorzichtig en eivormig *Spinzel* om zich heen, waarin ze naa 2 dagen in eene *Pop* verandert. Deze heeft eene gansch donker-bruine koleur, blyft den ganschen winter over, *ald.* 406. en wel tot in de maand *Mai*, waarna de *Vlinder* te voorschyn komt. Deszelfs gansche *Voorlyf* en de 2 *bovenvleugels*

hebben eene aschgrauwe grondverwe. By het lid ziet men een zwarten streep, die zich eindlyk overdwars door den vleugel verdeelt, daarop volgt, na de zyde van den voorsten rand toe, in het midden, een langwerpig rond ringetje, en overdwars, door de breedte des vleugels, eene uit ongelyke vlakten bestaande kronkel-linie; en de daarop volgende buitenrand zelf is met veele punten of vlakken bezet. Het geheele *Achterlyf* en de *Ondervleugels* zyn bleek oker-geel. De 6 *Pooten* zyn, aan de bovenschenkels, graauw en met hairstof begroeid, doch derzelver dunne leden met zwarte reepjes verciert, *ald.* 407.

Rups, (de zwart- en geel-gestreepte, hairige grootte,) benevens haare verandering tot in een Nachvlinder der tweede Classe, I. 255. enz. Deze leeft van veelerleie en verscheide gewassen, *ald.* 255. Haare *Eieren* zyn rond, groen van koleur, en ze hebben boven in het midden eene kleine indrukking of een groefje, *ald.* 256. De *Rups*, haare volkomen grootte bereikt hebbende, is ongeveer $2\frac{1}{2}$ duim lang. Haare *Kop* is tamelyk groot, blinkend zwart, en op de voorste vlakke staat een geele winkelhaak, wiens spitze punt tot aan den *bals* reikt. De *Bek* met de *Vreetpunten* is insgelyks zwart. De grondverwe der *huid* is zwart; maar met zo veele, in de lengte en overdwars getoogen, geele linien en streepen gerekend, dat de zwarte grond der vierkante vlakken, tusschen de geele streepen, slechts de vulling schynte te wezen, *ald.* 256. De *Pooten* zyn zwart. In den *Herfst* verandert zy in eene *Pop*, en wel onder de aarde, zynde haare koleur donker-rood; en in *Mai* of *Juny* des volgenden jaars komt daaruit de *Vlinder* voort, *ald.*

ald. 259. Op de *Bovenvleugelen* is de grondverwe zilvergrauw, en van een voortreffelyken glans. De geheele grond is uitneemend fyn en teder zwart bestipeld. De buitenrand heeft 7 kleine donker-bruine zaag-tandjes. Naast dezen ziet men een smal Oranje-geel boordzel, 't welk binnenwaarts wederom donker bezoomd, en met kleine tandjes bezet is. Naa eene breede tusschenruimte volgt eene andere Oranje-geele linie, en eindelyk nog eene derde diergelyke, na vooren aan het lid, maar die niet volkomen tot aan den achtersten rand gaat. De koleur der *Ondervleugels* en van het *Achterlyf* is over het geheel oker-of stroo-geel. Aan den buitenrand zyn deze vleugels cierlyk uitgesculpt, en met zwarte stippen bezet; en het *Achterlyf* heeft, aan beide zyden van ieder lid, eene zwarte stip. Het ronde en dikke *Voorlyf* heeft dezelfde koleuren en tekeningen, als de *bovenvleugels*, *ald.* 260. Zeer diep onder het *Voorlyf* zit een kleine *Kop* met donker-bruine *Oogen* en geele *Sprieten*. De *Pooten* zyn zeer kort en helder-geel; de *bovenschenkels* zyn digt met haren bezet, en de overige leden met donkere streepjes getekend, *ald.* 261.

Rups, (de zwarte,) met den bruinen *Kop*, en eene bezoomde heldere zyde-linie, die zich op de kruisbeziën onthoudt, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der tweede *Classe*, III. 250. enz. Deze wordt, in de maanden *Mai* of *Juny* zo wel volwasfen, als nog jong gevonden. Haare grootste lengte is nooit boven $1\frac{1}{4}$ duim. De *Kop* is blinkend helder-bruin, zo als ook de 8 stompe *buikpooten*, benevens de gansche ondervlakte des *buiks*. Aan ieder zyde van onderen loopt eene

doorgaande witte linie, de *hals* heeft eene byzondere witte bezooming, en aan ieder zyde een helder-bruin streepje. De 6 spitze *Voorpooten* met de 2 *Naschuivers* zyn zwart. By de veranderinge begeeft ze zich in de aarde, verbergende zich aldaar in een *Spinzel*, dat ze vervaardigt, en een eironden bol verbeeldt. Naa verloop van 8 dagen verandert zy in eene roodbruine *Pop*, welke van achteren een kort slaartpunt heeft, en een paar wratjes, *ald.* 250. Binnen 3 of 4 weeken komt de *Vlinder* te voorschyn. Op de grondvlakte van deszelfs *Voorvleugelen* vindt men de grondverwe donker Oranje-geel, of geel-rood-achtig-bruin. In het midden dezer *bovenvleugelen* ziet men een gansch wit punt, nevens 't welke nog een paar kleine stippen staat. De *Ondervleugels* hebben, zo als ook 't *Achterlyf*, over het geheel eene bleeke, geelachtig-bruine grondverwe, die met eene eenigzins helderer bezooming omgeeven is. Het *Voorlyf* heeft een donkerer of bruiner verwe; de *Sprieten* zyn hairvormig, *ald.* 251.

Rups, (de zwarte, met eene drievoudige geele borduuringvercierte,) welke zich op de *Wolle Wilgen* en *Esseboomen* onthoudt, benevens haare verandering in een *Nachtvlinder* van de tweede *Classe*, III. 236. enz. De grootste lengte dezer rups belooft bykans anderhalven duim. De *Kop* is zwart-blinkend. De grondverwe der gansche rups vertoont zich fluweel-zwart; en door dezelve loopen 3 schoone hoog-geele streepen. Een dezer streepen loopt midden over den rug, en de 2 andere zyn beneden aan de zyden te zien. Die geele boordzels zyn met witte punten bezet; en zo is ook de zwarte grond met eenige hoog-blaauwe, blin-

blinkende en verheve knopjes verciërd. De 6 spitze *Voorpooten*, met de 2 na-
schuivers, hebben eene zwarte koleur, maar de 8 *buikpooten* zyn helderer. Zy blyft den winter over in haare rupfen-
 gestalte. Haar *Spinzel* is zeer teder, witachtig en doorzichtig. De *Pop* heeft in 't begin eene blinkende rood-bruine koleur, maar wordt allengskens donkerer, *ald.* 237. Naa verloop van 3 we-
 ken komt 'er de *nachtvolinder* uit te voor-
 schyn. Deszelfs *ondervleugels* zyn hoog Carmyn-rood, en met 3 ongelijke zwarte vlakken, en aan den buitensten hoek nog met 2 roode vlakken voorzien, waarvan de eene grooter is, dan de andere. Het *Achterlyf* heeft eene dergelyke hoogroode koleur, en door deszelfs midden loopt een smalle zwarte streep, in de lengte, tot aan het uiterste lid, dat geheel zwart is. De *bovenvleugels* hebben eene zwarte grondverwe, die in het blaauwachtig groene speelt, en waarin eenige spierwitte, en oranje-geele vlakken gezien worden. Het *Voorlyf* heeft, benevens het eerste lid van 't achterlyf, een groenblinkenden zwarten grond. De *Kop*, de beide hairvormige *Sprieten*, en de 6 buigzaame *Pooten* zyn zwart, *ald.* 238. Het manneke is niet alleen donkerer van koleur, maar ook kleiner, en heeft vedervormige *Sprieten*, *ald.* 238.

Rups, (de zwart bruine, bontgespikkelde, roshairige,) benevens baare verandering tot in een *Nachtvolinder der tweede Clasfe*, l. 327. Deze vindt haar voedsel aan veelerleie Kruiden, en wordt in *July* en *Augustus*, zomtyds ook nog in het begin van *September* gevonden. Zelden wordt zy grooter, dan $1\frac{1}{4}$ duim. De grondverwe der *buid* is zeer donker-zwart-bruin, *ald.* 327. De *Kop* is mid-

delmaatig groot, blinkend zwart-graauw, en eenigzins bedekt door de geelachtig-roode haren, die rondom den hals staan. Ieder *ring*, de 2 eersten uitgenomen, is van onderen, wederzyds, met een hooggeelen boogswyzen streep verciërd, in wiens midden een kaneel-roode knop staat. De 8 paar *Pooten* zyn bruin. Wanneer de tyd haarer veranderinge nadert, kruipt zy meestal aan den stam van een boom, of zoekt ten minsten eenig hout, om 'er haar *Spinzel* aan vast te hechten. In deze wooning blyft ze nog eenige dagen te zamen gekromd liggen, en verandert dan in eene *Pop*, *ald.* 328. welker voorlyf, benevens de vleugelscheden zwart-bruin, en het *Achterlyf* iets meer roodachtig-bruin van koleur is, hebbende een kort staartpunt. Doorgaande komt de *Vlinder* 3 weken daarna uit het Poppevlies te voorschyn, ten ware hy een Spadeling is; want dan komt hy eerst in 't volgende voorjaar, gemeenlyk in de maand *Mai*, voor den dag. De grondverwe van deszelfs *voorlyf* en de *bovenvleugelen* is graauw, en genoegzaam gansch teder gemarmerd. Men ziet 'er eene groote menigte van zwarte en witte vlakjes, golfswyze geslingerde dwarslinien en ringerjes in. De buitenste cierlyk uitgeschulpte rand is geelachtig-graauw bezoomd; en dusdanig eene vlak, genoegzaam in het graauwe verdreeven, ziet men ook aan den voorsten rand, met een zwart puntje in het midden. De *Ondervleugels* zyn geelachtig-graauw, maar den buitensten uitgeschulpten rand ziet men iets helder-geel bezoomd. Het *Achterlyf* is insgelyks geelachtig-graauw van koleur, en met een teder stof bedekt, *ald.* 329. De *bovenschenkels* der *Pooten* zyn met haren begroeid. Alle
 de

de overige leden zyn bruin-graauw, en de voorite met zwarte ringetjes omgeeven. De *Sprieten* aan beide geflachten zyn eveneens, en hairvormig, *ald.* 330.

Rups, (de zwarte bairige,) met witte vlakken in de gedaante van klaverblaadjes versierd, benevens baare verandering tot in een Nachtvliinder der tweede Classe, I. 407. Deze *Rups* is aan de heidebezien-struik te vinden in de maand *July*. Haare grootste lengte zal niet veel boven een duim zyn, *ald.* 407.

De *Kop* is niet veel kleiner, dan de overige leden, en blinkend zwart van kleur. Voor aan denzelven bespeurt men een volmaakten driehoek, door eene witte linie geformeerd: maar alle de overige leden hebben eene fluweel-zwarte grondverwe. Op den 2den ring, van den *Kop* af, staat eene verheve, van vooren verdeelde, hoog-kaneel-roode vlak; en van den *Kop* af, tot aan het achtereinde der *Rupse*, loopt van onderen, ter wederzyde langs den buik, eene schoone roode linie. Boven deze roode linie staan, op ieder zyde, 9 uitnemend schoone witte vlakken, elke van deze uit 3 aan elkander liggende knopjes derwyze te zamen gesteld, dat ze, gevoegelyk, by een wit klaverblad vergeleken kunnen worden. De 8 paar *Pooten*, zo wel de 6 paar *spitze*, als de 10 *stompe*, zyn zwart van kleur. Haar *Spinzel* is wit-graauwachtig en doorzichtig, en de *Pop* is blinkend-bruin van kleur, zynde van vooren aan den *Kop*, met een paar korte hoekige spitzen, en van achteren met een verdeeld staartpunt voorzien. In de maand *Mai* van het volgende jaar komt daaruit de *Vliinder* voort; wiens grondverwe helder-graauw is, en het achterlyf met de *Ondervleugels* en *Bovenvleugels* is aschgrauw, *ald.*

408. Het dikste deel der *Pooten* is met graauwe hairtjes, en de overige leden zyn met zwarte reepjes bezet. De *Sprieten* zyn aan beide geflachten hairvornig en dun, *ald.* 409.

Rups, (de zwarte, styf-bairige,) met den geelen ruggestreep, benevens baare verandering tot in een Nachtvliinder der tweede Classe, I. 409. enz. De *Eieren* dezer *rupse* zyn paerel-rond en geelachtig. De *Mosdistel* is haare aangenaamste spys, en zy is, in haare volkomen grootte, ruim $1\frac{1}{2}$ duim lang; hebbende een geel-bruinen *Kop*, van vooren iets plat, en zwarte *Oogen*. De grondverwe des *Lyfs* is gansch zwart-bruin, en over het midden van den *Rug* loopt in de lengte, van den *Kop* af tot aan den staart der *rupse*, een oranje-geele streep. Aan beide zyden is ieder ring met helder-blaauwe, ovaal-ronde en zwart geboorde knopjes bezet, welke rondom met lange, styve, en zwarte haren begroeid zyn. Alle de *Pooten* zyn zwart-bruin. In den *Hersft* begint ze zich tot de verandering te schikken. Zy kruipt op den grond onder de struiken, besluitende zich aldaar in een doorzichtig, graauw en eivormig *Spinzel*, waar onder zy haare zwarte haren mengt, en verandert enige dagen daarna in eene *Pop*, *ald.* 411. Deze is in het begin rood-bruin van kleur, maar wordt naderhand dof-zwart; en aan derzelver *Achterlyf* ziet men, ter wederzyde van de ringen, oranje-geele Spiegelpunten. Zy blyft den winter over liggen, en in het volgende voorjaar komt 'er de *Nachtvliinder* uit voort. Deszelfs *boven- en ondervleugels* hebben eene gansch witte grondverwe, die in beide met veele zwarte punten als besprenkeld is; welke van onderscheide grootte zyn, zonder orde,

orde, en in de bovenvleugels menigvuldiger, dan in de ondervleugels staan. Het stompe *Voorlyf* is ook wit, maar valt eenigzins in 't geelachtige; maar het dikke *Achterlyf* heeft, op de bovenvlakte, eene hoog Oranje geele koleur, uitgenomen het laatste lid, dat weder witachtig is. De *ondervlakte van het lyf* is gansch wit, en met 2 reien zwarte vlakken vercierd. De *Sprieten*, *Oogen* en *Pooten* zyn zwart; maar de *bovenfchenkels* oranje-geel, *ald.* 412.

Rups, (de *zwartkoppige*, *vaal-bruine*,) zie *Zwartkoppige*, *vaal bruine Rups*.

Rupsen, dat 'er menigmaal *Rupsen* en andere *Wormen* op den sneeuw gevonden of ontdekt zyn, is eene bekende zaak; doch het gevoelen, als of deze schepzelen met den regen of sneeuw van den Hemel gevallen, of door een sterken wind uit het eene land in 't ander overgevoerd waren, kan men geenszins toestemmen. Niemand heeft ze ooit met den regen zien nedervallen, I. 564. En alle insecten weeten zodanige schuilplaatsen op te zoeken, waarin ze voor gevaaren, en dus ook voor 't geweld des winds, beveiligd zyn; en zy weeten zich met hunne Pooten zo vast te houden, dat ze niet zeer ligt van hunne plaats afgerukt kunnen worden. In den Sneeuw worden gaten gezien, daar de *Rupsen* uitgekroopen waren, *ald.* 565. Dat ze zich 's winters menigvuldig op den sneeuw laten zien, heeft geene vreemde grond-oorzaak, want het geschiedt niet, dan wanneer de aarde, eer ze bevriest, met dikken sneeuw bedekt wordt. Deze sneeuw verwart het land meer, dan dat hy het verkoelt. Gebeurt het dan, dat het Weer zagt en ontlattend is, zo ontwaaken, by zodanig lang aanhoudend weer, de *Wormen* onder den sneeuw,

door de warmte, uit hunnen slaap; en, hongerig zynde, worden ze op deze wyze uit de aarde gelokt, en kruipen by menigte op de bovenvlakte, *ald.* 566.

Rupsen, (*schadelijke*,) daar door worden alleen zodanige soorten verstaan, welke niet slechts veel sterker, dan andere, vermenigvuldigen, maar zich ook van dergelyke gewassen geneeren, welke of tot onderhoud van menschen en vee gansch noodzaaklyk, of ten minste van eene byzondere nuttigheid zyn. De buitengemeene sterke vermeerdering van zodanige schepzelen blyft intusschen de voornaamste grond van hunne schadelykheid, I. 306. enz.

Rupsen-jaager, is een schoon-groene en goud-blinkende *Kever*, die een walgeelyken flank van zich geeft, en zo wel de *Rupsen* zelve, als de *Poppen* ombrengt, I. 195.

Rupsje der Woudbeide, (*het uitneemend cierlyke groen- en wit geschakeerde*,) IV. 63. enz. Haare grootte belooft weinig meer, dan een duim. De stompe en ronde *Kop* is blinkend, blaauwachtig-groen; maar alle de leden van het *lyf* zyn doorgaande geel-groen van koleur. Aan ieder derzelven, den hals alleen uitgezonderd, ziet men overdwars 5 stompe verhoogde hoekspitzen, waar van elke uit eene vierhoekige piramide bestaat. Deze hebben, na den *Kop* toe, een helder-geel, of geelachtig wit, en na achteren een donker- of zwart-groen; waarby de 5 verhoogde hoekspitzen even zo vele reien van scherp toeloopende, helder en donker gevlakte bultjes uitmaaken, die zich over de gansche *Rups* uitrekken. Haare *Pooten* hebben eene groene koleur; doch de 6 voorste *klaauwpooten* zyn iets donkerer, dan de *stompe*, *ald.* 64. De *Pop* is schoon helder

helder blinkend, bruinachtig-rood van koleur, *ald.* 64. Een schoon dof bruinachtig-rood fluweel maakt de grondverwe van den *Vlinder* uit, die daaruit voortkomt, en even zo vertoont zich ook de *Kop* benevens het *Voorlyf*. In dit laatste zyn alle de deelen, als de halskraag, de fchouderbladen en het borftftuk, met fmalle goudgeele boordzelen voorzien. Daar benevens pronken de *bovenvleugels* niet alleen met even zodanige goudgeele geflingerde linien en vlakken, van verfchillende gedaante, langte en breedte, tot aan de inleding toe; maar 'er is ook, in derzelver midden, een breede, graauwe dwarsftreep te befpeuren, waarin men, aan den voorften rand, in den zwarten grond, eene gansch witte vlak ziet, terwyl de ftreep zelf, op ieder zyde, met eene reedere, zwarte, gekronkelde linie omgeeven is, *ald.* 65. De *Ondervleugels* zyn, van de inleding af, tot omtrent aan het midden, fchoon oranje geel, het overige gedeelte is koolzwart, en aan den rand oranje-geel bezoomd. Het *Achterlyf* is geel en zwart, overdwars, verciërd, derwyze, dat ieder lid of ring iets van die koleuren deelachtig zy. De *Spieten* zyn hairvormig, *ald.* 66.

Rupsje, (het kleine, bruine, hairige,) met witte fchilden, op den appelboom aazende, benevens deszelfs verandering tot in een Vlinder der vierde claffe, I. 540. enz. Deze vindt men, in de maanden van *Juny* en *July*, eerst volwaffen op de Appelboomen, fchoon het in den voetgaanden winter reeds uit het Ei gekomen is, beloopende zyne lengte niet meer, dan een derde van een duim. Het is bruin van koleur, en alle de leden zyn met hair bezet. Over het midden van den *Rug* loopt eene witte, met

zwart geboorde linie tot aan het einde, die ook de daarop fttaande 6 witte vierkante vlakjes doorsnydt. De *ringen* zyn met kleine geel-bruine knopjes bezet, waarop ettelijke hairjes ftaan. De *Kop* is klein en zwart: de 6 *voorpooten* zyn insgelyks zwart, maar de *buijpooten*, waarvan 'er hier maar 3 paar worden gevonden, benevens de *naschuivers*, hebben eene geel-bruine koleur, *ald.* 540. Als het tot de verandering zal overgaan, verbergt het zich in een *Spinzels*, dat licht-graauw is, veranderende daarna in een pin- of tapvormig *Popje*, het welk zo wel van vooren, als van achteren, ftomp is, en dus geen ftartpunt heeft. De koleur is bruin, en op den *Rug* iets donkerer, dan op andere plaatzen. Naa verloop van 3 weken komt 'er het *Vlindertje* uit te voorschyn. Deszelfs koleur is meeftal graauw; maar in de *bovenvleugelen*, kort aan het lid, ziet men eene donker-bruine, en aan den voorften rand, nog eene andere dergelyke, dog veel kleiner vlak. In den overigen grond der 4 *vleugelen* zyn nog verfcheide andere dwarsftreepjes en puntjes. De bruinachtige *Kop* heeft een klein fpits baardtje, waaronder een kleine *Zuiger* verborgen zit, en de *Spieten* zyn hairvormig, *ald.* 541.

Rupsje, (het kleine, dikke, bleek groene,) met bruine en heldere ftreepen, benevens deszelfs verandering in een Nachtvlinder der vierde Claffe, I 529. enz. Dit *Rupsje*, het welk meeftal in *Mai* en *Juny*, in de hoeken der tuinfchuttingen wordt gevonden, wordt naauwlyks een halven duim lang. Zyne grondverwe is bleek-groen; midden over den *Rug* loopt een witte ftreep, en van onderen ter wederzyde een bleeke okergeele,

geele, waar tusfchen nog eene helder-groene getrokken fchynt. Alle de leden, behalven de kop en de nafchuiver, hebben kleine hoogrens, en op dezelve ziet men ettelyke verheve puntjes, die regelmaatig ftaan, en met eenige bruine hairtjes bezet zyn. De *Kop* is geelachtig, en de *Nafchuiver* gras-groen; doch beide zyn eenigzins hairig, *ald.* 529. By de verandering omfpijnt het zich, en maakt zich met eenige draaden vaf. Hierop verandert het, naa verloop van 1 of 2 dagen, in eene *Pop*, welke dezelfde groene koleur behoudt, die ze als Rups reeds heeft gehad. Op den *rug* is deze met hairen bezet, die nu ligt graauw zyn; en naa 14 dagen komt de daarin verborgen zittende *Vlinder* te voorfchyn. Deszelfs koleur is zuiver wit; zyne *vleugels* beftaan uit vederen, zeer gelyk aan de flagpennen der vogelen. Op ieder zyde ziet men 5 van deze Vederen, waar onder de voorfte de langfte zyn. De voorfte *Vleugels* hebben 2, en de achterfte 3 pennen. De *Sprieten* zyn hairvormig; de *Kop* is klein, en benevens de *Pooten* fpijrwit, gelyk het lyf, *ald.* 530.

Rupsje, (het kleine, groene, bultige,) zie *Kleine groene, bultige Rupsje*.
Ruffifche Beer, zie *Beer (ruffifche.)*

S.

Salade rups, (de gladde, zwart en geel-gevlakte,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Claffe*, I. 399, enz. Men vindt ze meefal in *July* en *Augustus*, en ze bereikt, geheel volwassen zynde, de lengte van 2 duim. De *Kop*, die blinkend zwart is, heeft op de voorvlakte een witten driehoek. Boven op den rug

ziet men, op ieder ring, eene oranje-geele, ruitvormige vlak, *ald.* 399. Van onderen langs den buik loopt er, wederzyds, een helder-geele ftreep over alle de leden heen, waarin zwarte flippen gezien worden. De 3 voorfte paaren *Pooten* en het achterfte paar zyn zwart, en de 4 middelste paaren wit. Geene fpzye meer gebruikende, verfchuilt ze zich, omtrent 3 of 4 duim diep, in de loffe aarde, en maakt eene langwerpige ronde holligheid, die ze vervolgens inwendig met een graauw *Spinzel* bekleedt, ftookende, naa verloop van ongeveer 8 dagen, haare laafte rufpen-huid af, en verandert in eene *Pop*, *ald.* 400. Daaruit komt doorgaans in de maand *Mai* des volgenden jaars de *Vlinder* ter waereld, zynde hy gansch graauw, behalve dat de *Ondervleugels* eene bruine koleur hebben, die na het lid toe in 't Oker-geele verfmet. De buitenrand dezer *Ondervleugels* is met een wit boordzel voorzien. De *Bovenvleugels* hebben zeer weinig cie-raaden. Aan den buitenrand is, insgelijks, een wit boordzel, en binnenwaarts daar aan ziet men eene fmalle, zwarte, zaagswyze linie; terwyl de overige grond des vleugels met veele tedere, zwarte aderen doorfneeden is. Het *Voorlyf* is, van boven aan den *Kop*, met een hoog opgeworpen flepje voorzien. Het *Achterlyf* is aan 't einde gefpleeten, en ieder lid van 't zelve, van boven in het midden, met een zwart ftreepje getekend. De *Sprieten* zyn, by beide geflachten, hairvormig. Aan de *Pooten* zyn de *bovenschenkels*, zeer digt, met graauw hairftof bekleed, doch de *onderschenkels* met zwarte ringetjes omgeeven, *ald.* 401.

Salade-rupsje, (*het kleine*,) zie *Koolrupsje*, (*het kleine*.)

Satyn-capel, zo wordt genoemd de *Vlinder*, uit de bruinachtige *Wilgenrups* voortkomende, I. 234.

Schade, die de *Springkhaanen* kunnen veroorzaaken, hebben *Oostenryk*, *Bohemen*, *Moravie*, *Silezie* en *Thuringen* in den jaare 1693 ondervonden, en *Silezie* andermaal in de jaaren 1727 en 1728. II. 258.

Schadelyke, (*de*,) *geele en graauwe Koolrups*, benevens *baare verandering tot in een Dagvlinder der tweede Classe*, I. 86. enz. Deze eet behalven de kool- en moeskruiden, ook de bladeren van de wilde Nachtveil, *ald.* 86. *aanm.* De gedaante der *Eieren*, waaruit deze rupsen voortkomen, is kegelvormig en geel van koleur, zynde in de lengte met veele verheve ribben voorzien, tusschen welke men iets breeder en diepe voorens bespeurt, die gezamentlyk, overdwars, rondom het geheele Ei, met kleine nog dieper kerfjes voorzien zyn, *ald.* 88. en *aanm.* Eene dezer rupsen in haare volkomen grootte wordt zelden boven de 1½ duim lang, en ze is een goeden stroohalm dik. Haar *hoofd* is rond en heldergrauw, besprengd met tedere en verheven stippen, en rondom zwart bezoomd. Van boven over het hoofd loopt, van den hals af tot aan den bek, een zwarte streep, die zich in 2 scheef loopende linien verdeelt. Over den *Rug* loopt eene smalle zwavel-geele linie, en op ieder zyde van den buik eene dergelyke, iets breeder; doch alle drie loopten ze van vooren tot achteren recht door. De grondverwe van het *lyf* ter wederzyde is helder grauw, *ald.* 88. Op ieder ring staan veele, ten deele groote, ten deele klei-

ne zwarte stippen dicht by elkander, welke van verre eene groote zwarte vlak gelyken. Het laatste lid van 't lyf is, benevens de beide *Achterpooten*, zwart, en het geheele lyf over met tedere haren begroeid. De 6 *Voorpooten* zyn zwart, en de 8 stompe *Buikpooten* geelachtig. Als de tyd der verandering naby is, begeeft ze zich na de wanden der tuinen of huizen, of zoekt een boom of een anderen stengel van een struik, waar aan ze zich vast zet, en spint een draad om het lyf, *ald.* 89. veranderende in eene *Pop*, wier hoofdverwe, gemeenlyk, witachtig bleek-groen is. De geheele oppervlakte dezer Poppe is met veele kleine zwarte stipjes getekend, waarvan de meeste en grootste, op de uitsteekzels, met tedere witte randjes omzoomd zyn, *ald.* 90. Omtrent de vleugelscheden ziet men eenige regels kleine streepjes of stipjes, die van achteren schuins na beneden loopen. Na 14 dagen komt daaruit, by zomerdag, de *Vlinder* te voorfchyn. Deszelfs *Achtereulegel* is in het geheel bleek-geel, en aan den voorften rand, tot aan het lid, iets geeler bezoomd, met geele zwarte aderen doorweeven, en tusschen deze met zeer kleine zwarte stippen besprenkeld. De *voorste vleugel* is veel bleeker, en zo wel aan den voorften, als buitenften rand final-geel geboord. Byna midden in den voorften vleugel staan 2 ronde zwarte vlakjes. Het *voor-* en *achterlyf* zyn graauwachtig wit en hairig; de *Oogen* geelachtig-groen, en van boven met een wit randje omgeeven. De *Pooten* zyn, even als het *Lyf*, graauwachtig wit, *ald.* 91. De grondverwe der *Voor-* en *Achtereulegelen* is wit. Aan den voorften vleugel is de buitenfte en voorste hoek

zwart,

zwart, zo verre als hy op de onderste zyde des achtervleugels geel is. De *Achtervleugel* vertoont, aan zynen voorsten rand, een enkel zwart vlakje. Het *lyf* is, op de bovenvlakte, graauw en met haren bewassen, die ook gedeelyk de leden der vleugelen bedekken, *ald.* 92.

Schadelyke, (de,) gezellige Oranje geel *Rups*, met zwarte streepen over den rug en op de zyden, benevens haare verandering tot in een *Dagolinder* der tweede *Classe*, I. 81. enz. Deze is eene van de eersten, die in het voorjaar wordt gezien, *ald.* 82. en wordt in haare volkomen grootte byna 1½ duim lang. Het *hoofd* met den *hals* is zwartachtig. Op ieder zyde gaat een zwarte streep, van den hals af tot aan het einde, tusschen welken het gansche bovengedeelte Oranje-geel, doch in de leden iets donkerer is. Over den *Rug* ziet men een breeden zwarten streep. Onder den zwarten zyde-streep is de buik graauwachtig, en heeft by den streep, in 't midden van ieder lid, een zwart spiegelpuntje. De 3 paar voorste *Pooten* zyn zwart, de 4 paar *buikpooten* geelachtig-bruin, en het paar achterste wederom zwart. Wanneer de tyd der veranderinge begint te naderen, maakt ze op een takje, zo wel van achteren, alsom het lyf, tusschen den derden en vierden ring, een draad over zich heen, waarop zy haare Poppen-gedaante erlangt, *ald.* 83. Na 14 dagen komt 'er een *Vlinder* uit voort, doorgaans in de maand *July* of *Augustus*, *ald.* 84. Deszelfs *Vleugels* zyn geheel geelachtig-wit, alom met zwarte aderen doorreegen, die na den buitensten rand wat zwarter zyn, en iets breeder uitloopen. Het *Lyf* is van boven zwartachtig graauw, van onderen wit-

achtig, en alom met haren bezet. De *Oogen* zyn bruin, en de *Kop* heeft alles, wat de *Vlinders* dezer tweede *Classe* doorgaans hebben, *ald.* 85.

Schadelyke Koolrups, zie *Koolrups*, de (*schadelyke*.)

Schadelyke Rupsen, zie *Rupsen*, (*schadelyke*.) volgens I. 306.

Scharminkel, zo noemt men den zeer langen en mageren, buitenlandischen *Springkbaan*, II. 380. *aann.*

Schepper, (de,) heeft ons wel in ieder Insect, gelyk in alle zyne overige werken, genoegzaame merktekens eener oneindige Almacht en Wysheid voor oogen gesteld; maar nademaal zich, geduurig, by het eene meer volmaakt-heden, dan by het andere openbaaren, zo moet ook, zomwylen, dat geene, welke wy als iets buitengemeens aan eenig Schepzel ontdekken, ons tot aanspooringe dienen, om naauwkeuriger en vlytiger acht te geeven op de overige dingen, die wy anderszins nalaatig, zoo niet gansch verachtlyk, zouden aanzien, alleenlyk daarom, dewyl ze ons te algemeen voortkomen, I. 209. zie mede 212.

Schepzel, dat ieder schepzel, tot het Ryk der dieren behoorende, zyn oorsprong uit het *Ei* heeft, en dat by alle soorten derzelve het vrouwelyk geslacht reeds zynen ganschen voorraad van diergelyke eiertjes mede ter waereld brengt, welke door den tyd, door het mannelyke zaad, of alle te gelyk, (gelyk by de meeste Insecten geschiedt,) of veele van tyd tot tyd, of ook weinige van dezelve, zo als de natuur van ieder soort het naamlyk medebrengt, en de toevallen gedoogen, verlevendigd, en tot hunne volkomenheid gebracht worden, is en blyft eene altoos waarachtige stelling, I. 348.

Schild-

Schildkever, (de kleine zwarte,) met 2 roode vlakken, benevens zyn worm en deszelfs verandering, II. 136. Deze *Worm* wordt op de Wolle-wilgebladeren, en ook op andere struikgewassen gevonden. Zyn *Lyf* is verheven vrwulfd, en tamelyk breed: het is dermaate met stekelspitzen bezet, dat hy byna een Egel gelyke, hoewel men tuschen deze spitzen de oker- of geelbruine grondverwe bespeuren konne. De *Kop* is zeer klein, en de 6 *Pooten* zyn tamelyk kort en teder. Naa 2 dagen veranderde de *Worm* in eene *Pop*, wier voorste deel zwart, en het overige grootste deel donker-bruin is. Naa verloop van 14 dagen komt uit dezelve de kleine vlakke en breede *Schildkever* te voorschyn. Deze is zwart-blinkend van kleur, en heeft, in 't midden zynor bovenvlakte, 2 hoogroode, naaft elkander staande vlakken. De *Kop*, en het *halschild* zyn, gelyk de 2 *Sprieten*, en de 6 *Pooten* zeer klein en kort, *ald. 136.*

Schildkever, (de op de groote distelen zich onthoudende,) benevens zyn met flekels bezetten worm en deszelfs verandering, II. 139. enz. Deze *Worm* draagt, altoos eene bruine klont, als een Parasol boven zich, welke aan de beide achterste en langste spitzen vast kleeft. Deze klont is niet anders, dan de drek of vuilgheid van den worm, die 'er zich aan gheecht heeft. Wanneer hy van alle vuilgheid gezuiverd is; dan wordt zyne koleur bleek-grauwachtig-groen. Het *Lyf* is in den omtrek byna ovaal-rond, doch loopt van achteren iets puntig toe. De *Kop* is zwart en niet zeer groot. De *Worm* heeft, van den kop af tot aan het achtereinde, op ieder zyde, 16 *spitzen*, die alle, de 2 laatste uitgezonderd, bykans even lang zyn.

Voor zyne verandering vreet hy in 2 of 3 dagen niets meer, en eindlyk verschynt hy in de gedaante van eene *Pop*. Haar *Voorlyf* is kort, en veel breeder, dan het overige achterste. Het *achterlyf* vertoont, aan den rand van ieder zyde, maar 8 *Spitzen*, *ald. 140.* Haare koleur is meerendeels donker-bruin; het voorste deel of halschild heeft, aan den voorsten rand, een breed zoom, en midden door denzelfen loopt een dubbele zwarte dwarsstreep. Naa verloop van 3 weken komt de *Schildkever* uit deze *Pop* te voorschyn. Op zyne gansche bovenvlakte is hy bleek geelachtig-groen, doch de vleugeldeksels, inzonderheid na achteren, zyn schooner groen; en zyn naar de lengte, met diepe streepen doortoogen: daar benevens hebben ze van vooren aan het borststuk eene bruine vlak. Hy heeft 6 korte, zwarte *Pooten*, die aan het buitenste einde bruin-rood zyn, en aan zyne *Sprieten* heeft hy twee kolfjes, *ald. 141.*

Schildpadde, (de groene,) zo noemen Blankaart en Goedaart den Schildkever, die zich op de groote distelen onthoudt, II. 141.

Schildpad vlinder, zo zou men den Vlinder, uit de zwart-hairige Beerenrups voortkomende, kunnen noemen, I. 139. aanm.

Schildrups, zie dikke, gras groene en geel geborduurde Schildrups

Schildrupsje, zie Voorbericht des Vertaaalers I. en Kleine, dikke, en van boven ronde roozenverwige Schildrupsje, volgens I. 110. enz.

Schröter, zie Hart-kever.

Schuim- of Gest-worm der Wilgen en der brandnetels, benevens de verandering in een geuleugeld schepzel, II. 400. enz.
Deze

Deze *Worm* heeft, naa de derde verandering van huid, wanneer hy reeds met vleugelscheden voorzien is, en nog eens vervellen moet; de grootte van eengerstekorrel. Zyn *Kop*, waaraan ter wederzyde de *Oogen* en korte *Sprieten* zitten, heeft, gelyk ook het *Voorlyf*, de *Vleugelscheden* en de 6 *Pooten*, eene zwart-bruine koleur; waartegen het *Achterlyf* bruinachtig helder-graauw is, en met eene donkere spits eindigt. Aan den bek heeft hy een langen, tederen *Zuig-angel*, die tegen de ondervlakte van het voorlyf nederwaarts geboogen verborgen ligt, en op het einde meer stomp, dan spits is. Door behulp van dezen *Zuig-angel* trekt hy zyn voedsel uit de jonge spruitjes der gewassen; *ald.* 402. het welk hy naderhand, in plaats van zyne vuiligheid, door zyne achterste steeds in de hoogte geboogen spits, als een wit en waterig schuim, dat uit loutere blaasjes van ongelyke grootte bestaat, weder van zich geeft, *ald.* 402. Wanneer de tyd zyners laatste veranderinge van huid nadert; dan kruipt hy uit dit schuim op het drooge, en zet zich vast op het naaste blad, of aan den tak, waaruit het spruitje voortkomt. Naa verloop van een half uur barst zyne wormhuid van vooren op den rug van een, en hy komt 'er, in eene eenigzins veranderde gedaante, geheel wit en week, uit te voorfchyn. Kort daarop erlangen zyne vleugels hunnen volkomen wasdom, en de koleur verandert insgelyks. Hy wordt graauwachtig bruin van koleur; en zyn gantche *lyf* is nu bedekt door de *bovenvleugelen*, welke na achteren spits toeelopen, en in hunnen graauwen grond 2 okergeele vlakken hebben. De 6 *Pooten* zyn van gelyke dikte en lengte. Het *Wyfje* is dikker dan het *Mannerje*, en

legt kort naa de paaring zyne *Eieren* aan de Wilgenboomen; *ald.* 403. waaruit in 't volgende voorjaar weer andere dergelyke wormpjes gebooren worden. Van dit Insekt zyn 'er nog verscheide andere soorten, welke zich meestal aan de brandnetels ophouden. Deze soort is niet alleen merkelyk kleiner, maar ook anders van koleur, dan de voorgaande. Het geheele *Voorlyf* van zulk een *Worm*, benevens de 6 *Pooten*, is schoon-groen, waar tegen het *Achterlyf* eene oranje-geele verwe heeft. Wanneer hy nog eens van huid verandert, blyft hy ook nog wel groen; maar op zyn *Kop* en *Bovenvleugelen* ziet men eenige geele vlakken, *ald.* 404.

Scorpioen, (*beschryving van den Italiaanschen*.) III. 324. enz. Onder de menigte van *Scorpioenen* uit *Italië* waren 'er eenige, die gansch wit, en daarbenevens zo klein waren, dat ze naauwlyks een halven duim in de lengte, en zommigen pas 3 linien bereikten. De *witte Scorpioenen* zyn de verandering van huid onderworpen. Want kort daarna worden zy even zo zwart-bruin, als men de andere gemeenlyk vindt. De *kleine Scorpioenen* groeien zeer langzaam, en hebben ten minste 2 of 3 jaaren noodig, om hunne volkomen grootte te erlangen, *ald.* 326. Het dikke *lyf* aan het wyfje inzonderheid is schoon rood, maar de *Kop*, benevens de *Schaaren* en de *Staat*, zyn iets donkerer. De *vangtang* of *bek* bestaat als uit twee schaaren. Ieder dezer *schaaren* bestaat uit 2 vooraan gekromde, scherpe, spitze deelen. Voorts is ieder deel in 't byzonder en op zich zelf, aan den binnensten rand, met etelyke scherpe *tanden* van ongelyke grootte bezet, en 't binnenste onbeweegelyke deel vindt men met

met eenige styve haren begroeid. Tusschen deze beide mondschaaren ziet men een vooruitstekend gaffelvormig deel, de *tong*, en dat de Scorpioen na achteren en vooren beweegen kan, *ald.* 327. Deze 2 grasvormige smalle tongbladen zyn eenigzins geboogen, doorzichtig, en helder geel; doch in het midden donker, nadien 'er eene roodbruine ader doorheen loopt. Het overige deel dezer tonge is helder, en heeft een lid, gelyk een lepel, die toegeboogen kan worden. Vlak achter de wrat, aan de ondervlakte van het lyf, tusschen de inleding van het laatste paar pooten, is 'er aan de wysjes en mannetjes een gansch byzonder beweegelyk deel, gelykende na een paar *vlovederen*. Ieder dezer vlovederen heeft 10 spitzen of tanden, *ald.* 328.

Scorpioen, (de kleinste,) III. 317. enz. Deze wordt ook wel de *Boekscorpioen* genoemd. Ten aanzien der grootte is hy by een volwassen Weegluis te vergelijken. Hy heeft, gelyk andere Scorpioenen, 10 *pooten*, de schaaren nêe gerekend, welke pooten, zonder de inleding, uit 5 leden bestaan, aan welker uiterste deel 2 klauwen zitten, zo als aan de andere Scorpioenen. Hy heeft zyn verblyf tusschen allerhande papier, in oude boeken en banden, spleeten, scheuren, reeten van oude gebouwen enz. leevende aldaar van het kleinste gewormte, dat hy met de schaaren grypt, en aan den mond brengt. Zyne koleur heeft veel overeenkomst met de roodachtig-bruine Weegluis, hoewel de 8 *pooten* helderer, en de 2 *Schaarpoeten* schocner rood zyn. De buik bestaat in 11 ringen of afshydingen, daarop volgt de borst, en eindelijk de Kop. Onder de borst hebben

de 8 pooten hunne inleding. Aan den Kop zit, even als by andere Scorpioenen, een *tanggebit*, het welk met haren bezet is. In 't midden van het borststuk zit een paar Oogen, en, zoo men wil, meer anderen aan de zyden van 't zelve, *ald.* 318. Aan zyne schaaren is hy met tedere hairtjes bezet. Hy heeft noch staart noch angel. De *Eieren* zyn wit, en speelen, gelyk de paerlen, in 't groene en blaauwe, *ald.* 319.

Scorpioen, (de Oostindische,) III. 319. enz. schoon hy ook in *Afrika* te vinden is, *ald.* is een der grootste Scorpioenen, nochtans veel kleiner, dan de *Brazilijsche*. Hy heeft aan ieder zyde 4, dus te zamen 8 *pooten*, en van vooren 2 groote *schaaren*. Het *borststuk* is blinkend zwart, en eindigt van vooren met eene inkerving. De *Oogen* staan bykans midden op het borststuk, *ald.* 320. Het *Lyf* is verdeeld in 7 ringen of leden, die blinkend bruin zyn. De eerste dezer leden zyn smal, maar in den omtrek des te grooter; waartegen de achterste veel breeder, maar in den omtrek kleiner zyn, *ald.* 321. Aan 't laatste en tevens langste lid begint de *staart*, uit 6 knoppen of leden bestaande. Derselver koleur is donkerer, dan die van 't lyf, *ald.* 322. De *Angel* dezes Scorpioens is hol, en daaruit vloeit eene vergiftige vochtigheid, *ald.* 323. De *Pooten* draagen de koleur van 't lyf, doch by zommigen zyn ze iets helderer. De *Schaarpoeten* vertoonen zich zwarter van koleur. Deze *pooten*, en zo ook alle de andere, zyn met veele haren bezet, welke men insgelyks aan de leden van den Staart, en op zommige plaatzen van het lyf bespeurt, *ald.* 324.

Scorpioen, (de Surinaamsche,) III. 329. Deszelfs grondverwe is dof bleek-bruin, en

en alle de overige deelen, het laatste lid van den staart, waaraan de Angel zit, benevens de 2 schaaren uitgezonderd, zyn met donkere dwarsstreepen en vlakken besprenkeld. De 2 oogen staan in het midden op de bovenvlakte van het borststuk, *ald.* 329.

Scorpioenen, van deze zegt JONSTON, dat ze onderscheiden worden naar hunne *gestalte, geslacht, grootte, koleur en krachten*; III. 314. en deze verdeeling kan ons beknoptelyk leeren, wat 'er van ouds af, tot op zynen tyd, van de Scorpioenen bekend geweest is; maar, dewyl de berichten der Ouden zeer fabelachtig zyn, zo kan men deze verdeeling geenzins voor de naauwkeurigste opgeeven, *ald.* 315.

Scorpioen-spin, (de zo genaamde) behoort onder geene der 5 Classen der Spinnen, gemerkt zy geene eigenlyke Spin is, en nooit een draad spin; maar ze is veeleer onder het geslacht der Scorpioenen te plaatzen, schoon haar de Scorpioen-staart ontbreekt, III. 139.

Selaam, zie by *Arbe*.

Slakken, ten opzichte van deze is bekend, dat 'er altoos, wanneer ze haare hoornen uitsteeken, een zwart rond kogeltje in beide hoornen van onderen opryft, en zich in 't bovenste toppuntje plaatst. Deze kogeltjes zyn, buiten twyfel, de oogen der slakken; want iers gezien hebbende, of aangeraakt wordende, trekken zy dezelve terstond binnenwaarts, indiervoege, dat ze in elkander krimpen, des zo wel de hoornen, als de oogen op een oogenblik verdwynen. Zonder het uitsteeken der hoornen, en het opryzen der oogen, kruipen ze als in den blinde; maar als ze willen weeten, wat 'er omtrent haar is, dan steeken zy hoornen en oogen na buiten, IV. 26. *aanm.*

Slakken-kreeft, anders ook de *Heremiet*, de *Soldaat*, en de *Wachter* genoemd, III. 302. enz. SWAMMERDAM zegt, dat het huisje, waarin deze slak woont, voor haar eigen huisje gehouden moet worden, het welk zo wel voor haar gegroeid is, als het ook met haar opgroeit, *ald.* 302. Maar, dewyl de Kreeftslakken onderscheiden soorten van huisjes bewoonen, zo oordeelt RÖSEL, dat zulks voltrekt het gevoelen der geenzen begunstigt, die beweeren, dat de Kreeftslakken zich van het eene huisje in het andere begeeven, en 'er hunne woning in neemen; het zy dat ze de eigen inwoners verteeren, of dat ze deze huisjes ledig vinden. Men ontdekt ze toch niet slechts in zodanige slakkenhuisjes, die haar natuurlyk eigen schynen, maar ook in die van Spil- of Schroefflakken; in ronde en glad gedrukte huisjes; als mede in die van de zo genaamde Perspectief-slakken, mitsgaders in verscheide andere, van welke men al te wel bewust is, dat 'er andere diertjes dan Kreeftslakken, in plagten te woonen, *ald.* 303.

Slangetje, (*het madenachtige*.) III. 532. enz. Deze naam is het gegeeven, om dat het in den beginne voor eene *Made* van die soort wierdt gehouden, als die daar muggen of vliegen uit voortkomen. Zyne grootste lengte belooft zelden een halven duim. Zyne dikte is niet altyd eveneens; dewyl het dezelve byna geduurig verandert: onder tusschen is het van achteren iets dunner, dan van vooren; en de beide eindden zyn gansch stomp: voor 't overig is de koleur in 't algemeen flechtwit, *ald.* 532 Dit gansche Slangetje, van vooren af tot aan den stompen staart, schyn uit eene witte, darmachtige

tige, heldere en doorzichtige huid te bestaan; doch de *ingewanden* zyn van een gansch zonderling maakzel: hunne koleur is bleek geel, *ald.* 533.

Slangetjes of Wormen, (beschryving van drieërleij,) welke zich, gelyk de Arm-polyphen, vermeederen, als ze doorge-sneeden worden, III. 522. enz. Delengte van dit Slangetje is anderhalve duim. De *Kop* is 't dikste deel van het diertje, en het daarop volgende lange *lyf* is na genoeg overal even dik, behalve dat de *staart* iets dunner wordt, en meer stomp, dan spits eindigt. De *huid* is gansch helder en doorzichtig; doch hier en daar met enkele korte hairtjes bezet. Dezelve is helder geel, echter het schoonste aan den *kop* en *bals*, alwaar eenige zwarte vlakken zyn. De overige, door het gansche Slangetje heen loopende vlakken, zyn eigenlyk geene vlakken, maar bruine door de huid heen schynende ingewanden, welke zich voor het oog als een om een staf gewonden band vertoonen, *ald.* 524. Zyn voedzel zyn waterlinzen of derzelver wortelen. Aan de onder-vlakte van den *Kop* bespeurd men een klein *wratje*, 't welk het Slangetje nu langer, dan korter maaken, en ook, als het wilde, geheel intrekken kan, en dit is werkelyk deszelfs *mond*, *ald.* 525. Dwars door in 2 stukken gesneeden zyn-de, wierden die stukken tot volmaakte Slangetjes: maar met de staartstukken ging het langzaamer voort, doch die kree-gen ook hunnen *Kop*, en binnen 10 of 11 dagen waren zy zulke volkomen Slangetjes, als de kopstukken; en deze ver-deeling wierdt herhaald, waarop allen even volledig en volmaakt waren, *ald.* 527. enz.

Sloane heeft verscheide *Kevers* beschreeven, II. 21. 27. 31.

Sluip- of Wipper-wesp, (de grootere,) met baar zwart en geel achterlyf, die in veelerleij vlinder-poppen baaren volkomen wasdom bereikt, II. 494. enz. De *Poppen* van deze worden in de ring-rupfen gevonden, *ald.* 494 zynde zulk eene *Pop* tamelyk hard, geelachtig wit van koleur, en langwerpig rond. Het *Wyfje* is aan zyne achteruit steekende leg-pyp te kennen, maar voor het overige komt dit met het *mannetje* in gestalte en koleuren overeen. Het *achterlyf* dezer *Wespen* is byna spilvormig, *ald.* 495. aan de ondervlakte schoon geel, en van boven zwart: maar het *Voorlyf* en de *Kop* hebben in 't geheel eene zwarte koleur. De *Sprieten* zyn lang en ook haivormig: de 6 *Pooten* vertoonen zich oranje-geel; en de 2 *bovenvleugelen* zyn, aan de buitenranden, met een driehoekig zwart vlakje voorzien, doch deze zo wel, als de onderste, vallen by de inle-ding iets in het geele. Als zulk eene wesp een *Spinzel* van ingesponnen *Poppen* ontdekt, kruipt zy over het zelve heen, en de *Pop* wordt van haar met een *Ei* belegd, *ald.* 496. waaruit eene groote witte *Made* voortkomt, die van achteren dik is, van vooren spits toeloop, en een zeer spitzen zwarten *Kop* heeft, *ald.* 495.

Sluip-wesp, (de kleine gezellige,) met het geele achterlyf, welke haare Eieren aan de rupfen legt, benevens baare verandering, II. 490. enz. Het *Wyfje* dezer soorte heeft geene Legpyp; haar *achterlyf* is meestal geel, doch van boven en aan 't einde graauw; waar tegen het *voorlyf* eene blinkende zwarte koleur heeft, en de 6 *Pooten* weder geel zyn. De 2 zeer lange *Sprieten* vertoonen zich haivormig, en de 2 glanzige *bovenvleugels*, waarin verscheide koleu-

ren

ren als een Regenboog speelen, hebben, omtrent het midden van den buitenrand, eene driekantige zwarte vlak, *ald.* 491. De bevruchte Wyfjes leggen hunne *Eiertjes* aan de Rupfen, zo dat die aan de huid en hairen derzelve hangen. De *Maden*, uit deze *Eiertjes* voortkomende, zyn met een zeer spitzen *Kop* voorzien, niet ongelyk aan de spitze eener naalde; ook schynen ze zo hard te wezen; en dus kunnen deze diertjes daar mede de buiten dien reets gatige rupfen-huid te ligter doorbooren; *ald.* 492.

Sluip- of Whipper-wesp, (de kleine zwarte,) die zich, als *Made*, in de groote *Pinnen-rups* met den breeden rugstreep, ontboudt, benevens haare verandering, II. 492. enz. Deze foort van *Wespen* legt haare *Eieren* meest in de groote *Pinnen-rups*, wanneer deze half volwassen is, of voor den tyd haarer laatste veranderinge van huid. De *Maden*, daaruit voortkomende, blyven menigmaal 14 dagen, of zo lang tot dat ze volwassen zyn, in de Rups verbor-gen; maar eindelyk kruipen zy 'er met veelerleie zeldsaame beweegingen uit. Zulk eene *Made* is dan omtrent eenderde van een duim lang; zy is geel van koleur, en met eenige donkere vlakken getekend. Zodanig eene *Made* spint zich in, en weet haar *spinzel*, dat altoos zeer hard, ovaal-rond van gedaante, en zwart-bruin van koleur is, aan een tak of wand zo vast te hechten, dat het noch door de nattigheid los geweekt, noch door een geringen stoot afgeworpen kan worden. In zulk een huisje verandert zy in eene *Pop*, en omtrent 3 weken daarna komt 'er de *Wesp* uit voort, *ald.* 493. Haar gansche *Lyf* is zwart, doch de 6 *Pooten* zyn roodachtig-geel. Haare dunne *Sprieten*, waar-

aan geene kolfjes te bespeuren zyn, draagt ze gemeenlyk om hoog, iets achter overgeboogen. De 2 *bovenvleugels* zyn, aan den bovenrand, van een paar zwarte vlakken voorzien. De *Wyfjes* hebben geene Legpyp, *ald.* 494.

Sluip- of Whipper-wespen, (de zeer kleine, gezellige,) die zich als wormen in de *Poppen der Dagvlinders* ontbouden; II. 485. enz. Deze *Wespen* beleggen de nog zeer weeke, en in dien tyd nog groenachtige *Poppen* met haare *Eieren*, en deze kleeven 'er zo vast aan, dat ze, door de verharding der *Poppen*-huid, niet los geraaken. Wanneer nu deze aan de *Pop* zittende *Maden*, naa een korten tyd, meer voedsel noodig hebben, verlaaten zy de *Eierschaale*, en booren in de *Pop* zelve in. Terstond beginnen ze den *Vlinder*, die 'er in zit, en in een vloeibaar vocht ligt, aan te tasten, en tot hun voedsel te gebruiken, *ald.* 488. Deze kleine *Maden* zyn geelachtig wit, en zonder *Pooten*; doch zy veranderen ook in *Poppen*, die in 't begin de eigenste koleur hebben, maar naderhand donkerer en graauwer worden. Zy maaken geen *Spinzel* om zich heen, gelyk die van andere *Wespen*; want de van haar uitgeteerde *Poppen*-hulze verstrekt haar tot een veilig verblyf, waarin ze buiten alle gevaar kunnen liggen, tot dat ze ryp geworden zyn. Deze rypheid bereiken ze, des zomers, binnen 14 dagen; doch in eene *Pop*, welker rups eerst in den herfst verandert, en waaruit de *Vlinder* eerst in in het voorjaar ter waereld stondt te komen, blyven zy ook den ganschen winter door. Zy leggen haare poppenhuid te gelyk af; byten door het bekleedzel van haare voorige woning heen, en

zwerven rondom dezelve. Deze Sluip- of Wipper-wespen onderscheiden zich van anderen, door 2 hairvormige Sprietten; zy blinken aan het *voor-* en *achterlyf*, gelyk de zo genaamde goude Torren, hebbende die deelen eene schoone groene grondverwe; doch haare 6 *Pooten* zyn oranje-geel, *ald.* 489.

Sneeuw, Rupsen, op den sneeuw gevonden, zie by *Rupsen*.

Snoeper, zo wordt by LINNÆUS de *Vlinder* genoemd, die uit de *gladde schoon geelachtig-groene Rups* voortkomt, IV. 112. *aann.*

Snorbok, zie *Paauwoog-pylleert*.

Snuitkever, die uit den *Hazelnoot-worm* voortkomt. Het *Wyfje* van dezen boort met zyn snuit in eene nog groene en weeke hazelnoot, en weet 'er een Ei zo wél aan te hechten, dat het vast blyve zitten. Hierop komt 'er, naa 14 dagen, een *worm* uit voort. Deze *worm* bereikt, in de volgende maand van *September* of *October*, zyne volkomen grootte, en byt dan door de harde schaal der Noot heen, III. 334. Hy heeft eene helder okergeele, koleur, en overdwars loopende vouwen of plooiën, benevens een blinkende, ronden, bruinrooden *Kop*, achter welken, op den eersten ring, 2 vlakjes van de eigenste koleur staan. De *vuikpooten* ontbreken hem; en hy heeft, in derzelver plaats, op alle de ringen van onderen, ter wederzyde, kleine wratjes; en aan de 3^e eerste zyn 6 korte, naauwlyks zichtbare *klaauwpootjes*. Wanneer hy buiten de noot is, begeeft hy zich terstond in de aarde, en blyft 'er den ganschen winter door, zommigen tot in de volgende maand *Juny*, in de gestalte van worm in liggen, en verandert dan in eene *Pop*. De koleur van deze is

helder Okergeel, en aan het laatste lid ontdekt men 2 korte spitzen, *ald.* 335. In de maand *Augustus* begint hy zyne tedere bekleedzels allengskens af te leggen, maar blyft nog wel 8 dagen in de aarde. Daarna komt hy te voorschyn, in de gedaante van een *Snuitkever*. Deszelfs kleine *Kop*, het *borststuk* en de *vleugeldekkzels* hebben, op hunne rond verheve bovenvlakte, eene geelbruine koleur, en de 6 *Pooten* zyn geelachtig rood. De *Kop* is kogelrond, en met geel-bruine hairen bezet. Dezelve heeft 2 platronde zwarte *Oogen*, en tusschen deze zit voorwaarts de *Snuit* vast. Byna in 't midden van deze snuit hebben de *Sprietten* haare inleding, ieder derzelve bestaat uit 2 deelen. Elk dezer leden is aan het dikste deel met een hairje bezet, en de koleur is helderbruin, *ald.* 336.

Snuitkever der Nagelstruiken, III. 337. enz. De *Worm*, aan den struik van een Nagelbloem gevonden, heeft, wegens zyne schoone koleuren, eene zeer fraaie gedaante. Het gansche *lyf* is, op de ronde *bovenvlakte*, schoon roozenrood, en door het midden van dezelve loopt eene helder-geele linie; waar tegen de *ondervlakte*, zo als de beide zyden en de 20 *Pooten*, blaauwachtig-groen zyn, en de *hals* maakt den *Kop* een helderer ring heeft. Volwassen zynde maakt hy, zonder alvorens in de aarde te kruipen, een geelachtig doorzichtig weefzel. Naa dat hy 8 dagen daarin gelegen heeft, verandert hy in eene *Pop*, wier *bovenvlakte* van het *lyf* schoon carmyn rood is, de *ondervlakte* helder-geel; en de vleugelscheden, benevens de kop, vertoon een fraai blaauwachtig-groen. Naa 10 dagen komt 'er een *Snuitkever* uit te voorschyn, *ald.* 337. Hy heeft eene

geelachtige bruinroode koleur, gelyk aan die der *teugeldekkzelen*, en deze zyn met verheve en verdiepte linien in de lengte doortoogen. Het *balschild* is zwartgroen, in 't midden met een helderder streep; en de 6 *Pooten* vertoonen zich insgelyks zwart-groen, *ald.* 338.

Soldaat, zie *Slakken-kreeft*.

Soorten der bladkevers, haar getal is zo groot, dat ze wel eene byzondere *Classe* konnen uitmaaken, II. 128. De bladkevers onzer landstreek bestaan meendeels uit loutere kleine soorten; waartegen die, in andere waerelddeelen, veel grooter vallen, *ald.* 129.

Soorten der Kevers. Eenige leeven slechts eenige maanden, en worden uit dien hoofde *Maandkevers* genoemd: ook draagen sommigen wel den naam, alleen naar die maand, in welken zy hun Leeven verflyten, als *Mai-kevers*, *Juny-kevers*, en *July-kevers* enz. Daarentegen ontmoet men weer andere Kevers, die zich van 't voorjaar af tot in het najaar vertoonen, en zomtyds wel 3 en meer jaaren leeven; als de *Ros kevers* en de *Goud-kevers*, II. 5. Doch het grootste onderscheid tusschen de soorten der Kevers der *eerste Classe* is, dat ze deels *hoornen* hebben, en deels 'er niet mede begaafd zyn, *ald.* 6.

Spaansche Vaan, zo wordt de *Nachtvlinder*, uit de kleine, zwarte en tegelroode *Beeren-rups* voortkomende, by LINNÆUS genoemd, IV. 131. *aanm.*

Spanmeeter, } de byzondere gang of
Spanrups, } zeldsaame gestalte, waarmede deze soort van Rupsen in het kruipen voorkomt, heeft aanleiding tot deze benoeming gegeven. Andere Rupsen konnen, door behulp der buikpooten, haar lyf gevoegelyk voortschuiven; maar by de *Spanrupsen* is 't in tegendeel

gansch anders gesteld, I. 470. Byaldien eene *Spanrups* kruipen wil, moet ze een gedeelte des lyfs van haare plaats brengen, terwyl het andere gedeelte vast blyft. Dit geschiedt in dezer voege: zy zet zich met de Voorpooten op iets vast, en trekt het achterste deel des lyfs tot kort aan het voorste, en zo moet het middelste gedeelte eene ronde bocht maaken. Daarop zet zich de Rups met de achterpooten elders vast, en verheft het voorlyf; het zelve te gelyk uittrekende, en maakt dus zeer wyde schreden. Vermits nu de gang dezer rups omrent van die natuur is, als wanneer men eene tusschenruimte in de lengte met de hand, door spannen, wil meeten; zo hebben eenigen haar, uit dien hoofde, den naam van *Spanrupsen* of *Span meeters* gegeven, en onder dezen naam is deze soort by de meeste beschryvers der Insecten bekend, *ald.* 471.

Spanrups, (de blaauwachtig-groene, geelgestreepte, en zwart bestippelde,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der derde *Classe*, I. 483. Deze *Rups* wordt voornaamlyk in het begin van *Juny*, wanneer zy haaren grootsten wasdom heeft bereikt, aan de Kruisbezien-struiken gevonden, *ald.* 483. en *aanm.* De langste onder dezelve bezit weinig meer, dan de lengte van een duim. Haar lyf is byna overal even dik. De *Kop* is blinkend groenachtig-bruin van koleur, en met veele tedere zwarte stipjes besprenkeld. De grondverwe van het gansche *Lyf* is blaauwachtig-groen. Ter wederzyde loopt 'er eene helder-geele, breede linie over alle de ringen heen. Boven op den *Rug* ziet men eene enkelvoudige, hair-dunne, donkere linie, die, ter wederzyde, van een dergelyken tederen witten streep

vergezeld gaat. De gansche *buid* is doorgaande met verheven zwarte puntjes versierd, die alle met tedere en korte hairtjes begroeid zyn. De 3 paar *voorpooten* zyn bruin van koleur, en zitten onder de 3 eerste leden. Het zevende lid rust op een paar stompe; *ald.* 484. en het aller laatste lid heeft de zo genaamde *Naschuivers*. Deze *stompe Pooten* zyn zo groen van koleur, als de huid, en desgelyks teder zwart besprenkeld. Wanneer de tyd der veranderinge nadert, verliest deze Rups haare schoone groene koleur, en wordt ganschlyk rood-bruin, behalve op de geele zydevlakken, welke niet zo rood worden, *ald.* 485. en *aanm.* Kort daarna kruipt ze na beneden onder de dorre struikjes, of verbergt zich wel in de losse aarde. Zy omwindt zich met een weinig *Spinzel*, en verandert binnen 2 dagen in eene helder-bruine blinkende *Pop*, die eindelyk gansch donker-bruin wordt. Op zyn hoogst verloopen 18 dagen, of de *Vlinder* komt te voorschyn, *ald.* 485. en *aanm.* De grondverwe van dezen is gemeenlyk bruinachtig-witgrauw. Alle 4 de *Vleugels* zyn, aan den buitenrand, cierlyk en evenrodig uitgeschulpt. Aan den voorsten rand der *bovenvleugels* ziet men 4 donker-bruine vlakken van onderscheide grootte en gedaante: door den donkeren streep, kort aan den rand, loopt eene smalle, heldere kronkellinie, waaraan eenige zwarte punten staan, welker getal doorgaans even is. Daar deze donkere streep in den helderen grond verdwynt, bespeurd men wederom eene zaagswyze, zeer bleeke dwarslinie; terwyl de overige grond met veele bleeke dwarsstreepen en puntjes besprenkeld is. In de *Ondervleugels* ziet men zulke linien niet, als in de bo-

venvleugelen; hoewel ook de buitenrand bruinachtig bezoomd, en met zwart-bruine puntjes of streepjes getekend zy. Het *Lyf* heeft eene dergelyke bruinachtig-helder-grauwe koleur, gelyk de *Vleugels*. De *Oogen* zyn byna gansch wit. De *Sprietten* hebben, in beiderlei geslacht, eene geelachtige koleur. De *Zuiger* is tamelyk lang. De *Pooten* hebben geene al te hairige bovenschakels, en zyn voor 't overige van gedaante, gelyk die van alle Nachtvinders, *ald.* 486.

Spanrups, (de bleek-groene, op de Maluwe of Winter-rooze aazende,) benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der derde Classe, I. 481. enz. Deze *Rups* heeft, in alle trappen des ouderdoms, eenerleie koleur en gestalte. De grootste lengte zal ongeveer 2 duim belopen. De *Kop* is, gelyk het gansche *Lyf*, bleek-groen. Ieder *ring* is met eenige witte puntjes, en van onderen ter zyde met een zwart puntje voorzien. De 3 paar spitze *Voorpooten* zyn geel; waar tegen de 2 paar *Achterpooten* de groene koleur van 't lyf hebben. Uit dezelve ontstaat eene kleine, donker-bruine en blinkende *Pop*, welke 2 korte staartpunten heeft, *ald.* 481. Naa verloop van 3 weken komt daaruit de *Vlinder* te voorschyn. Deszelfs gansche *Lyf* is helder geelachtig bruin, zo als ook de *Kop* en de tedere hairachtige *Sprietten* zyn. De *Oogen* zyn bruin, en de opgerolde *Zuiger* is lang. De buitenrand van alle de 4 *Vleugelen* is doorgaande zeer cierlyk uitgeschulpt, en geel-bruin bezoomd. Hierop volgt binnenwaarts eene witte, smalle, zaagswyze linie, die eene andere dergelyke tegen over zich heeft, en wel indiervoegen, dat de beide spitzen tegen elkander

ko-

komen; terwyl de ruimte tusschen deze linien roodachtig-bruin gevuld is. De koleur der *Pooten* is helder-bruin, *ald.* 482.

Spanrups, (de dikke, byzonder *schoone*,) met 2 na wilde *Geiten-hoornen* gelykende *haaken*, en andere *Pinnen* op den *rug*, benevens *baare* verandering tot in een *Nachtvlinder* der derde *Classe*, I. 504. enz. Deze wordt, in de maand *Juny*, aan den *Spaanschen Vlierboom*, anders *Lilat* of *Syringa* genaamd, gevonden. Haare volkomen lengte belooft iets meer, dan een duim. Het *Lyf* is van achteren tamelyk dik; en de eenigzins kleine *Kop* heeft eene blinkende bruine koleur. De *bovenvlakte* van den *Rug* is, ongeveer tot aan den zesden ring, hoog oranje-geel; en van die zelfde koleur zyn ook de 2 grootste *pinnen*, die na vooren op den *rug* nevens elkander staan. Het overige gedeelte van 't *lyf* heeft, meerendeels, eene uit graauw en roozen-koleur vermengde grondverwe. Op de 2 grootste oranje-geele pinnen volgt een paar verheven witte knoppen, en alsdan ziet men 2 groote achterwaarts gekromde haaken, die naby elkander staan, oranje-geel van koleur zyn, en uit hoofde van 't satsoen by de hoornen van *Geitenbokken* vergeleeken mogen worden, schoon ze op verre na zo hard niet, en op 't gevoel veeleer gansch week zyn, *ald.* 505. Achter deze staan weder 2 witte knoppen. De *ondervlakte* van het *lyf* is meestal bruin, als mede de 3 paar spitze *Voorpooten*; maar de 4 achterste *stompe* zyn iets helderer, en de puntig toeloopende *staartklep* is donker gestreept. By de verandering omspint ze zich met een langwerpig, wydlyftig en zeer teder net, en daarin ligt ze tweevoudig te zamen gekromd,

zo dat de *Kop* na boven staat. Na 4 dagen verandert ze in eene *Pop*, welke zeer dik, van vooren stomp is, en van achteren spits toeloopt. Het spitze deel is van achteren graauw, en heeft ter wederzyde eenen zwarten streep, *ald.* 506. Drie weken daarna komt 'er de *Vlinder* uit voort. Het grootste gedeelte der *Vleugelen*, is eenigzins bleek olyf-groen; doch hunne overige ciernaaden bestaan in de oranje-geele vlakken in de hoeken der *Bovenvleugelen*, de bleeke roozen-roode vlakken en streepen, en de bruine linien en punten in alle 4 de *vleugelen*. De *Sprieten* zyn eenigzins vezelig. De *Eieren* zyn bleek-geel en plat; rond, *ald.* 507.

Spanrups, (de dikke gras-groene en witgestreepte,) benevens *baare* verandering in een *Nachtvlinder* der tweede *Classe*, I. 487. enz. Deze voedt zich met alle kool- en moeskruiden. De *Eieren*, waaruit deze voort van rupsen voortkomen, zyn wel eenigzins geelachtig-groen; maar, eigenlyk gesproken, meer wit, dan groen. Zy blinken, en hebben eene halfronde verwulvede gedaante, welke van onderen, daar ze vast zitten, plat gedrukt is. Van boven in het midden hebben ze een klein knopje, waarin veele voorentjes en ribbetjes, die overdwars teder ingekorven zyn, te zamenloopen. De groene koleur is dezen Rupsen eigen van haare geboorte af aan, en zy behouden dezelve tot aan den tyd haarer veranderinge, zo nochtans dat de eene altoos groener is, dan de andere; want zommige zyn meer graauw en bruinachtig, dan groen *ald.* 487. en *aanm.* Zy groejen zelden langer, dan $1\frac{1}{4}$ duim. De *Kop* dezer rupse is zeer klein, geelachtig-groen van koleur, en heeft ter wederzyde een

zwart puntje, *ald* 488. De gansche *buid* is blinkend, gras-groen van koleur, waarna eenige smalle witte linien bespeurd worden. Ter wederzyde, benevens den buik, ziet men nog 2 diergelijke linien: ook is het gansche *Lyf* alom met korte, tedere hairtjes dunnetjes begroeid, welke uit veele kleine puntjes te voorschyn komen. De spitze en stompe *Pooten* hebben dezelfde groene koleur als het *lyf*. Deze Rups heeft 2 paar *buikpooten* en dus een paar meer, dan alle andere *Spanrupsen*, *ald*. 489. Volwassen, en tot aan den tyd haarer veranderinge gekomen zynde, bespint ze zich in een teder, wit en doorzichtig *spinzel*, het welk langwerpig-rond van gedaante, en niet zeer ruim is, veranderende reeds den volgenden dag in eene *Pop*, welke zich, even naa het afstroopen der rupshuid, met eene schoon groene koleur vertoont, maar binnen weinig uren zwartachtig bruin wordt. Voor aan, ter plaatze van den *Kop*, staat een rond knopje; de vleugelscheden strekken zich ver na beneden over het onderlyf uit; en dit loopt al lengkens zeer spits toe. Binnen 3 weken, bereikt de *Vlinder*, onder deze *Poppe*-maske verborgen, zyne rypheid en behoorlyke gestalte. De buitenrand van zyne 4 *vleugelen* is een weinig of teder uitgeschulpt. De *Ondervleugels* hebben een wit boordzel, en in het zelve slaan zo veele zwarte vlakjes, als 'er randjes te tellen zyn, *ald*. 490. De overige grond, van dit wit boordzel af, tot in het midden des vleugels, is bruinachtig-graauw, en van daar tot aan het lid geelachtig-bruin. De grondverwe van den *bovenvleugel* is roodachtig, en heeft een recht koperachtigen glans. Deszelfs overige ruimte ziet men, hier

en daar, door gekronkelde en geboogen dwarslinien, in 5 of 6 verscheide vakken verdeeld; waar onder eenige met graauwachtige, andere met donkerbruine streepen en vlakken, van allerhande figuur en grootte, verciert zyn. Het *Achterlyf* is van gelyke koleur als de *Ondervleugels*. Op ieder lid van 't zelve ziet men een verheven hairigen wrong, eenigzins donkerer van koleur. De *Pooten* hebben hairige bovenschakels, en zyn bruinachtig graauw van koleur. De *Kop* is met eene rei van kleine vedertjes, op de wyze van een *Paauwen-Kop*, voorzien, *ald*. 491. en daarbenevens een paar blinkende, helder-bruine *Oogen*, met een zwart middelpuntje. De *Sprieten* zyn geelachtig-bruin, en hairvormig. De *Rug* van het voorlyf is met een groot bosje bruinachtige haren verciert. Voor na den *Kop* toe is het voorlyf als met een bruinen halskraag, en deze met een smal, wit boordzel, omgeeven. De *Zuiger* is tamelyk lang, *ald*. 492.

Spanrups, (de dikker groene,) met den rooden ruggestreep, benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der derde Classe, I. 500. enz. Deze is in de maanden *Mai* en *Juny* op de Appelboomen reeds volwassen te vinden. Haare lengte is $\frac{3}{4}$ duim, en haare grondverwe gras-groen; van boven, midden over den rug, loopt 'er, van den kop tot aan den staart, eene smalle, hoogroode streep. De *Kop*, de 6 spitze *voorpooten*, en de 2 paar *stompe*, welke achter aan zitten, hebben eenerleie grondverwe met het *lyf*. By haare veranderinge bewindt ze zich, in een zamengetrokken blad, met een wit *spinzel*, en verandert in eene *Pop*. Het voorlyf van deze is meestal groenachtig, en

en heeft een paar donkere oogvlakjes; het *achtereinde* is geelachtig rood-bruin. Na 14 dagen komt 'er de *nachtvlinder* u't voort, *ald.* 500. Zo wel de breede als smalle donker-grauwe dwarsstrepen, door de 4 *vleugels* loopende, zyn als een zaag uitgetand; stootende het donkere boordzel van dezelve altoos aan eene heldere plaats van den grond, *ald.* 501.

Spanrups, (de dunne bruine,) met witte vlakken op den rug en aan de zyden, benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der derde Classe, III. 22. enz. Deze is, in haare volkomen grootte, zelden meer, dan een duim lang. In de maand *Mai* wordt ze reeds volwassen gevonden, op de Linden, aan de Sleet-doornen, en op de Abeel-ofwitte Popelierboomen, *ald.* 22. en *aann.* Haar onderscheiden kenteken van andere bestaat in 2 op den rug staande vlakken, die op den vierden en vyfden ring te vinden zyn. De *Kop* is bruin-grauw, doch met eenige zwarte stippen versierd: van denzelfen, tot aan het uiterste einde, loopt 'er, wederzyds, eene zwarte linie, welke de bovenvlakte van de onderste afscheidt; en deze vertoont zich als een breede, bleeke, bruin-roode zyde-streep. Eene dergelyke kleur hebben ook de voorste *klaauwpooten*, de beide *stompe* aan 't einde van den buik, en de *staartklep*. De *Rug* is, van achteren af tot aan de grootste roozenvormige vlak, donker-grauwachtig-bruin van kleur, en het daarop volgende gedeelte, tot aan den *Kop*, meer rood-bruin; maar over 't algemeen is deze gansche *bovenvlakte*, met veele langwerpige stippen of kleine streepjes bezaaid, *ald.* 23. Ten tyde haarer veranderinge maakt zy lieft aan bedekte

plaatsen, in hoeken, een hard, styf en doorzichtig *Spinzel*, en wordt eene *Pop*. Deze is blinkend bruin-rood van kleur, en aan haar voorste deel, inzonderheid van onderen, veel donkerer, dan van achteren, en aan het uiterste einde met een staartpunt voorzien. De *bovenvleugels* van den *Vlinder*, daaruit voortkomende, hebben eene bruin-grauwe grondverwe, waarin zeer veele kleine, en ook eenige groote stippen gezien worden. In de *Ondervleugels* bespeurt men hetzelfde; *ald.* 24. en *aann.* hoewel de kleur voor 't oog een weinig helderer zy. De *buitenrand* zo wel van dezen, als van de anderen, is met donkerer franje bezoomd. De *Sprieten* zyn vedervormig en oker-bruin, *ald.* 25.

Spanrups, (de dunne, met verscheide schubachtige vlakken en punten versierde,) benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der derde Classe, I. 508. enz. Deze wordt in de maand *Juny* aan de Nagelbloem-plant gevonden, en haare lengte belooft ruim een duim. Haare grondverwe is witachtig of helder-grauw; door dezelve is, in de lengte, een donkere streep getoogen, en ter wederzyde van dien streep ziet men nog eene bleeke linie. Het middelste gedeelte des *lyfs* is met 5 grauwe, hockige, geschubde dwarsvlakken voorzien, en tusschen deze staan even zo veele oranje-geele. De *Kop* is in het midden verdeeld: de 6 voorste spitze *Pooten* zyn bruin; en de 4 achterste *stompe* helder-grauw, *ald.* 508. Zy bekleedt zich, by haare verandering, met een dun *Spinzel*. Na 5 dagen liggens verandert ze in eene bruinachtig-geele *Pop*; en na 5 weeken komt de *Vlinder* daaruit te voorschyn. Deze

heeft

heeft eene witachtige grondverwe, die zo wel in 't geelachtig-bruine, als in 't graauwe uidoopt. In dezen witachtigen grond ontdekt men eene ontelbaare menigte van zeer tedere, graauwe punten en stippen. Ook zyn 'er in de *Bovenvleugelen* verscheide dezer grootte, hier en daar, verstrooid te zien, doch in de *Ondervleugelen* staat 'er in 't midden, na het lid toe, maar een. Het gansche *Lyf* heeft dezelfde grondverwe der *Vleugelen*: aan den *Kop* zitten 2 zwarte *On-gen*, en by dezelve een paar haarvormige *Sprieten*, *ald.* 509.

Spanrups, (de geelachtig-groene,) der *Pruineboomen*, met den donkeren ruggestreep, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der derde *Classe*, I. 498. enz. Deze wordt in *Juny* of *July* geboren, groeit zeer langzaam, wordt in *September*, op de bladeren der *Pruineboomen*, in haare volkomen grootte gevonden, en is zelden boven $\frac{3}{4}$ duim lang. Haare *Kop* is rond en gansch groen. Het gansche *Lyf* is meer geel, dan groen van grondverwe; en midden over den *Rug* loopt eene tedere, donkere linie. Van achteren heeft ze maar 2 stompe *Pooten*, van dezelfde grondverwe als het *lyf*; maar de 6 spitze *Voorpooten* zyn groen, *ald.* 498. By haare verandering in *September* of *October* kruipt ze in de scheuren der boom-schorse, of ook onder de bladeren op den grond, bekleeden te zich aldaar met een witen doorzichtig *Spinzel*. Binnen ertelyke dagen verandert zy in eene *Pop*, welke zich in het eerst van vooren groen, en van achteren geelachtig-rood vertoont; maar welke koleuren wel haast donkerer worden. Zy is met een teder staartpunt voorzien. Deze *Pop* blyft, gemeenlyk, den winter door, tot in 't

aanstaande voorjaar liggen, en in *Juny* komt 'er de *Nachtvlinder* uit voort. Deszelfs grondverwe is meest al geel bruinachtig-wit. De *Bovenvleugels* zyn, aan den buitenrand, helder-graauw bezoomd, en in deszelfs voorste gedeelte ziet men veele donkere punten. Aan den voorsten rand wordt men eene grootte donker-graauwe vlak gewaar, en na het lid toe staan eenige heldere vlakken nevens elkander, achter welken nog eenige bleeke en tedere dwarsstreepjes te zien zyn, *ald.* 499. De *Ondervleugels* zyn byna evensens overdwars gestreept, en getekend. De *Kip* is bruin; de *Sprieten* zyn, aan beide de geslachten, haarvormig; en op het achterlyf vertoonen zich nog eenige dwarsstreepjes of vlakjes, *ald.* 500.

Spanrups, (de graauwachtig witte,) met den geelen buik en zwarte vlekken op den rug, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der derde *Classe*, I. 476. enz. De *Eiertjes*, waaruit deze soort van rupsen voortkomen, zyn oval-rond, in het begin blinkend stroo-geel, doch veranderen in eene graauw-geele koleur. De *Vlinder* legt deze *Eieren* (meerendeels in *Augustus*,) 8, 12, 16, meer of minder, tuschen de ribben der onderzyde van de *Steek*- of *St. Jans-bezien-bladeren*, doch nooit aan den stam of takken zelve. Na 12 of 14 dagen, gemeenlyk in het begin van *September*, komen de rupsjes, ter grootte van eene linie, te voorschyn, en zyn donker-graauw, en tuschen de ringen iets geelachtig-graauw; maar hebben reeds een zwarten *Kop*, en dergelyke gevlake *Pooten*, *ald.* 476. *aann.* Na 12 dagen vervellen ze voor de eerste maal, en voorts na 12 dagen andermaal, waarop ze de winterkwartieren zoeken, of

of onder het afgefallen loof, of in de scheuren en spleeten der flammen en takken, alwaar ze blyven, tot dat het voorjaar haar weder nieuwe spys verschaffe. Naa dien tyd vervellen ze nog 2 maal, *ald.* 477. *aann.* Haare lengte kan, in den volwassen staat, naauwlyks $1\frac{1}{2}$ duim uitmaaken. De grondverwe dezer rupse is witachtig. Over den ganschen *Rug*, in de lengte, loopt 'er eene rei ongelijk van elkander staande zwarte vlakken. De gansche *Buik* is saffraan-geel, en in deze koleur ziet men, ter wederzyde van het *lyf*, een regel zwarte punten van ongelijke grootte: ook is het *lyf* met weinige, zeer tedere zwarte hairtjes bezet. De 6 spitze *Voorpooten* zyn zwart. Het laatste paar *Pooten*, benevens de *Naschuivers*, zyn van gelyke geele koleur, als de *buik*, *ald.* 477. Ten tyde der veranderinge maakt ze zich aan een blad, flam of wand, met haar achterste lid, door eenige draaden, vast, weeft dan een zeer wydlyftig wit *Spinzel* om zich heen, en wordt eene *Pop*, welke eerst volkomen blinkend-geel is, als of ze verlakt ware; maar kort daarna donkerer wordt, *ald.* 478. en *aann.* Naa omtrent 3 weken, naar maate dat het Weer kouder of warmer is, komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn. De grondverwe van deszelfs *bovenvleugelen* is wit, en daarin zyn vele zwarte vlakken en geele streepen te zien. De grond des *Ondervleugels* is insgelyks wit, doch een weinig graauwachtiger, dan die der *bovenvleugelen*. De buitenrand is ook met zwarte, doch eenigzins bleeker vlakken, bezoomd; van welke vlakken men ook eenige, hier en daar, in den vleugel verstrooid ziet, *ald.* 479. De *Kop* is zwart-bruin, gelyk ook de hairvormige *Sprieten* zyn. Het gansche

Voor- en Achterlyf is saffraan-geel, en over den *rug* met zwarte vlakken verciert, zo dat 'er op het voorlyf 2, en op het achterlyf 6 of 7 geteld worden. De 6 *Pooten* zyn kort aan 't *lyf* geelachtig, en voor 't overige zwart, *ald.* 480. *Spanrups*, (de groote bruinachtig-graauwe,) met den platten *Kop*, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der derde Classe*, I. 501. *erz.* Deze wordt op de Peereboomen gevonden in de maand *Mai*, *ald.* 501. en haare volle lengte maakt volkomen 2 duimen uit. De *Kop* is van vooren gansch vlak en plat, vertoonende een driehoek, in wiens onderste gedeelte de *bek* staat. Het *Lyf* is vol rimpels en vouwen. Door de vermenging van het graauwe, bruine en oker geele, vertoont deze *Rups* de koleur van een dor takje. Boven over den *Kop* is een donkere dwarsstreep, en ter wederzyde zyn een paar golvende dwarsstreepen naar de lengte, door de 3 eerste ringen, getoogen. Op alle de volgende ringen wordt men eenige kleine verheve puntjes gewaar, welke deels helder, deels donker van koleur zyn. De middelste ring heeft, op ieder zyde, in een helderen of graauwen grond, een donker-bruinen dwarsstreep, die in de lengte uitloopt; en dergelyke zyn ook op den *Naschuiver* of laatste ring te zien. Het achterste paar breede, en het volgende paar stompe *Pooten* hebben, zo wel als de 3 paar spitze, eenerleie koleur met het *lyf*, *ald.* 502. By haare verandering maakt zy, onder de beknaagde bladeren, een *Spinzel* om zich heen, en verandert, binnen 8 dagen, in eene *Pop*, wier *achterlyf* schoon blinkend, bruin-rood van koleur is, doch het *voorlyf* donkerer, en meer zwart-bruin, het laatste lid met een staart-

punt voorzien zynde. Naa 14 dagen komt 'er de *Vlinder* uit ter waereld. Deszelfs grondverwe is leder- of stroogeel. In het midden der *Ondervleugels* ziet men een overdwars getoogen donkeren streep, en in het gedeelte, van dezen streep, dat zich tot aan het lid uitstrekt, een teder stip of punt. De *Bovenvleugels* hebben, in het midden, een breeden streep of vlak, die bleekrood, en aan beide de einden donker bezoomd is; in het midden na den voorsten rand laat zich insgelyks een donker punt of vlakje zien. De *boven* en *ondervleugels* hebben, aan den buitenrand, een donkerer zoom of boordzel, dan de grondverwe zelve is. Het hairig *Voorlyf* is donkerer, en schooner van koleur, dan de vleugels, inzonderheid na den Kop toe; doch het *onderlyf* is eenkoleurig met de vleugelen. Diezelfde koleur hebben ook de *Sprieten*, welke min of meer vezelig of vedervormig zyn, *ald.* 503. De *Zuiger* is aan dezen Vlinder naauwlyks te zien, en de *Pooten* zyn, in koleur, van het onderlyf niet te onderscheiden, *ald.* 504.

Spanrups, (de groote, bruine en donker gestreepte,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der derde *Classe*, I. 492. enz. Deze *Rups* wordt op de Wilgen- Vlier- Kwets- Peer- Appel- en Lindeboomen, als mede op het kruidje, hoe langer hoe liever, enz. gevonden, *ald.* 493. *aanm.* De *Eieren*, waaruit deze soort van rupsen voortkomt, zyn langwerpig-rond, in het begin helder-geel, naderhand hoog Oranje-geel, en eindelyk graauwachtig-bruin, zynde zy met donkere streepjes in de groefjes, tusschen de ribbetjes, getekend. De jonge rupsjes zyn naauwlyks 2 linien lang, tamelyk raak van lyf, en deels zwart-

achtig, deels bleek-bruin. Zy verwisfelen ten minsten 4 of 5 maal van huid, en haare grootste lengte is 4 Rhylandsche duimen. De *Kop* is meer plat en breed, dan hoogrond. Het *Lyf* bestaat, gelyk dat van alle Rupsen, in 12 leden, 494. *aanm.* Naa de 3 eerste leden of ringen volgen de 6 spitze *voorpooten*. In het midden van 't lyf is deze Rups, op het einde van den 6den ring, wederzyds, benevens den rug, met merkelyke hoekige deeltjes van knobbels voorzien. De 9de ring is de dikste van allen, en van onderen met 2 stompe buik- of ondersteurings-pooten voorzien. Onder den 12den ring van 't einde bevinde zich de beide *stompe*, en van achteren in 2 spitzen verdeelde *Naschuivers*. De koleuren dezer Rups zyn zeer verscheide; men vindt ze nu donker- dan helder-bruin; nu roodachtig- dan geelachtig-bruin; ook wel gansch graauw van koleur. Haar gansche lyf is, in de lergte, met veele tedere, donkere en golvende streepen en linien verciert, en heeft aan ieder zyde van het lyf een helder wrongachtig boordzel, waarin de 18 naauw zichtbaare Ademgaten te vinden zyn. Zy is gewoon, onder de takken der boomen een neerhangend, en met geknaagde bladeren doormengd, wyd- lustig, doorzichtig *garen-zakje* om zich heen te weeven, waarin ze na 3 of 4 dagen de rupsenhuid afstrookt, en in eene *Pop* verandert. In dit zakje blyft de Pop, met het voorste deel omhoog, 3 à 4 weken hangen, naa verloop van welken tyd de *Vlinder* daaruit te voorschyn komt, *ald.* 459. *aanm.* Deze is in het algemeen bleek-zwavelgeel, van koleur, maar aan de buitenkanten der Vleugelen en aan het voorlyf iets hoog-geeler. De *Ondervleugels* zyn, in

in het midden, aan den buitenkant, met een aardig uirgerond en uitsteekend hoekpunt voorzien, in wiens breedste deel zich een paar gekromde zwarte vlakken bevindt. Door ieder *bovenvleugel* loopen 2 tedere bleek-bruine streepen overdwars, en hy is met veele graauwe, korte en fyne dwarsstreepjes besprenkeld. De *Kop* is boven de *Sprieten* helderbruin; de hairvormige *Sprieten* zyn geel, en zonder vezelen; de *Zuiger* is bruin; de *Oogen* zyn zwart, *ald.* 497. en *aanm.* en de 6 *Pooten* hebben eene bleek-geele koleur, *ald.* 498.

Spanrups, (de kleine ranke en gesclubde,) benevens haare verandering in een *Nachtvlinder der derde Classe*, I. 512. enz. Deze wordt, in de maand *Juny*, aan de *Syringa* met witte bloemen, aan de *Eiken-* en *Boekeboomen* gevonden, bereikt de lengte van omtrent $\frac{3}{4}$ duim, en en zomtyds meer. Haare *Kop* is donker bruin; maar het *Lyf*, dat doorgaande even dik is, heeft eene schoone geel-bruine grondverwe; waarin 3 of 4 spits toeloopende zwarte schubben-streepen te zien zyn; naast dezelve loopt een heldere streep, en ze maaken dus te zamen spitze winkelhoeken uit, *ald.* 512. Na den hals toe ziet men eene groote zwart-bruine vlak schuins rondom het lyf, en van hier af loopt 'er, midden door het overige deel van den *Rug*, een bruine streep, die tot aan den *Kop* reikt; nevens welken zich, ter wederzyde, nog eene andere donkere linie vertoont. De tyd der veranderinge gebooren zynde, wikkelt ze, door middel van ettelyke draaden, eenige bladeren te zamen, en neemt tusschen dezelve wel haast de gedaante der *Poppe* aan. Deze is geel-bruin van koleur, en in stede van een staartpunt ziet men, op haar achterste

lid, veele kleine buigzaame hoogzels of verhevenheden. Na 3 weeken komt daaruit de *Vlinder* ter waereld. Deszelfs grondverwe is groen. De beide *Onder-vleugels* zyn meer hoekig, dan rond; doch alle 4 de *vleugels* hebben alomeen even breedten witten zoom, die in het midden met een regel donkere punten versierd is; en zo zyn 'er ook 2 witte dwarslinien door het midden der vleugelen getoogen, die evenredig met elkaander loopen. Het *Voorlyf* heeft dezelfde groene koleur der vleugelen; doch de leden van 't *Achterlyf*, de 6 *Pooten* en de *Sprieten* zyn meer bruinachtig, *ald.* 513. en *aanm.*

Spanrups, (de ranke, zwart-bruine,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder, behoorende tot de derde Classe*, I. 470. enz. Deze *Rups* houdt zich meestal aan de *Kerse*, *Peere*-, *Appel*-, en *Pruneboomen* op, en bedient zich van derzelver groene bladeren tot spyze, *ald.* 471. De *Eieren*, waaruit deze soot van rupsen voortkomt, zyn groenachtig-bruin van koleur, en langwerpig rond van gedaante. De *Rups* haare volkomen grootte bereikt hebbende, is ongeveer $2\frac{1}{2}$ duim lang. Haar *Lyf* is zeer rank, en bruinachtig-zwart-grauw van koleur. De *Kop* is langwerpig-rond, en in het midden eenigzins verdeeld: voor aan den bruinen *bek* ziet men ook een paar vreetpunten. Het voorste van den hals, of de eerste ring, is rondom met eene rei witachtig-geele puntjes versierd, niet ongelijk aan een paerelschoer. Aan de 3 eerste ringen zitten de 3 paar spitze *Voorpooten* of klauwtjes. Boven op den *Rug* ziet men 3 korte, scherpe, overdwarsstaande uitwassen of hoeken, die op den rug wel bruin zyn, maar ter wederzyde

zich echter oker-geel vertoonen. Onder den eersten dezer uitwassen staat, op ieder zyde, een geel rond puntje, onder den middelsten 2 zodanige puntjes onder elkander, en aan den derden uitwas, maar wat verder na achteren, recht onder het eerste paar der stompe buikpooten, wordt men weder een geel puntje gewaar. Van hier tot aan de kort daarop volgende achterpooten of naschuivers, loopt een oker-geele streep in de lengte langs het onderlyf. Gansch achter aan op den rug ziet men een byzonder paar, naby elkander staande, spitze uitsteekzels, en eindelyk, boven den staartklep, nog een paar, die iets langer zyn, welke zich schuins achterwaarts strekken, *ald. 472*. Wanneer deze Rups den tyd haarer veranderinge bespeurt; dan verwaardigt zy, in een verborgen hoek, eene behuizing, die van lange draaden te zamen gesteld, maar wydluftig gevlochten en doorzichtig is; en naa het afstrooken van de huid, vertoont zich eene aardige blaauw-groenachtig-witte *Pop*, welke rank is, *ald. 473*. wier leden van het achterlyf in een bleek bruinachtig staartpunt eindigen. 'Er verloop byna 6 volle weeken, eer de *Vlinder* uitkomt; maar is de *Pop* een spadeling, dan blyft ze den winter over liggen. De grondverwe des ganschen *Vlinders* is okergeel; doch de *Vleugels* zyn cierlyk geschaakeerd, en met kleine bruine vlakjes en spikkels besprenkeld. Zo wel de *Boven-* als *Ondervleugels* zyn, aan den buitenrand, cierlyk uitgetand; en deze gansche rand is niet alleen met een rood-bruinachtig-geel boordzel bezoomd, maar ook het einde van ieder tand is bruin gevuld. De meeste dezer bruine vlakjes zyn zeer bleek, doch dwars door den bovenvleugel loopt een

rei, en nader na het lid toe nog verscheide reien van vlakjes, die gansch donker bruin zyn. De *Ondervleugel* heeft veele bleeke, maar geene donkere vlakjes, en beide de *vleugels* zyn omtrent het lid wat haitig, *ald. 474*. De *Kop* zo wel, als de beide *baardspitzen* en de *balskraag*, hebben eene dergelyke donker-geele koleur, als die, waarmede de vleugels bezoomd zyn. De *Oogen* en *Sprieten* zyn witachtig; aan het dikke en hairige *Voorlyf*, dat op den rug citroen-geel is, zitten van onderen 6 *Pooten*, welker *bovenschenkels* groenachtig-graauw, en de overige leden geelachtig zyn. Het hairige, ronde en dikke *Achterlyf* is rondom alle de ringen met smalle reepjes bezoomd, *ald. 475*. *Spannrups, (de rood-bruine,) behoorende tot de derde Classe der Nachtvinders, benevens haare verandering in een wyfjes-vlinder zonder vleugelen, III. 80.* Deze wordt, in *Juny*, reeds volwassen gevonden op de Kerseboomen en Linden, en ook menigmaal op den zwarten en witten doornstrik, dienende de bladeren van alle deze gewassen haar ter spyze. Haare grond is bruin-rood, en heeft aan ieder zyde een zwavel-geelen streep, waarin zo veele rood-bruine, uit stippen bestaande, streepjes gezien worden, als 'er ringen of leden zyn, door welke de geele streep heen loopt. Boven op den *Rug* ziet men, tuschen ieder plooi der ringen, een graauwen dwarsstreep, doch de hairvormige *Kop*, de *Naschuivers*, en de beide daar naast zittende *Pooten*, zyn helderder rood, dan de grondverwe des lyfs; dat insgelyks plaats heeft aan de 3 eerste ringen naast den *Kop*, en de daar onderstaande 3 paar *voorpooten*. Haare grootste leng-

lengte is een en een vierde duim. Ten ryde der veranderinge vervaardigt zy in de aarde een ruim verblyf, *ald.* 80. dat ze met eenige draaden omfpint; waarop ze, naa verloop van 8 dagen, in eene *Pop* verandert, die rood-bruin van koleur is, van achteren spits toeloopt, en in een staartpunt eindigt. De *wyffes-vlinder*, daaruit voorkomende, heeft een van vooren en van achteren spits toeloopend, en in het midden wat dikker *Lyf*, 't welk Oker-geel, en op aller ringen met groote en kleine zwarte vlakken bezet is. Even dit, ten aanzien der koleure en der vlakken, ontdekt men aan de 6 *Pooten*, die voor het overige, gelyk de pooten der spinnen, zeer lang en dun zyn. De *Kop* is aan dit Insekt een der kleinste deelen; de *Oogen* zyn zwart; en de okergeele *Sprieten* zyn zwart besprenkeld, *ald.* 81. De beschryving van het *Mannetje*, zie by *Spanrups*, van 't gevlugelde *Mannetje*, enz.

Spanrups, (de schoone, groene, breedlyvige,) met den byzonderen *Kop*, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder* der derde *Classe*, I. 510. enz. Deze wordt, in de maand *Juny*, op de gemeene *Brem* gevonden. By haare volkomen groote beloopt haare lengte niet veel meer, dan een duim. Het gansche *Lyf* is, overal, met eene menigte van verheve witte punjes bezaaid, over haaren *Rug* ziet men een donkere linie loopen, en ter wederzyde van dezelve vertoonen zich nog 2 andere, die veel tederer en helder geelachtig-groen zyn. Voor 't overige heeft zy, zo wel aan de boven-als ondervlakte, eene schoone geel-groene grondverwe. De *Kop* vertoont zich van vooren, als in 2 scherpe spitzen

verdeeld. *ald.* 510. Door middel van eenige witte draaden spint zy zich in, met een dun weefzel, en verandert in eene bleeke en geel-groenachtige *Pop*, wier voorste deelen van het *lyf*, of de vleugelscheden, geeler zyn, dan de achterste leden; en overal is zy met kleine punten besprenkeld. Naa 3 weeken komt 'er de *Vlinder* uit te voorschyn, wiens *lyf*, benevens de *vleugels*, eene bleek-blaauwachtige-groene grondverwe hebben. Deze *vleugels* zyn aan den buitenrand met een iets helderer boordzel, dan de grondverwe, bezoomd, en niet verre van daar ziet men een witten streep, die zo breed is als het boordzel, en overdwars door de vleugelen loopt, *ald.* 511. Achter dezen is eene iets donkerer, doch bleeke gevlamde, dwarslinie door de bovenvleugels getoogen. De 2 *Sprieten* zyn hairvormig, en het *Achterlyf* is tamelyk dik, *ald.* 512.

Spanrups, (de,) van 't gevlugelde *Mannetje*, wiens *Wyffe* vooraf beschreeven is by *Spanrups*, (de rood-bruine,) behoorende tot de derde *Classe* der *Nachtvlinders*, III. 211. Deszelfs *bovenvleugels* hebben 'eene oker-geele grondverwe, en zyn, behalven met veel kleine stippen, ook met eenige breede, donkerbruine vlakken en streepen verciend. De *ondervleugels* daarentegen zyn bleek okergeel, en met veel meer helder-grauwe, tedere stipjes besprenkeld; doch aan den buitenrand hebben zy eene geele bezooming. Het *Achterlyf* is eenigzins helder-geel van koleur; *ald.* 212. en ieder lid of ring pronkt met zwarte langwerpige stippen: maar het *voorlyf* is iets geeler. De *Kop* is nog helderer van koleur, en heeft 2 vedervormige *Sprieten*, *ald.*

213. Na de paaring van het Mannetje met 't Wyfje legt dit zyne *Eieren* in de maand *October*, welke langwerpig rond, en, als de hoender-eieren, aan het eene einde spitzer zyn, dan aan het andere, *ald. 211. aanm.*

Spanrups, (de witachtig bruine, gewaterde, groote,) die met spitzen en knopjes bezet is, of de gemeenlyk zo genoemde *Roos van Jericho*, benevens baare verandering tot in een *Nachtvlinder der derde Classe*, III. 20. enz. Deze, haaren volkomen wasdom bereikt hebbende, is bykans anderhalven duim lang, wordende op de *roozen van Jericho* gevonden, *ald. 20.* Op haar laatste lid ziet men, van boven, 2 spitzen nevens elkander uitsleeken, en op het vierde, van achteren aferekend, staat nog een paar andere. Deze spitzen zyn boven aan witachtig, en voor het overige donker-bruin. De leden, ruffchen deze 2 paar spitzen, zyn van boven met knopjes bezet; en op de overige leden bespeurt men ook diergelyke knopjes, doch niet verder gaande, dan tot den 5den ring van den *Kop* af gerekend, op welken ring die 2 knoppen het grootste zyn. De kleur dezer *rups* is over het algemeen helder-bruin, hoewel de bovenvlakte donkerer zy, dan de onderfte, en de beide zyden. Ten tyde der veranderinge spint zy de bladen van haar voorgaande voeder met witte draaden te zamen, en naa 5 dagen is ze reeds in eene *Pop* veranderd. Het voorlyf, borststuk en de vleugelscheden van deze zyn blinkend zwart bruin, *ald. 21.* doch het rood-bruine *Achterlyf* is nog glanziger, en tusschen deszelfs leden ziet men eenige geelachtig-roode streepjes. Naa 25 dagen komt 'er de *Vlinder* uit voort. Deszelfs grondver-

we is over het geheel bleek- of okergeel van kleur; doch de buitenrand der 4 vleugelen heeft eene breede bruinachtig-graauwe bezooming, welke in de ondervleugelen geheel doorgaat, maar in de bovenvleugelen vooraan verdeeld is, en verdwynt, eer dat ze nog aan den voorsten rand komt. Elke *Vleugel* is met 6 okergeele tandige vlakken versierd. De kleur dezer vlakken is helder, dan die van den middelgrond, en aan den voorsten rand der bovenvleugelen vertoont zich die kleur insgelyks tot in het midden. Het kleine *Voorlyf* is, benevens de *Kop*, ook geel; en aanden *Kop* zit een paar tedere hairvormige *Sprieten*, waatnevens men aan de zyden 2 bruine *Oogen* gewaar wordt. De *Zuiger* is tamelyk lang. Het *Achterlyf* heeft dezelfde bleek-okergeele grondverwe der Vleugelen, *ald. 22.*

Sparske keverije, (het bontgevlakte,) benevens zynen worm en deszelfs verandering, II. 137. enz. De *Worm*, waaruit dit Kevertje voortkomt, wordt in *July* en *Augustus*, zomtyds ook nog later, aan de reeds geschooten *Sparske* gevonden. Volwasfen zynde is hy ruim een derde van een duim lang, en van eene groenachtig-graauwe, of bleekelyf-kleur. Zyne kleine roode *Kop* heeft van vooren eene platte vlakte, welke met een zwart streepje omgeeven is. Hy heeft 6 korte *klaauwpooten*, en 2 bykans onzichtbaare *nafschuivers*. Wanneer hy ter veranderinge wil overgaan, kruipt hy in de aarde, en verandert aldaar, binnen korten tyd, in eene stroo-geele *Pop*, welke van achteren spits toeloopt, en aan welke men, ter wederzyde van den *Kop*, 2 zwarte puntjes ziet. Naa verloop van 3 of 4 weken komt uit de *Poppeschaal* het *Kevertje*

verije te voorschyn. Deszelfs *Kop* en de *Vleugeldeksels* hebben eene groenblikende grondverwe, waarin 6 witte vlakjes gezien worden, derwyze, dat 'er op ieder zyde drie staan. Het *borststuk*, en het onder de vleugeldeksels uitsteekende *achterlyf* zyn rood, *ald.* 137. De iets lange en dunne *Sprieten*, benevens de 6 iedere *pootjes*, zyn zwart. Het Wyfje legt zyne bevruchte *Eiertjes*, die kogelvormig van gedaante zyn, aan het Sparie-gewas, uit welken, naa weinig dagen, de kleine wormen wederom voortkomen, *ald.* 138.

Spiegelpunten, zie *Adembaaling*.

Spiegel-rups, (de kleiner,) zonder *staart* benevens baare verandering tot in een *Nachtrolinder der eerste Classe*, I. 151. enz. Deze wordt, in *July* en *Augustus*, aan het kruid *Gallium*, of de groote soort van onzer Lieve Vrouwe-Beddestroo met witte bloemen, en den Wederik gevonden, *ald.* 151. 152. *aanm.* en *Voorbericht* *. 5. De allergrootste soort, wordt zelden boven de $2\frac{1}{2}$ duim lang. Zy is nooit met zodanig een staartje of hoornje voorzien, als men aan de groote soort doorgaans bevindt; zy heeft, betreffende de eigenschappen, behalve de groote en het hoornje, alles gemeen met de groote *Wynstokrups*. Zie *aldaar*. De kleur der *Poppe* is een weinig anders, dan de kleuren der *Poppe* uit gemelde *Wynstokrups*, *ald.* 152. Haar voorste deel is volkomen zwart, en het achterste donker-bruin. De *Plinder* komt eerst in het voorjaar daaruit te voorschyn. Deze heeft knodsvormige witte *Sprieten*, groene *Oogen*, smalle *Vleugels*, witte *Pooten*, en een spits toeloopend *Achterlyf*. In den *bovenvleugel* ziet men aan den uitgeronden buitenrand een breeden dofroozen-

rooden streep, die aan den binnenkant uitgepunt, en aan den buitenkant iets rooder geboord is. De voorste rand is met een paar helder roozen roode vlakken verciert. Dwars door den vleugel in het midden loopt een paar redere donkere linien, welker tusschenruimte wel olyf-groen, maar iets bruiner, dan de overige grond is. De *Ondervleugels* zyn aan den buitenrand, die insgelyks uitgerond is, bleek roozen-rood geboord; daarop volgt een donker-roode dwarsstreep. Het overige is olyfkoleurig, maar valt na het lid toe geheel in 't donkere. De 4 laatste leden van het *Achterlyf*, mitsgaders de beide zyden van den *buiik*, (in welke laatste men eenige witte vlakjes bespeurt,) en ook het voorste lid van 't lyf, zyn hoog roozen-rood, *ald.* 153. Het *Voorlyf* heeft een met rood bezoomden *halskraag*, die in het midden verdeeld is. De olyf-groene dwarsstreep in den *bovenvleugel* van het mannetje is iets donkerer, en de grondverwe van de *ondervleugels* insgelyks wat zwartachtiger, dan by het Wyfje, *ald.* 154.

Spinnen, (alle) behooren tot die Insecten, welke geene vleugels hebben; de gestalte, waarin zy uit het Ei voortkomen, altoos behouden, zonder ooit daaromtrent te veranderen; die uit haar achterlyf een draad kunnen spinnen, waarmede zy gedeeltelyk allerhande weefzels maaken; en boven dien ook nog 8 *pooten* hebben, welke allen hunne inleding hebben aan 't voorste deel van 't lyf, of aan het borststuk. Ten aanzien van hun gewoonlyk verblyf, kunnen ze in *landen* en *waterspinnen* verdeeld worden, III. 138. Haar *Lyf* is uit 2 deelen te zamen gesteld, te weten het *voorlyf*, dat men ook het *borststuk* zou kunnen noemen,

en het *achterlyf*, dat de buik is. De *Mannerjes*zyn aan hun rank en dun *achterlyf*, zeer licht van de *Wyffjes* te onderscheiden; doch de mannelyke Spinnen krygt men niet zo veel te zien als de vrouwelyke, IV. 192. *aanm.* Aan het einde van haar *Spinzel* vervaardigen zy nog eene kleine Celle, waarin ze zich, by den nacht of windig weer, of als het regent, begeeven. Daarentegen zyn 'er ook onder de Spinnen, die een radvormig net maken, eenige soorten, die alleen by nacht in het zelve zitten, en op haaren roof loeren; maar zich by den dag in haare Cellen begeeven. Zelfs heeft men eene soort van *Kruisspinnen*, die, buiten haar net, van boven, onder een verdek, een hinderlaag bouwen, waarin ze zitten te loeren op de *Muggen*, die het ongeluk hebben, van in haar net te vallen, IV. 193 *aanm.* Byna de meeste Spinnen hebben, van haar uitkomen uit het Ei af, tot op haare volkomen en ter voortplantinge van haar geslacht vereischte grootte, een tyd van meer dan een jaar noodig. Alle bekende soorten van Spinnen teelen haar geslacht door *Eieren* voort. Deze *Eieren* der meeste soorten van Spinnen zyn kogelrond; hebben meer eene weeke doorzichtige huid, dan eene harde schaal; en de koleur is, naar de onderscheidene soorten, verschillend: eenige zyn wit; andere geel, weer andere groenachtig, roodachtig, helder blaauwachtig, en ook nog wel anders gekoleurd. Van eenige Spinnen worden de *Eieren* reeds in 't begin van 't voorjaar, van anderen nog voor het einde van 't zelve, en wederom van anderen in den zomer, of in den herfst gelegd. Uit de eerste komen de jonge Spinnen, gemeenlyk, nog in dat jaar, waarin de *Eieren* gelegd zyn, in

de zomermaanden te voorschyn; doch de laatste blijven meerendeels den winter door liggen, en de daarin zynde jonge Spinnen worden eerst in het volgende voorjaar gebooren. De Spinnen vervellen menigmaal, eer zy haare volle grootte bereikt hebben, *ald.* 194. *aanm.* leggende, van alle haare uitwendige deelen, de geheele huid af, waarvan zelfs de hoornagtige vangtangen niet uitgezonderd zyn. En haare koleur is, naa de afgelegde vervelling, niet altyd zo, als voor dezelve; dikwyls ondergaat zy zeer veel verandering, *ald.* 195. *aanm.* *Spinnen*, (classen der,) zie *Classen der Spinnen*, en *Classen der Landspinnen*. *Spinnesteen*, geeft men dien naam, om dat men 'er afdrukzels van Spinnen op meende te vinden, III. 515. Ook heeft hunne gestalte eenige overeenkomst met die der Spinnen, als 'er de kop en pooten afgetrokken zyn. WALLERIUS noemt ze *Alvroitas*, en zegt, dat men die soort van steenen *Spinnesteen* noemt, om dat ze met hunne sterren, even als de Spinnen op den buik, vlaklig zyn. Ze worden ook *Arachnites* of *Arachneolithi* genoemd, en zyn werklyk steenen. Eenvoudige menschen gelooven, dat dezelve ontstaan, uit het opsluiten eener Kruisspinne, die men 7 jaaren lang bewaart; en meenen, dat die nuttig en dienstig zouden zyn tegen het zogenaamde vergif der Spinnen, IV. 200. 201. *Sprieten*, de Heer Dr. *Sulzer* is van gedachten, dat mogelyk de *Sprieten* of zo genoemde *Voelhoornen*, het zelfde by de Insecten verrichten, het geen anders de Ooren by andere schepzelen doen; en dus de Ooren of gehoortuigen dezer schepzelen zyn: vermits hy vermoedt, dat derzelve innerlyke gesteltenis wel ligt overeenkomen mogt met

met de gesteltenis der werktuigen des gehoors by anderen, I. 466. *aanm.* Voor 't overige schynen deze *Sprieten* den Vliender ook van veel dienst te zyn, om hun lichaam in het vliegen in evenwicht te houden, *ald. aanm.*

Springklaan, volgens *Frisch* heeft de Hoegd. naam *Heuschbrack* (of *Springkbaan* by de *Hollanders*.) zyn oorsprong van het woord *Heu* (*Hooi*) en van *Schrecken*, dat voor dezen zo veel als *schryden*, *springen*, *buppelen*, enz. beduidde, II. 253. Doch de *Larynsche* naam *Licustia*, beduidt, volgens de meening van zommigen, zo veel als eene verzengde plaats, doordien de *Springkhaanen* de landen en velden, daar ze komen, dermaate kaal vreeten, dat ze 'er uitzien, als of ze afgebrand waren: en anderen willen den oorsprong dezes naams afleiden van *loquendo*, *praaten* of *babbelen*. De naam van *Springkbaan*, zegt de Schryver van het *Kort begrip van de historie der Insecten*, pag. 87. komt van het woord *springen* gelyk dezelve in het *Fransch*, om die zelve reden, ook *Sauterelle* heeten, van *Sauter*, en in het *Itaalaansch* *Salterella*, van het *Larynsche* woord *Salta-re*, welk insgelyks *dansen*, *springen* betekent, *ald. 254. aanm.*

Springkbaan, (*beschryving van een buizengemeen schoonen*.) II. 303. enz. Deszelfs lengte beloopt ruim 2 duimen. Hy is zeer schoon, blinkend, karmynen koraal-rood van kleur. Aan den *Kop* heeft hy een byzonder opgeworpen kruinslepje, aan 't welke de beide niet zeer lange *Sprieten* zitten. De daar achter staande blinkende *Oogen* zyn ovaal-rond, *ald. 303.* en verheven. Van voren op den *bals* is eene groote, ronde verhooging, en het overig gedeelte van

den hals, mitsgaders het *balschild* of de *kraag* is met veele groote en kleine knopjes, nevens verscheide ingedrukte punten, zeer cierlyk bezet. De kleur van 't halschild en van den hals is niet zo helder rood, als die van den *Kop*, waar tegen zy met een schoonen karmyn-glans pronken. De *vleugeldeksels* zyn weder donkerer, en de verheven aderen, die 'er over heen loopen, schynen uit louter blinkende punten zamengesteld te wezen. Het *achterlyf* is ook donkerer van kleur, dan de *Kop*; en het *voorlyf* schynt met den *Kop* eene evengelyke helder-roode kleur te hebben. De 6 *Pooten* hebben, insgelyks, eene schoon-roode kleur, hoewel de *bovenschenkels* iets donkerer zyn, dan de overige leden. Het knielid aan de *springpooten* is zwart, en het daarop volgende dunne, lange lid, aan 't einde, by het gewricht van den voet, heeft een zwarten zoom; waar ter plaatze ook eenige stekelspitzen gezien worden, doch welke niet zeer lang zyn, *ald. 304.*

Springkbaan, (*beschryving van een grooter, doch niet volwassen*.) II. 305. enz. Deszelfs *Kop* gelykt niet alleen na een Paardenkop, maar het gebit komt ook tamelyk overeen met eene Muilkorf; ook heeft de hoog gekromde *bals* veele overeenkomst met den maanenhal van een paard. De achterkant der langste en dunne deelen van de 2 *springpooten* is met 2 reien grove spitzen bezet, en de breede en dikke *bovenschenkels* dezer *Pooten* vindt men, zo wel van boven, als van onderen, met breede uitgeholde spitzen voorzien. De overige 2 paar *pooten* zyn veel korter en dunner. Het *achterlyf* is voorwaarts redelyk dik, maar loopt na agteren, allengskens dunner af, en heeft eene korte legpyp. De *bals* en

't voorlyf zyn met veele kleine en groote wrattenvormige hoogtens en dieptens verciërd. Deszelfs grondverwe is geelachtig-groen, *ald.* 306. Op ieder zyde van het achterlyf is eene ovaale roodbruine vlak te zien, en dergelyk eene koleur hebben ook de verheven ovaalronde *Oogen*, *ald.* 307.

Springkhaan, (beschryving van een nog jongen en onvolwasjen,) II. 307. enz. Aan dezen ontdekt men geen het minste teken van vleugelscheden, en zo zou hy nog 2 maal van huid hebben moeten veranderen, om zyne volkomen grootte te verkrygen, *ald.* 307. De algemeene grondverwe van dezen Springkhaan is oker-geel; doch aan het *achterlyf* vindt men dezelve iets bleeker of helderer, dan aan de overigen. Door dit *achterlyf* loopen, naar de lengte, 3 breedte en donker-bruine streepen, waarvan de eerste boven over het midden van den rug gaat, en 3 reien zwart-bruine spitzen heeft, welker middelste rei de grootste is. De *Kop* is aan deze soort meer rond, dan langwerpig, en zo zyn ook de *Oogen*, die voor 't overige nevens de *Sprieten*, en 't werktuig des gebits, eenerleie koleur hebben. Het dunne en langste deel der *Springpooten* is met 2 reien van vry groote steekelspitzen voorzien. Aan 't middelste paar *Pooten*, en derzelve tweede lid, zitten van boven 2, en van onderen ertelyke kleiner spitzen; welke laatsten ook aan de voorpooten te zien zyn, *ald.* 308.

Springkhaan, (de in het gras leevende groote,) nevens zyne voortplanting en overige eigenschappen, II. 313. enz. Deze is, in de maand *July*, in zyn volwassen staat, in de weiden te vinden, *ald.* 313. Van dien tyd tot in *September*, is hy gewoon zyn geslacht voort te

planten. De koleur is meerendeels groenrosachtig, en bruin; hoewel 'er hier en daar, voornaamlyk in de bovenvleugelen, eenige iets donkerer, zo wel groene en bruine, als zwarte vlakken te zien zyn. Voor 't overige vindt men 'er nog eenige andere van die soort, welke nu van deze, dan van geene grondverwe meer of minder hebben, en dus eene plaats tusschen deze verdienen; doch buiten dat zyn ze, van uiterlyke gestalte en maakzel, volkomen aan elkander gelyk. De langwerpig ronde *Kop*, die van vooren met een opgeworpen bult voorzien, en zeer hard is, vertoont ter wederzyde een tamelyk groot, langwerpig-rond, zwart-bruin *Oog*. Boven het zelve ziet men, ter wederzyde, een helder-bruinen wortel of hoogte der 2 tedere of dunne *Sprieten*, wier lengte zo groot is, dat zy, als ze de Springkhaan achter over op den rug nederlegt, byna het einde der Vleugelen bereiken, *ald.* 314. De *Bek* is gemeenlyk vleeschverwig van koleur. Het harde en styve *balschild*, is van boven byna gansch plat, en van achteren toegerond. Onder het zelve is de inleding van 't voorste en kortste paar *Pooten*, aan 't eerste lid van 't voorlyf; aan 't tweede lid van 't lyf zit het middelste paar *pooten*, het welk iets langer is. Aan het daarop volgend derde lid hebben de 2 tamelyk lange en dikke *springpooten* hunne inleding, aan welken de bovenste schenkel het dikste deel is, *ald.* 315. Deze Springkhaan heeft 4 vleugelen, die alle gezamenlyk hunne inleding naby het halschild hebben. De bovenste gaan over het achterlyf heen, en voegen zich van boven zo zonderling te zamen, dat ze aan het halschild eene breede bovenvlakte formeerren. Het *mannetje* is meerendeels groen; het

het bovendeel der *Vleugelen* heeft eene bruine verwe; aan beide de zyden ziet men 'er eenige donkere vlakken in, en de aderen zyn geel. Het dunste en langste deel der *Springpooten* is, gelyk het buitenste van alle zes, bruin-rood. Het *Wyfje* is over het gansche *lyf* en de 6 *pooten* meer donker-purper-rood, ook ziet men van deze koleur iets aan den kop en 't halschild, waartegen de *vleugels* meestal roodachtig-geel zyn, en 't overige groen is, *ald.* 316. Het trillende geluid, 't welk men in de maand *July* dikwyls op de velden hoort, komt alleen van de *mannetjes* voort. Het werktuig, waarvan ze zich ten dezen einde bedienen, bestaat in hunne beide *bovenvleugelen*, welke zy tegen elkander wryven, *ald.* 317. Daar door lokt het een insgelyks brontlig wyfje tot zich, en dit, dat insgelyks lust tot paaren heeft, klimt terstond boven op het zelve, en blyft alsdan stil zitten: hierop grypt het mannetje het wyfje met zyne tang by de legpyp, trekt het kort aan zyn *lyf*, en houdt het zo lang vast, tot dat alles, wat ter paaring vereischt wordt, gedaan is. Op deze wyze gaat de bevruchting toe, *ald.* 316. Het *Wyfje* legt vervolgens zo veele *Eieren*, als 'er bevrucht zyn geworden, in het gras, waartoe het zich van zyne legpyp zeer wel weet te bedienen. Deze *Eieren* zyn in het begin witachtig-graauw, en langwerpig van gestalte, en blyven van den herfst af, den ganschen winter door, in de aarde liggen zonder eenig nadeel, *ald.* 319. en daaruit komen, in het voorjaar, de jonge *Springkhaanen*, in hunne volkome gestalte, te voorschyn, behalve dat ze nog geene vleugels hebben, *ald.* 320.

Springkbaan, (de groote,) die zich op

de boomen en in de boschen ontboudt, nevens zyne voorttceling en overige eigenschappen, II. 328. Hy bereikt zyne volkomen groote reeds in *July*, en blyft tot laat in den Herfst in 't leeven. Deszelfs *ondervleugels* zyn geheel doortichtig, met veele grove, naar de lengte loopende aderen doortoogen, en tuschen dezelve met ontelbaare andere dwars-aderen doorweeven. Daarenboven zyn ze als een Waajer gevouwen, *ald.* 329. en ploojen zich ook even zo re zamen. Het *Wyfje* heeft eene lange legpyp, en 't *mannetje* is, aan 't uiterste einde, met eene gryp- of nypaang voorzien, *ald.* 330. Deze groote *Boom-springkbaan* heeft meerendeels eene schoone geelachtig-groene koleur; doch de 6 *Pooten* zyn meestal geeler, dan de overige grond. De blinkende *Oogen* vindt men by de meesten helder groenachtig, en zelden bruin; terwyl alleenlyk de lange en dunne *Sprieten*, benevens de spitzen der 6 *pooten*, en de uiterste voet met zyn haakvormigen klaauw, bruin zyn. De bovenschenkels der lange *Springpooten* zyn rank en dun, *ald.* 331. Zyn voedsel bestaat in de bladeren van verscheide boomen. Wanneer 't bevruchte *Wyfje* zich van zyne rype *Eieren* wil ontlasten; dan legt het dezelve onder de boomen in de aarde. Deze *Eieren*, naast aan de rypheid zynde, zyn zwart bruin; maar, zo dra zy in 'de vrye lucht komen, worden ze wit-graauw. Zy blyven den ganschen winter door in de aarde verborgen liggen, tot in de maand *Mai*, of ook wel laater, wanneer de jonge *Springkhaanen* daaruit te voorschyn komen. In dien tyd zyn ze alrede schoon-gras-groen, van koleur, en moeten zich zo lang met loof en gras geneeren, tot dat ze, benevens

de behoorelyke groote, ook vleugels gekreegen hebben, *ald.* 332. Als ze ten derden maale van huid veranderen, komen de vleugelscheden niet alleen te voorschyn; maar men kan 'er ook het voornaamste kenteken der Wyfjes, naamlyk de legpyp, aan gewaar worden. Als de laatste verandering geschieden zal, zet hy zich aan een vry staand spruijtje of takje vast, en strookt vervolgens de reeds geborsten huid af, waarop de vleugels snel beginnen te groejen, zo dat zy, op zyn hoogst, binnen het halve uur, hunne volkomen groote, kleur en hardigheid bereiken. *ald.* 333.

Springkbaanen, (een der grootste Indiaansche,) II. 281. Zyne lengte, van den Kop tot aan het achterste einde van 't lyf, beloopt wel $4\frac{1}{2}$ duim. De *bovenvleugels* zyn, in vergelyking by de andere, wat smal, en hebben eene okergeele grondverwe, welke met veele dobbelsteenachtige bleek-groene vlakken van verschillende groote, onordentelyk besprenkeld is. Van de plaats der inledinge af loopen, door de *vleugels*, 3 dikke okergeele aderen, tusschen welke nog veele andere diergelyke adertjes te zien zyn. De *ondervleugels* kunnen zich, door middel van hunne aderen, gelyk een Waajer toevouwen, *ald.* 283. Hunne grondverwe is ook wel bleek okergeel; doch men ziet deze kleur, in 't midden der vleugelen, op zyn duidelykft, alwaar ze zo veel als een dwarsstrep uitmaakt; vervolgens wordt ze, na het lid toe, door eene schoone blaauwachtig-groene kleur, waarmede een tamelyk gedcelte des vleugels verciërd is, verdorkerd. De buitenste rand is bruin, maar wordt allengskens helderer. De middelste geele grond is met groene en langwerpig-vierkante vlakjes overdwars

bezet, hoedanige vlakjes ook in 't groene deel gezien worden. De *Kop* is niet anders gesteld, dandie der Springkbaanen van onze gewesten. De grondverwe van dien heeft eene roodachtig-bruine kleur; de *bek* is iets donkerer; de *Oogen* zyn blinkend rood-bruin, en de *Sprieten* okergeel. De *bals* draagt van boven eene verdeelde scherp oploopende verhooging; bykans overeenkomende met een haanekam. Deszelfs kleur is byna oranjegeel, en hier en daar zyn 'er veele ingedrukte punten op te bespeuren. Achter dezen hals vertoont zich een breed en toegespijft *Ruggeschild*, dat niet kwalyk na eene Monnikskap gelykt: ook heeft het by zyne oker-bruine grondverwe nog grooter en dieper ingedrukte punten, dan de *bals*. Het *Voorlyf* heeft eene zwartachtig groenen glans, *ald.* 284. en het roode *Achterlyf* is in 9 of 10 ringen verdeeld, ziende men by ieder afdeling een breed den zwarten streep, als of dezelve met een zwarten band bezoomd ware. Het achterste lid is met eenige gekromde spitzen voorzien, wier kleur donkerer is, dan de roodachtige grondverwe der overige deelen van dit achterlyf. De *Pooten* hebben wel gezamenlyk eene schoone, heldere, koraal-roode kleur; maar nochtans valt het achterste paar, wegens deszelfs byzondere cieraaden, meest in het oog. Men ziet naamlyk op de buitenste vlakke der *bovenschenkelen* dezer achterpooten, schoone helder-geele vlakken, welke twee aan twee in eene goede orde staan, en allengskens in grootte verminderen, tot dat zy eindelyk, omtrent het knielid, geheel teniet gaan. By dit lid hebben de schenkels eene zwarte bezooming. De *achtervlakke der Springpooten* is met 2 reien scherpe

pe spitz bezet, en aan het einde zitten van vooren nog eenige zodanige steekelspitzten, die iets langer zyn; en daarop volgt de *voet*, welke uit 3 korte leden bestaat; *ald.* 285. waarvan het laatste lid, aan 't einde, een paar na beneden gekromde, haakvormige, scherpe klauwen heeft, met welken ook de overige pooten voorzien zyn, *ald.* 286.

Springkhaan, met roozenverwige onder-vleugelen, II. 394. enz. Deze soort wordt in begroeide landstreeken gevonden. De *onder-vleugels* zyn schoon-roozenverwig, hoewel zy aan den buienkant iets in het bruine vallen. Eene dergelyke koleur heeft ook doorgaans het dunne en lange deel der *Pooten*; waar tegen de dikke *bovenschenkels* eene bruin-gesprende verwe hebben: en het *voor-* en *achterlyf* is insgelyks bruin. De smalle *bovenvleugels* vertoonen een geelachtigen grond, die met donkere vlakken besprenkeld is, *ald.* 394. en door dezelve ziet men in de lengte een geelen streep getoogen. Het *Mannetje* is iets kleiner, dan het *Wyfje*, *ald.* 395.

Springkhaan, met schoone blaauwachtig-groene onder-vleugelen, II. 393. enz. Deze wordt gemeenlyk op dorre velden en schraale akkers gevonden, alwaar een zandige grond is, die weinig gras of andere kruiden voortbrengt. Deszelfs *onder-vleugels* zyn, rot over de helft, schoon blaauwachtig-groen, doch hebben van vooren eene breede zwartachtige bezooming; maar de buitenste hoekpunt is helder en doorzigtig. De smalle *bovenvleugels* hebben eene helder-graauwachtige grondverwe, die nochtans, veeltids, aan anderen dezer soorte bleek oker-geel is. In ieder dezer dekvleugelen, ziet men, gemeenlyk, 3 groote bruine vlakken, die 'er dwars

doorloopen, en waarvan die geene, welke aan de inleding staat, altoos de donkerste en grootste is. De *Kop* benevens de *balskraag* is bruin-graauw; het *achterlyf* heeft eene donkere oker-bruine verwe; de *Springpooten* zyn weder iets helderer, en hun dunne langste deel is, aan de achterhelft even zo groen, als de *onder-vleugels*. Deze groene *onder-vleugels* zyn het kenteken, waar door men die soort van de andere kan onderscheiden, *ald.* 393.

Springkhaan, (Surinaamsche,) II. 271. Dezen heeft Juffr. MERIAN beschreeven, die uit een worm zou voortkomen. Deze worm veranderde in eene bruine blaas, en zou verder, volgens het zeggen der inwoners, de gestalten van het door haar afgebeelde groene diertje aanneemen, dat allengskens, gelyk een vliegende Springkhaan, vleugels kreeg; *ald.* 271. doch haar gezegde komt niet alleen zeer onwaarschynlyk voor; maar ook is dit *Surinaamsch* Insect voor geen Springkhaan te houden, *ald.* 272.

Springkbaanen, (Classen der,) zie *Classen der Springkbaanen*.

Springkbaanen, de kleinste soort der Springkbaanen dezer landen, II. 387. Deze stemmen, ten aanzien hunner gedaante, met de grooter soorten volkomen overeen, en behooren tot die geene, welker wyfjes geene legpyp, en geene lange sprieten hebben. Deze, anders elkander zo gelyk zynde schepzelen, zyn nochtans in koleur zeer verschillende. Sommigen zyn gansch rozenkoleurig; anderen zyn deels groen, deels geel; wederom anderen hebben eene bruinachtige grondverwe: doch, by 't verwisselen van huid, veranderen zy niet van koleur, *ald.* 387. Het *achterlyf* is roodachtig, terwyl de overige deelen schoon

ſchoon-groen zyn: de *ondervleugels* zyn groenachtig-graauw en doorzichtig, maar alle de overige deelen zien 'er meest bruinachtig uit. Zy hebben meerendeels hun verblyf op de akkers en in de weiden, *ald.* 388.

Springkhaanen, een iets grooter ſlach, welker wyfjes geene legpyp hebben, II. 388. Deze zyn wel groen van koleur, maar verſcheiden zyn ook zo wel geel, als bruin of roodachtig; en den zodanigen ontbreekt het deſgelyks niet aan onderſcheide vlakken en cieraaden, welke zich nu dus, dan anders vertoonen, *ald.* 388.

Springkbaanen, eene andere kleine ſoort; welker wyfjes eene legpyp hebben, II. 389. enz. Deze ſoort kan niet zo ligt gevonden worden op de akkers en weiden, als wel op de met gras bewaſſen plaatzen in de Boſchen en op beſchaduwde Heiden. Men kan ze, behalven aan de legpyp der wyfjes, van de andere ſoort onderſcheiden, zo wel door hare lange en dunne Springpooten, als door de hair-dunne en lange Sprieten, *ald.* 389. De *kop*, het *borſtſtuk* en de *vleugeldekzels* zyn bruin. De dikke *bovenſchenkels* der Springpooten zyn okergeel; en het *achterlyf*, benevens het dunne en langſte deel der Springpooten valt in het rozenkoleurige en groene. Andere dergelyke Springkbaanen zyn gansch groen; en wederom andere hebben ſchoone roode *pooten* en vlakken. Het Mannetje dezer ſoorte heeft aan zyne *bovenvleugelen*, waarmede hy 't muziek moet maaken, ter plaatze hunner inledinge, meer kromte, en grover aderen, dan het wyfje, *ald.* 390.

Springkbaanen, (*verſcheide buitenlandſche*,) II. 367. enz. zynde een ſchoone, en byzonder *vremde*, met *bladerachtige*

vleugelen, en een dubbelen *Halskam*; *ald.* 369. enz. een byzonder ſoort van *Springkhaanen*, met een enkelvoudigen, verbeven en zaagvormigen *kam*, *ald.* 371. enz. een wel kleiner, maar veel byzonderer *Springkhaan*; *ald.* 372. enz. een ſchoone groote *Springkhaan*, met een rood geknopt *borſtſtuk*, en groen gevlakte *vleugelen*; *ald.* 375. enz. een gansch byzondere, kleine, ſtroo-geele *Springkhaan*, met lange *vleugelen*, en eene zwarte vlakte voor aan den *Kop*; *ald.* 377. enz. eene andere ſoort, van eene okergeele en bruine koleur, *ald.* 378. enz. twee gantsch byzondere, zeer lange en magere, die niet kwalyk na een *berkenrys* gelyken, *ald.* 384. enz.

Springkbaanen, (*beſchryving van tweeërleie*,) dezer landen, waarvan de een groenachtig, en de andere blaauwachtig *ondervleugels* heeft, II. 397. enz. Deze kommen onder de middelſoorten geteld worden; doch eigenlyk behooren ze onder dat ſlach van *Springkhaanen*, die korte *ſprieten*, en welker wyfjes geene legpyp hebben. De eene ſoort pronkt doorgaans met roode, geele, groene en bruine koleuren, en wordt zo wel in de boſchen als velden op groen bewaſſen plaatzen gevonden. Hare *Springpooten* zyn tamelyk lang, en derzelver dunne en lange beendeel is gansch geel, maar de *bovenſchenkels* zyn ſchoon rood geſchakeerd; waartegen de overige 4 korter *pooten* meer in 't groenachtig-geele vallen. Het *voorlyf* valt uit het roode in 't geele, en by zommigen is 't volkomen groen, gelyk de *kop*, die hier geelachtig-groen uitvalt, en wiens *Oogen*, *Sprieten* en *Vreſſpitzen* zich bruin vertoonen. De *bovenvlakte* van het *borſtſtuk* en van den *kop* wordt by

zommigen schoon-rood-bruin, by anderen iets groenachtig bevonden, *ald.* 398. Het *achterlyf* heeft gemeenlyk eene bruine grondverwe, de *Ondervleugels* hebben tweërleie kleur; want de achterste helft is bleek groenachtig-geel, en de voorste bleek bruinachtig. De *bovenvleugels* zyn bruin met geele streepen, *ald.* 399. De andere soort van Springkhaanen, welke, door haare bleek blaauwe *ondervleugels*, van anderen onderscheiden is, onthoudt zich meer op onbebouwde velden en plaatsen dan op weiden en andere begroeide landen. De blaauwachtige *ondervleugels* zyn hier aan hunne binne-helft donkerer, dan na den voorsten rand toe, alwaar het blaauwe eindelyk bykans te niet loopt. Het *achterlyf* is doorgaande meer donker-groen, welke kleur ook aan het dunne en lange beendeel der *Springpooten* te zien is; waar tegen derzelver dikke *bovenschenkels* oker-bruin zyn. De finale *Bovenvleugels* vertoonen zich aan 't einde insgelyks groenachtig; maar worden, by hunne inleding, rood-bruin, en in dit rood-bruine ontdekt men eenige donkere aderen en vlakken. Het *balschild* is van 's gelyke rood-bruin, en de *kop* daarentegen groen; doch de *Oogen* en *Sprieten* zyn bruin. Dergelyk eene kleur hebben ook de 4 overige *pooten* aan de *bovenschenkels*, schoon de ondercinden meerendeels groen zyn, *ald.* 399.

Springrupsje, (*het groene*,) op de *bop aazende*, benevens deszelfs verandering tot in een *Nachtvlinder der vierde Classe*, I. 531. enz. Dit vindt men in *July* en *Augustus*, niet alleen op de hop, maar ook op andere gewassen. Nog op het blad zittende, en aangeraakt wordende, trachten zy, door eene sprin-

gende beweeging, van 't eene blad op 't andere te komen. Onder het méermaals veranderen van huid, bereikt het de lengte van ongeveer $\frac{1}{2}$ duim. Het heeft een rank *lyf*, dat na achteren allengskens dunner wordt, en groen van kleur is. De *Kop* vertoont zich helder-bruin. Van onderen langs het *lyf* loopt, ter wederzyde een witte streep in de lengte; en tusschen de ringen ziet men, in ieder inkerving, overdwars een diergelyken: over het midden van den *rug* wordt men eene doorgaande zwarte linie gewaar, *ald.* 531. De *ringen* zyn ook met eenige tedere zwarte puntjes bezet, op ieder van welke een zeer kort en naauwlyks zichtbaar haartje staat. De *Pooten* hebben dezelfde kleur als het *lyf*. Volwassen zynde kruipt het of in de aarde, of tusschen de omhoog staande hoppe-bladeren; of ook wel ergen in een hoek; bekleedt zich met een wit-graauw dun en doorzichtig *Spinzel*; verandert, naa ettelyke dagen, in eene donker-rood-bruine langwerpige *Pop*, die boven op het voorlyf eene scherpe sneede heeft, en met geen staartpunt voorzien is. Drie weeken verloopden zynde, ziet men de *Nachtvlinder* daaruit te voorschyn komen. Deszelfs *Kop* heeft twee nevens elkander staande bladeren, en tusschen dezelve zit een kleine *Zuiger*, *ald.* 532. De *bovenvleugels* zyn aardig met oker-geele, graauwe en bruine vlakken getekend; doch de *ondervleugels*, die als een waajer gevouwen zyn, hebben eene blinkende graauwe kleur, en aan den uitgeschulpten buitenrand een oker-geelen zoom. Het gansche *Lyf* is desgelyks oker-geel en graauwachtig-bruin. Op het begin van 't *Achterlyf* maakt het vederstof een paar kleine hoogzels; en op ieder *Boven-*
vleu-

vleugel worden 'er ook 3 diergelyke gezien. Op de *vleugelen* en het *voorlyf* is hy bruinachtig-grauw. De *Sprieten* zyn aan beide de geslachten hairvormig, en de *bovenschenkels* der 6 *Pooten* zyn met geene haren bezet, *ald.* 533.

Spring-spinnen, zie by *Classen der Land-spinnen*.

Spuut rups, zie *Basterd-rups*, (de groote bleek groene.)

St. Jacobs-rupsje, (het fraaie,) *benevens deszelfs verandering tot in een Nachtvliinder der tweede Classe*, l. 418. enz. Het *St. Jacobs-kruid* (*Jacobæa*) dient ons rupsje voornaamlyk ten verbylyve, *ald.* 418. By ieder vervelling verandert het niet anders, dan in grootte. Het is ongeveer drie vierde van een duim lang. De *Kop* is klein, blinkend-zwart van kleur, en heeft aan den hals een wit boordiel; de overige leden, nevens de *bals*, praalen met eene ten deele zwarte, ten deele heldere Oranje-kleur overdwars: doch het laatste lid of de naschuiwer, en de daaraan zittende *Pooten*, zyn gansch zwart. Van gelyke kleur zyn ook de 3 paar spitze *voorpooten*; waar tegen de 4 paar *buikpooten* meestal geelachtig zyn. Als de tyd haarer veranderinge in den herfst nadert, kruipt ze in de arde, en maakt in dezelve, of onder het gras en 't verwelkte kruid, eene veilige woning en een bruinachtig doorzichtig *Spinzel*, waarin ze naa eenige dagen de gedaante eener *Poppe* aanneemt, *ald.* 419. Deze *Pop* is meerendeels bruin-rood, en heeft geen staartpunt. In de maand *Juny* des volgenden jaars komt 'er eerst de *Nachtvliinder* uit voort. De grondverwe zyner *bovenvleugelen* is donker-grauw, zo nogtans, dat ze eenigzins in 't bruine valt. Kort aan den voorsten rand ziet

men een schoonen hoog-carmyn-rooden streep. De achterrand is met een spits toeloopenden streep voorzien, en aan den buitenrand ziet men insgelyks 2 carmyn-roode vlakken. Die zelfde schoone kleur verciert ook de gansche bovenvlakte der *Ondervleugelen*, maar de buitenste zoom is donker grauw, *ald.* 420. Het gansche *Lyf* is zwart, doch het *voorlyf* helt iets meer, dan het achterlyf, na 't blaauwachtige. De *Kop* is ook zwart, en de *Sprieten* hebben die zelfde kleur. Alle de 6 *Pooten* zyn zwart, en de *Zuiger* is tamelyk lang, *ald.* 421.

St. Jans vliinder, zo wordt de *Vliinder*, uit de dikke, helder geele en zwart gevulakte *Rups* voortkomende, by de Liefhebbers genoemd, l. 440.

Staartrups, (de groote,) op de *Winde aazende*, *benevens haare verandering tot in een Nachtvliinder der eerste Classe*, l. 164. enz. Deze wordt doorgaans in de maand *Augustus* gevonden. Daar is eene *bruine*, en eene *groene soort*. De *bruine* is byna 5 duimen lang, en haare hoogte omtrent een duim; maar de *groene* is iets kleiner. Het gansche *Lyf* der *bruine* is bedekt met tweéelei bruin; want de bovenvlakte van den *Rug*, benevens de staartvormige hoorn veroot zich geheel donker, en de ondervlakte des *buiks* is veel helderer of oker-bruin, *ald.* 164. Voor van den *Kop* af tot aan den 4den ring loopt een heldere streep, en benevens dien een donkere; in welken, zomwylen, op den vierden ring, eene heldere vlak staat. Het achterste of laatste deel is, van de donker-bruine staartspits af, benevens de stompe naschuiwers, helder van kleur. De blinkende *Kop*, hoekig van gedaante, is ook iets helderer van kleur, dan de

de rug, en daarby in de lengte met 4, doch zentyds met 6 zwarte linien heel net getekend. De 4 paar stompe *buikpooten* hebben eenreleie koleur met den buik, en van onderen een zwarten rand, bestaande uit louter kleine haakjes. De koleur der 6 spitze en klauwenvormige *Voorpooten* is wat donkerer-bruin. De 2de soort dezer *Rups* heeft meestal eene bleek-groene grondverwe; doch het staartje of spits toeloopend hoornje is schoon oranje-geel, en alleen aan 't einde zwart. Op alle de voorgte ringen, tot aan den hals toe, staan boven op, by ieder inkerving of plooi, 2 zwarte vlakken of groote stippen nevens elkander, en van ieder paar derzelven, de 3 voorste ringen uitgenomen, loopen isgelyks 2 zwarte streepen, schuins over de ringen heen. Wyders ziet men, onder alle deze zwarte, andere wat breedere streepen, die geel van koleur zyn. De *Kop* van de *Rups* is meer geelachtig, dan groen; de 8 stompe *buikpooten* zyn ook groen; maar de 3 paar spitze *klauwpooten* iets bruiner, *ald.* 165. Volwassen zynde, verbergt zy zich in de aarde, en maakt 'er een ruim verwulfel in. De *Pop* ziet 'er, in de 2 eerste dagen, groenachtig uit, vervolgens wordt zy, voornamlyk aan 't *achterlyf*, allengskens bruiner; maar eindelyk wordt ze in 't geheel schoon blinkend Castanje-bruin. Het byzonderste aan deze *Pop* is de *Zuiger* of *Slurp*, die byna de gedaante heeft van het oor van een por, *ald.* 167. In *Juny* des volgenden jaars komt 'er eerst de *Vlinder* uit voort. De 4 *Vleugels*, van achteren met een smal len gevlakten zoom voorzien, hebben eene bruin-grauwe gestippelde grondverwe. De *Voorvleugels* zyn boven dien met veele donkere en zwart-bruine, als

ook helder-grauwe vlakken en trekken versierd. De *Zichter-* of *Voorvleugels* hebben in den grauwen en bruin-geestipelden grond 4 zwart-bruine, gekronkelde, of op- en nedergaande dwarsstreepen. De *Kop* is helder-grauw, en de 2 *Oogen* hebben, van onderen, een rooden kring, en van boven een breedten witten zoom, die zich aan ieder zyde tot over het geheele voorlyf uitsprekt, *ald.* 168. De zeer groote, blinkende, en als vuur schitterende *Oogen* hebben eene rood-bruine koleur, en de *Sprietten*, boven dezelve staande, zyn geelachtig-wit, van onderen met korte, nabyeen staande, en bruinachtige vezelen bezet. De *Zuiger* is in de lengte byna 3 duim, en in 2 takken verdeeld. Op den *halskraag* heeft deze *Vlinder* een iets verheven *Wrong*, vooraan wat bruin, maar ter plaatze, daar ze aan het voorlyf raakt, zwart bezoomd. De *Rug* is bruin, en zodanig afgedeeld, dat men 'er duidelyk 2 schouderbladen aan ziet. Alle zyne deelen en cierraaden zyn alom met een teder vederstof bezet. Het *Achterlyf* is dik en rond, maar loopt na het einde allengskens spitzer toe. Van boven over het zelve loopt 'er, naar de lengte, een grauwe streep, welke na achteren iets breeder wordt, en in het midden door eene zwarte linie verdeeld is. Aan de 2 voorste *Pooten* schynt het middelste en langste lid zeer dik, dewyl het met een iets lang of hairachtig vederstof of vezelen bewassen is, dat eene bruin-grauwe koleur heeft. De overige 4 *Pooten*, waaraan dat vederstof ontbreekt, zyn wat leetiger, *ald.* 169.

Staartrups, (de kleine, zeer schoone, groene,) met roode vlakken, behoorende tot de eerste Klasse der *Nachtvlinders* III. 201. enz. Men vindt dezelve

ve, dikwyls, in de maand *Augustus*.
Haare lengte belooft geen 2 duimen.
De *Kop* is klein, en haar *Lyf* is
vooraan dunner, dan van achteren en
in het midden. Haare grondverwe is
doorgaande bleek groen. Even zo rood
als de 8 paar streepen zyn op ieder
zyde, in 2 reien geschaard; zo is ook
de hoornvormige staart, welke staart-
spits byna recht op staande, of een
weinig voor over geboogen is. De
zeer spitze *klaauwpooten* zyn rood;
doch de stompe *buikpooten* hebben de-
zelfde grondverwe als het lyf, *ald.*
201.

Staart-rups, (de ongemeen schoone, groe-
ne, met vele carmyn-roode vlakken
vercierde,) op de *Appel- en Wilgeboo-
men* aazende, III. 203. enz. Deze
Rups is niets anders, dan eene verwis-
feling van de zo genaamde *Appel en
Wilge-rups*, die in het I *Deel, bladz.*
124. enz. beschreeven wordt als de
*eenzaame, blaauwstaartige, groene
Rups*, met schuinse witte zyde stree-
pen. Zy verschilt alleen daarin van
deze, dat ze in haaren geel-groenen
grond met verscheide roode vlakken
verciert is; en dat hare 16 *Pooten*,
benevens de *Vrcelpunten*, van gelyke
koleur zyn. Voorts zyn de 7 schuin-
se streepen, en de rechte linie, welke
van den *Kop* tot over de 3 eerste rin-
gen loopt, mitsgaders de tedere be-
zooming van den blaauwachtig-groenen
Kop, van eene zeer frische en geele
koleur, *ald.* 204.

Staart-rups, (de schoone, groene,) zie
Liguster rups.

Stamrups, zie *Gras-rups*, (de grootte
hairige.)

Stormkuive, zo wordt by LINNÆUS de
Vlinder genoemd, voortkomende uit

de gladde, schoon-geelachtig-groene
Rups, IV. 42. *aanm.*

Streepvleugel, dezen naam draagt de *Vlin-
der*, uit de kleine zwart-bruine en kort-
bairige Rups voortkomende, by LIN-
NÆUS, IV. 117. *aanm.*

Surinaamsche Scordioen, zie *Scorpioen*
(*Surinaamsche*.)

Surinaamsche Springkbaan, zie *Springk-
baan* (*Surinaamsche*.)

Swammerdam, (Dr. Job.) heeft, in zy-
nen *Bybel der natuure*, eene manier
aan de hand gegeven, om de koleuren
der Insecten nog naa hunnen dood te
bewaaren Hy wil naamlyk, dat men
'er de ingewanden uit neemen, en de
overige vochtige deelen met gips of
ongeslachten kalk bestroijen zal, die
beiden deze vochtigheden opdroogen,
II. 217. *aanm.* Zyn eigen geduld daar-
omtrent moet onbeschryfelyk groot ge-
weest zyn, III. 94. *aanm.*

T.

Tappen rups, zie *Pinnen rups*.

Taurus volans, zie *Neusboorn-kever*, (de
zeer grootte, met 3 boornen voorzien
zynde.)

Teelleden der Spinnen, zie by *Spinnen*.

Threenen, zyn *Hommel- of zo* genoemde
Broedbyen, ook bekend by den naam
van *Basterd-bommelen*, de mannetjes,
II. 529. en *aanm.*

Toddy boom, zie *Mamei-boom*.

Trek-springkbaan, (de schadelijke,) II.
405. enz. en 454. enz. Het Mannetje
is niet alleen iets kleiner, maar ook al-
toos smaller van achterlyf, dan het wyf-
je. Behalve dit zyn ze ook nog onder-
scheiden, door de aan 't laatste lid van
't lyf zittende teelleden. Voor 't overi-
ge is deze Springkbaan ook de grootste
van

van alle de soorten, die in onze gewesten gevonden worden. De *Sprizen* zyn aan deze Trek-Springkhaanen zeer kort, en niet veel langer, dan $\frac{1}{2}$ duim. De *Kop* daarentegen is zeer dik en groot, en aan zyne ronde voorvlakte, even als aan de vreetpunten, vleeschverwig. II. 407. Aan ieder zyde van denzelven ziet men, naby de tanden, eene groote donker-blaauwe vlak, alhoewel de overige grondverwe doorgaans groenachtig-blaauw zy. De 2 groote *Oogen* vertoonen zich wyders blinkend rood-bruin. De *Halskraag*, die in het midden zynner bovenvlakte geen kam, maar eene in de lengte uitlopende tedere linie vertoont, is by sommigen groener, dan by anderen, en gemeenlyk met eene tedere vleeschverwige linie bezoomd, gelyk 'er dus ook aan deszelfs beide zyden nog etelyke heldere, vleeschverwige vlakken te bespeuren zyn. Het grootste deel van 't *voorlyf*, of het *borststuk*, is tamelyk breed, vooral wanneer men zyne ondervlakte beschouwt. Daar ter plaatse is het meestal vleeschverwig en blaauwachtig; doch aan beide de zyden ziet men het groenachtig, nu helderer, dan donkerer. Het *Achterlyf* valt van boven in 't violet, van ondren in 't vleeschverwige, en by sommigen in 't roode of geelachtige. De beide langste *Springpooten*, benevens de 4 overige korte, zyn zomryds rood, en ook wel eens slechts bleek-vleeschverwig. Dus vindt men ook derzelver dikke *bovenschenfels* menigmaal of geheel, of alleen van boven groen, en aan de 4 korte heeft die verandering mede dikwyls plaats. De 2 *bovenste vleugels* zyn tamelyk smal, maar hebben nochtans die lengte, dat ze over het achterlyf, inzonderheid aan 't mannetje, verre uit-

steeken. Derzelver grondverwe is bleek-bruin, zynde met veele aderen door-toogen, tusschen welke men veele donkere, zwart-bruine vlakken ziet van verschillende grootte. Deze smalle bovenvleugels bedekken 2 breede *Ondervleugels*, die, geslooten zynde, gelyk een Waajer toegevouwd liggen. Aan hun voorste gedeelte zyn ze insgelyks bleek-bruin; doch in het midden begint deze koleur allengskens te verslaauwen, en wordt bleek-groener, en eindelyk aan 't lyf gansch groen. Voor 't overige zyn deze beide ondervleugels veel doorzichtiger en dunner, dan de bovenvleugels, ald. 408. Het *Wyfje* wordt niet op eenmaal bevrucht; maar, de bevruchte *eieren* naa eenige dagen gelegd hebbende, paart het weder op nieuw; en herhaalt zulks zo menigmaal, tot daralle de Eieren bevrucht zyn geworden, welke het zomtyds wel aan de aarde vertrouwt, maar meest aan andere lichaamen, als grasstengels, steenen, wortelen, enz. overtrekkende dezelve met een wit schuim of slym, dat uit het teellid voortkomt, doch kort daarna bruin en hard wordt. De *Eieren* zelve zyn dooier-geel, blinkend, en niet anders van gedaante, dan de Eieren van andere Springkhaanen, waaruit de jongen al in *May* of *April* te voorschyn komen, indien het een warm voorjaar is, maar anders eerst in *Juny*, ald. 410.

Trekvogels, zie *Wachtels* en *Zwaluwen*. *Trochiten* zyn kleine platte en ronde steentjes, met een gaatje in het midden, en hebben uit dien hoofde dezen naam van *Trochiten*, *Radersteentjes* of *Molensteentjes* ontvangen, III. 513.

Tulpbandel. Even als 'er een tyd was, waarin men de *Vlinder-vleugels* zo duur betaalde, dat men 'er wel Diamanten

voor koopen kon; zo was het ook in *Holland*, gedurende de jaaren 1634 en 1637, met de *Tulpbollen*, wanneer men in die jaaren voor een *Tulpbol* gaf 2500 gulden, en naderhand wierden ze by 't gewicht, en wel by Aazen verkocht. Men durfde zeggen, dat 'er, gedurende 3 maanden, in eene stad alleen, voor 10 millioenen guldens aan *Tulpen* verkocht waren, III. 224. *aanm.*

Tyger vinders, zo noemt men in *Engeland*, (en mogelyk ook elders,) de *Vinders*, die nu geeler, dan bleeker vleugels hebben, en waarin zich nu meer, dan minder, zwarte vlakken vertoonen. Deze *Tyger-vinders* komen meestal uit de styfhairige rupsen voort, I. 415.

V.

V-Vlinder, zo wordt de *Vlinder*, uit de eenzaamte *Doornrup*, met den half geelen en half witten rug, en bruin lichaam voortkomende, genoemd, van wegens de letter, die hy op het onderste des vleugels draagt, I. 33.

Vaan, (*Spaansche*,) zie *Spaansche Vaan*. *Vangen der Kreeften*. Behalven dat ze in 't najaar, in den winter en het voorjaar, met de handen uit de helen gehaald konnen worden; zo bediend men zich daartoe van *Fuiken*, in welke men de *Kreeften* door 't een of ander Aas lokt, of van een uitgespannen *Warnet*, dat met stokken in den grond vastgestoken wordt. In *Saxen* laat men, van dunne yzere roeden, verscheide ringen maaken, die omtrent een voet middellyns hebben. Aan deze ringen wordt een stuk van een Net indiervege vast gemaakt, dat het een niet al te diepen zak formeere; dwars door het midden van ieder ring

loopt een stuk van een doorspleeten Rys, dat aan beide zyden vast gebonden is, III. 270. aan den Ring zelve worden 3 eindten tamelyk sterk bindtouw, ieder van 2 voeten lang, op zulk eene wyze gehecht, dat 'er de ring als eene weegschaal aan hange: van boven worden deze 3 touwen te zamen gebonden aan een enkel touw, het welk men korter of langer maakt, naar maate de rivier, waarin de Kreeftenvangst geschieden zal, diep of ondiep zy, en dan wordt dit schepnet, met dat touw, aan een stevigen stok vast gemaakt. Aan het door 't midden van den ring loopende dwarshout, hecht men een gevilden Kikvorsch, een bruinen Graskikker, en daarop laat men het schepnet in 't water neder zakken ter plaatse, daar men denkt, dat zich de meeste Kreeften bevinden. Dan vallen de Kreeften terstond op het Aas; en, het Schepnet opgetrokken wordende, zyn 'er zomtyds, 2, 3, of 4 Kreeften in; maar, als men het langer, dan omtrent duizend tellens, in 't water laat is de Kikvorsch verteerd, de Kreeften zyn weg, en 't net is ledig. Ten tyde van den Tarwen-bloei zyn de Kreeften het vinnigste op het aas; en, als 'er ten dien tyde eene donderbui aan de lucht is, by welke gelegenheid zy hunne helen verlaaten, kan men op die wyze, in weinig uren, eene ryke vangst doen, *ald.* 271.

Vederbos-polyp, (*beschryving van den zogenaamden*,) III. 390. enz. Deze is een gezellige *Polyp*. 'Er leeven doorgaans verscheiden by elkander, schoon elk zyn byzonder Celletje hebbe; doch deze Celletjes zyn zodanig aan elkander verknocht, dat ze te zamen een takkig Rysje, of een soort van Coraalstruik uitmaaken; en, wanneer alle de *Polypen* hunne

hunne Armen uitbreiden, een uit verscheide bloemen geformeerde Bouquet of Tuilje vertoonen, *ald.* 391. Men kan drieërle soorten van *Vederbos-polypen* onderstellen, welke daarin met elkander overeenkomen, dat ieder *Polyp*, al waren 'er honderd in een bosje te zamen, zyn eigen Celletje heeft; waaruit, behalve zyn vederbos, maar weinig van het lyf te voorschyn komt; schoon de vederbos op zich zelve by alle die soorten eenerleie gestalte hebbe, *ald.* 393. Deze zyn, in de maanden van *Mai, Juny, July* en *Augustus*, ja zelfs nog in 't begin van *September*, in de met waterlinzen bedekte vyvers gevonden. De bos, waarin meer Polypen te zamen woenen, is altoos grootdeels onder de waterlinzen verborgen, daar veelmaals nog allerleie andere dingen by komen, welke de Polypen met een lynig vocht, rondom hunne wooningen schynen vast te hechten; invoege dat een Polypen-bos, altyd, eene soort van bedekking om zich hebbe, waarvan men den Polyp, zonder het lyf te beschadigen, niet ligtlyk los kan maaken, *ald.* 394. Wanneer de inwooners van een stok zich eens verborgen hebben, komen zy vervolgens zeer langzaam, en dan nog de een naa den ander, weder te voorschyn; zelfs blyven ze menigmaal een, twee of drie dagen achter, zo dat het schyne, als of ze dood waren: ook schynen ze eene soort van ziekte te lyden, waardoor 'er, hier en daar, eenige takjes versterven; uit welke echter, naa verloop van 2 of 3 dagen, weer jonge spruitjes uitschieten, die zich kort daarna als jonge Vederbos-polypen vertoonen, *ald.* 395. Zulk een Polypen-stok, overdwars, in meer

dan 10 stukken doorgesneden zynde, was de uitlag, dat ze niet alleen het Lceven behielden, maar ook wel dra bytakken en jongen uitschooten, zo dat ze binnen 14 dagen wederom een volmaaken stok vertoonden, *ald.* 407.

Vederbos-polyp, (de kleine,) met het balvormig lyf, III. 517. enz. Wanneer deze Polypen of Vederbossen zich beginnen te vertoonen, ontdekt men eerst alleenlyk kamtandjes; naderhand ontstaan uit deze louter door elkander verwarde draaden, als wormen, van eene gelyke dikte, die een kolfachtig einde hebben, en als 't ware uit eene niet zeer wyde opening uitkruipen. Hierop veranderen zy indiervooge van gedaante, dat ze veel gelyken na 2 by elkander staande bloeiende distelknoppen. Kort daarna worden deze beide knoppen iets langer, en vertoonen na genoeg de gedaante van een hoeflyzer, om dat de beide schenkels of steelen rond blyven. Vervolgens worden de beide schenkels allengskens dunner en langer, waarna zy eindelyk een volkomen, schoonen, dubbelen vederbos vertoonen, die geduurig eene andere gedaante krygt, naar maate men hem van deze of geene zyde beschouwt, *ald.* 520. Elk dezer Vederbos-polypen bestaat uit 2 schachten, die elk met 2 reien vezels bezet, en aan het einde van elke schacht zodanig geslukt zyn, dat ze met het uiterste kolfachtig einde eene soort van boog uitmaaken. Ter plaatze, daar deze beide schachten vereenigd zyn, heeft ieder *Polyp* een korten *bals* of steel. In denzelfden is, tusschen de beide schachten, zomtyds een wratje, doch ook menigmaal eene kleine verdieping, en dit schynt de *mond* der Polypen te zyn. Ieder Polyp kan zyne vezelen en schachten,

ten, waaraan zy zitten, niet alleen korter, maar ook langer en dunner maaken, en beide de schachten, of ook maar een alleen, of halfwege, of geheel intrekken. Wanneer alle de Polypen zich uitgebreid hebben, dan is het lichaam zelf gansch helder en doorzichtig; en alsdan kan men binnen in hetzelfde eenige donkere deelen bespeuren, *ald. 521*. Ingeval deze Polypen hunne vederbossen eens hebben uitgebreid, pronken ze tamelyk lang met dezelve, indien men ze niet stoort, *ald. 522*.

Veelkraat, (de,) of de groote zwart-hairige Rups, benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der tweede Classe, III. 246. enz. Deze *Rups* wordt, van het begin des Zomers tot in den Herfst, gevonden. Om dat ze, gedurende haaren leeftyd, zo bestendig en greetig vreet, wordt ze met recht, ter onderscheidinge van andere rupsen, de *Veelkraat* genoemd. Het gras is haar zo aangenaam, als verscheide andere kruiden en planten, *ald. 246*. Omtrent den Herfst hebben, inzonderheid die geene, waaruit een wyfjes-vlinder staat voort te komen, menigmaal de lengte van meer dan 3 duimen. Haare grondverwe is zwart-bruin. De *Kop* is rond, zwart van kleur, en met korte hairtjes bezet. De korte vilthairen maaken den grond van 't ganschelyf bruin, en zo blinkend als het Atlas: voorts zyn de lange haren als dan gansch zwart. Even zo is 't gelogen met de inkervingen der ringen of leden; dewyl ze nu als met een zwarten zoom omringd zyn, aan wiens beide zyden zich van onderen 2 goudblinkende dwarsstreepen vertoonen, die, na boven, omtrent den rug, in den bruinen grond verdwynen. De gansche *ondervlakte* is, benevens de

16 *Pooten*, zwart, en de lange zwarte haren staan in 3 reien; eene over het midden van den rug, en de 2 andere op de zyden na beneden. Byaldien men deze *Rups* ter veranderinge wil brengen; moet men haar, tot in *January* toe, vochtig en frisch voeder, als Gras of Heide, bezorgen, *ald. 247*. en in geen warme kamer houden. In *April* of *Mai* spiint ze zich in, op eene plaats, welke niet hoog boven de aarde verheven is, zynde haar *Spinzel* bruinachtig-graauw, en niet doorzichtig. Dit spinzel maakt zy van tamelyk sterke, doch zeer dunne draaden, waaronder zy eenige haarer haren mengt. Vier dagen in dit spinzel gelegen hebbende, strookt zy gemeenlyk haaren balg of de huid af, en verschynt in de gedaante eener *Poppe*. De grondverwe van deze is over het algemeen dof zwart; doch de 3 eerste diep ingekorven ringen zyn okergeel, en nu breeder, dan snaller, naar mate de *Pop* zich meer of minder kromme, of uitstrekke. Aan haar laatste lid heeft zy geen spits of staartpunt. 'Er verloopen omtrent 2 weken, eer deze *Pop* haar *Spinzel* verlaat, of de *Vlinder* te voorschyn komt, *ald. 248*. Het *Mannetje* heeft breede en vedervormige *Sprieten*, die aan het *Wyfje* dun en spits zyn. Ten aanzien der grondverwe is 'er, menigmaal, onder de beide geslachten een zichtbaar onderscheid. Het *Wyfje* heeft eene vaal-roodachtig-bruine kleur, en 't *Mannetje*, schoon mede wel roodachtig-bruin, is echter meer okergeel; dan het tegendeel hiervan heeft ook, dikwyls, by dezen *Vlinder* plaats. Ondertusschen is het hoofd-kenmerk aan beiden eenerlei; het bestaat naamlyk in 2 heldere streepen, die dwars en eenigzins

zins schuins door de beide bovenvleugels loopen. De *Ondervleugels* zyn, benevens het gansche lyf, gemeenlyk eveneens van koleur, *ald.* 249. Op de *bovenvleugels* zyn ze, deels met donkere, deels met heldere dwarslinien getekend; deels hebben ze een, deels 2 witte slippen, en ook zomwylen een donker punt op dezelve, *ald.* 250.

Veld-krekel, (de zeer schadelijke groote,) of geveugelde Mol, met molspooten, benevens zyne voorplanting en de overige eigenschappen, II. 353. enz. Dit Insect wordt niet alleen in *Duitschland* gevonden, maar is ook een bewooner van verscheide andere *Europische* landen, ja van *Virginie* en *Carolina*. Wanneer een *Wyfje* dezer soort bevrucht is, zo maakt het, in *Juny* of *July*, zelden laater, een hol omtrent een hand breed diep onder de bovenvlakte der aarde, en daarin legt het zyne *Eieren* op een hoop te zamen, die wel uit 300 stuks bestaat. Doorgaans heeft dit Nest 2 duimen in de lengte, en een in de hoogte; zynde van binnen zeer glad uitgewerkt, *ald.* 354. en aan de eene zyde met eene opening voorzien, tot een in- en uitgang. De *Eieren* hebben eene blinkende geelachtig-bruine koleur; van gestalte zyn ze meer rond, dan langwerpig, en voorts iets grooter, dan een gierste-korrel. Zy blyven byna eene maand liggen; eer de jonge *Krekels* 'er uit voer den dag komen, *ald.* 355. Deze voeden zich met de tedere wortelijes. Ondertusschen groejen ze al voort in de grootte, en op dien ouderdom is hun verblyf omtrent de verdorde plaatzen der Weiden. In deze eerste jeugd zyn dergelyke *Veldkrekels*, boven op het lyf, zwart-grauw van koleur, en van onderen en aan de pooten bleekgeel, *ald.*

356. Ten derden maal verveld hebben de, blyven ze, den ganschen winter door, tot in het voorjaar, onder de aarde. De vierde verandering geschied zynde, vertoonen zich ten laastten de vleugelscheden, en in die gedaante wordt de *Veldkrekel* ten deele reeds in *April*, en ten deele eerst in *Mai* gevonden, *ald.* 357. Het *borststuk* is, benevens de *mol-pooten*, aan dit schepzel wel het byzonderste. Het *borststuk* heeft van achteren en van vooren een smallen zoom, en brengt door zyne hardigheid veel toe, om in de aarde te konnen graaven, *ald.* 358. De *Kop*, ten aanzien van het gansche lyf zeer klein, heeft, in het gemelde borststuk, eene zodanige inleding, dat dezelve, naar vereisch van zaaken, en ingetrokken en uitgestoken kan worden. In dien *Kop* zitten 2 kleine zwarte *Oogen*. Voor dezelve ziet men 2 lange *Sprieten*. Aan den *bek* heeft by een paar *Vreetspunten*, ieder uit 4 leden bestaande, waarvan het laatste een geel kolfje uitmaakt; en onder deze besept men 2 andere, die uit 3 leden bestaan, en korter zyn. Ter plaatze, alwaar het lange *achterlyf* zich met het *voorlyf* vereenigt, en niet verre van deze vereeniging, ziet men het middelste en zwakste paar *Pooten*, waar boven de 2, slechts tamelyk kleine *dekvleugels* gezien worden, die eene zeer bleekke, lichte, okergeele grondverwe hebben. Dezelve zyn met veele, zo wel fyne als grove aderen doortoogen, die het eenigste kenteken zyn, waar door men 't *Wyfje* van het *Mannetje* kan onderscheiden. Zo klein als de boven- of *dekvleugels* zyn; zo groot vindt men in tegendeel, de slechts gedeeltelyk bedekte *Ondervleugels*, *ald.* 359. Het *Achterlyf*, uit 8 of 9 leden bestaande,

is van boven bruin; welke koleur zich evenwel, aan de zyden, en van onderen, in eene geelachtige rood-bruine verliest. Aan het achterste en kleinste lid bespeurt men een paar *Sprieten*, die byna zo lang en recht uitlopende zyn, als die, welke men aan den *Kop* vindt; maar, zo spits als zy aan 't einde zyn, zo dik zyn ze in tegendeel ter plaatze, daar zy aan het lyf vast zitten. Deze *Sprieten* zyn van onderen met eene rei tedere haitjes bezet. Schoon nu ook hier de 2 achterste *Springpooten* de beide andere paaren in lengte overtreffen; zyn ze echter zo groot niet, dat ze den Krekkel genoegzaam opheffen kunnen. Aan de *bovenschenkels*, die iets dikker zyn, dan het middendeel, zyn ze eenigzins bruin-graauw, waar tegen de overige deelen meer in 't rood-bruine vallen; welke koleur ook het gansche middelste paar heeft. Daarenboven zyn de gemelde *Springpooten*, aan hun middelste deel, met 3 of 4 tamelyk lange spitzen bezet, die in eene rei achter elkanderen staan. De *Voorvoet*, uit 4 leden bestaande, is zo wel aan de achterste, als middelste schenkels of pooten even zo gesteld, als aan de Springkhaanen en andere soorten van Krekels, hebbende aan 't einde een dubbelen haakvormigen klauw, *ald.* 360. De *voorstste Pooten* zyn, van onderen, als eene Zaag, of als eene Haanekam gesteld; zy bestaan elk uit 3 hoofddeelen, eerst een klein, waarmede het zyne inleding aan het borststuk heeft; het daarop volgende middelste deel is het dikste; het laatste deel is, eindelyk, dat geen, 't welk, van wegen zyne zaags-, of tandswyze gedaante, dezen poot doet gelyken na den voorpoot van een Mol, schoon hy nog van een gansch ander maakzel zy.

Met deze 2 Voorpooten kan de Krekkel, volgens gedaane waarneeming, zo veel krachts doen, dat hy in staat is, om 2 stukken, ieder 3 ponden zwaar, op eene gelyke vlakke, te verschuiven; en derhalve zal het niemand vreemd voorkomen, dat hy de aarde gelyk een Mol doorgraaft, al was dezelve nog zo vast op een gepakt, *ald.* 361.

Veldkrekkel, (de zwarte,) benevens deszelfs oorsprong, voortplanting, en overige eigenschappen, II. 344. enz. Deze legt voornaamlyk in *July* en *Augustus* zyne Eieren. Dezelve zyn langwerpig, zo als die van den Huis krekkel, doch iets grooter en donker-geelachtiger van koleur. Na 14 dagen komen 'er de Jongen al uit, *ald.* 344. zynde zy alsdan geelachtig-rood bruin, maar worden welhaast bruinachtig zwart-graauw, en hebben tamelyk lange *Sprieten*. Hunne spyze zyn de jonge gras-spruitjes enderzelver worteltjes. Zo dra de koude nachten beginnen, of 'er vriezend weer ontstaat, houden de half volwassen Veldkrekels zich, onder de aarde, in hunne holen verborgen, en worden ook den ganschen winter door niet grooter, *ald.* 345. Met het voorjaar komen zy uit hunne holen te voorschyn. De ousten vervellen dan voor de derde maal. Hierop vertoonen zich de vleugelscheden, die aan een gespleeten bloem, van welke ieder helft 4 blaadjes heeft, niet ongelijk zyn. Ten einde van *Juny* en *July*, leggen ze ten vierden en laatsten maal de huid af, en erlangen, binnen een quartier-uurs, de 4 vleugelen, en hunne huid verkrygt de vereischte hardigheid, *ald.* 346. Het voornaamste kenteken van het *wyffe* bestaat in de van achteren recht uit steekende legpyp, zynde aan het einde met eene kolfachtige spits

spits voorzien. De *bovenvleugels* van *het wyfje* zyn, by hunne gladde en bruine koleur, die aan het voorlyf okergeel wordt, wegens hunne schuins over elkander loopende aderen, als een Traliewerk; waartegen aan de Mannetjes het buitenste deel alleen zodanig gesteld is. Het dikke bruin-grauwe *Achierlyf* wordt, naa de bevruchting, menigmaal, zo in de lengte als in de breedte, dermaate uitgezet, dat de vleugels het niet meer geheel bedekken kunnen. Het *Voorlyf* gelykt byna meer een hals, dan een borststuk; het schynt, wegens zyne bovenste en 2 zyde-vlakten, meer hoekig, dan rond; en is, zo als de rond verwulfd *Kop*, en de 6 *Pooten*, blinkend zwart. De *Oogen*, een linzenvormig glas gelykende, bestaan uit ontelbaar veele andere, verheven glasvormige deelen. Voor dezelve staan de beide lange, hairvormige *Sprieten*, op eenigzins dikke en laage bultjes, waarin ze hunne inleding hebben, *ald.* 347. De *bovenvleugels* van *het mannetje* hebben, ter plaatze, daar ze aan het voorlyf vast zitten, eene groote en heldere okergeele vlak, die door den bruinen grond genoegzaam in 3 afscheidingen verdeeld wordt; en de hoofdadereen loopende schuins en kronkelende over de bovenvlekte heen. De *bovenschenkels* zyn, aar den kant van 't lyf, tamelyk dik en grof; ook meer bruin-rood, dan zwart; maar by het dikke en ronde knielid worden ze weer dunner. De eigenlyke *voet* bestaat uit 4 zeer kleine leden, en eindigt met een dubbelen haakvormigen klaapw, *ald.* 348. De *Ondervleugels* zyn aan deze soort van Krekels wel doorzichtig, maar veel bruiner en korter, dan aan de Huiskrekels, *ald.* 349. Acht dagen naa de bevruchting begint het Wyfje zy-

ne *Eieren* te leggen, en het schuift dezelve, door middel zyner legpyp, in zyne wooning in de aarde. Zyn Eierstok vervat wel 300 eieren, *ald.* 351. *Venkelrups*, (de eenzaame, schoone, groen-geelachtige,) met zwarte dwarsstreepen, en roodachtige geele vlakjes, benevens haare verandering tot in een *Dagvlinder* der tweede Classe, I. 69. *euz.* Deze draagt den naam van *Venkelrups*, om dat ze zich lieft op de *Venkel* onthoudt, hoewel zy ook, zomwylen, op het Dilkruid en de Petercelie wordt gevonden. De *Eieren* zyn geelachtig van koleur, en kegelvormig van figuur. By warm zomer-weer komen de jonge rupsen binnen 4 weeken uit, *ald.* 69. Het hoofd dezer rups is niet hartvormig, maar doorgaans rond, en, ten aanzien van het lyf, klein. Haare lengte bedraagt op 't hoogst drie vierde van een duim. Zy heeft 3 paar spitze *voorpooten*, 4 paar stompe *buikpooten*, en een paar *naschuivers*. De grondverwe der rups is een schoon dof-groen, waarop andere koleuren fraai afsteeken. De *Kop* is in het midden wat helderer, en heeft een rond zwart vlakje, dat van wederzyde omringd is met een zwarter streepje. De *bals* heeft een smal zwart randje, waarin van boven een paar oranje-geele en ronde vlakjes staan. Over het midden van den hals loopt overdwars een breede fluweel-zwarte streep als een band, op welken, van onderen aan ieder zyde, ook oranje-geele vlakjes staan. By alle ringen wordt overal een bandvormige fluweel-zwarte streep, met oranje-geele vlakken, op den groenen grond, gezien. Ook ziet men onder ieder benedenste of laatste oranje-geele vlakje, aan den buik, nog een langwerpig zwart streepje, *ald.* 70.

De 6 *Voorpooten* zyn met zwarte spitzen voorzien, maar alle anderen met 2 over elkander staande vlakken getekend. Intusschen verschillen de koleuren by deze soort van rupsen merkelyk. Want men vindt eenige, waaraan het groene meer in 't blaauwe valt, en wederom andere, die 'er geelachtiger-groen uitzien. Desgelyks zyn ook de vlakken aan de eene rooder, en aan de andere geeler. Ja zelfs de zwarte dwarsstrepen worden nu breeder, dan smaller bevonden. Deze Rups heeft eene byzondere eigenschap, naamlyk, dat 'ereen paar *hoornen* voor op den eersten ring, die op den hals volgt, staan, welke zy, als eene flak haare hoornen, uitsteeken en intrekken kan, *ald. 71. en aanm.* Wanneer ze volwasen is, maakt ze zich gereed tot de verandering, zoekende in de nabyheid eene plaats, die niet zelden op het zelfde kruid is, waarmee zy zich te vooren heeft gevoed. Aldaar maakt zy zich met alle de pooten vast, zo dat het gansche lyf op den grond der plaatze ruste, spint zich aan de achterpooten vast, en overtrekt het lyf meteen witten, tederen en sterken draad, tusschen den derden en vierden ring, derwyze dat hy aan wederzyde op den grond, waarop de Rups zit, vast gemaakt zy, van boven suite, en ter zyde een weinig van het lyf af staat. Alsdan barst de huid van boven achter den hals open, en door de menigvuldige beweeging afgestroopt zynde, wordt de *Pop* gezien, *ald. 72.* Deze Poppen van die soort verschillen merkelyk, zo wel in koleur, als in grootte; zynde eenige derzelven stroo-geel en bruin, anderen daarentegen helder- of bleek-groen: doch alle hebben ze aan beide zyden een oneffen geelen streep, die van vooren tot aan

het einde toe loopt. Wanneer deze *Pop*, het Weer nog warm zynde, 14 dagen heeft gelegen, springt zy van vooren op, en de *Vlinder* komt te voorschyn, *ald. 73.* De grondverwe van alle 4 zyne *Vleugels* is helder zwavelgeel, waarop allerhande zwarte vlakken en aderen, hoewel niet op eenerleie wyze, te zien zyn. Aan de onderzyde van den *Achtersvleugel* ziet men ter plaatze, daar hy aan het lyf vast is, 2 zwarte aderen, waarvan de eene van onderen breed is, na den voorsten rand geboogen oploopt, eindelyk te niet gaat, en buitenwaarts een takje heeft; de andere omringt het midden des vleugels, en komt ten laatste, naa op verscheide plaatzen 6 takken na den buitenkant gemaakt te hebben, weder ter plaatze, daar ze begonnen is. Voorts loopen 'er 3 reien zwarte streepen trapswyze door den vleugel, en de ruimte tusschen de 2 binnenste reien is gevuld met graauwachtig-geele stippen. Achter aan den vleugel na beneden ziet men een met zwart omzoomden tamelyk ronden Spiegel, wiens binnenste meest kaneel-rood, en na het lyf toe *bleumourant* of *bleek-blaauw* is. Verder na boven staan nog 2 à 3 zodanige roodachtige vlakken in den geelen grond, die de gedaante van een hart hebben. De buitenste rand is eenigzins uitgeschulpt, *ald. 74.* In de onderzyde des *voorsten vleugels* loopen 2 hoofdaderen in de lengte, en verscheide andere in de breedte. Tusschen deze 2 hoofdaderen bevinden zich 3 zwarte vlakken overdwars, en wat verder op nog eene kleiner, nevens welke eene langwerpige ronde vlak van de andere zyde doorschynt. De *buitenrand van ieder Vleugel* heeft een smal geel boordzel, en op ieder ader een klein driekantig vlakje; daar

daar aan grenst een breede graauw-geele zoom, die met 8 doorschynende ovaal-vormige geele vlakken voorzien is. De grondverwe der *bovenvleugels* is insgelijks zwavel-geel. Op het einde staande kareel koleurige vlakken of spiegels, met blaauw en zwart omzoomd. De *buitenrand* is smal geel geboord, en heeft, in een breeden zwarten zoom, 8 ovaal ronde geele vlakken, en verder binnenwaarts eene rei tedere geele stipjes. Het *Lyf* is geelachtig en hairig. Het *Hoofd* is voorzien met 2 zwarte met kolffjes verciere *Sprieten*; met 2 ronde blinkende *Oogen*, en van onderen met een te zamen gerolden slurp of *Zuiger*. Aan het Voorlyf zitten 6 zwarte *Pooten*, wier boven-einden met geele haren bezet zyn. Het *Achterlyf* heeft, ter wederzyde, een zwarten streep, en verder na onderen nog eenen dergelyken in delengte. En zo ziet men ook over den rug van het voor- en achterlyf een breeden zwarten streep, *ald.* 75.

Vergelyking van sommige zaaden van boom en planten met de Insecten, II. 179. Zie by *Planten*.

Verrotting, eenigen verdedigen, dat de *Insecten* uit de verrotting ontstaan, en bedienen zich, veeltyds, ten bewyze daarvan, van de *Maden*, die in ouden kaas en vervuuld vleesch veelvuldig worden gevonden, II. 367. doch worden door proeven wederlegd, *ald.* enz.

Versteende Mosselen en Slakken, III. 508. enz. Dat deze waarlyk, eertyds, dieren zyn geweest, zal niemand in twyfel trekken, die ze ooit met waare mosselen en slakken vergeleeken heeft: waarom ook de meeste kenners dierzelfen den spot dryven met dezulken, die voorwenden, dat diergelyke steenen daadlyk van zelve in de aarde groejen, of zo gescha-

pen zyn. Ook vinden zy weinig geloof die onderstellen, dat de *Eieren* dezer dieren, met de dampen uit het water opgeheven, naderhand weder neergevallen, en tot Viscchen en Schulpdieren, doch in het drooge, tot steen geworden zyn. Anderen, welken de voortteeling der dieren, en dus ook die steenen, uit eene verrotting willen doen voortkomen, verdienen hedendaags volstrekt geene aanmerking. Daarentegen heeft het gevoelen der geenen, die den oorsprong dezer steenen van den Zondvloed afleiden, tot hertoe de meeste goedkeuring gevonden, *ald.* 508. Vraagt iemand, hoe het bygekomen zy, dat deze *Mosselen*, *Slakken*, enz. in steen veranderd zyn? daarop diene ten antwoord: dat alle steenen uit verscheide vochtigheden, en andere grover aarddeelen schynen ontstaan te zyn; te meer, dewyl 't bekend is, dat alle wateren, zy mogen zo helder zyn als ze willen, diergelyke aarddeelen in zich hebben. Diergelyke wateren nu kunnen veroorzaaken, dat 'er, naar gelange hunner verscheidenheid, ook verscheide soorten van steenen, zo wel edelen als gemeenen, uit hun voortkomen, *ald.* 510. Even zodanig eene vochtigheid heeft dan ook de, door overstroming, in de bergen en velden gevoerde *Slakken*, *Mosselen*, enz. waarmede de grond der zee bedekt is, doordrongen, en dezelve, haare aarddeelen terug latende, aldus in harde steenen veranderd, *ald.* 511.

Vervellinge der Rupsen. Dat de *Rupsen* verscheide maalen vervellen is eene bekende zaak. Hierby is aan te merken, 1.) dat alle vervellingen haar zeer bezwaarlyk vallen, ja zelfs haar menigmaal het Leeven kosten; 2.) dat de *Rups*, door haare laatste vervelling, eerst tot haare

haare volkomenheid geraakt, I. 8. Vraagt iemand, *wat is toch het oogmerk van deze veelmaalige vervellingen? of strekken ze in der daad tot eenig wezenlyk nut?* dan is het antwoord, dat deze vervellingen haare oorzaak hebben, en niet zonder reden geschieden. De *Rupsen* hebben, boven ontelbaare andere dieren, een zeer spoedigen wasdom; dat is: haare vloeiende deelen neemen sterk toe, waar door haare vaste deelen meer en meer uitgezet worden; die, door middel van het voedselsap, dat in de tuschenruimte doordringt, en zich vast hecht, nieuwe vezelen krygen, en by gevolg grooter worden; doch dit alles geschiedt binnen weinig tyds. Vermits nu de buitenste huid, die zo veel als het dekzel of de rok der rups is, moet dienen ter bewaaringe van die uitzettende deelen, zo moet dezelve, noodwendig, merkelyk vast zyn, dan de binnenste deelen; en dit heeft natuurlyk ten gevolge, dat ze minder bekwaam is, om uit te dyen, en derhalve ook zo spoedig niet kan voortgroeyen. Hieruit ontstaat dan, wanneer die binnenste deelen zo lang toegenomen hebben, tot dat de huid ten hoogsten graade uitgezet is, en zich niet verder uitzetten kan, dat de tedere vezeltjes, waar door de huid aan de binnenste deelen vast gehecht was, aan stukken breeken, en dus de invloed der voedselsappen op die huid ophoude; weshalve ze van dien tyd af van zelve moet verdroogen. Inmiddels groeit 'er, onder de oude huid, eene tedere nieuwe, en, als de oude hier door nog verder uitgerekt wordt, barst ze eindelijk geheel, en strookt dus af. Hieruit dan blykt ten klaarste, waarom de *Rupsen*, by iedere vervelling, grooter worden, nademaal de nieuwe weke huid

zich in 't begin sterker laat uitzetten, en werkelyk zo lang uitgezet wordt, tot dat ook zy, even als de voorgaande, barsten moet, *ald.* 192. 193.

Vestingswerk, zie *Fortificatie*.

Violen-vlinder, zo wordt de *Vlinder* genoemd, voortkomende uit de *eenzaam*, *koolzwarte Doornrups*, met tegelroode zydevlakken, IV. 135. *aanm.*

Vis-egel, of *Bloedzuiger*, *benevens* zyne *veranderinge*, III. 171. enz. Deze wordt een *Vis-egel* genoemd, uit hoofde dat hy zyn voedsel voornaamlyk aan de vissen zoekt. Deszelfs koleur is over het geheel bleek olyfverwig, of graauw-achtig-groen, met veele witte punten besprenkeld. Wanneer hy volwasen is, en zyne grootste lengte bereikt heeft, belooft dezelve tot over de twee duimen. Het achterste einde is het dikste, terwyl hy na den *Kop* toe allengskens dunner wordt. De *Kop* is plat, en van vooren iets gefpleeten, hebbende in 't midden der ondervlakte eene kleine verdieping als een puntje, *ald.* 172. Wanneer hy zich van de eene plaats na de andere wil begeeven, gaat hy, gelyk de *Spanrupfen*, voort, dat is: hy zet zich eerst met zyn achterlyf ergens aan vast, vervolgens steekt hy zyn voorlyf uit, en zet den kop van vooren aan het lichaam, waarop hy zyn weg vervorderen wil; alsdan trekt hy het achterlyf na zich toe, en, zo dra dat weder vast zit, steekt hy het voorlyf verder uit, en gaat aldus voort. Oudtyds heeft men van de *Egelen* gezegd, ja veelen gelooven het nog hedendaags, dat ze van zelve uit de verrotting voortkomen; maar de ontdekking heeft, by de naauwkeurige beschouwing dezer schepzelen, het regendeel geleerd; nademaal alle soorten van *Egels*, in het voorjaar, doch voornaamlyk

lyk in de maand *Mai* paaren; waarop de wyfjes vervolgens *Eieren* leggen. Deze hebben wel een ovaalen, maar teffens een fcherpen omtrek, *ald. 173.* en zyn plat aan de ondervlakte, maar de bovenvlakte is eenigzins verheven verwulfd, en aan het einde fchynen zy eene fpleet te hebben. Ten einde van 3 weeken komen daaruit de kleine *Egel-tjes* voort, *ald. 174.*

Vleesch-vlieg, zie *Besmet vlieg*.

Vleugelen der Vinders groeijen niet zo zeer, maar wel ontploojen zich, of dyen uit, I. 455. *aanm.* De leevendigheid, de groote glans, en de menigvuldigheid der koleuren hebben hun veel bewonderaars verworven, en zommigen waren 'er dermaate opgefteld, dat ze de vleugels van zekere *Vinders* tot zulk een hoogen prys inkochten, dat men 'er wel *Diamanten* voor koopen konde, III. 223. 224.

Vliegen, *beschryvinge der vliegen*, II. 530. enz. De infecten, welke met 2 na *Perkament* gelykende doorzichtige vleugelen voorzien zyn, en, gelyk veel andere *Infecten*, veranderen, voor dat ze in hunne laafte gefalte verfchynen, worden *Vliegen* genoemd. Het aantal haarer *foorten* is veelvuldig, *ald. 530.* Zy draagen hunne *vleugelen* op onderscheide wyzen; want zommige *foorten* fluiten dezelve vlak en kruiswyze over het achterlyf te zamen over elkander; maar anderen leggen ze alleenlyk vlak over het achterlyf aan elkander; en nog anderen draagen ze open, vlak en pylvormig nevens het achterlyf uitgebreid. Haare *vleugels* zyn veelal doorzichtig of glasachtig; nochtans zyn 'er eenige *foorten*, die ze deels bruin deels zwartgevlakt hebben, *ald. 531. aanm.* Door het getal en de orde hunner aderen kon-

nen de onder een geflacht behoorende foorten meerendeels van elkander onderscheiden worden, *ald. 532. aanm.* De *Eieren* der *Vliegen* vertoonen zich meerendeels glad; zyn langwerpig-rond van gefalte, ten deele geelachtig, ten deele witachtig, ten deele groenachtig, en anders van koleur. Zommige *Vliegen* leggen ze of aan leevende, of aan doode fchepzelen, of in verrotte en flinkende *Aazen*, en vochtigheden, of ook wel aan allerhande boomvruchten, *ald. 533. aanm.* De *maden der vliegen* zyn verfeidenlyk van gefalte en koleur. Want zommige zyn lang, flang- en wormvormig; zy hebben eene rondachtige gefalte, die bykans overal even dik is; en aan diergelyke foorten vindt men den *Kop* slechts iets kleiner, dan de dikte van het *lyf*; by anderen is het *lyf* onderscheidenlyk in ringen of leden verdeeld; en aan nog anderen is zulks weder bykans niet te ontdekken. Eenigen zyn ook wel wormvormig van gefalte, doch van vooren dunner en fpijzer. Wederom anderen hebben eene meer breede, rond verwulfd gefalte, nagenoeg gelyk de flakken; inzonderheid die foorten, welke op leevende bladluizen aazen; en deze zyn van vooren insgelyks fpijs, en gemeenlyk na achteren op zyn breedft. De *Kop* is, aan dit flach, wel het fpijs de deel, en meer gefchikt, om te zuigen, dan om te knaagen. Eenigen dezer verfeide vliegenmaden zyn houtgeel; zommigen witachtig, anderen graauw, en eenigen groen of geel, of ook wel anders van koleur. Nog ettelijke andere *foorten* hebben meer eene korte, diklyvige, dan lange gefalte; zommigen zyn geheel glad; anderen hebben gansch korte hairtjes of hairige fpijzen. Ettelijken dezer foorten

ten veranderen in haar verblyf, waarin ze geboren en gevoed zyn; doch eenigen niet. Zy veranderen meerendeels onder den Maden-balg in *Poppen*; echter zyn 'er veelen, die in het geheel niet vervellen, *ald. 532. aanm.* Eenige vliegen-poppen hebben eene eironde of onvormige gestalte, inzonderheid die der *Aas-vliegen*; anderen zyn kolsfachtig, gelyk daar zyn de Poppen der blad-luis-vreetende Maden; doch ten opzichte der koleuren zyn ze verschillende, en ten deele helder, ten deele donker. Zelfs onder de *Vliegen* bespeurt men eene merkelyke verscheidenheid, en haare geslachten worden, door smaller of breeder, door langer of korter vleugelen; door eene smal- of breedlyvige, door eene dik- of dunlyvige gestalte; door het getal der aderen en derzelver ordening in de vleugelen; door haare kleur, en andere kentekens meer, van elkander onderscheiden, *ald. 533. aanm.* De *vliegen* hebben maar 2 *vleugels*; zyn allen met een paar *kolsjes* voorzien; hebben een *snuit* of *Zuiger*, die by eenigen styf en hol is; doch by anderen is hy week, en zodanig gesteld, dat ze, door dit werktuig, de onderscheiden tot haar voedsel dienende vochtigheden, en andere lichaamen of oplikken en opvatten, of inzuigen en doorslikken kunnen, *ald. 534.*

Vliëgend bart, zie *Hartkever*.

Vliegende stier, zie *Neusbuorn kever*, (de zeer groote, en met 3 hoornen voorzien zynde.)

Vlinder, (de buitengemeen groote,) met graauwe gewaterde bovenvleugelen, en helder violet-blaauwe en zwarte onder-vleugelen, behoorende tot de tweede Klasse der Nachtvinders, IV. 152. enz. De *Rups* van dezen grooten

Nachtvinder is, van de maand *Mai* tot op het einde van de maand *Juny*, te vinden. Ze onthoudt zich gemeenlyk op de Espenboomen, welker blaaden zy tot voedsel gebruikt; doch geneert zich ook met den zwarten Popelieboom. Zy heeft eene groote licht-witte plek van vooren op den rug, het zekerste kenteken, waardoor ze van de *Witdoorn-rups* onderscheiden kan worden. In de maand *Augustus* komt uit haar de *Nachtvinder*, *ald. 153. aanm.* Deszelfs *bovenvleugels* zyn, in den helder-graauwen grond, met verscheide donker-graauwe en zwarte golfachtige dwarsstreepen, linien, okergeele trekken, en witte vlakken verciërd. Het *lyf* is blaauwachtig-graauw, inzonderheid het *borststuk*, maar aan het *achterlyf* is het derde en vierde lid op de bovenvlakte zwart, en 't laatste lid bruin. De groote en breede *Ondervleugels* zyn niet alleen aan den rand met een byzonderen zoom voorzien, maar hebben ook nog een schoonen helderen violet-koleurigen breedten dwarsstreep. De randbezooming aan ieder *vleugel* bestaat uit 7 zeer diep ingetande, gelykvormige, witte uitsteekende spitzen, allen met een tederen zwarten omtrek, en met een langhairig wit vederstof, in de gedaante van franje, voorzien. Naast deze witte bezooming ziet men een zwarten grond, die aan den kant van 't lyf merkelyk smaller, dan buiten om, en aan den witten rand, in 't blaauwachtige verdreeven is. Alsdan volgt een byna even zo breede, schoone heldere, violet-blaauwe boogswyze dwarsstreep. De overige grond is geheel zwart. Hy heeft lange hairvormige *Sprieten*, en een paar groote bruine *Oogen* in den Kop. De *bovenvleugels* zo wel, als de *Ondervleugels* zyn

zyn aan den buitenrand ingetand, *ald.*

^{154.}
Vlinder, (de kleine,) met doorzichtige vleugelen, behoorende tot de eerste Classe der *Nachtvlinders*, III. 202. enz. Deszelfs 4 *vleugels*, van welke de voorste in de lengte en grootte de anderen overtreffen, zyn niet alleen doorzichtig, gelyk het fynste vrouwen glas, maar hebben ook een regenboogachtigen speelenden glans. Uit dien hoofde ziet men geen het minste vederstof op dit doorschynend deel van dezelve; maar de buitenrand is met een breeden, purperrooden, doorzichtigen zoom voorzien, en daarin vertoonen zich de donkere aderen gansch helder. Van eene diergelyke roode koleur is ook de winkelhoekvormige streep, *ald.* 202. dien men voorwaarts na de inleding toe ziet; waar tegen de voorste rand een geelachtig-olyfkoleurigen zoom heeft, en aan den achtersten rand begint, by de inleding, eene breede vlak, van dezelfde koleur, die spits uitloopt. De iets kleiner *ondervleugels* zyn ten naasten by even zo gesteld, als de bovenste; hoe wel hun de winkelhoekvormige streep ontbreeke, terwyl de purper-roode rand, die aldaar eenigzins smaller is, een smallen witten zoom heeft. Het *voorlyf* en de *Kop* zyn met een olyfkoleurig vederstof bezaaid; aan de 3 eerste leden van het achterlyf is dit stof schoon purperrood; en in het midden van het derde lid staat een wit stipje. Het laatste lid van dit *achterlyf*, langer en smaller, dan de overige, en bykans pinnenvormig, is in het midden donker-geel, en aan de zyden zwart bezoomd. Zyn *Zuiger* is tamelyk lang; en de *Sprieten* zyn kolfachtig. De 6 *Pooten* zyn, aan de bovenschakels, met haren bezet, en de

ondervlakke van het lyf is helder-geelachtig wit, *ald.* 203. De beschryving der *Rups*, waaruit hy voortkomt, zie by *Rups*, (de gespikkelde groene,) met eene oranje geele staartspits, en 2 witte zyde linien; volgens IV. 184. enz.

Vlinder, (de) met louter geel bezoomde zwarte oogspiegelen, behoorende tot de eerste Classe der *Dagvlinders*, IV. 180. enz. Op deszelfs *bovenvlakke* ziet men eene schoone, weerschynige, meer oranje-bruine, dan olyfkoleurige grondverwe. Alle de 4 *vleugels* hebben eene cierlyke witte uitgeschuipre bezooming; waarop in ieder, 5 niet zeer heldere oranje-geele ovaal-ronde ringen van ongelijke grootte en byzondere orde gezien worden, die allen van binnen zwart zyn. Behalve deze ringen bespeurt men ook nog, omtrent het midden van elken vleugel, eenige korte dwarsstreepen, welke iets helderer zyn, dan de grondverwe. Het *Lyf* vercoont zich meerendeels zwartachtig-blaauw-graauw. De *Kop* is, nevens de *Sprieten*, even zo gesteld, als by anderen dezer Classe. De grondverwe der *Ondervleugels* is bleek oranje geel, met olyf-bruin vermengd; en na den kant der inleding valt dezelve donkerer, dan aan den buitenrand, welke met eene cierlyke bezooming pronkt, *ald.* 181. Aan dezen rand naamlyk zyn ze, van buiten, met eene gansch witte uitgesplijste bezooming voorzien; waarop 2 heldere okergeele streepen, die even breed zyn, volgen. Op deze bezooming volgt, in ieder vleugel, een breede, heldere dwarsstreep. In denzelven staan 6 schoon heldergeele ovaal-ronde ringen, van onderscheiden grootte. Ieder dezer ringen, in een donkeren grond geplaatst, omsluit een koolzwarten oogspiegel, en heeft een

eën klein sneeuw-wit puntje in 't midden. De *Posten*, mitsgaders de *baardspitzen* zyn geel; de *Oogen* groen; en het *Lyf* is zwartachtig-blaauw, *ald.* 182. De *Rups*, waaruit deze Vlinder voortkomt; heeft over 't geheel eene bleek-groene koleur; de *Kop* is rond, en op het laatste lid staan 2 witte punten. Het Woudgras is haar voeder. Zy vervelt ordentelyk 3 maalen; doch behoudt den geheelen tyd dezelfde koleur. De *Pop* is meer rond, dan langwerpig. In het begin vertoont ze zich geheel-groen; doch ze wordt van tyd tot tyd bleeker, en krygt vervolgens eene gansch witte koleur, welke zy 8 dagen behoudt, waarop ze donker-bruin wordt, *ald.* 181. *aann.*

Vlinder, (de ongemeen schoone koolzwarte,) met witte vlakken en oranje-geele zwart-gevlakte ondervleugelen, benevens een Carmyn-rood Achterlyf, behoorende tot de tweede Classe der Nachtvinders, IV. 155. enz. Deszelfs bovenvleugels zyn, even als het borststuk, in den grond koolzwart en wit gevakt; het borststuk heeft 2 of 3 drickantige vlakken, en de vleugels pronken met 9 zodanige vlakken; doch welke aan eenigen, inzonderheid by de wyfjes, ook wel iets in 't zwavelgeele vallen. De grondverwe der beide ondervleugelen is altoos zeer schoon en hoog Oranje-geel; men wordt in dezelve, behalve een zwart punt, 6 in grootte en vorm verschillende zwarte vlakken gewaar, die voorts, aan het buitenste stompe einde van den vleugel, nog in grootte verre overtroffen worden door eene zevende vlak. Het Achterlyf is, by het Mannetje, tot over de helft, hoog carmyn-rood, en 't overige gedeelte, na den kant van het borststuk, in 't oranje-ge-

le verdreeven. Aan de Wyfjes, in tegendeel, is het achterlyf gemeenlyk hoogrood, *ald.* 155. en beiden hebben ze, op de bovenvlakte, eene rei zwarte punten. De beide Sprieten zyn veder-vormig en zwart, doch aan de Wyfjes vry wat snaller, dan aan de Mannetjes. De *Rups*, waaruit deze Vlinder voortkomt, zie beschreeven by Beeren-rups, (de zeldzaame bruinbairige,) met den rooden Kop en Pooten, volgens IV. 158. enz.

Vlinder, (de ongemeen schoone Celadon-groene,) behoorende tot de derde Classe der Nachtvinders, IV. 104. enz. Deszelfs lange en smalle Achterlyf vertoont zich meer wit, dan groen; en zyne beide eenigzins dikke en spits toeloo-pende Sprieten zyn geel, doch de Oogen donker-bruin. In den schoonen groenen grond der 4 vleugelen vertoonen zich, behalven eene overdwars-midden doorlopende witte en smalle kronkel-linie, geene andere ciernaaden; *ald.* 104. alleenlyk zyn de Vleugels, aan den buitenrand, nog met eene smalle bleek-geele bezooming voorzien, *ald.* 124.

Vlinder, (de schoone bruine, met rozen-rood gevlakte ondervleugels pronkende,) voortkomende uit de met 2 oogspiegels versierde Wynrups, en behoorende tot de eerste Classe der Nachtvinders, IV. 47. enz. De lengte van deze Rups belooft niet veel meer, dan 3 duimen. Haare grondverwe is bruin. De kleine Kop is blinkend bruin; en achter den zelfden ziet men, ter wederzyde van den vierden ring, eene groote zwarte oog-vlak van eene ronde gedaante, die een tederen geelen ring ter bezooming, en, iets buiten 't midden van zyn zwarten grond, na achteren, een blaauwachtig-wit.

wit punt heeft. Op den vyfden ring is ook een paar zodanige, doch kleiner vlakken. Door de overige ringen loopt, aan weerskanten, langs de vlakke van den rug, een even breede geele streep, die beiden in de staartspits eindigen, welke eene diergelyke koleur heeft. Onder dezen streep ziet men een paar kleine zwarte vlakken; doch de 9 *luchtgaten*, aan wederzyde, hebben dezelfde koleur van den streep en het staartspits. Voor 't overige schynt de bruine huid dezer rupse met een spiegelnet overtoogen te zyn, *ald.* 48. By haare verandering verbergt ze zich onder de bladeren van haar voedzel, zonder eenig spinzel te maaken, en naa weinig dagen wordt zy eene *Pop*. Het voorste deel van deze is graauw-zwart, en zo ook de steelspits, die aan het achterste einde van 't achterste rood-bruine deel zit; doch beide deze deelen worden allengskens donkerer, *ald.* 49. De *bovenvleugels* van den *Vlinder* hebben eene bruine grondverwe, welke echter, door verscheide heldere en donkere linien en vlakken, hier en daar, afgebroken wordt. Aan den uitersten of achtersten rand, die tusschen de beide eindspitzen staat, hebben zy een breedten, graauw-bruinen zoom, door welken eene tedere, witte kronkellinie loopt; waarop eene andere witte, meer recht uit loopende, doch evenwel iets gedwongen linie volgt; die door eene nevens haar heenloopende zwarte linie des te meer verhoogd wordt. Hierop is een bruine streep te zien, die tegen het lyf aan op zyn breedste is, en zich in den uitersten hoek des vleugels, spits toeloope, verliest. Naast dezen volgt een helde-

re okergeele streep; doch is in de breedte voorwaarts in het witte verdreeven; alsdan volgt een zwarte; naa deze eene witte linie. De *Ondervleugels* zyn meereendeels hoog-roozen rood; vooral omtrent de inleding, alwaar zy als Carmyn gloeien; maar omtrent den achtersten rand valt die roode meer in 't roozen-roode. Door hetzelfde loopen 2 uitgeronde, zwarte dwarsstreepen; en de achterste rand dezer vleugelen heeft eene bleeke, bruinachtig-graauwe bezooming, die eene witte linie genoegzaam tot haar boordzel heeft. Het allengskens spits toeloope *Achterlyf* is, op zyne ondervlakte, geelachtig bruinrood, en op de bovenste donker. Midden door hetzelfde loopt in de lengte een witte streep, door welken weder eene tedere zwarte linie gaat. Ter wederzyde van den witten streep ziet men een donker-bruinen, voorts een helder-bruinen, en daarop volgt de grondverwe, *ald.* 50. Het *borststuk* heeft eene donkerbruine grondverwe; en op ieder zyde van 't zelve ziet men, boven de inleding der bovenvleugelen, een paar eenigzins geboogen streepen, die zich vooraan met elkander vereenigen. De bovenste is geel, en de onderste wit. De *Oogen* zyn groot en roodbruin. De *Sprietzen* zyn knodsvormig, en hebben, aan 't vooreinde, eene kleine nederwaarts geboogen zwarte spits; voor 't overige zyn ze bleekgeel; en zo ook de hairen, die aan de bovenschensels der 6 witte en tedere *Pooten* gezien worden, *ald.* 51.

Vlinder, (de uitnemende fraai getekende,) met hoogroode en zwartgevlakte ondervleugelen, wiens bovenvleugels bruin geruit, en met eenige witachtige geele dwarsstreepen doortoogen zyn;

en *Wiviens Achterlyf oranje geel is; behoorende tot de tweede Classe der Nachtvinders*, IV. 156. enz. Deszelfs *bovenvleugels* hebben eene niet zeer donker bruine grondverwe; welke by zommigen helderer, by anderen donkerer uitvalt; en boven dien schoon groenachtig of koperverwig schynt. Ieder *vleugel* is met ettelijke schuins overdwars slaande, geele, licht-witte, en ongelijk breede streepen voorzien. De *achterrand* is met een smallen zoom ingevat. Het *borststuk* of *voorlyf* pronkt, in den bruinen grond, mede met zodanige vercieringen. De *Ondervleugels* vertoonen zich zo ongemeen hoog en helderrood, dat 'er het fynste Carmyn donker by is. In dezen grond telt men 3 verstrooide, groote, koolzwarte en onregelmatige vlakken, benevens een punt van gelyke kleur. Het *Achterlyf*, dat lang en glad is, heeft eene oranje-geele grondverwe, en is menigmaal met 5 of 6 zwarte stippen, over 't midden van den rug, voorzien. De kleine *Oogen* zyn groenachtig, en de *Sprieten* hairvormig, *ald.* 157.

Vlinder, (*de witte*,) zie *Witte Vlinders*.

Vlinders. De Vlinders, welke onder de Insecten een der talrykste geslachten uitmaaken, worden verdeeld in *Dag-* en *Nachtvinders*. De *eersten* hebben dezen naam, uit hoofde dat ze alleen by dag herom vliegen, en hunne natuurlijke werkzaamheden verrichten; en de *laatste*, om dat ze, zich over dag verborgen houdende, tegen den avond of wel des nachts vliegen. Het getal der *laatste* is ongelijk veel sterker, dan dat der *eersten*, I. 2.

Vlinders, *drieërleie uitneemende fraaje soorten van Vlinders*, behoorende tot de tweede Classe der Nachtvinders, III.

204. enz. Zie de beschryving van elken dezer Vlinders, by *Bacren rups*, (*de bruinhairige*,) volgens IV. 29. enz. by *Nachtvlinder*, (*de groote, wit en kaneel-bruin gevlekte*, volgens III. 206. enz. en by *Nachtvlinder*, (*de bleek blaauwachtig-groene, wit- en zwart geschakeerde*,) volgens III. 207.

Vlinders, (*drieërleie zeldzaame, inland-sche*,) *van onderscheiden Classen*, IV. 42. enz. De *eerste* dezer drie behoort tot de *tweede Classe der Dagvlinders*. Deszelfs 4 vleugels hebben eene schoone, hoogstele, Gummigut-kleur ter grondverwe; en in de *bovenvleugelen* ziet men veele zwarte trekken en dwarsvlakken van ongelijke grootte en vorm, benevens verscheide diergelyke aderen; waartegen derzelver buitenste rand met eene dubbele dwarsrei geslingerde of schubbenvormige trekken als bezoomd is, *ald.* 43. De beide *Ondervleugelen* pronken, behalven de verscheide zwarte trekken en cieraaden, in den geelen grond slaande, nog, in de binnenste rei der zwarte uitgepunte vlakken, met 5 hoogroode, en even zo veele daar aan grenzende blaauwe vlakken. Het eenigzins hairige *Lyf* van dezen Vlinder is, aan zyn voorste deel, zwartgrauw, en met meer hairen bezet, dan aan het achterste, het welk iets helderer van kleur is. De *Sprieten* zyn helderer dan hy zelve, en aan het uiterste einde met een kolfje voorzien, het welk half zwart, en half geel is, en de *Oogen* zyn bruin, *ald.* 44. Het voorste deel van 't *Lyf*, benevens de bovenschenkel der 6 *pooten*, zyn met schoone hoogroode vlakken verciert. De *tweede Vlinder* is beschreeven by *Nachtvlinder*, (*de okergeele en kaneelbruine*,) volgens IV. 45 en de

derde by *Vlinder*, (de *schoone*, *bruine*, met *roozenroode* gevlakte *onder-vleugels* *pronkende*,) volgens IV. 47. enz.

Vlinders, (zevenertleie *zeldzaame*, *Indiaansche*,) IV. 16. enz. De eerste is beschreeven by *Dagvlinder*, (de *Oranje geele Indiaansche*,) volgens IV. 18. de tweede by *Dagvlinder*, (de *ongemeen schoone Indiaansche*,) volgens IV. 19. de derde is een *Vlinder*, van die *byzondere soort der Indiaansche Dagvlinders*, welke *lange en smalle vleugels*, en een *ieder smeedig lyf* hebben. In alle zyn 4 *vleugels* heeft hy *groote*, *doorzichtige*, *bruinbezoomde*, *onregelmaatige vlakken*. In den *bovenvleugel* zyn 'er drie, en in den *Ondervleugel* twee. De *ondervleugels* zyn, aan den *buitenrand*, in den *donkeren grond*, derwyze met *donkere punten* bezet, dat het *schyne*, als of ze met een *snoer paerlen bezoomd* waren. Ook *vertoon*en zich eenige *diergelyke punten* aan den *buitenrand der bovenvleugelen*, IV. 20. De vierde is de *kleine bleekgeele en witte Vlinder*, met *breede bruinbezoomde vleugelen*, behoorende tot de *tweede Classe der Dagvlinders*. De *grondverwe* zynr *Bovenvleugelen* is *zwaavel-geel*, en die der *Ondervleugelen* *wit*. Rondom den *rand der vleugelen* is een *bruin cierraad*, en in de *bovenvleugelen* wordt een *Oranje-geele streep* gezien. De *ondervlakte* is *wit en geelachtig*. De vyfde is beschreeven by *Dagvlinder*, (de *groote boog Citroen- en Oranje-geele*,) met *breede ondervleugelen*, volgens IV. 21. De zesde is beschreeven by *Dagvlinder*, (de *donkerbruine*,) met *lange*, doch *smalle vleugelen*, volgens IV. 21. de zevende by *Dagvogel-*

tje, (het *ongemeen schoone*,) volgens IV. 22.

Vlinder-springkbaan, zie *Klapper springkhaan*.

Vloot, *beschryving van deze*, II. 540. enz. De *Eieren*, waaruit de *Vloot* voortkomen, die de *menschen* en *honden* *plaagen*, zyn *witachtig* van *kleur*, en *langwerpig* rond van *gedaante*. Uit deze *Eieren* worden *geene Vloot* *gebooren*, *gelyk* *zommigen* *zich* *verbeelden* en *schryven*, maar *kleine Wormen*, die des *zomers*, *doorgaans*, binnen 6 *dagen* *uitkomen*; doch 's *winters* *blyven* ze wel 12 *dagen* *liggen*. Als deze *wormen* nog *niets* *genuttigd* hebben, zyn ze *bykans* *geheel* *wit*. Het *Lyf* is *dun*, en *bestaat* uit 13 *leden* of *ringen*, behalven den *Kop*, die van *vooren*, op *zyne* *bovenvlakte*, 2 *korte stompe hoornjes* heeft; ook *zitten* 'er 2 *dergelyken*, doch *wat korter*, voor aan den *bek*. Achter den *Kop* *bespeurt* men, van *boven*, een *geelachtig-bruin vlakje*, en de *daarop* *volgende ringen* zyn, hier en daar, met *hairen* bezet, *ald.* 543. Zy hebben *geene Pooten*, maar aan het einde van 't laatste lid, 2 *nederwaarts* *geboogen* *eenigzins gekromde geelachtige spitzten*, welke hun in 't *kruipen* tot *Naschuivers* dienen, en *zich* in den *beginne* *wit* *vertoonen*, *ald.* 455. In den *zomer* *verloopen* 'er niet meer dan 11 *dagen*, wanneer ze den *vollen wasdom* bereiken. De *Maden*, waaruit *Mannerjes-vloot* voortkomen, worden nooit zo *groot*, als die, waaruit de *Wyfjes-vloot* *gebooren* worden. De *Kop* is iets *geeler*, dan het *Lyf*; heeft een *tanggebit*, en van *boven*, *nevens* de *stompe hoornen*, een paar *Oogen*, *ald.*

ald. 545. Naar verloop van gemelde dagen worden deze Maden weder geheel wit, kruipen in de aarde, en worden volkomen *Vloo-poppen*, zonder Spinzels te maaken, *ald.* 546. Zulk eene *Pop* van 't mannelijk geslacht is kleiner, dan die van het vrouwelyk geslacht; heeft ook een meer om hoog geboogen *Achterlyf*, welks einde met 2 wrattenvormige spitzen voorzien is, waartegen de Wyfjes pop maar eene zodanige spits heeft. Ten aanzien der koleure ziet men ook eenig onderscheid, nademaal de eerste zich wit, en de andere zich bruinachtig vertoont, *ald.* 547. De kleinheid der *Vloo* vertoont ons weinig anders, dan haare bruine koleur en de Pooten. Het *Mannetje* is doorgaans kleiner, dan het *Wyfje*, en boven dit heeft het eerste altoos een na boven geboogen, maar het wyfje een rechthoofden *Achterlyf*. Voor 't overige zyn ze elkander in getalte meereendeels gelyk. De *Kop* is aan beiden zeer klein, *ald.* 549. Ter wederzyde van denzelven ziet men een rond helder blinkend *Oog*. Van onderen aan dezen *Kop* hebben de beide voorste *Pooten* hunne inleding. Tusschen dezelve bevindt zich de *Zuigangel*, welke gansch glad en doorzichtig is, en in het midden uitgehold schynt. De 2 voorste aan den *Kop* zittende, en uit 4 leden te zamen gestelde deelen zyn de *Sprieten*, waaraan men veele korte haitjes bespeuren kan. Ook is deze *Kop*, van onderen, aan de zyden met veele scherpe achterwaarts geboogen spitzen bezet. Achter het *Oog* ziet men een plat schubachtig deel, van eene ronde gedaante, dat met haren begroeid is. Dit houdt men voor het *Oor* der *Vloo*, *ald.* 550. Het op den *Kop* volgende *Lyf* heeft 12 leden of ringen, die

genoegzaam uit schubben te zamen gesteld schynen, welke zich allerduidelijkst op de bovenzijde vertoonen. Allen zyn ze, van boven op de vlakke van den rug, met na achteren uitsteekende styve, en harde haarspitzen voorzien. Aan de 5 eerste ringen zyn de meeste en grofste te zien. De 6 *Pooten* aan den *Kop*, en het Voorlyf, bestaan uit 4 hoofdeden, het laatste met een dubbelen klauw voorzien zynde. Het achterste paar *Pooten* is het langste. De beide bovenste en dikste deelen dezer *Pooten* zyn aan alle zes geheel glad; maar de overige deelen zyn met veele grove en styve haren van ongelyke lengte bezet. Aan 't laatste lid van 't *Achterlyf* zien we aan het *Mannetje* 2 opwaarts geboogen bladvormige deelen, die aan hunnen buitenrand met haren begroeid zyn. Deze deelen versprekken eigenlyk tot eene soort van nyptang, en onder dezelve legt het teelddel verborgen, *ald.* 551. Het *Wyfje* in tegendeel is aan het laatste lid met een wrattenvormig uitsteeksel voorzien, het welk van buiten met veele haren bezet is; wat laager ziet men nog een ander rond deel, dat insgelyks met haren bewassen is; en onder dit is eerst de opening, waar door de *Eieren*, in de paaring met het *Mannetje*, bevrucht worden. By de paaring zit het wyfje altoos op het mannetje, en zy blyven menigmaal een uur lang vereenigd, *ald.* 552.

Vlookruid, zie by *Perficaria*.

Vloo-valle, beschryving van deze, II. 548. Men laar een yvooren pypje draagen, dat van binnen hol, en van buiten met veele gaatjes voorzien is; waarin dan een cylindrecht spilletje geschroefd wordt, dat men met versch en

en nog warm bloed bestrykt. Vermits nu dit bloed de Vloen lokt; zo blyven de-zelve, door de gaatjes na binnen gekroopen zynde, aan het met bloed beftreken spilletje hangen, en worden dus in de val geknipt: hierop kan men het spilletje daaruit trekken, en alle de Vloen, naar believen, na het Ryk der dooden zenden, *ald.* 548.

Voedzel der Vlinders, waarin bestaat het toch eigenlyk? Wy zien wel, dat ze op bloemen en bloeffems vliegen, I. 363. en als men de werkzaamheid der Dagvlinders oplettend beschouwt, kan men duidelyk ontdekken, dat ze, op de bloemen zittende, den *Zuiger* nu uitfteeken en ontwikkelen, dan weder intrekken en te zamen rollen; waaruit natuurlyk te begrypen is, dat ze door dit werktuig hun voedzel ophaalen. Doch dan blyft het nog eene onvoldongen zaak, of de Vlinders het fap der bloemen zelve uitzuigen, dan of ze alleenlyk den dauw, die op de buitenzyde der bladeren zit, afflikken. Het laafte is niet waarfchynlyk. Want indien de bloote Dauw alleen genoeg ware tot hun voedzel, behoeften zy denzelven niet alleen op de bloemen te zoeken, maar zouden dien, overal, op het gras en de bladeren genoegzaam konnen vinden. Daarenboven ziet men de *Dagvlinders* meest omrent de bloemen zweeven, wanneer de hitte op haar grootfte, en 'er by gevolg geen Dauw, maar alles droog is. De *Nachtvlinders* zouden ook, tot inzuiging van den nachtdauw, geene zo lange *Zuigers* noodig hebben, als men by veelen van dezelve ontdekkt. Derhalve moeten wy vast ftellen, dat de *Vlinders*, door middel van hunnen kunftig, daartoe gefchikten *Zuiger*, het fap zelf uit de bloemen trekken, en daar hun voed-

zel van ontvangen, zo dat ieder geflacht van eene zekere foort van bloemen leeft, naar welke de gefteltenis hunner *Zuigers* geëvenredigd is, *ald.* 364.

Voelboornen, noemt men de 2 hairvormige *Sprieten*, aan de einden met kolfachtige knobbeltjes voorzien, I. 12. Dr. SULZER is van gedachten, dat mogelyk de *Sprieten* of zo genoemde *Voelboornen* het zelfde by de Inftekten verrichten, het geen anders de *Ooren* by andere fchepzels doen, en dus de *Ooren* of gehoortuigen dezer fchepzelen zyn; vermits hy vermoedt, dat derzelver innerlyke gefteltenis wel ligt overeenkomen mogt met de gefteltenis der werktuigen des gehoors by anderen, I. 466.

Voorjaar augft, zo wordt ook het *Hafst* of *Oeveraas* genoemd, II. 230.

Vuurworm, by dezen naam is de *hariker*, of het zo genoemd *vliegend bart* in *Duitschland* bekend, I. 57.

W.

Wachtels, Kwartels of Kwakkelen; van deze komt, alle jaaren, omrent en by *Rome*, in den herft, eene groote menigte over, en dan begeeven zich veele arme lieden na den zeekant, om de aankomft dezer Vogelen af te wachten. Wanneer zulk een zwerin den oever bereikt, en op het naafte land nederftrykt; dan zyn ze zo afgemat en krachtloos, dat men ze met de hand vangen, of met ftokken doodflaan kan, II. 416. Vervolgens brengt men eenige dagen na elkander deze *Wachtels* binnen *Rome* te koop, alwaar ze dan zo menigvuldig gegeezen worden, dat men 'er een walg van krygt, *ald.* 417.

Wachter, zie *Slakken-Kreeft*.

Wandelaars, worden die veelerleie foorten

ten van *Springspinnen* genoemd, die haaren buit altoos met een snellen sprong verrassen en vangen, en, gemerkt zy bestendig heen en weder wandelen, ook den naam van *Wandelaars* draagen, IV. 194.

Wandelend blad, zie *Wandelende blad*, (bet zo genoemde.)

Wandelend blad, (afbeelding van zulk een;) dat met recht dien naam verdient, II. 373. enz. Het *Lyf* en de beide *vleugels* van dezen *Springkbaan* vertoonen, natuurlijk, 2 op elkander liggende boombladeren; en hy verdient alleszins den naam van een *wandelend blad*. De *vleugels*, geslooten zynde, maaken maar een blad uit. De 3 wezenlyke *Aderen* van ieder *vleugel* zyn eenigzins verheven, en tusschen dezelve zyn nog veele kleine en tederer *Aderstjes*, even als in een natuurlijk blad, te zien. Het *Achterlyf* eindigt met eene spits; in 't midden is het op zyn dikst, en vervolgens wordt het allengskens zo dun, dat het aan de buitenkanten, ter wederzyde, niet dikker zy, dan een blad van een boom. Midden door dit *achterlyf* loopt, in de lengte, eene verheven linie, die van 8 andere dwars doorsneeden wordt, welke juist zo veele leden of ringen vertoonen. In 't laatste lid ziet men eene gespleeten opening, waar door dit Insect zyne vuilgheid uitgeeft. Vooraan wordt dit *lyf*, even als de *vleugels*, tamelyk smal, doch de *bals* vertoont zich nog dunner. De *Kop* is langwerpig rond, en met 2 kleine, ronde, en kort by den bek staande *Oogen* voorzien, nevens welke de haardunne *Sprieten* haare inleding hebben, *ald.* 374. Het voorste paar *Pooten* heeft aan den hals zyne inleding; het middelste paar zit aan het borstdeel, het welk we-

derzyds met korte spitzen bezet is; en het 3de of achterste paar *Pooten* zit aan het grootste en laatste borstlid van het voorlyf vast. Alle de 6 *Pooten* hebben daarin iets byzonders, dat ze aan de zyden der bovenschenkelen met bladvormige vercierselen verrykt zyn, en aan de scherpe kanten zyn ze als eene zaag ingetand. De dubbele *klaauw*, waarmede ieder poor eindigt, is duidelyk te bespeuren. De koleur van dit Insect is helder groen. Wanneer deze *Springkbaan* onder het afgevallen loof der boomen stil zit, zal het allerscherpst ziende oog hem menigmaal over het hoofd zien, *ald.* 375.

Wandelend blad, (een zeer byzonder zo genoemd,) II. 309. enz. Dit Insect was in *Ceylon* van een boom gevallen, *ald.* 309. en de inwooneren diens lands waren volstrekt van gevoelen, dat het op de boomen groeide, of uit derzelver bladeren voortkwam. Dit Diertje wordt, dikmaals, van verscheide koleuren gevonden; nademaal zommigen groen, anderen geel, en eenigen den verwelkten bladeren gelyk zyn; ze worden ten deele met *vleugelen* voorzien, en ten deele zonder *vleugelen* gevonden, *ald.* 310. De *Kop* is lang en smal, voornaamlyk omtrent den bek: tusschen de ronde, verheven en groote *Oogen* ziet men eene lange *Kuif*, die uit 2 deelen of spitzen te zamen gesteld schynt te zyn; en nevens deze staat een paar tedere *Sprieten*, welke eene byna even gelykelengte met de *kuif* hebben. De *bals* en het gansche *voorlyf* is veel langer, dan het *achterlyf*; welke hals en *voorlyf* maar uit een stuk schynen te bestaan. Aan ieder zyde vertoont zich een breed en te gelyk dun scaouderblad, welke beide te zamen niet kwalyk gelyken na
een

een hartvormig uitzetzel, dat onder aan de oranje-bladeren te zien is. Onder dezelve hebben de 2 voorste *vangpooten* hunne inleding, welker bovendeel zeer rank is, en van anderen eene kleine spits heeft. Het daarop volgende lid valt tamelyk in 't breede, maar is daarby zeer dun, en de kleine spitzen, die ter wederzyde onder aan de smalle vlakten zitten, geeven genoegzaam te kennen, dat deze voorpooten tot het vangen geschikt zyn; het welk de daarop volgende klauw, waaraan men insgelijks eenige scherpe spitzen bespeurt, nog duidelyker aantoon. De overige *Pooten* zyn teder, lang en dun. Aan de bovenschenkels, by het knielid, wordt wederom zodanig een bladvormig deel gezien, gelyk 'er aan den hals zit, doch het welke zich hier iets smaller vertoont. Het *Achterlyf* is wel het dikste deel; maar of het ook met vleugelen voorzien zy, gelyk het schynt, heeft de Schryver uit de hem toegezonden afbeeldingen niet duidelyk genoeg kunnen bespeuren. Aan 't einde van dit achterlyf ziet men 2 na beneden geboogen spitzen, die op eene dikker spits staan; *ald.* 311. doch ter wederzyde heeft dit achterlyf, wegens de aldaar zynde cieraaden, volkomen de gedaante van een uitgekorven en ingewikkeld blad, *ald.* 312.

Wandelende blad, (het zo genaamde,) met deszelfs Eieren en Jongen, en Eigenschappen, IV. 66. Dit schepzel wordt in *Duitschland*, *Frankenland*, *Zwitserland*, verscheide Gewesten van het *Russisch Ryk*, en in *Oostindie* gevonden, *ald.* 66. De *Eierklomp* schynt met louter lange en smalle dwarschubben bedekt te wezen, en heeft eene blinkende, okergeele, bruinachtige ko-

leur. Zyne lengte belooft ongeveer een en drie vierden duim, en, in het midden, daar hy het dikste is, heeft zyn doormeter de lengte van twee derde duims. Aan het onderste einde is hy meer kolfachtig of stomp, dan aan het bovendinde, dat meer spits uitvalt, en na genoeg eene foort van Kop verbeeldt, *ald.* 67. Na 5 dagen kwamen op de bovenvlakte, in 't midden, naar de lengte, allengskens, in eene dubbele reil, verscheide langkwerpige eironde bolletjes te voorschyn, en uit dezelve kroopen wel dra, hier en daar, kleine leevende schepzeltjes, welke niet anders zyn, dan jonge wandelende bladen, die anders ook *Mantes* genoemd worden. Het *Ei*, te vooren geel zynde, was nu gansch wit en doorzichtig, gelyk eene blaas. Deze *jonge wandelende bladen* zyn, in het begin, schoon- oker- of oranje-geel; maar deze koleur verandert, binnen een half uur, in eene bruine, en wordt vervolgens gansch bruin, *ald.* 68. Hunne spys is eene foort van zwarte bladluizen van de vlierstruiken; maar anders neemen zy ook muggen en kleine Springhaantjes en meelwormen aan, *ald.* 69. en *aanm.* In *Augustus* en *September* zyn ze volwassen. De ken- tekens ter onderscheiding van de *Wyfjes* en *Mannetjes* bestaan hierin, dat de laatste altoos veel kleiner zyn, dan de eersten, en dat de mannetjes een ongelyk dunner en ranker lyf hebben, dan de wyfjes, *ald.* 71. Het *Wyfje* heeft veel korter *Sprieten*, dan het *Mannetje*. De beide *Oogen* hebben een zwart beweegelyk punt, en zyn uit veele kleinen te zamen gesteld; hunne koleur is by de leevende blinkend groen. De platte en linzenvormige *Kop* is, van boven, aan zynen scherpen rand, tot

over de helft der oogten, roozenroodgeboord, welke koleur ook de *Sprieten* hebben. Van vooren, midden in den Kop, tusschen de oogten, staan 3 geele, kleine knopjes. De *mm* is met een kort *tanggebit* voorzien, dat aan ieder zyde 2 roozenroode *vreetspitzen* heeft. Het lange en dunne *borststuk* heeft, wederzyds, van 'sgelyken, een roozenrood boordzel, dat als eene bezooming voorkomt. Aan 't einde van het *achterlyf* zitten 2 weeke, nederwaarts geboogen *voelarmen*, waarmede de wyfjes zo wel, als de mannetjes, voorzien zyn, *ald.* 74. Ter plaatze, alwaar de inleding der vangpooten aan het lyf is, ziet men een zwart vlakje, in 't welke men te gelyk, menigmaal, een iets kleiner wit vlakje ziet: ook is de *bovenschenkel* daaromtrent met witte punten besprenkeld. In het hierop volgende *scheenbeen* wordt men, omtrent het midden, eene zwavel-geele vlak gewaar, en, benevens de scherpe vangklaauw, de eigenlyke tedere Poot, die uit ettelijke leden bestaat, *ald.* 75.

Wandluis, (de,) welke ook de *Papierluis* genoemd wordt, en dien naam heeft, om dat haare gedaante veele overeenkomst heeft met die van eene luis, behoort tot de Insecten, die geene verandering onderworpen zyn; heeft geene vleugelen, maar lange *Sprieten* en 6 *Pooten*, van welken de achterste de grootste en langste zyn, II. 110. Dit Insect wordt, in de Drukkeryen, in oude boeken en tusschen gedrukte bladen papier gevonden, maar het doet 'er geen schade aan, en kan zeer snel loopen. 'Er is nog eene andere soort, die zich meest in de tuinen en op de velden onthoudt. Deze is niet zo blank, als de

eerste, maar meer donker graauw-bruin van koleur; doch voor het overige van het zelfde maakzel; men kan ze onder de bloemen-knoppen en elders by menigte vinden, *ald.* 111.

Wapendraager, zo wordt onder de Insecten-liefhebbers de *Vlinder* genoemd, die uit de zwart- en geel-gestreepte, *baarige* groote *Rups* voortkomt, I. 261.

Waterdraad, (de,) van DILLENIUS, (*Conserva gelatinosa omnium minima*,) zou, volgens de naauwste waareemingen van BONAVENTURA CORTI, geene leevlooze waterplant, maar een leevend, en wel zodanig een dier zyn, dat alleleie willekeurige beweegingen maakt, werklyk het licht zoekt, en zich door verdeeling vermenigvuldigt, III. 410. *aann*

Water insecten, die de verandering ondergaan. Onder dezelve vindt men eenigen die 6 *Pooten* hebben, gelyk de wormen der Waterkevers en Water-nimphen, het Oever-ais, enz. Zestien *Pooten* hebben de Water-rupsen, die in Motten veranderen. Geene *Pooten* hebben de Water-maden enz. Onder de *Water insecten*, die niet veranderen, vertoonen zich zommige met 6 *Pooten*, als de *Water-luizen* enz. met 8 *pooten* ziet men de *Water spinnen* enz. met 10 *Pooten* de *Kreeften-soorten* enz. met 14 *pooten*, de *Water oxelworm* enz. Zonder *Pooten* zyn de *bloedzuigers*, de *mosselen* en *slikken* enz. I. Voorrede, * 3. *Eerste Classe der Water insecten*, waarin de zo genoemde Water-kevers, in 't algemeen, volgens hunnen oorsprong, verandering, en andere wonderbaare eigenschappen beschreeven worden, II. 143. enz. *Tweede Classe der Water insecten*, waarin derzelver oorsprong

spiong, verandering, en andere wonderbaare eigenschappen in het daglicht gesteld worden, II. 174. enz.

Water-kever, zie by *Water-worm*.

Water-kever, (de kleine, blinkende, zwarte en sinkende,) benevens zyne voortteeling, behoorende tot de eerste Classe der water-insecten, III. 168. enz. Deze wordt, van 't voorjaar af, tot in den herfst, in alle wateren, en zomtyds by menigte te zamen gevonden. Hy heeft, boven anderen, deze eigenschap, dat hy een walgelyken reuk van zich geeft, derwyze, dat men den stank wel 8 of 10 treden van daar konne ruiken, *ald.* 168. De *Kop* is klein, en met een paar stompe korte *Sprietjes* voorzien: het *borststuk* wordt allengskens breeder; en de harde vleugeldekzels zyn in het midden op zyn breedste. Achter dezelve steekt nog een gedeelte van het spits toeloopend *achterlyf* uit, dat blaauwachtig graauw schynt, en aan het einde 2 geelachtig-roode, korte spitzen heeft. Voor 't overige is deze *bovenvlakte* donker zwart-graauw; doch haar glans doet dezelve in het blaauwachtig-witte spelen; en de 6 *Pooten* zyn zodanig onder het lyf verborgen, dat het toefschyne, als of zy 'er in het geheel niet waren. De *ondervlakte* is volkomen dof-zwart, en gansch plat; ook worden aldaar de 6 *Pootjes* gezien, die eene geelachtig-roode koleur hebben. Het uiterste deel der *achterpooten* heeft eenige vouwen of ploojen, en ieder deel is met tedere aderen doortoogen, *ald.* 169. De *Eieren* zyn blinkend, bleek stroo-geel, en rond van gestalte, maar driemaal langer, dan dik. Binnen 3 weken komen de jonge *wormen* uit dezelve voort. De jonge *Worm* is gansch doorzichtig, en geelachtig.

wit; doch de *Kop* vertoont zich bruinachtig, gelyk ook het eerste daarop volgende lid. Het gansche *Lyf* bestaat uit nog 12 andere leden, die allengskens in dikte afneemen, en waarvan het laatste vier tedere spitzen heeft, welker beide middelsten de kortsten zyn. Aan de 3 voorste leden hebben de 3 paar tamelyk lange *pooten* hunne inleding; en aan de zyden der overige leden wordt men 9 vederpitzen gewaar, die allen zydwaarts na achteren uitsteeken, en door den worm vlak aan het lichaam geleid konnen worden. De voorsten dier vederpitzen zyn de langsten; en de achtersten de kortsten; doch allen zyn ze wit, welke koleur ook de 4 tedere spitzen, die aan het staartlid zitten, benevens de 6 Pooten hebben, *ald.*

Water-kever, (de zwarte,) van middelbaare grootte, met eene ronde verheven bovenvlakte, benevens zynen worm en deszelfs verandering, II. 167. enz. Deze wordt alle jaaren, van het voorjaar tot in den herfst, in stil staande wateren gevonden, *ald.* 167. Deszelfs *bovenvlakte* heeft eene zwart-blinkende koleur, en aan het deel, dat de vleugeldekzels uitmaakt, schynt hy wel het meeste rond verwulfd te zyn. De *Kop* is met 4 *Sprietten* voorzien, van welke het vooraan staande paar langer is, dan die op zyde by de oogen uitsteeken; doch beide de paaren hebben aan de eindden zwarte kolfjes, en zyn, voor 't overige, benevens de 6 pooten, roodachtig-bruin van koleur. De *ondervlakte* is doorgaande roodachtig bruin. Het kortste paar pooten staat onder het halschild, en de 2 overige paaren zitten aan het achterlyf vast. Ieder poot bestaat uit 3 deelen; waarvan het laatste, aan de 4 achterste, van omtrent 5 kleine leden

leden te zamen gesteld, en tot aan 't middelste en grootste deel, daar de 2 doornpunten staan, met bruine hairen begrooid is, *ald.* 168. De *worm*, waaruit hy zynen oorsprong heeft, is, in zyne volkomen grootte, ongeveer 1½ duim lang. De *Kop* is met zyn groot takkig *tanggebit* okergeel; tusschen de vangtang, voor aan den *Kop*, is een Zuigpunt, dat eenigzins breed en stomp is, en waaraan van vooren nog een kleiner deeltje zit, het welk de *Worm* uitschuiven en intrekken kan. Van onderen deze vangtang komen 4 tedere geele *Sprieten* te voorschyn, waarvan de 2 buitensten langer zyn, dan de 2 daartusschen staande. Verder ziet men ook op den *Kop*, in het midden, eene zwarte langwerpige vlak, welke van vooren als eene vierkante ruit eindigt, en ter wederzyde wordt men insgelyks de *Oogen* gewaar, die uit ettelijke zwarte puntjes te zamen gesteld zyn, *ald.* 170. Het daarop volgende *halschild* is rond verheven, bruin van koleur, boven dien met zwart bruine gekromde streepen getekend, en ook met diergelyken aan 't einde geboord. Dewyl de verheven ringen van het lyf diepe inkervingen hebben, zo ziet men ook eene zeer scherpe affnede van de beiderleie koleuren. De bovenste is bleek-bruinachtig-graauw; de onderste bleek graauwachtig-wit; doch deze beide alzo gekoleurde deelen zyn doorzichtig. De 14 weeke en takkige *zwem- of vin-vederen*, die ter wederzyde dwars afstaan, zyn wit-graauw, en zo zien 'er ook de tedere, aan 't achterende zittende en binnenwaarts geboogen *haakspitzen* uit; maar de 6 *pooten* zyn geel; en aan de 2 eerste leden of ringen hangen, in plaats van vin-vederen, ettelijke hairtjes op een punt te za-

men, *ald.* 171. Naa dat hy 4 weeken in zyn hol onder de zoode met aarde verborgen heeft gelegen, verschynt hy in de gestalte van eene *Pop*, die eene groenachtige wit graauwe grondverwe heeft. De geboogen *buid* is boven den *Kop* met bruin-geele hairen bezet, en de in den *Kop* zittende *Oogen* zyn bruin. De leden van het *achterhlf* vertoon zich aan de zyden met groenachtig-witte hairen bezet; en aan het achterende ziet men een geel lid, dat met 2 spitzen eindigt, en zeer veele gelykenis heeft met een sikkel of halve maan, *ald.* 172. Naa verloop van 10 dagen verschynt daaruit een witte en nog gansch weeke *Keuer*, en naa 8 dagen is hy, zo als hy vooraf beschreeven is, *ald.* 173.

Waterluis, (de breedlywige, zwart-bruine,) met het geel bezoomde achterlyf, benevens baare voortplanting, III. 155. enz. Deze is, alle jaaren, genoegzaam by menigte, in poelen en staande wateren te vinden, en heeft ten aanzien van den omtrek des lyfs, en de gedaante der vleugelen, eene zichtbaare overeenkomst met sommigen onzer grootste boomluizen, die zich nooit in het water onthouden. Haare *Eieren* zyn meer rond dan die der andere soorten van waterluizen. De Jongen erlangen eerst hunne geheele grootte naa de vierde verandering van huid; op welken tyd zy ook hunne 4 vleugels krygen. De tyd van hunne volwassenheid is eerst in de maand *Augustus*, maar ze paaren niet voor in de lente van het volgende jaar. De *Kop* is wel tamelyk breed, maar teffens zeer stomp. De *hals*, of liever het *borststuk*, heeft nog meerder breedte, dan de *Kop*; doch beiden hebben ze eene bruine koleur; en de platte *Oogen* zyn

zyn zwart. De *Vleugels* zyn meer helder-, dan donker-bruin. Het *Achterlyf* heeft eene oranje-geele bezooming, en is met zo veel scherpe insnydingen voorzien, als 'er leden of ringen aan dit achterlyf geteld worden, *ald.* 156. De ondervlakte van den kop en het voorlyf, nevens de vangpooten, hebben eene groene koleur, waartegen de overige 4 *pooten*, zo als het achterlyf, deels okergeel, en deels bruin zyn. De *roecipooten* bestaan uit 3 gewrichten zonder klauwen, van welken het eerste en tweede, aan den achtersten rand, ten sterkste met styve hairen bezet zyn. Het middelste paar *pooten* is zeer dun en teder, en aan het uiterste einde met een dubbelen klauw voorzien. De *vangpooten* hebben alleenlyk 2 in dikte zeer ongelijke leden. Het voorste bestaat uit een enkelen scherpen klauw; en het achterste, dat zyne inleding aan het borststuk heeft, is veel dikker, dan alle de overige pooten. De *steek-zuiger*, of *Zuig-angel*, is gelegen aan de borst, tusschen de beide voorpooten. De *bovenvleugels* zyn bruin, en hebben, aan den voorsten en achtersten rand, eene inkerving; waartegen de ondersten, met eenige weinige aderen doortoogen, dof witachtig van koleur zyn. Het *achterlyf* is, vooraan, meestal zwart; doch van achteren helderder en meer bruin, *ald.* 157. *Sprieten* kan men aan deze foort van waterluizen niet ontdekken, *ald.* 158.

Waterluis, (de groote) dezer gewesten, met 2 *vangpooten*, en eene zonderlinge *luchtpyp*, II. 126. enz. Als zy uit het *Ei* voortgekomen is, is haare koleur flykachtig aardverwig; in de maand *July*, wanneer ze reeds 2 maal van huid veranderd is, vindt men ze veel grooter.

In *Augustus* geschiedt de derde verandering, en dan vertoonen zich de *vleugelscheden*; doch haare koleur is, op dien ouderdom, niet altoos even eens; want ettelijken behouden haare eerste flykachtige grondverwe; anderen in tegendeel zyn geelachtig oker-bruin. De vierde huid neemen ze in *September* of *Oktober* aan, wanneer ze zich na den oever in het riet begeeven, boven de oppervlakte des waters; op dat haare 4 *vleugelen*, die nu te voorschyn komen, beter mogen groejen, zich uitbreiden, en met het gansche lichaam des te sterker worden. De koleur van het *manne-tje* en *wyffe* is dof-aardverwig. Aan 't uiterste einde van het *achterlyf* zien wy als een recht uit steekenden priem, welke nogtans niet zo zeer een priem, als wel eene *luchtpyp* is, zynde deze half zo lang als het gansche schepzel, *ald.* 128. Voor aan dit achterlyf formeeren de *bovenvleugels* een drie- of sluithoek, en voor denzelven staat het *voorlyf* of *borststuk*, dat een aan de hoeken afgestompt vierkant vertoont. De beide voorste hoeken steeken eenigzins uit, en tusschen dezen zit de kleine *Kop*, zonder hals, met eene nederwaarts geboogen spits; waarin de *steek-zuiger* verborgen is. De beide *Oogen* zyn blinkend rood. Voor aan den *Kop* hebben, ter wederzyde, de beide *Vangpooten* hunne inleding. Het middelste paar *pooten* is het kortste; waartegen het achterste paar wel zo lang uitvalt, als het voorste; doch deze 4 laatste *pooten* zyn dun en rank, hebbende hunne inleding van onderen aan 't achterlyf, en zy zyn, aan 't uiterste einde, met 2 kleine by elkander staande klauwen voorzien. De *bovenvlakte van het achterlyf* is met eene zeer schoone, dof hoogroode ka-

neel-koleur verciend; maar vooraan na 't borststuk toe, ter plaatze van den sluit-hoek, is de grond zwart, en in denzelven bespeurt men, wederzyds, een overdwars staande heldere punt; waartegen, op ieder inkerving van 't lyf, altoos in 't midden, eene zwarte, verdreeven, ruitvormige vlak te zien is. De beide *Ondervleugels* hebben een doorzichtigen, bleek-bruinen grond, en derzelver grofste aderen, die by de inleding 't breedste zyn, hebben ook eene kaneelverwige roode koleur. De 2 *bovenvleugels* vallen wat langer en smaller uit; hunne grond is aardkoleurig; en aan het uiterste einde ziet men ze van 's gelyken eenigzins doorzichtig, *ald.* 129. De *paaring* van dit Insect geschiedt altoos in 't voorjaar, tot op het einde der maand *Mai*; en naa de paaring ontlafst het wyfje zich van zyne *Eieren*, niet door de luchtpyp, maar uit eene opening van 't achterlyf, die kort by en onder dezelve is, *ald.* 131. Deze *Eieren* zyn helder geel, maar de 7 vederispitzen, rondom elk als zo veele straalen staande, zyn, van het midden tot aan het uiterste einde, schoon-rood. Naa dat deze *Eieren* 12 of 14 dagen gelegen hebben, komen de jonge, vooraf beschreeven, luizen daaruit te voorschyn, *ald.* 132.

Waterluis, (de groote lange en smalle,) met 2 *vangpooten* en eene *luchtpyp*, III. 132. enz. Deze onthoudt zich in poelen of stil staande wateren. In haare eerste jeugd wordt ze doorgaans in *Mai* en *Juny* gevonden, en haar ontbreekt dan niets dan de luchtpyp en de vleugelscheden. In *Augustus* krygt zy haare tweede huid, en dan valt de luchtpyp reeds duidelyk in 't oog. Naa de derde huid verschynt ze met de vleugelscheden, en haare koleur is dan nog dezelfde,

naamlyk over het algemeen okergeel, hoewel 'er ook eenigen iets bruiner zyn; maar het lange en smalle achterlyf begint dan reeds Oranje-geel, en aan het einde by de luchtpyp bruiner te worden, *ald.* 133. By de vierde en laatste verandering komen de 4 vleugels in vryheid, beginnen straks te groeien en zich uit te breiden. De *Vangpooten* hebben naby den Kop, voor aan het borststuk, of aan den hals, hunne inleding. De *Kop* is klein, en de *Oogen* zyn zwartblinkend kogelvormig. Het *voorlyf* of *borststuk* is, tot over de helft, wel zeer dun of rank, maar wordt na achteren allengskens dikker, en is, ter plaatze van de inleding der 2 *bovenvleugelen*, op zyn dikste. De grondverwe dezer deelen, benevens der overige 4 dunne *Pooten*, is oker bruin, hoewel aan zommigen iets geelachtiger; en de smalle *bovenvleugels* zyn van dezelfde koleur, maar hebben meerendeels een donker-bruinen weerschyn, waartegen hunne uiterste einden veel helderer en doorzichtiger zyn, *ald.* 134. De *Ondervleugels* zyn wel korter, doch daarentegen aan het lyf zo veel te breeder. Ter oorzaake van hunne tedere gesteltenis zyn ze, als het Marien-glas, doorzichtig. By de inleding vallen ze in 't blauuwe, aan 't uiterste einde worden ze geelachtig bruin; en de aderen, die 'er doorloopen, zyn donker en zwartachtig. Het *Achterlyf* vertoont van vooren 2 heldere punten; heeft wederzyds eene saffraan-geele bezooming; en de gansche daar tuschen zynde vlakke is kaneel-rood. Dit achterlyf heeft van achteren een byzonder dun lid, aan 't welke de lange en dunne *luchtpyp* verknocht is. Haare 6 *Pooten* zyn met donkere vlakken besprenkeld. De *Zuiger* zit aan den Kop vast; heeft

aldaar

aldaar zyne inleding; bestaat, volgens het uiterlyk aanzien, uit 2 deelen, en is aan 't uiterste einde met haartjes bezet, *ald.* 135. De *Luchpyp* dezer Waterluis kan in 2 deelen worden gespleeten, dienende wezenlyk tot de ademhaaling. De paaring geschiedt, gemeenlyk, in het voorjaar; latende het Wyfje de *Eieren* in het water op den grond vallen. Deze hebben eene langwerpige gestalte, en helder-geele kleur, en zyn met 2 spitzen voorzien, die enkel wit zyn. Naa 14 dagen kruipen 'er de jonge Waterluizen uit, *ald.* 137.

Waterluis, (de groote Surinaamsche breedlyrige.) III. 146. enz. Deze uitheemsche *Waterluis* is van de onze onderscheiden door de *luchpyp* aan het laatste lid van 't achterlyf, als welke veel korter is, dan aan de luis, die zich in onze wateren onthoudt. De bovenvlakte van het *achterlyf* is okergeel. Haare beide voorste *vangpooten* overtreffen de anderen in dikte; en zyn ook in al het overige den *vangpooten* van onze *Waterluis* gelykvormig. De dikke *bovenschenkel* heeft, aan den voorsten rand, eene goot of sleuf, wier beide scherpe randen met vele tedere spitzen bezet zyn. De uiterste klauw komt, als het Insect zyne *vangpooten* sluit, boven aan den dikken schenkel te liggen, *ald.* 147. De overige *pooten* hebben 3 hoofdgewrichten, en zyn met haren begroeid. Aan 't uiterste einde hebben zy een tweevoudigen klauw, welken de Luis zodanig te zamen trekken kan, dat ze maar enkelvoudig schynen. De *Oogen* zyn dermaate groot, dat ze meer, dan 2 derde deelen van den *Kop* uitmaaken. De schede van den *speekzuiger* zit voor aan den *Kop*;

en is aan den bodem tamelyk dik, maar loopt na vooren zeer spits toe. De kleur dezer *Waterluize* is aan het *voorlyf*, benevens de *pooten* en breede *voorvleugelen*, helder- en donker-bruin gevlaakt, doch de buitenste rand dezer bovenvleugelen heeft nog eene byzondere, breede, donker-bruine vlak, en eene doorzichtige bleeke bezooming, van eene geelachtig bruine kleur. De beide breede *Ondervleugels* zyn daarentegen zeer dun, graauwachtig, of dof doorzichtig, en met etelyke bruine aderen doortoogen, *ald.* 148.

Waterluis, (de kleine smallyrige,) met het roodachtig oranje-geele achterlyf, IV. 149. enz. De jongen van deze geraaken, naa de vierde verandering van huid, eerst tot den volkomen wasdom; haar voedzel bestaat ook enkel in andere water insecten: in 't voorjaar vliegen ze mede uit den eenen in den anderen waterpoel; en, naa dat ze gepaard geweest zyn, konnen zy geen winter meer overleeven. Het gansche *Lyf* van deze *Waterluis* is klein, smal, en byna doorgaande van eene gelyke breedte. Op den *Kop*, die eene tamelyke breedte heeft, ziet men van boven eene kleine geele vlakte, en de beide *Oogen* zyn donker-bruin, *ald.* 159. Het bruine blinkende *balschbild* loopt na achteren spits toe, zonder dat 'er, verder, achter het zelve een byzonder afgedeelde sluithoek te bespeuren zy. De *bovenvleugels* hebben eene iets geelachtig-bruine grondverwe, en zyn, behalven de heldere linien, die op den rug in een hoek te zamen loopen, met donker-bruine punten bezaaid. De 6 *Pooten* zyn helder-geel; de achterste of *Roepoot* n vindt men de langste, en 't meest met haren bezet. De voorste of *vangpooten* zyn

zyn de allerkortste, en in maakzel onderscheiden van die der andere Waterluizen. Het *Achterlyf* heeft eene schoone vuur-roode of hoog Oranje-geele kleur; en over het midden loopt een breede zwart-grauwe streep, van den hals af tot aan het laatste lid, dat helder-geel is; en ter plaatze, daar 't oranje-geele aan de zyden ophoudt, zyn de beide scherpe randen met zwarte punten bespikkeld. Dit achterlyf bestaat uit 7 afdeelingen of inkervingen, van welken de 2 laatste met hairtjes bezet zyn. Het uiterste klauw-deel der *vangpooten* is, aan den binnenkant, met eene rei, styve, bruine hairen bezet. De grondverwe dezer *pooten* is, gelyk die van den Kop, helder-geel; de *Zuig-angel* is zo kort en teder, dat hy naauwlyks in 't oog valle, *ald.* 160.

Waterluis, (de,) met de geele bovenvleugelen, welke gewoon is, op den rug te zweemen, nevens haare voortplanting, III. enz. Deze is, den ganschen zomer door, alle jaaren, in poelen en staande wateren, in grooten getale te vinden; maar vliegt, met eene snelle vlugt, van den eenen na den anderen poel, en valt zo plotseling in het water, dat men niet anders denken zoude, dan dat 'er kleine steentjes in geworpen wierden. Zy paaren gemeenlyk in *April*, of in 't begin van *Mai*. Het *wyffe* ontfalt zich, binnen 8 of 12 uren, van zyne bevruchte *Eieren*. Deze zyn langwerpig-ovaal-rond van gestalte, en helder okergeel van kleur. Naa 9 of 10 dagen krygen zy ter plaatze, daar het voorste deel of de Kop der jonge luizen zit, een paar hoogroode punten: doch zodanig eene Waterluis heeft bykans 14 dagen noodig, eer ze in staat is, den Eierdop te verlaten, *ald.* 150.

Haare *Oogen* hebben alsdan eene roode kleur, die zy nog lang behouden, schoon haar lyf okergeel zy, *ald.* 151. Zy verandert 4 maal van huid. Naa de derde verandering is haare grondverwe meestal nog okergeel; doch ter plaatze, daar anders de bovenvleugels, aan eene volwassen luis, op den rug een sluithoek maaken, ziet men eene halfronde zwarte vlak. Een half uur naa de vierde of laatste verandering vertoont zich deze *Luis* in haare volkomen grootte en gestalte, en ook te gelyk met vleugelen voorzien. In het begin is ze nog gansch geelachtig-wit; maar naa een uur tyds verwisselt zy ook deze in haare gewoone kleur. Het spits toeloopende *achterlyf*, het welk iets smaller is, dan dat van 't wyffe, valt in de dikte meer driehoekig, dan rond of breed. De beide rond verheven rood-bruine *Oogen* slaan aan de zyden van den stompen bleekgeelen Kop. Dergelyk eene kleur heeft ook het *borststuk*, het welk echter meerendeels bezet is met eene, door die kleur heen schemerende, zwartachtige vlak; waarop een grooter, driekantige, fluweel zwarte sluithoek volgt, aan wiens beide zyden de *bovenvleugels* hunne inleding hebben. Deze zyn schoon oker- of oranje geel van kleur; *ald.* 152. en hebben in het midden een zwarten stip, waarvan de eene helft aan den binnen- of achterrand van den linker- en de andere helft aan dien van den rechter-vleugel staat. Aan den voorsten op beide zyden liggenden rand bespeurt men nog eene ganse rei van zodanige stippen. Na 't uiterste einde loopt het *achterlyf* spits toe, en aldaar is de rand met veele tedere hairen bezet. Aan deze soort van Waterluizen is alleen eigen, boven op het water, op den rug te

zweem-

zwemmen, en haaren roof te vangen. De gehele *ondervlakte* is niet alleen donker-bruin, maar ook met veele hairen van dezelfde koleur bezet. Het langste paar *Pooten* heeft 3 gewrichten of leden. De beide uitersten, aan ieder poot, zyn met eene rei styve hairen bezet. De *Roeipooten* overtreffen de beide overige paaren wel in de lengte en dikte; maar hebben daarentegen aan het uiterste einde geen dubbelen klaauw, waarmede men de anderen voorzien vindt. Ondertusschen komen alle de *Pooten* daarin met elkander overeen, dat ze geelachtig van koleur zyn. De beide *bovenvleugels* hebben van achteren, of liever binnenwaarts, geen gelyken, maar veel meer een uitgeholden rand, en hunne koleur wordt na 't einde, daar ook eene kleine inkerving is, veel helderer. De beide *ondervleugels* zyn zeer dun, helder en doorzichtig; mitsgaders met eenige weinige aderen doortoogen. Het gansche *Achterlyf* heeft eene donkere, zwariachtige koleur, *ald. 153.* die aan de zyden in het geele valt. Onder de beide *Oogen* steeken 2 korte *Sprietjes* uit, bestaande in 3 kleine leden, van welken het dikste of naaste aan den *Kop* zittende bruinachtig, doch het middelste, benevens het laatste en kleinste, geel is. De *Kop* loopt na beneden spits toe, en is aldaar met eenige hairtjes bezet. Aan deszelfs einde ziet men de tamelyk uitgedyde, en aan het uiterst einde met een spits kolfje begaafde schede van den *seekzuiger*, waarin de lancetvormige *Angel* zit, *ald.*

154.

Waterluizen, kunnen in drieërleie *soorten* onderscheiden worden. De *eerste soort* is van vooren met 2 vangpooten, en van achteren met eene luchttyp voor-

zien, maar heeft geene roeipooten. De *tweede soort* is gewoon, boven 'op het water, met het onderlyf om hoog, op den rug te zwemmen. De *derde soort* bestaat in verscheide Classen van veelerele grootte, en deze zyn, voor 't overige, wel 't meest den Water-Keveren gelyk, III. 127.

Water-made, (de lange, bruine en donker gestreepte,) benevens baare verandering in eene veel kleiner vlieg, II. 555. enz. Deze wordt in het voorjaar, in de stil staande wateren der slooten en moerassen gevonden, en wel van onderscheiden grootte. De allergrootste beloopt wel 3 duim in de lengte, en bestaat uit 12 leden, die ongelyk in dikte en lengte, en doorgaande meer vlak, dan rond verheven zyn. De *Kop* is, van vooren, daar hy zwart is, met 2 korte, nederwaarts geboogen, zwarte *Sprietjes* voorzien. Tusschen deze bespeurt men nog twee, doch veel kleiner spitzen. De *Kop* is op de bovenvlakte bruin, en heeft wederzyds een zwarten streep, onder welken hy gansch wit is, *ald. 555.* Alle de leden of ringen hebben, op de bovenvlakte, eene bruine grondverwe, die ter zyde, en van onderen, in eene bleeke te niet loopt. In dezen grond is de *Made* met veele bruine en zwarte streepen, in de lengte, doortoogen; aan het laatste, langste en dunste lid bespeurt men veele, om een puntje rond staande, tedere hairtjes, die byna even lang zyn. In 't midden tusschen deze hairtjes is eene opening, waardoor de *Made* adem schept, *ald. 556.* Wanneer de tyd nadert, dat zulk eene *Made* veranderen zal, blyft ze wel by de oppervlakte des waters, maar nadert echter, meer en meer, den oever, alwaar zy, eindelyk, gansch styf en onbewe-

wee-

weegelyk blyft liggen, en naa verloop van 12 of 14 dagen komt daaruit eene *vlieg* voort, *ald.* 557. welke van andere vliegen kenbaar onderscheiden is. Haar *Kop*, dien de beide *Oogen* bykans alleen uitmaken, is tamelyk groot, en Oranje-bruin van koleur. Vooraanden-zelfen ziet men een paar korte, tedere en zwarte, hairvormige *Sprietjes* uitsteeken, die uit een puntje schynen voort te komen; en daar onder staat een geel wrattenvormig deel, achter het welke de witte *Zuiger* verborgen ligt. Haar *voorlyf* of *borststuk* is van boven zwart, doch ter wederzyde en van anderen Oranje-geel. De 6 tedere *Pooten* hebben hunne inleding eenigzins zwart. Het dikke *Achterlyf*, meer glad, dan rond zynde, heeft van achteren een klein uitsteekend en nederwaarts geboogen deel; voor 't overige is deszelfs grondverwe insgelyks oranje-geel; by ieder afdeeling der leden ziet men een zwarten dwarsstreep. Het wordt van boven eenigzins bedekt, door 2 zeer smalle, en doorzichtige *Vleugels*. De koleur haarer *Eieren*, is, volgens SWAMMERDAM, van een aangenaam groen, *ald.* 558. en *aann.*

Water-myt, (de *schoone boog-roode*,) of MAAL, III. 144. enz. De *Kop* nevens het *Borststuk* is het kleinste deel, zo dat dit Insect alleen uit het dikke ovaal ronde, en eenigzins platte *Achterlyf* schynen te bestaan. De 8 *Pooten* hebben eene gansch andere inleding, dan by de Spinnen. De koleur dezer *Myt* is hoog-rood, *ald.* 146.

Watermyten, van deze zyn 'er maar 2 *soorten*. De eene *soort* wordt slechts in het voorjaar, in poelen, stil staande wateren, en zodanige vaten of bakken gevonden, waarin men het regenwater verzamelt. Ze zyn of helder- of oker-

bruin, en den kleinen Spinnen; die slechts de grootte van een giertekorrel hebben, zeer gelyk. De *tweede soort* dezer *Water-myten* is hoog rood van koleur, en komt volkomen overeen met die geene, welke zich op het land onthouden, III. 145.

Waternimph, (de *bruine en geele*,) benevens haaren *Worm*, en deszelfs verandering, II. 207. enz. De *onder-vlakte* van dezen *Worm* is met geene hairen begroeid, en helder of bleek-groenachtig-graauw van koleur, schoon de *Pooten* dezelfde koleur als het *voorlyf* hebben. Het achterste en breedste deel dezer vlakte is, aan de zyden, gansch plat; maar door het midden loopt eene vlakke rond verwulste verhooging, welke voor en achter smal toeloopt. De *Kop* laat de gedaante van een *Masker* zien, dat niet anders, dan de *Vangtang* is. Zy is overdwarsgelyk een helm gespleeten, en van boven loopt 'er, over het midden, nog eene andere, doch korter spleet, zo dat het bovendeel van dit *Masker* in 2 andere deelen verdeeld zy. De verandering in eene *Waternimph* geschiedt, zonder dat de *Worm* alvorens eene *Pop* worde. Ten dien einde kruipt hy, in *Juny*, *July*, of *Augustus*, uit het water, *ald.* 208. en zet zich, door middel zynner scherpe klauwen, hier of daar aan een riet vast. Naa eenigen tyd baret de wormenhuid, op den rug van 't *voorlyf* van een, en eerlang komt de *Waternimph*, die alsdan nog zeer teder en bleek van koleur is, allengskens te voorschyn. De *bovenschenkels* van haare 6 *Pooten* hebben eene oranje-geele koleur. De groote blinkende *Oogen* zyn bruin, en de tusschen beide op het voorhoofd zittende wratten geel. Het dik-

dikke en ronde *borststuk* van het voorlyf is met veele bairen begroeid, en, nevens de *kals*, ook bruin, maar heeft, op ieder zyde, eene langwerpige, groenachtig-witte vlak, en het overige van het voorlyf, tusschen de vleugelen, is insgelyks met eene bruine koleur overroogen. Het breede *achterlyf*, dat van achteren nog spitzer toeloopt, dan van vooren, is, naa de 3 eerste leden, ter wederzyde, met schoone geele vlakken verciert; en door den bruinen grond, die tusschen beiden is, schemeren verscheide geelachtige streepen en trekken heen. Aan 't einde van het laatste en kleinste lid zitten 3 korte spitzen. In ieder der 4 *vleugelen* wordt, by het lid, eene zwarte vlak gezien, daar een oranje-geele streep door heen loopt, en de tedere aderen des vleugels schynen tusschen dit zwart-geel door, maar in de *voorevleugelen* ziet men deze zwarte vlak naauwlyks half zo groot, als in de achterste. Het overige deel der vleugelen is, behalven de zwarte aderen, helder en doorzichtig, *ald. 209.*

Waternimphen worden gevoegelyk in drie soorten verdeeld worden. De eerste soort vervat dezulken, die een lang en dun lyf, en een grooten ronden Kop hebben: de tweede soort heeft een Kop als de voorige, maar zyn breeder en korter van lyf; deze beide soorten houden de vleugelen in 't zitten even zo uitgebreid, als of ze vloogen. De derde soort heeft ook een lang en dun lyf; maar is van de voorgaanden voornaamlyk daarin onderscheiden, dat ze de vleugelen op verschillende wyzen te samen legge, en dat haar Kop meer breed, dan lang is; waarom ook de oogen zeer verre van elkander af staan, II. 178.

Waternimphen, (de grootste soort van,) benevens haare wonderbaare voortplanting, en andere eigenschappen, II. 185. Deze behoort onder de eerste soort, doordien ze een lang en dun lyf, als mede een grooten Kop heeft, en daar benevens haare vleugelen in 't zitten uitgebreid draagt. Zy worden van het einde van *Mai* tot in *September* gezien. By haare donker-bruine grondverwe heeft zy zeer schoone en helder-blaauwe en groene vlakken, waarmede byna alle de leden van het lyf verciert zyn. Doch deze vlakken vindt men aan andere dergelyke *Waternimphen* zomtyds kleiner, nu eens helderder, en dan weer donkerer. De doorzichtige en glansryke *Oogen*, welke bykans het grootste gedeelte van den Kop uitmaaken, en waarin men ettelijke zwarte vlakjes van verscheide grootte ziet schemeren, spelen hier ook in 't blaauwe en geele. Tusschen de *Oogen* en boven den Mond is eene verhooging, die in 't groenachtig-geele valt. Deze is by de oogen zwart, en heeft van boven eene zwarte vlak, boven welke eene kleine witte hoekvlak staat, en waarby, ter wederzyde, een kort, teder, zwart en hartvormig *Sprietje* te voorschyn komt. Als de grondverwe der *Waternimph* anders gesteld is; dan zyn ook, volgens dezelve, de *Kop* en de *Oogen* van eene andere koleur; zo heeft eene andere eene Karmyn-roode grondverwe, op welke hier en daar geel-bruine vlakken gezien worden. En, gelyk de grondverwe van dezen rood is, zo zyn 'er ook veele anderen, welke een byna gansch bruin gekoleurd lyf hebben; en die, benevens de eerstgemelde soort, met iets bruiner vleugelen,

len, dan de eerste, voorzien zyn. Het *achterlyf* van alle Waternimphen bestaat in 9 of 10 leden. Het *voorlyf* is veel korter, en ook, inzonderheid omtrent den Kop, veel dikker, en is met korte hairtjes bezet. Aan sommigen ziet men ook, vooraan by den Kop, een helder witachtig vlakje op ieder zyde; waar onder de 6 *poeten* naast elkander ingeleed zyn, welke 7 leden of gewrichten hebben, *ald.* 186. Digt aan het lyf staat een paar korte; daarop volgen 2 langere; en op dezen 4 kleinere, die den voet uitmaken, welke met 2 haaken voorzien is. Aan den voorsten rand van ieder *vleugel*, kort aan het buitenste einde, wordt een langwerpig zwart vlakje gezien, dat bruin is. Voor 't overige bestaan de *vleugels*, tusschen de aderen, uit een zeer teder, doorzichtig en blinkend vlies, het welk, als 'er de zonnestralen op vallen, met de schoonste koleuren van een helderen regenboog verciend schynt. De *Kop* is aan de binnenvlakte van 't lyf ingedrukt, en zit 'er aan vast, door middel van een *hals*, die niet dikker is, dan een draad garen. De naam van *Koorn byters* wordt haar ten onrechte gegeven; nademaal zy noch het koorn, noch de dorre rysjes, tot spyze gebruiken; maar ze verkiezen, wanneer ze willen rusten, deze zitting, om des te beter rondom van zich te kunnen zien; want ze zoeken haar voedsel aan de hier en daar door de lucht zweevende Insecten, die geene harde schaal hebben, en die ze vermeesteren kunnen, *ald.* 187. De *Bek* is voorzien met 4 *lippen*, welke zo wel tot het vangen der spyze, als tot het afscheeren van dezelve dienen, en nog andere werktuigen bedekken, die inzonderheid tot de kaauijng vereischt worden. De

deelen, onder de lippen verborgen, zyn 2 harde en scherpe *tanden*, die ieder met 4 spitze punten voorzien zyn, en onder deze zitten nog 2 dunne enkelvoudige spitzen, welke de voorige in het vermaalen der spyze moeten helpen, *ald.* 188. De *Waternimphen* worden door de paaring van een mannetje met een wyfje van gelyke foort voortgeteeld; en deze paaring geschiedt op de volgende wyze. Wanneer het Mannetje een Wyfje aantref; zo weet het, met zyne knyp- of gryptang, aan het uiterste einde van het lyf zittende, het zelve zodanig om den hals te vatten, dat het zich niet weder los konne maaken, *ald.* 189. Het Mannetje zet zich, zomwylen, aan een dor takje, en verheft het achterste deel van zyn lyf, waarmede het wyfje vast gehouden wordt, in de hoogte, om het als te errinneren, dat het de noodige stelling aanneeme; tot dat eindelyk zyne begeerte voldaan wordt, *ald.* 190. Als het bevruchte wyfje in vryheid is, en zich van den last wil ontslaan, zoekt het 'er eene bekwaame plaats toe. Het gaat op een stukje dryvend hout, of kort by de bovenvlakte van 't water aan een riet zitten, en laat, het achterlyf in 't water dompelende, de bevruchte *Eieren* daar in vallen. Derzelver grootte is, ten aanzien van het diertje, gering; van koleur zyn ze bruin, en van gedaante langwerpig rond. Deze *Eieren* komen deels in den zomer, deels in den herfst, en ook nog wel laater uit, naar dat ze vroeger of laater gelegd zyn, *ald.* 191.

Waternimphen, (de iets kleinere foort van *smallyvige*.) bereevens haaren breedten worm, en de wyze van deszelfs verandering, II. 203. enz. De *wormen*, waaruit deze Waternimphen voort•

voortkomen, onthouden zich niet alleen meestal onder op den grond, maar ze liggen zelfs als in den slyk begraven. De *lengte* van een volwassen *Worm* komt zelden tot een duim; zyne *grondverwe* is over het geheel slykachtig okerbruin. Het *achterlyf* heeft, van boven in het midden, eene verheven vlakke, doch van onderen is het bykans geheel glad. In den *Kop* heeft hy 2 kleine *Oogen*, welke op de beide zyde-hoogtens zitten. Voor aan den *Kop* staan 2 *Sprieten*, welke uit 4 à 5 leden te zamen gesteld zyn. De *Hals* is het dunste of rankste lid van 't lyf, en gelykt een smallen band. Het *achterlyf* bestaat uit 8 of 9 leden of ringen; op ieder van dezelve ziet men verscheide donkere vlakjes, *ald.* 204. of afgezette streepen, en het achterste, dat tevens het kleinste lid is, heeft 3 scherpe spitzen. De 6 *Pooten*, waar onder de 2 achtersten de langsten zyn, worden gezamenlyk langer, dan by veele andere soorten, bevonden. Ieder derzelven bestaat uit 3 leden, te weeten 2 lange, en een kort. Onder de langste is het naast aan 't lyf staande dikker, dan het daarop volgende; en het korte, dat eigenlyk de *voet* genoemd kan worden, is uit 4 à 5 leden te zamen gesteld, en aan het uiterste einde met een dubbelen klauw voorzien. Alle de 6 *Pooten* zyn, even als de zyde-deelen, en de gansche bovenvlakte van het lyf, met korte en wollige hairen bezet. Deze *Wormen* scheppen ook lucht door het achterste lid van 't lyf, alwaar de 3 spitzen staan. Hunne *spyze* bestaat enkel in zulke Water-insecten, die noch te groot, noch te hard van schaal zyn. Het gansche *lyf der Water-nimpe*, uit zulk een *Worm* te voorschyn komende, pronkt met een zeer

schoonen goudglanzigen groenen grond; *ald.* 205. en het dunne *achterlyf* is echter vooraan en achter dikker, dan in het midden. De groote blinkende *Oogen* hebben eene bruine koleur, en het verhoogde en verdeelde *voorhoofd* heeft eenerleie grondverwe met het lyf. Op het verwulfdde *borststuk* ziet men van vooren, door het midden, een verheven goudgeel streepje, dat met bruine hairtjes begroeid is. De 4 doorzichtige *Vleugels* vallen, aanden voorsten rand, een weinig in 't geelachtige; doch by hunne inleding zyn ze meer oranjegeel, en byna aan het einde van den voorsten rand is 'er in ieder een langwerpig zwart vlakje te zien. De ruimte tusschen deze vleugelen, of de rug van het voorlyf, die eene bruine koleur heeft, is met louter kleine spiertjes bezet. De 6 *Pooten* zyn zwart van koleur, en aan hun langste en dunste deel doorgaande mer 2 reien styve hairtjes bezet. Het *Manneje* heeft een veel ranker achterlyf, dan 't *wyfsje*, en aan zyn laatste lid 4 weeke, niet al te lange, en achter uit staande spitzen, waarvan 'er aan het wyfsje maar 2 te zien zyn, *ald.* 206.

Water-nimphen-worm, (*de kleine breed-lyvige*), benevens deszelfs verandering, II. 214. enz. Deze *worm* vindt men, den ganschen Zomer door, doch alleen in stil staande wateren en vyvers. Hy wordt ouder dan eenjaar, doordien men hem, met zyns gelyken, op denzelfden tyd, van verschillende grootte vindt, *ald.* 214. Volwassen zynde is zyn *achterlyf* in het midden zeer breed, verheven en verwulfd. De *Kop* en de *Vleugelscheden* zyn mer onderscheide streepen en vlakken verciend; en zo zyn ook de 6 *Pooten* aan alle

de leden overdwars gevlaakt: op alle de leden of ringen van het *achterlyf* ziet men verscheide streepen en punten, die in eene cieriylke orde staan. Aan het laatste lid heeft hy 3 korte en styve spitzen. Zyn voedzel bestaat in niets anders, dan in kleine Water-insecten; en, wanneer hy in een gevleugeld schepzel veranderen zal, klimt hy tamelyk hoog uit het water, aan het by den oever staande riet, of andere gewassen, in de hoogte, en kort daarna komt uit hem eene *Waternimph* te voorschyn. Deze is wat klein, en men vindt ze van verschillende koleuren. Het *Achterlyf* is meer rond, dan breed; in 't midden vertoont het zich op zyn dunste; aan het borststuk is 't wat kolsachtig rond; van achteren wordt het dikker, *ald.* 215. en nog kolsachtiger, en op het einde, daar het met 2 of 3 spitzen voorzien is, loopt het scherp toe. Eene soort van deze *Waternimph* heeft eene geelachtige koleur, welke nogtans aan den blinkenden kop en het borststuk iets in het bruine valt. Maar in 't geele *Achterlyf* ziet men, ter plaatze, daar de leden hunne dwarsvouden hebben, by alle deze *Waternimphen*, van welke koleur zy ook zyn, iets donkerer dwarsstreepen, dan de grondverwe is; en op het midden van het dikste deel zyn insgelyks ettelike streepen in de lengte getoogen. Men ziet ook veele *Waternimphen* dezer soort, wier *achterlyf*, benevens de groote en blinkende *Oogen*, karmyn rood zyn, en op wier *borststuk* dat meerendeels bruin is, de verhoogde wratten schoon-rood zyn. De 4 *vleugels* zyn, kort aan den buitenhoek van den voorsten rand, met een langwerpige donker vlakje voorzien, en derzelver voorste rand schemert, tusschen de grof-

ste aderen, eenigzins in 't verdwynend geelachtig-bruine. De 6 *Pooten* zyn aan alle deze *Waternimphen* zwartachtig-bruin. Haare paaring geschiedt op dezelfde wyze als by de andere soorten, leggende het Wyfje zyne Eieren in het water, doch eerst in den Heift, *ald.* 216.

Waternimphen worm, (de kleine *smally-vige*,) met de 3 breede roeivederen, benevens deszelfs verandering, II. 224. enz. Deze wormen kan men in alle vyvers en watersloten, in het voorjaar, veelvuldig vinden. De verscheiden soorten zyn zeer talryk, en de daaruit voortkomende *Waternimphen* verschillen van 's gelyke merkelyk van elkander, *ald.* 224. Binnen een jaar tyds worden deze wormen volwassen, en, schoon ze vervellen, hebben ze evenwel, zo dra zy uit het Ei komen, hunne volkomen gestalte, tot op de vleugelscheden na, welke zy eerst krygen, wanneer ze de laatste huid ontvangen. De driebladige roeivederen leggen zo na by elkander, dat dezelve aan den staart van een Vis niet ongelyk zyn. Deze *Roeivederen* vallen dikwyls af, zo dat men 'er, nu in 't geheel geene, en dan slechts eene of 2 aan den Worm zie; maar dit verlies wordt weldra door andere hersteld, en de nieuw gewassene neemen in grootte toe. Het *achterlyf* dezer wormen bestaat uit 9 leden of ringen, *ald.* 225. welke, aan zommige Wormen, met verscheide donkere vlakken en punten besprenkeld zyn; dat van de 6 *Pooten* desgelyks gezegd kan worden. Wanneer de tyd der veranderinge nadert, verlaat de Worm het water, en klimt by 't riet op. Naa dat hy zich met de pooten aan 't zelfe heeft vastgezet, en de wormen-huid van boven op den rug van een ge-
bor-

borsten is, komt 'er de kleine, en menigmaal zeer schoone *Waternimph* uit te voorschyn. Zy is over het geheel schoon hemelsblauw; welke koleur ook zelfs haare blinkende kogelronde *Oogen* hebben; maar het ranke *achterlyf* is met verscheide zwarte ringen zeer aardig versierd. Gelyk nu deze soort helder-blauw van koleur is; zo hebben ook andere, die iets grooter zyn, een bleek en violet-blauwen, en wederom anderen een byna vleeschverwigen grond; *ald.* die met even zulke zwarte cieraaden, als het vorige slach, pronkt. Naa de paaring zoekt het Wyfje wel haast het water, om zich van zyne *Eieren* te ontleiden, *ald.* 217. Voorts zyn de 6 tedere *Pooten* dezer *Waternimph* zwart, en bestaan uit 3 leden; in de 4 zeer smalle doorzichtige *Vleugelen* ziet men, aan den voorsten rand, niet verre van het uiterste einde, een zwart vlakje, *ald.* 228.

Waternimphen-worm, (de platte breedlyvige,) benevens zyne verandering, II. 210. enz. Deze is meer in stroomende, dan in stillstaande wateren te zoeken, en niet zo zeer in de diepte, als wel aan den slykigen oever. Eer hy zyne laatste wormenhuid, benevens de vleugelscheden, als mede de behoorlyke grootte heeft verkreegen; zal men meestal zien, dat zyn *lyf* groenachtig zwart-graauw van koleur is. Over het *achterlyf* zyn dan, op de leden, heldere en smalle dwarsstreepen getoogen; het over midden van't zelve loopt eene rechte linie in de lengte, en ter wederzyde eene andere, die kronkelig is. De 6 *Pooten* zyn iets helderer, dan de grondverwe van het *lyf*. In den volwassen staat, in *Juny*, hebben de

meesten eene lengte van $1\frac{1}{2}$ duim. Alsdan is het gansche *lyf* van dezen Worm met veele wollige en korte haaren bezet, en de gansche huid draagt eene slykige geelachtig-bruine koleur, die echter aan het platte *achterlyf* iets bleeker is, dan aan het voorlyf, waarin men ook teffens nog eenige heldere en donkere cieraaden bespeurt. Daarbenevens wordt men op den *Kop*, behalven de beide oogpunten, die aan de zyden iets verheven uitsteeken, nog ettelijke in orde volgende streepjes en puntjes gewaar. De *bals* vertoont een donkeren en helder geboorden halsband, welke met heldere puntjes versierd is. De *vleugelscheden* zyn met bruine vlakken besprenkeld, en het breede platte *achterlyf* is, op de bovenvlakte, met heldere dwarsstreepen versierd, *ald.* 211. De *Kop* heeft van vooren een paar korte, kolfachtige en stompe *Sprieten*, en de voorste en middelste *Pooten* hebben, aan het einde van 't middelste dunne en lange lid, een haakvormig achterwaarts geboogen uitsteekzel. Het bovenste en dikste deel der pooten, of eigenlyk de bovenschinkel, ziet men naar de lengte donker gestreept. In de maand *Juny* of *July* begeeft hy zich uit het water na den oever, gaat op een steen, of op het laage gras zitten, en wel dra komt 'er het gevleugeld Schepzel uit te voorschyn, *ald.* 212. Het *achterlyf* heeft een schoonen helder-blauwen grond, en de ter wederzyde langwerpige geele vlakken versieren het niet weinig. Het achterste en kleinste lid, dat by de wyfjes met 2, en by de mannetjes met 3 korte spitzen voorzien is, *ald.* 213. heeft eene donker-bruine verwe, en zo ook het voorste van de dikke leden, dit
ech-

echter iets meer in 't heldere valt. De *Kop*, het *Voorlyf*, de by de inleding met bruine vlakken en geele aderen versierde *Vleugels* en de *Pooten* zyn, aan deze *Waternimph*, even als aan de voorige gesteld, *ald.* 214.

Waternimphen-worm, (de *smallyveige*), welke met 3 roeivederen voorzien is, benevens deszelfs verandering, *II.* 217. enz. Deze wordt in de vyvers en poelen gevangen; *ald.* 217. en zyne hoogste lengte beloopt, de roeivederen daarby gerekend, niet wel 3 duim, doch zonder dezen zelden meer, dan anderhalf duim. In koleur zyn deze *wormen* van elkander verschillende; 't geen mede plaats heeft in de daaruit voortkomende *Waternimphen*. Het *Lyf* van zulk een *worm*, die eene bruin-geelachtige koleur heeft, is zeer rank en dun, en de *Kop* niet veel dikker, dan het *lyf* zelf. Van vooren heeft hy een paar *Spieten*, welke uit 3 leden bestaan, waarvan het laatste veel dunner en spitzer is, dan 't geen aan den *Kop* zyne inleding heeft. De *Oogen* zyn wel iets donkerer van koleur, dan het overige *lyf*, maar kunnen niet groot genoemd worden. Onder den hals zit het eerste paar der 6 *Pooten*; deze *Pooten* zyn in den grond doorzichtig, maar teffens met veele donkere vlakjes, tot aan den ondersten klauw, besprenkeld. Van boven over het *borststuk* loopen, gemeenlyk, 2 donkere streepjes in de lengte, en van onderen hebben de 4 andere *pooten* hunne inleding. De *vleugelscheden* zyn ongeveer 3 linien lang. Het *achterlyf* bestaat uit 9 leden, welke, in ieder inkerving, door eene overdwars loopende rei van langwerpige puntjes onderscheiden worden, *ald.* 218. en aan het eerste lid zitten 3 styve roeivederen, waarvan de

2 buitenste omtrent een halven duim lang zyn, en de middelste is iets korter. Deze roeivederen gelyken na een rietblad, dat 3 freeden heeft; zy hebben bruine vlakken, welke de daar tusschen staande heldere in de breedte niets toegeeven. Een andere *worm* dezer soort heeft eene groenachtige grondverwe; maar is, voor 't overige, even als de eerstgemelde, met vlakken en streepen versierd. En zo zyn 'er nog andere *wormen*, die nu helderer, dan donkerer van koleur, maar nogtans in gestalte en alles aan elkander gelyk zyn. Hunne spyze bestaat in niets anders, dan in zulke leevende water-insecten, welke zy met hunne vangtang betrappen en bedwingen kunnen. Deze *vangtang* draagen zy als een Masker aan de onderzyde van den *Kop*, en reikt bykans tot aan het borststuk, *ald.* 219. Zy is van vooren in 2 sterke armen verdeeld, welke ieder, aan 't uiterste einde, 4 dunne, scherpe, en binnenwaarts geboogen, klauwenvormige spitzen hebben, waarvan de 2 buitenste langer zyn, dan de middelste. De tyd zynrer veranderinge noodzaakt hem, het drooge te zoeken, begeevende hy zich op het gras of riet dat aan den oever staat; *ald.* 220. de wormhuid op den huid berst van een, waarop 'er de *Waternimph* uit voortkomt. Onder deze soort van *Waternimphen* zyn 'er van onderscheide koleuren. Sommige hebben 4 gansch blaauwe vleugels tot aan den buitenrand, die eenigzins in 't zwart-bruine valt: by andere is het midden der vleugelen blaauw, en het gedeelte by de inleding, als ook het buitenste, helder en doorzichtig; doch het blaauwe deel heeft, ter wederzyde, eene verdwynende bruine koleur: andere wederom hebben zwart-bruinach-

tige, en overal doorzichtige *vleugels*; en deze zyn, gemeenlyk, met een zeer schoon en iets donker lazuur-blaauw *lyf* voorzien, waar tegen het *borststuk* in 't groene speelt. Alle deze genoemde *Waternimphen* zyn altoos *Mannetjes*, maar die geene, welke ook tot deze soort behooren, doch doorzichtige geel-achtig-bruine vleugels hebben, waarin aan den voorsten rand, omtrent het einde, steeds een wit puntje te zien is; mitsgaders die geene, welke gansch heldere, en doorzichtige groenachtige vleugels zonder een wit puntje hebben, zyn *Wyfjes*. Ook zyn de *Wyfjes* daar door van de *Mannetjes* te onderscheiden, dat haare *vleugels* doorgaans smal-ler zyn, en dat ze geen blaauw, maar een groen-goud-glanzig *lyf* hebben. De uitpuilende *Oogen* van alle *Waternimphen* zyn gemeenlyk blinkend bruin-rood, en nevens dezelve staan, voor aan den *Kop*, een paar kleine *Sprieten*. De *rug* van het dikke *borststuk* is, by de inleding der vleugelen, scherp verheven; *ald.* 221. de onder het zelve staande 6 lange en tedere *Pooten* zyn gansch zwart, en tot aan het laatste klauw-lid met tedere haartjes in eene schoone orde begroeid. Het lange en ranke *achterlyf* is bykans doorgaans van eene gelyke dikte; het bestaat uit 9 of 10 leden, en is alleen aan de wyfjes van achteren wat kolfachtig. Het laatste lid eindigt met een paar korte *spitzen*, die aan de *mannetjes* eenigzins gekromd zyn, en aan de *wyfjes* recht uit staan. In het paaren blyven ze langer aan elkander, dan de grooter soorten; en de *Eieren* legt het wyfje in het water, *ald.* 222.

Water-peper, zie *Persicaria*.

Waterpeper-rups, (de kleine,) benevens baare verandering tot in een *Vlinder*,

I. 349. enz. Na de aflegging der laatste huid krygt deze *Rups* eene roodachtig-bruine kleur, en haare lengte bedraagt ongeveer 1½ duim. De *Kop* is geel-bruin, en de *streepen* in de lengte over het *lyf* vertoonen zich zeer bleek. De geheele *buik* is, benevens de *Pooten*, helder-bruin. Boven in de lengte over den *rug* loopt een breede donkere streep, en de overige grond is met zwarte punten versierd. Zy verandert onder de aarde in eene *Pop*, welke 2 kleine staartpunten heeft, waaruit eerst in *Mai* of *Juny* des volgenden jaars de *Vlinder* te voorschyn komt. Deze heeft geele hairvormige *Sprieten*, welke van het *mannetje* en *wyfje* eenerlei zyn. De *Kop*, het *Voorlyf*, de *Pooten* en de *Bovenvleugels* zyn rood-bruin. In ieder dezer laatste ziet men een Oranje-geel vlakje, en, naby den uitgeronden buitenrand, eene witte gekronkelde linie, *ald.* 350. De *Ondervleugels* en het *Achterlyf* zyn bleek graauw van kleur. Derzelver buitenrand is helder bezoomd, en ongeveer in het midden des vleugels, ontdekt men een donker-graauw vlakje, *ald.* 351.

Water-rups, (de,) die zich in een huisje, van zandkorrels vervaardigd, onthoudt, of de zo genaamde *Pyp-worm*, benevens zyne verandering, II. 239. enz. Deze *worm* heeft maar 6 *Pooten*, en zou dus eigenlyk niet onder de *Rupsen* zyn te tellen; maar, om dat 'er nogtans een gevleugeld schepzel uit voortkomt, dat voor een *Vlinder* aangezien moet worden; zo schynt dit Insect eenig recht te hebben, om zich den naam van *rups* toe te eigenen; en men noemt het eene *Water-rups*, om dat het zich in 't water onthoudt. In den volwassen staat beloopt haare lengte, even als de be-

huizing, omtrent 1 duim. De 9 achterste leden van het *lyf*, welke op die 3 naast den donkerbruinen *Kop*, de iets dunner en bykans gelijk-koleurig is, volgen, hebben eenertele dikte, en eene heldere okergeele grondverwe. Onder de 3 eerste leden hebben de insgelyks donker-bruine *Pooten* hunne inleding; en het laatste of twaalfde en iets smaller lid is met 2 na beneden gekromde, harde en scherpe spitzen voorzien. Op het eerste der helder-okergeele leden ziet men 3 vleeschverwige pinnen, waarvan de middelste rechtop steekt, en de andere, aan ieder zyde, buitenwaarts staan. Van ieder zyde-pin af loopt 'er, tot byna aan het laatste lid, eene tedere zwarte linie; en alle de leden, welke op die pinnen volgen, zyn met enkele korte haartjes bezet, *ald.* 240. Deze Rups, eene behuizing voor zich zelve willende maken, brengt uit haar taai slymstof een *spinzel* om zich heen, en bezet, ten zelfden tyde, de draaden van buiten met zandkorrels, waaruit dan eindelyk een huisje ontstaat, dat men by eene Robbenvel-scheede vergelyken kan, maar dat van achteren en van vooren eene opening heeft. Van binnen is het gansch glad, en op deze wyze is de *Rups* met een gemaklyk Pantzier gedekt. Dit Pantzier verlaat ze ook niet, en komt 'er niet verder uit, dan voor zo verre haare eerste 3 harde leden of ringen reiken, *ald.* 241. Haare *spyze* bestaat zo wel in Gewassen, als in andere doode mitsgaders leevende schepzelen en Insecten, welke zy met haare 6 scherpe *Pooten* weet te vangen en vast te houden. Wanneer zy wil veranderen, begeeft ze ze zich na den oever, of aan de ryskens en struiken, die in het water groejen, en aan derzelver wortelen. Dan wordt

ze allengskens korter, en eindelyk, den balg afstropende, verandert zy in eene *Pop*, welke aanvanglyk geheel witachtig is; maar vervolgens helt haare koleur meer na het donkere, echter zo, dat ze, gemeenlyk, eene geele grondverwe behoude. Het *achterlyf*, dat iets dikker is, dan het voorlyf, heeft aan het laatste lid eene korte spits, en van deze af loopt 'er, aan ieder zyde, van 't achterlyf tot aan het voorlyf, eene na de inkervingen trapswyze opklimmende linie om hoog, welke de ondervlakte, als 't ware, van de bovenvlakte afzondert; zynde de laatste helderer, dan de eerste, die merkelyk in 't bruine valt, *ald.* 242. Na 14 dagen komt de *Vlinder* daaruit te voorschyn. Die is enkel okergeel, en die koleur valt iets in 't bruine. De *Kop* is tamelyk van het borststuk gescheiden, en heeft 2 zwarte *Oogen*, nevens welke 2 lange hairvormige *Sprieten* hunne inleding hebben. De *Pooten* zyn vry lang, hebben aan het voorste deel 5 leden, en aan de langste leden der 2 paar *achterpooten* zitten ettelyke korte en tedere doorpuntjes. Het *achterlyf*, door de vleugelen bedekt, is ook geelachtig, hoewel het by andere diergelyke *Vlinders* niet altoos de grondverwe der overige deelen hebbe, *ald.* 243. *Water-rups*, de grootste soort, benevens haare verandering in een *Vlinder*, 11. 248. enz. Deze laat zich meer in groote stil staande, dan in vlietende wateren vinden, en bouwt ook een huis voor zich, draagende haare bouwstoffen, in allerlei spaantjes en splinters bestaande, met groote moeite te zamen, en voegende dezelve zeer zorgvuldig, door middel van haar *spinzel*, zodanig aan elkander, dat 'er eindelyk eene bekwaame wooning uit voortkome, *ald.* 248. Haa-

te lengte maakt byna 2 duim uit. De *Kop* heeft eene oker-bruine grondverwe, waarin eenige, naar de lengte getoogen, zwarte streepen gezien worden. De 3 daarop volgende ringen of leden zyn van boven wel iets bruiner, dan alle de andere; maar vallen van onderen in 't bleek-geele en groenachtige, voornaamlyk aan het laatste lid. Van de beide zyd-pinnen af loopt 'er, rechts en links, over den 5den, en 6den tot den 11den ring eene tedere, bruine linie; en tusschen de 2 achterste bruine, harde en scherpe spitzen staat van boven eene verheve *Wrat*. Voor 't overige is ook deze *Rups*, op alle de ringen, van achteren af, tot aan de 3 voorste, met tedere hairtjes bezet. Wanneer de tyd haarer veranderinge nadert, begeeft ze zich, met haar huisje, na eene plaats, of aan eenig lichaam, dat deels onder water is, en deels 'er over heen hangt, een riet of eenig ander gewas. Daar maakt zy haar huisje vast, *ald.* 249. trekt het met harde draaden te zamen, en sluit het van vooren en van achteren toe. Na 14 dagen verschynt zy eindelyk in de gedaante van een *Vlinder*. Ten aanzien der grondverwe is 'er in dit slach van *Vlinders* eenig onderscheide, want sommige derzelve zyn oker-bruin, en hebben in hunne *bovenvleugelen* veelerleie donker-bruine vlakken, waar tusschen zy met verscheide streepen en aderen, van gelyke koleur, doortoogen zyn; en deze zyn de *Wyfjes*: andere hebben in tegendeel eene helder-grauwe grondverwe, met even diergelyke, verschillende, donkere, ja zelfs zwarte vlakken en punten; en deze zyn de *Mannetjes*. Aan de beide *ondervleugelen* ziet men in 't geheel geene donkere vlakken; maar ze zyn, daar en tegen, met veele don-

kere aderen doortoogen; ook is het *Achterlyf* van dezen *Vlinder* meer graauw, dan bruin. De 6 *Pooten* zyn altoos oker-geel, en even zo is het gelegen met de *Sprieten*. Het bevruchte *Wyfje* ontledigt zich van zyne *Eieren* buiten het water aan het daarin groeijende riet of andere gewassen, *ald.* 250. waaruit de jonge waterrupsen veelal in de maand *Mai*, hoewel ook zommigen eerst in de maand *Juny*, het daglicht zien, *ald.* 251.

Water-rups, (de zespootige,) welke hare wooning ten deele van afgeknaagd gras, en ten deele van schorsen en andere kleine houtspaanjes maakt, II. 244. enz. Haare koleur is, over het algemeen genomen, groenachtig; doch de *Kop* en de 3 eerste ringen, benevens de *Pooten*, zyn altoos iets donkerer, dan het overige deel. Op den vierden ring naa den *Kop* is ze met 3 pinnen, en aan het achterste of laatste lid is ze met 2 kleine haakjes voorzien, *ald.* 245. Omtrent den tyd der aanstaande veranderinge maakt zy haar huisje aan de Watergewassen vast, en spint het van achteren en vooren toe, gelyk men haar nog in *Mai* en *Juny* op die wyze vindt hangen, en wordt eene *Pop*. In dit Cellerje blyft deze *Pop* 14 dagen lang, en naa verloop van dien tyd breekt 'er de *Vlinder* uit. Van deze soort van rupsen komen tweeërleie *Vlinders*, in grootte en koleuren verschillende. De een is iets kleiner, en, behalve zyne beide zwarte *Oogen*, doorgaande geelachtig-oker-bruin; maar in het midden van den *bovenvleugel* bespeurt men eene vlak, welke iets heiderer is, dan de grondverwe. De tweede en grooter *Vlinder* ziet 'er veel frischer uit, *ald.* 246. schoon hy meerendeels slechts okergeel zy. In de *boven-*

vleugelen wordt men 2 gansch wit blinkende vlakken gewaar, rondom welke, in den grond, verscheide donkere, verdwynende streepen en vlakken gezien worden. Het *Achterlyf* heeft eene groenachtige grondverwe, en de *Ondervleugels* zyn veelal wit, hoewel deze koleur, na den voorsten rand toe, in 't okergeele verdwynt; boven dien zyn ze zeer teder en doorzichtig. De *bovenvleugels* zyn zeer smal, en aan den achtersten rand eenigzins golvend; tusschen de beide heldere en groote vlakken worden nog drie heldere punten gezien, en ze zyn met ettelijke aderen doortoogen. De beide ronde, kleine en zwarte *Oogen* steeken aan de zyden verre uit; de *Sprietzen* zyn lang, en de beide achterste *Pooten* zyn de langsten, *ald.* 247.

Water-scorpioen, zo noemt SWAMMERDAM de groote *Waterluis*. Maar deze benaaming gevalt den Schryver niet; gemerkt de *Scorpioenen* tien *pooten* hebben; en dat Insect in tegendeel 'er maar zes heeft; mitsgaders, dewyl deszelfs *vangpooten* niet in het minste te vergelyken zyn by zodanige schaaren, als die der *Scorpioenen*; en dit schepzel boven dien geen *Verweersangel* heeft, waarmede de *Scorpioenen* aan hunnen staart voorzien zyn, III. 127.

Water slangeetje, (*bet dunne*,) met 2 *gafelspitzen*, III. 534. enz. Deszelfs lengte is zelden boven drie vierde van een duim. De *Kop* en *Staart* uitgezonderd, is het overal genoegzaam even dik. Dit even dikke deel is, aan beide zyden, met eene rei tedere haartjes bezet, van welke 'er, gemeenlyk, 2 by elkander staan, en ieder paar bevindt zich op een gelyken afstand van elkander. De koleur van dit Slangetje is wel geel, maar het is teffens zo doorschynend, dat

men de ingewanden duidelyk kan zien. Aan den *Kop* kan men noch oog en, noch vreetwrat ontdekken; doch, in plaats van dien wrat, ziet men, in het midden der ondervlakte van den *Kop*, eene overdwars loopende diepe inkerwing. Aan 't einde van den staart is het met 2 *gafelspitzen* voorzien, die uit loutere korels te zamen gesteld schynen, staande aan een dik kolfachtig deel, dat teffens, met de spitzen, gespikkeld wit van koleur, en van onderen zodaniger wyze ingekorven is, als of het uitgekapt ware, *ald.* 535. De Proeven nopens de verdeling van dit *Water-slangetje*, zyn van dat gevolg geweest, dat het deszelfs ondergang verhaaltte, *ald.* 537.

Water-slangetje, (*bet.*) met den langen *tongachtigen Spriet*, III. 434. enz. Dit Slangetje vindt men niet alleen in stil staande wateren, maar ook menigmaal in loopende rivieren en beeken. Deszelfs verblyf is veelal onder de *Waterlinzen*, *ald.* 434. De *Kop*, die het lyf merkelyk in dikte overtreft, is eirond, en vooraan denzelven staan de *Oogen*, als een paar zwarte puntjes. Achter den *Kop*, vlak aan de zo genoemde geele Kern, ziet men het beginzel van den darm, die door het gansche lyf heen loopt, en wel 40 afdeelingen of leden schynt te hebben, schoon 'er aan 't heldere bekleedzel, of de huid van 't slangeetje, geen afdeeling of rimpel te merken zy, *ald.* 437. MULLER heeft in dit *Water-slangetje*, dat hy de *getongde Naide* noemt, wonder in wonderen, naamlyk niet alleen den moederworm, maar ook in denzelfden moederworm de duidelykste merkiekens van 4 *voortteelingen*, of afzonderingen tot 4 jonge wormen, en aan den *eersten* en

tweeden reeds weder het beginzel eener nieuwe *voortteeling* in het derde geslacht, waargenomen, *ald.* 435. *aanm.* *Water-spin*, (de kleine roode,) met *zwarte cieraaden*, III. 138. enz. Haar byna kogelrond *lyf* heeft eene schoone karmyn-roode grondverwe; doch over deszelfs bovenvlakte, omtrent in 't midden, loopt, van vooren na achteren, een zwarte streep. En deze wordt van vooren-by den *Kop* door 2 zwarte dwarsstreepen zodanig doorsneden, dat hy een dubbeld kruis formeere. Het voorste deel van 't *lyf* of borststuk is klein en kort, echter hebben alle de *pooten* hier hunne inleding; en de *Kop* heeft van vooren een paar *vreetpunten*, die men naauwlyks zien kan; waarby de eigenlyke *bek* dezer Spinne is. De 8 *Pooten* zyn even lang; bestaan uit veele gewrichtten, en zyn alle met korte en tedere haartjes bezet, *ald.* 143. Het *wyffe* belegt de Waterluis met haare *Eieren*, die 'er zo vast aankleeven, dat ze noch afgewreeven, noch door de schuuring van het water losgemaakt kunnen worden, *ald.* 144.

Water-worm, (de kleine,) met den langen *bals*, en zyne verandering in een *Waterkever der eerste Classe*, II. 160. enz. Deze wordt alle jaaren, van de lente tot in den herfst, veelvuldig in de stilstaande wateren en moerassen gevonden, *ald.* 160. De *Eieren*, waaruit deze soort van Waterwormen voortkomen, zyn bleek-geel van koleur, en langwerpig rond, waaruit, naa verloop van naauwlyks 14 dagen, zeer kleine wormtjes te voorschyn komen, die, 8 dagen oud zynde, met het bloote oog bemerkt kunnen worden. Deze vervellen verscheide maalen, maar ondergaan, uitgenomen in grootte, geene ver-

andering. De hoogste lengte van zulk een volwassen *Worm* beloopt zelden meer dan $1\frac{1}{4}$ duim. Het *Lyf*, dat in het midden op zyn dikste is, en na achteren spits toeloopt, is meer breed, dan rond. De *Kop* is van vooren wat breeder, dan van achteren, en daarby tamelyk plat. Op deszelfs midden staan, van boven, 2 zwarte vlakjes achter elkander, en aan ieder zyde wordt men een vlakje gewaar, het welk niets anders is, dan de *Oogen*. Van vooren heeft de *Kop* eene korte *vangtang*; van binnen in die tang ontdekt men een paar korte, en na by de oogen eenanderpaar iets langere *vreet-* of *voelspitzen*, *ald.* 161. De *Kop* is geelachtig, en de *ondervlakte van het lyf* valt meer in 't witte; doch van boven is het gansche *lyf*, beneden den *bals*, weder bruinachtiger. Over het midden van den *rug* loopt een donkere streep; en alle de schubbige leden zyn, ter wederzyde, met een even dergelyken streep voorzien. Nevensden *ruggestreep* is 'er, op ieder zyde, nog een andere te zien, die breeder en graauwachtig is. Het laatste spits toeloopende lid is, ter wederzyde, met eene reë naauwlyks zichtbaare haartjes bezet, en het einde is met 2 dunne en tedere *voerspitzen* voorzien. De *Pooten* hebben eene bleek-geele koleur, *ald.* 162. Deze *worm*, volwassen zynde, zoekt den naasten oever, om zich aldaar eene wooning ter aanstaande veranderinge te bereiden, maakende voor zich een ruim ovaal-rond hol. Naa dat hy eenige dagen, in eene gekromde gestalte, daarin doorgebracht heeft, verandert hy in eene *Pop*, welke geelachtig wit is, en naa ruim 14 dagen komt daaruit de *Kever*. Hy is van de platdyvige soort. De harde *vleugeldekkzels* en de voorste *Pooten*

geeven een duidelyk onderscheid van geslacht te kennen. De glidde blinkende *bovenvlakte van het mannetje* heeft eene bruinachtige zwart-graauwe grondverwe; de *buitenrand der vleugeldekkelen* is, aan de zyden van het lyf, okergeel bezoomd; *ald.* 163. waaronder echter de grondverwe eenigzins vermengd is. Het *balschild* ziet men rondom geel bezoomd, en door het midden van dit halschild loopt een andere geele streep overdwars, die met beide de einden na den achtersten hoek geboogen is. Op den *Kop* bespeurt men insgelyks eenige geele cieraaden. Het langste paar der tedere *Sprieten* is voor aan de oogen; en tusschen deze ziet men nog 2 andere, doch kortere paaren, die zo veel als de vreespitzen zyn. De 6 *Pooten* hebben eene blinkend bruine koleur; de 2 achterste, die tot roeiriemen strekken, zyn de breedste en langste. Derzelver uiterste lid bestaat uit 7 gewrichten, en is met bruine hairtjes bezet. Het daarop volgende middelste lid is met 2 doornpunten voorzien, die men mede aan de tedere middelpooten gewaar wordt. Het voorste en kortste paar pooten heeft aan het middelste en dikste lid een ronden Bal, het welk echter alleen aan 't mannetje eigen is. Het dunste deel der voorpooten heeft, aan 't uiterste einde, een paar haakvormige klauwen. De *ondervlakte* van dezen Kever is blinkend geel-bruin van koleur, doch aan het lyf zomwylen iets donkerer. Tusschen de middelste en achterste pooten wordt men een verheven *buikchild* gewaar, het welk ter plaatze, daar het finaller toeloopt, ook iets vlakker wordt, *ald.*

164.

Water-worm, (de.) met den breedten ruggestreep, zonder spaarpunten, bene-

vens deszelfs verandering in een Water-kever der eerste Classe, II, 153. enz. Zyne grootste lengte loopt wel tot 2 en een halven duim. Zyn *Kop* is, naar geraade van 't lange lyf; niet zo groot, van vooren niet zo rond, en 't achtereinde des worms is wel met tedere puntjes, maar geenzins schulpswyze, versierd. Over het midden van den *Kop* loopt een paar linien, die voortwaarts in 2 donkere nevens elkander staande punten eindigen. De lange *Sprieten* staan onder de vangtang, welke aan dezen worm van achteren breeder, en van vooren met bruine punten voorzien is. De voorste rand van den *Kop* heeft 3 spitze uitsteekzels, wier middelste de *Zuiger* is. Van de leden waaruit het lyf bestaat, is het eerste 't grootste, en donker okergeel; waartegen de grondverwe der overigen, behalven de ruggestreep, meer in het bruine valt, *ald.* 154. Deze leden verminderen na achteren toe allengskens in dikte, zo dat het laatste gansch spits toeloop; endit, benevens de 6 *Pooten*, is met tedere okergeele vederachtige hairen bezet; doch aan de pooten zyn ze niet zo lang, als aan de beide laatste leden van het lyf. De tyd zynrer veranderinge genaderd zynde, bereidt hy zich, aan de laatste oevers van het water, een hol verblyf, zynde een langwerpig rond, *ald.* 155. en verandert naa ruim 11 dagen in eene *Pop*. Na verloop van 3 weken komt 'er de *Kever* uit voort. De grondverwe zynrer *bovenvlakte* heeft een donker-groenen spiegel glans, *ald.* 156. De harde *vleugeldekkzels*, benevens het *balschild*, zyn aan den buitenrand wel met een okergeelen streep bezoomd; doch 'er komt aan de vleugeldekkzels zelve nog iets van de grondverwe uit den

streep

streep te voorschyn. Op deze deksels ziet men drie, in de lengte uitlopende reien van tedere ingedrukte punten. De *Oogen* zyn meer bruinachtig, dan blaauwachtig, en voor aan den *Kop* is, boven den bek, ook een geel boordzel, *ald.* 157. In de groote ruimte van de ondervlakte des *lyfs*, tusschen de middel- en achterpooten zyn geene zwart bezoomde velden te zien; en het borststuk, dat op de middelste verhooging zit, is niet zo afgezonderd noch verheven, en voor het overige van dezelfde koleur, als de andere deelen. Anders is de koleur der gansche *ondervlakte*, benevens die der *Pooten* rood oker-bruin, *ald.* 158. Het *achterlyf* heeft, aan de zyden, een iets opgeworpen rand, waar door de bovenvlakte eenigzins verdiept wordt. Binnen dezen rand is ieder lid met korte hairtjes belegen, waaronder de luchtgaten verborgen zyn. De *ondervleugels* zyn doorzichtig, en hebben ter plaatze, daar de grootste aderen, na het uiteinde toe, in elkander loopen, hunne buiging of vouwing, *ald.* 159. Zo wel de worm, als de Kever, zyn den ganschen Zomer door te vinden: en de Kever houdt zich meer in loopende rivieren, dan in stil staande wateren op, *ald.* 160.

Water worm, (de,) met den grooten linzenvormigen Kop, en deszelfs wonderbaare verandering in een Water kever der eerste Classe, II. 145. enz. De *Eieren*, waaruit deze soort van wormen voortkomen, zyn ovaal-rond en geel. In den volwassen staat is de *Worm* ruim 2 duimen lang, *ald.* 146. Zyne *koleur* is meerendeels graauwachtig-bruin, hoewel zy onder aan den buik, die ook als doorzichtig is, altoos iets helderer geelachtig valle, dan op de bovenvlakte.

Het *lyf* is rondachtig, en loopt ra achteren smaller toe. De *Kop* is linzenvormig, en aan ieder zyde van dien ziet men 6 kleine, zwarte punten, die in de manier van Spinnenooogen te zamen staan, en onder dezen ontdekt men het eerste en langste paar dunne *Sprieten*, welke 2 of 3 leden hebben. Naby dezelve wordt men de *vang tang* gewaar, welke uit 2 krom gebooge dunne en scherpe spitzen bestaat. Tusschen deze vangtang staan nog 2 paar kortere *Sprieten*. De *bals* is dun, en niet ongelijk aan een halsband. Het *Lyf* bestaat uit 12 leden of ringen, waarvan het eerste na den hals het grootste en dikste is. Van boven hebben deze leden eene schubbighe bedekking. Midden over den rug loopr, van den hals tot aan den staart, een helder-bruine streep, en ter zyde zyn de schubben ook helderer, dan boven by den gemelden fireep. De *Worm* heeft 6 *pooten*, welke uit 4 leden bestaan, die zeer dun, en van onderen met eene rei tedere hairtjes bezet zyn. Aan het achterste en laatste lid heeft dezelve 2 afhangende, even groote, tedere en weeke spitzen, die aan de zyden derwyze met hairtjes bezet zyn, dat ze genoegzaam 2 vederen vertoonen. Diergelyke hairtjes vertoonen zich ook ter wederzyde van het laatste lid des worms, *ald.* 147. Deze *Worm* schept lucht door het einde van zyn laatste lid, *ald.* 148. Zyn *Zuiger* is hol. Ter veranderinge wilende overgaan, stelt hy alle poogingen in 't werk, om uit het water te komen, maakt in de aarde onder de zoode eene holligheid, *ald.* 149. en naa verloop van 14 dagen is hy in eene *Pop* veranderd. Deze gelykt niet kwalyk na eene ingewikkelde Mumie, behalve dat ze niet zwart, maar geelachtig-wit is. Aan

haar achtereinde heeft ze een paar stompe oker-geele punten. Zommige dezer Poppen blyven wel 3 weken, andere slechts 16 dagen in haar vochtig verblyf liggen; doch de Wormen, die eerst in den Herfst veranderen, blyven als Poppen, den ganschen Winter door, tot in het voorjaar, in hunne gemelde wooning, *ald.* 150. Het *Mannetje* heeft gladde, en het *Wyfje* met smalle verheve streepen ingekorven vleugels. De *oppervlakte* dezer van boven harde *vleugelen* is, aan beiderleie geslacht, blinkend zwart-bruin; en ter wederzyde ziet men ze, zo als het halschild rondom, met een oker-geelen breedten zoom geboord. Vooraan den Kop, by den bek, is ook nog een geel boordzel, en aan de zyden ziet men 2 blaauwachtige blinkende *Oogen*. De lange *Sprieten* zyn dun, geel bruin van koleur, en bestaan uit 10 of 12 leden. Onder deze ziet men aan den bek nog een paar korte, inwaarts geboogen *Sprietjes*, welke van 's gelyken uit eenige leden te zamen gesteld zyn. Het voornaamste kenteken, waaraan het mannetje beft van het wyfje te onderscheiden is, bestaat daarin: dat het eerste een paar dikker *Voorpooten*, en aan dezelve, van anderen, een breedten *Bal* heeft, *ald.* 151. en *aann.* De *ondervlakte* des Kevers, benevens de huid der pooten, heeft altoos een rosachtigen oker-bruinen glans. De achterste en langste *roeipooten* hebben hunne inleding in 't midden van het achterlyf, het welk uit 6 of 7 leden bestaat. Aan het andere gedeelte des lyfs zyn geene leden, maar eenige zwart bezoomde gladde velden, en tusschen dezelve is, op het verheven midden, een byzonder smal uitgesneden schild, dat bruin van koleur,

en na beneden toe in 2 stompe spitzen verdeeld is, *ald.* 153.

Water-worm, (de zespootige geele en bruine,) met 14 zydespitzen, en eene aan 't einde van 't laatste lid, benevens zyne verandering, II. 235. enz. Deze worm onthoudt zich den ganschen Zomer, en ook meestal den winter door, zo wel in loopende, als in stil staande wateren, waarin hy zich voornaamlyk met kleine Insecten voedt. Deszelfs lengte belooft, het achterste spits niet mede gerekend, naauwlyks $\frac{3}{4}$ duim. Hy is doorgaande blinkend en glad, veranderende, by zyne herhaalde vervelling, in niets anders, dan in de koleur. Zyn *Kop* heeft, benevens het gansche *achterlyf*, eene donker-bruine grondverwe; en dit laatste bestaat uit 8 à 9 leden, welke door zo veele helder-geele dwarsstreepjes onderscheiden, en met allereerste punten van gelyke koleur versierd zyn, *ald.* 237. De 3 leden van het *voorlyf* hebben daarentegen eene oker-geele verwe, en onder dezen vindt men de inleding der 3 paar pooten. De steekels of spitzen, waarvan 'er aan ieder zyde van het achterlyf 7 staan, die dezelfde koleur als de Pooten hebben, zyn voor geene pooten aan te zien, maar dienen veelligt den Worm, als de luchtvederen aan 't Oeverraas. Aan 't laatste lid heeft hy ook nog eene lange, na achteren recht uitlopende spitze, welke hem in 't zwemmen tot een stierroer schynt te strekken. Wanneer deze Worm veranderen zal, verlaat hy het water, en begeeft zich na den naasten vochtigen oever, alwaar hy eene ruime verwulfdde holligheid maakt, naa ettelijke dagen, zyne huid afstrookt, en in eene *Pop* verandert. Deze is in het begin geelachtig wit;

wit; doch kort daarna verandert haare grondverwe, en wordt over het geheel bruin. Na verloop van een paar weeken komt 'er een Insect uit voort, *ald.* 238. het welk een *Watervlinder* is: want, behalve dat hy uit de Pop van een worm, die in het water leeft, hervoorstkomt, zo draagt hy ook, in het ziten, zyne vleugelen, even als de *Nachtvlinders*, aan 't lyf geslooten. De 4 *vleugels* hebben een ovaal-ronden omtrek, zyn doorzichtig, geel-bruin, en met donkere aderen doortoogen. Het gansche *Lyf* is over 't geheel, gelyk dat van den Worm was, bykans overal even dik, en doorgaande donker-bruin van koleur, met rood-bruine inkervingen. De 6 *Pooten* zyn teder, niet zeer lang, en hunne uiterste deelen bestaan uit 4 leden. Aan den dikken *Kop* ziten 2 haivormige *Sprieten*, *ald.* 239. en *aann.*

Weduwe, dezen naam heeft de *zonderling* *schoone Nachtvinder*, met *hoog Karminroode ondervleugelen en achterlyf*, en met *witte, overdwars met zwarte vlakken versierde bovenvleugels*, by LINNÆUS gekreegen, IV. 147. *aann.*

Weegdoorn uil, zo wordt de *grootte Vlinder*, die met *louter geel bezoomde zwarte oogspiegelen versierd is*, by LINNÆUS genoemd, IV. 180. *aann.*

Weerschyn-vlinder, (de *schoone*,) *behoorende tot de eerste Klasse der Dagvlinders*, III. 220. enz. Deze *Vlinder* is een der fraaisten van onze gewesten; doch alle zyn ze niet even schoon, maar in koleuren en tekeningen onderscheiden. Daar zyn 'er, waarby de boven- en ondervlakte der vleugelen, wegens den zwart-bruinen grond, de donkerste is; en andere zyn helderer. Nog zyn 'er andere tusschen deze beide soorten,

die ten deele donkerer uitvallen; en men vindt 'er ook, hoewel zelden, eenige, die den overigen in alles volkomen gelyk zyn, doch niet in 't blaauwe speelen, *ald.* 222. Wanneer men zodanig een *Vlinder* in eene zekere strekking of afstand houdt, ziet men overal op denzelfen of een onvergelykelyken blaauwen weerschyn, of eene slechte aardverwige koleur; en deze tweeleie koleuren zyn de oorzaak, dat men hem den naam van *weerschyn-vogel* of *weerschyn-vlinder* geeft. De *Vlinders* dezer soorte, die eene donker-bruine grondverwe op de *bovenvlakte* hunner vleugelen hebben, zyn in de 4 vleugelen meestal met witte vlakken voorzien; welke, in tegendeel, in de heldere soort veelal oranje-geel zyn; doch de overige vlakken en oogspiegels zyn in beide weder oranje-geel. En zo heeft men ook ten aanzien der *ondervlakte* aan te merken, dat die, behalve de oranje-geele oogspiegels, met veele donkere grondvlakken en cieraaden pronkt, terwyl de ondervlakte der vleugelen van de heldere soort dezer *Vlinders* altoos, meer dan de bovengemelde, met oranje-geele vlakken, gekronkelde cieraaden, en bezoomingen versierd is, *ald.* 223. Wanneer men dezen *Vlinder* beziet, zo als men met den rug na 't venster staat, en hem, met zyne uitgebreide vleugelen, indiervoegen houdt, dat deszelfs *Kop* gekeerd zy, na 't licht, en de oogen van den geenen; die hem beschouwen wil; zo zal men byna overal eene schoone blaauwe koleur ontdekken. Maar, als men hem derwyze draait, dat het einde van zyn achterlyf en vleugelen na de oogen en 't invallend licht gekeerd is, zo valt de koleur geheel in 't bruine, *ald.* 224. De

Rups, waaruit deze Vlinder voortkomt, is volgens *aanm. ald.* 220. beschreeven by *Rups*, (*de mat- of dofgroene*) van *eene zonderlinge gestalte, genaamd het Rhee-bokje*.

Wesp, (*de kleine, geel en zwart verciërde, gezellige*;) welke een open nest bouwt; benevens haare verandering van 't *Ei af*, II. 497. enz. De Cellen haarer Nesten zyn zeshoekig, gelyk die der Byen of andere Wespen; en bestaan alleenlyk uit de afgeknagde houtvezelen, welke zy met eene soort van Lym, die ze uit haar lichaam voortbrengen, aan elkander vastkleeven, en in die gestalte kunstig weeten te vormen. De *Nesten* zelve bestaan uit 40 of 50 *Cellen*. In dezelve leggen de bevruchte wyfjes hunne *Eieren*, elk wyfje maar een *Ei* in ieder *Celle*, maakende het dit behoorlyk vast door een slym, dat te gelyk met het *Ei* uit haar lyf komt, en in een oogenblik hard en droog wordt. Het *Ei* is langwerpig van gedaante, en stroo-geel, *ald.* 500. De *Wormen*, uit deze *Eieren* voortkomende, krygen, naa een verloop van 6 dagen, hunne natuurlyke grootte. Hun *Kop* is blinkend zwart-bruin, en zeer weinig van het lyf afgezonderd. Dusdanig een worm bestaat verder uit 10 of 11 ringen of leden. Het *Lyf* is, veelal, bleek okergeel; en op de eene vlakte van het lyf ziet men, van den *Kop* tot aan den staart, eene tedere donkere linie, die men voor de gewoonlyke *Polsader* van de rupsen en wormen, of voor het *hart* houdt. Deze *Worm* heeft in 't geheel geene *Pooten*, en is veeleer eene *Mide*, dan een *Worm*, te noemen. Hy moet alleen van de oude Wespen gevoerd worden, dewyl 'er in de *Cellen* noch voorraad van Honig, noch eenig ander voed-

zel is te vinden, *ald.* 501. Zo dra deze Wespen-maden tot haaren volkomen wasdom gekomen zyn, en op het punt staan, van te veranderen, sluiten zy haare *Cellen* toe, maakende ten dien einde een *Spinzel*, dat, van binnen hol en van buiten verheven, een volkomen dekzel gelykt, het welk iets witter van koleur is, dan het overige Nest. Naa eenige dagen vindt men ze reeds in eene andere gedaante, in deze haare behuizing, alzo ze haare voorige huid heeft afgelegd. Zulk eene *Pop* blyft, des zomers, 14 dagen in haare *Cel* liggen, en daaruit komt dan de *Wesp*, *ald.* 502. Haare *vleugels* schynen zeer smal, het welk een algemeen kenmerk is van de Wespen der eerste Classe. Het ontbreekt haar niet aan eenen in het lyf verborgen zittende *Verweer-angel*, welks steek zo wel swelling als pyn veroorzaakt. De *Kop* en het *Voorlyf* hebben meerendeels eene zwarte grondverwe; tusschen de *Gebittang* zit een zwavelgeele *Lip*, en daar tegen over ziet men 2 gelyk-koleurige punten. De *Kop* is van vooren met een zwavelgeelen dwars-streep verciërd; en de bovenvlakte van het borststuk heeft, na achteren toe, mede eenige geele vlakken, die insgelijks, ter wederzyde, by de inleding der vleugelen, pierswyze gezien worden. Het *Achterlyf*, welks afdeelingen zo veele schubben schynen, is zwart en geel, en deze beide koleuren zyn indiervoegte verdeeld, dat ze als zaagvormige streepen voorkomen. De *Sprieten* zyn niet zeer lang, en rood-geel van koleur. De eene helft is kolfachtig, en hangt iets nederwaarts geboogen; doch de andere, die haare inleding aan den *Kop* heeft, is veel dunner. Het grootste gedeelte der 6 *Poo-*

en is oranje-geel; maar ter plaatze, daar ze hunne inleding hebben, en ter helfte van het deel, dat men den bovenschonkel kan noemen, zyn ze zwart, *ald.* 503.

Wespen, haar getal is zo groot, en haare Eigenschappen zyn zo verscheiden, dat men ze ten minsten wel in 3 *Classen* verdeelen kan, II. 465. Tot de *eerste Classe* behooren die geene, welke gezellig leven; tot de *tweede de Blad wespen*, en tot de *derde de Wipper-wespen*; *ald.* 466. De *Wespen der eerste Classe* maaken *Nesten*, die van binnen vol Cellen of huisjes zyn; uit Maden of Wormen zonder pooten voortkomen, en een verborgen Verweerangel hebben, *ald.* 467. De *Wespen der tweede Classe*, bekend onder den naam van *Blad-wespen*, leggen haare *Eieren* aan en op de bladeren der takken van verscheide Gewassen, waaruit naderhand Rupsen gelijkende Wormen voortkomen. Deze leiden ten deele een gezellig, en ten deele een eenzaam Leeven; en voeden zich met de bladeren der Gewassen, waarop zy voortgekomen zyn, tot datze, den volkomen wasdom bereikt hebbende, in Poppen veranderen, *ald.* 468. De *Wespen der derde Classe* worden, gemeenlyk, *Sluipwespen* genoemd. Maar, dewyl ze in eene geduurige beweeging zyn, en zo wel met het lyf, als met de Vleugelen en Sprieten bestendig wippen, zo worden ze ook *Wipper-wespen* genoemd, *ald.* 470.

Weversknegt, zo wordt ook de *Haver- of Houtbok* genoemd, IV. 192. *aann.* *Wilgenkruid*, zie *Perficaria*.

Wilgen-rups, (de bruinbairige,) met witte rugschilden, en rood-bruine knoppen, benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der tweede Classe*,

I. 229. enz. In *July*, of ten uitersten in *Augustus*, komen deze jonge rupsen ter waereld, en geneeren zich vervolgens zo lang met de buitenste randjes der tederste blaadjes, tot dat deze beginnen te verwelken, en kruipen dan in de scheuren of gaten der stammen, of ook wel onder de struiken op den grond, bekleeden zich met een weinig spinzel, en blyven van dien tyd af, den ganschen winter door, zonder eenig voedsel onbeweegelyk liggen, tot dat ze in 't Voorjaar, door de toeneemende warmte der zonnestralen, weder uit deze hoeken en winkels gelokt worden, als wanneer zy haar benoodigd voedsel terstond greecd vinden, *ald.* 230. De koleur, gestalte en tekeningen zyn by de jongen en volwassen eveneens, uitgenomen, dat de tekeningen, by toeneemenden ouderdom en grootte, iets duidelyker worden. De grootste wordt zelden meer, dan $1\frac{1}{2}$ duim lang, en zo vindt men ze omtrent het einde van *Mai*, of in 't begin van *Juny*. De *Kop* is niet buitengemeen groot, zwartachtig graauw van koleur, en met korte haartjes digt begroeid. Om den hals, kort aan den *Kop*, zitten 4 bruin-roode, rond-verheven knoppen. Het *Lyf* heeft tweeerleie grondverwe, van onderen naamlyk wederzyds graauw, en teder zwart besprenkeld, doch over den rug stuweel-zwart, en deze zwarte grond is, aan ieder zyde, door eene fyne geelle linie, van den graauwen afgescheiden, *ald.* 231. De *Rugschilden* vallen, by sommige rupsen, wel eenigzins in 't geelle, maar by de meeste ziet men ze gansch wit. In den graauwen grond van onderen ontdekt men wederzyds een rei bruinroode verheve knoppen. De *Voorpooten* zyn meest zwart, en alle de overige bruin van koleur, wordende

voor 't grootst gedeelte door de hairen bedekt. De koleur der *hairen*, waarmede deze rups op de zyden als bosjes bezet is, valt in 't geelachtig-roode, schoon ze met enige grauwe hairen doormengd zyn. Den tyd der veranderinge daar zynde, begint ze de naaste bladeren, die ze bereiken kan, door eenige draaden te zamen te trekken, en daaruit eene tent of dekzel over haar spinzel te vervaardigen. Daarin hangt de Rups aan den staart, en blyft in die gedaante een of 2 dagen, tot dat ze in eene *Pop* verandert. Onder deze *Poppen* wordt een merkelyk onderscheid gevonden, met opzicht tot derzelver grootte en koleur, *ald.* 232. Eene der *kleinste en zwartste* is niet veel meer, dan een halven duim lang, hebbende 4 regels langwerpige witte vlakjes, welke met veele gele hairtjes omgeeven zyn. De *grootste* is $\frac{3}{4}$ duim lang, blinkend wit, geel en zwart van koleur. Deze *Pop* is nog sterker met hairen bezet, dan de overige, waarvan aan den *Kop* geheele bosjes te zamen staan. Doch alle *Poppen* dezer soorte zyn met een stomp *staaripunt* begaafd, waaraan zy in haar Spinzel nederwaarts hangen. Wanneer ze nu byna 3 weeken in dien toestand geweest zyn, komen 'er de *Vlinders* uit te voorschyn, *ald.* 233. De *bovenschenkels der Pooten* zyn zeer hairig en gansch wit; waartegen de overige leden met enige zwarte dwarsstreepjes voorzien zyn. Hoe witter de *Vlinder* is, hoe schooner zyne git-zwarte *oogen*, en de daar boven staande *Sprieten* zich vertoonen. De breede en verheven *Rug* is, nevens het *Achterlyf*, zeer digt met een wit poejer, of zo genaamd *veder-stof* bedekt. De *Schacht der Sprieten* in het midden is wit, doch de daaraan

zittende *Veder-vezelen* zyn grauw. De *Starp* of *Zuiger* is tamelyk groot, *ald.* 234. Na de vermenging verloopen 'er naauwlyks 8 dagen, of het Wyfje legt zyne *Eieren*. Hiertoe verkiest het een groen Wilgeblad, zet de *Eieren*, welke groen van koleur en rond van gedaante zyn, aan 't zelve digt by elkander; nu eens aan de onder- dan eens aan de bovenzyde van het blad; en overtrekt dezelve met eene witte en blinkende vochtige stoffe, die terstond op de plaats droog, en eindelyk zeer hard wordt, waaruit naa 12 of 14 dagen de jonge rupsfen voortkomen, *ald.* 233.

Wilgen-rups, (de kleine,) met den vleesch koleurigen ruggestreep, en 2 roode rug-wratten; benevens baare verandering in een Nachtolinder der tweede Classe, III. 226. enz. De Eieren, waaruit deze soort van rupsfen voortkomen, zyn rond verwulfd, en van onderen plat gedrukt, doch loopen van boven enigermate spits toe. Derzelver koleur is in 't begin groenachtig-grauw, maar wordt eerst roffer, dan loodverwig, en eindelyk gansch zwart. In *Augustus* komen 'er de *jonge rupsfen* uit te voorschyn, *ald.* 226. *aanm.* By elke vervelling, die viermaal geschiedt, overspinnen zy de plaats, daar ze de huid zullen afleggen, op dat ze voor 't afvallen verzekerd konnen zyn. Haare grootste lengte is, zelden, boven een duim. De *Kop* draagt eene bruin-grauwe koleur, en is met enige hairtjes bezet. De *Hals* heeft eene oranje-geele bezooming; en de beide zyde-vlakken zyn aschgrauw; doch over den *rug* loopt, van den hals af tot aan het achterste lid, een heldere, breede, vleesch-verwige streep, waarin 2 hoogroode *Wratten* staan. De eerste zit op den vier-

vierden ring, van den Kop af gerekend; en de tweede vertoont zich op den laatste ring, en achter deze Wrat ziet men 2 reien kleine oranje-geele knopjes. Van onderen heeft deze Rups, op ieder zyde, eene oranje-geele bezooming, en boven dezelve staan, in den graauwen grond van elken ring, 2 gelykvormige knopjes tegen over elkander. Van die eigenste geele koleur zyn ook de 8 stompe *buikpooten*, beneffens de *naschuivers*; en de voorste *klaauwpooten* vindt men iets donkerer. Het *Lyf* is, overal, met tedere, donkere hairen bezet; doch op de beide Wratzen zyn die hairen wat langer, en vallen aan den wortel in 't oranje-geele, *ald.* 227. en *aanm.* By de aanstaande verandering blyft ze doorgaans in hare oude woning, welke zy dan met een digter, en eenigzins sterker weefzel omspint, en naa verloop van 4 of 5 dagen verandert zy in eene bruinroode *Pop*, waaruit, in de maand *October*, de *Nachtvlinder* te voorschyn komt. Deszelfs grondverwe is, zo wel aan zyn ganfche lyf; als aan de 4 vleugelen, meerendeels aschgrauw; doch aan den voorkant van den buitenften rand der *bovenvleugelen* ziet men eene donker-grauwe vlak, en aan dezelve etelyke fchoone, oranje-geele uitgetande vlakjes; voor 't overige zyn deze *bovenvleugelen* ook nog met eenige onregelmaatige, heldere dwars linien doortoogen; en nevens de groote vlak staat een donker punt. Het *achterlyf* eindigt met vederstof, *ald.* 228.

Wilgen-rups, (de fchoone, diklyve,) die, in plaats van *naschuivers*, met een dubbelen *staart* voorzien is, benevens baare verandering in een *Nacht-*

vlinder der tweede Classe, I. 290. er7. De boomen, waaraan zich deze Rups meest onthoudt, zyn de fmalbladige Wilgen. Zomwylen echter vindt men ze ook op de Lindeboomen en Popelboomen, *ald.* 291. en *aanm.* De grootfte is byna 2½ duim lang, en meer dan middelmaatig dik. De *Kop* is van onderen zeer vlak verwulfd. De 3de ring na den Kop heeft van boven eene spits toeloopende hoogte. Van achteren, en boven de lange *staartspitzen*, staat een paar korte zwarte uitfteekende punten. De *Rug* fchynt geheel vlak, en aan beide de zyden iets uitgezet. Zy komt met 2 knopjes achter aan den Kop ter waereld, die men by een paar *Ooren* vergelyken kan, welke rondom met korte hairtjes bezet zyn, en deze zo genaamde *Ooren* zyn bruin, *ald.* 295. De voorfte vlakke van den *Kop* is buitenwaarts zwavel-geel, onder den bek breed, en rondom den Kop fmal, met fchoon carmozyn-rood, in 't geele verdreeven, bezoomd. De koleur der zyden van het lyf is, tot aan het breede boordzel van den rug, fchoon-gras-groen, en in de inkervingen iets geelachtig; de *Rug* is bleek-grauwachtig-groen van koleur; doch by veele andere wirt. Van het laatste paar *buikpooten* tot achter aan den *staart* loopt 'er, onder langs den buik, een hoog Carmyn-roode ftreep. De *buikpooten* der *Mannerjes* zyn wel groen, gelyk de zyden van het lyf; maar ieder derzelven heeft eene zwarte vlak, van binnen met een witten flip voorzien. De *voetzoolen* zyn rondom zwart geboord, en met korte hairtjes begroeid. De spitze *Voorpooten* zyn zwart-bruin van koleur, en daar tusfchen met witte ringetjes

omgeeven. De grootste verscheidenheid van het Wyfje met het Mannefje bestaat in de donkere koleur, zo wel van den ring, (die omtrent violet-bruin is,) als van het overige des lyfs, *ald.* 296. Wanneer de tyd van haare verandering in eene Pop nadert, verliest zy haare schoone leevendige koleur, en wordt zeer bleek. Eindelyk begint zy de afgeknaagde spaandertjes onder haar *Spinzel* te mengen, en dit krygt dezelfde koleur als het hout, waaruit het nest vervaardigd is. In dit *Spinzel* blyft de Rups nog 4 volle weeken onveranderd; naa welken tyd zy eene schoone donker-rood-bruine *Pop* wordt, *ald.* 297. welke van vooren eenigzins blinkend is, doch van achteren smaller toeloopt, en stomp eindigt. Deze *Pop* blyft meerendeels den geheelen winter over liggen, tot in de maand *Juny*, waarop eindelyk de schoone, wit-graauwe *nachtvlinder* voortkomt. Deszelfs *bovenvleugels* zyn witachtig-graauw, en met veele, boven elkander getoogen, zwart-graauwe schubachtige en golvende linien versierd. Voor aan het lid ziet men eenige zwarte vlakjes. De 3 groote hoofdadereu of streepen, in de lengte, van het lid af, door den vleugel loopende, zyn tot over het midden geelachtig-rood van koleur. De grondverwe der *Ondervleugelen* is eenigzins donkerer-graauw, dan die der *bovenvleugelen*, en van alle de cieraaden; behalve dat de buitenrand wat helderer, en met donker-graauwe vlakken voorzien is. Het *Achterlyf* is hairig, en heeft eene witte grondverwe. Van boven op het midden staat eene rei vierkante ruitjes, die door zwarte te zamen gestelde linien geformeerd worden; indiervoege dat ieder ring of lid van 't lyf met zodanig

eene ruit pronke. Naast ieder dezer ruiten ziet men, ter plaatze daar ze te zamen loopen, wederzyds, eene na binnen spits toeloopende groote zwarte vlak. Het *Voorlyf* is met een wit en wollig vederstof digt begroeid, en met langwerpige zwarte vlakken, als een Hermelyn-vel, versierd. Zomwylen valt de witte koleur van 't *Voorlyf* wel iets in het groenachtige. De wortels der *Spieten* zyn met hairige wrongen omgeeven, *ald.* 298. De *Oogen* zyn zwart, en tamelyk groot, maar worden meestal door het daar over hangend vederstof bedekt. De *bovenschenkels der 6 Pooten* zyn, even als het lyf, zeer wol-hairig, en de overige leden wit, met zwarte kringertjes omgeeven. De *Eieren* zyn niet alle even donker-bruin, maar veele ook helderer van koleur. Aan hunne ondervlakte zyn ze eenigzins ingedrukt, ook meestal helder-groen van koleur, en met een helder-bruinen rand omgeeven. Naa verloop van 14 dagen komen de jonge Rupsen ter waereld, *ald.* 299 en *aanm.*

Winderups. Deze is, van anderen, ter wederzyde, met een byna gansch witten buikstreep voorzien. De *Kop* is helder oker-geel, en met eenige zwarte streepjes in de lengte doortoogen. Op de 3 naa den *Kop* volgende ringen ziet men ook nog 3 okergeele streepen. De *Winderupsen* bezitten nog die byzonderheid, dat ieder derzelve bykans verschillende is van de andere; doch eene gras-groene en ongestreepte *Winderups* zal wel het zeldzaamste gevonden worden. Deze *Winderupsen* komen voort uit groene, gladde, en eironde *Eieren*. De *Vlinders*, uit de Poppen dezer rupsen ontstaande, draagen

gen hunne *vleugels*, in het stil zitten, niet zo pylvormig nevens het lyf uitgebreid; maar slaan ze veel meer dekvormig over het achterlyf, zo dat zy 'er het achterlyf meestal mede bedekken, III. 33. en *aann.*

Wipper-wesp, (de groote, zwarte,) die menigmaal uit de *Pop* van een *Dagvlinder* te voorschyn komt, II. 520. enz. Aan het *mannetje* is zo wel het *Voor-* als *Achterlyf* geheel zwart, en het laatste ook zeer dun. Het *wyffe* is niet alleen dikker van achterlyf, maar heeft ook, ter wederzyde van het zelve, een smallen, helder geelen streep, en aan het allerlaatste lid een niet zeer langen *leg-angel*. De 6 *Pooten* zyn geelachtig-rood; de 4 doorzichtige *Vleugels* by de inleding geelachtig-bruin; en aan de 2 bovenste ziet men, aan den binnensten rand, een driekantig zwart vlakje; doch de 2 tamelyk lange *Sprieten* zyn zo dun, als een haar. Deze *Wesp* weet zich zeer wel te bedienen van den rechten tyd en de gelegenheid, om haare *Eieren* te leggen. Zy valt gemeenlyk op de *Rups*, juist ten dien tyde, als deze haare voorige gestalte verlaaten, en in eene *Pop* veranderen wil. Zy legt altoos maar een enkel *Ei* in zodanig eene *Pop*, en als het gebeurt, dat 'er 2 maden in gevonden worden, zullen dezelve haaren oorsprong ook van tweeërleie *Wespen* hebben, *ald.* 521.

Wipper-wespen, deze naam komt haar met recht toe, dewyl de op- en nederwippende beweging genoegzaam onophoudelyk aan haar bespeurd wordt, II. 473. Onder de verscheide soorten van *Wipper-wespen* is ook eene soort van *Rupsen-dooders*, aan welken deze naam wel het beste past. Dezelve hebben een *Kop*, die met eene *Gebintang* voorzien,

en doorgaans breeder is, dan de rug. Zommige bezitten korte, doch andere lange *Sprieten*. Haar *Achterlyf* ver-toont zich veelal, na achteren toe, dik en kolfachtig van gestalte; en 't is, by de meeste, door een dun, by zommige tamelyk lang, en by andere zeer kort kanaal, aan 't Borststuk vast gehecht. De *Bovenvleugels* vindt men by eenige korter, dan 't achterlyf, maar by andere even zo lang; en zy leggen dezelve vlak over 't achterlyf te zamen. Het getal haarer *voetleden* is even zo groot, als dat der andere soort van *Wespen*; alhoewel ze niet zo glad, als by de langlyvige en andere *Wipper-wespen*, maar meerendeels met haren bezet zyn. Dierzelfer *Eieren* hebben, insgelyks, eene langwerpige ronde gedaante, en zyn van verschillende koleuren, *ald.* 474. *aann.*

Wipperwespen, (de grootere,) zie *Sluipwespen*, (de grootere.)

Wipper-wespen, (de zeer kleine, gezellige,) zie *Sluipwespen*, (de zeer kleine, gezellige.)

Wipperwespen, (de kleine zwarte,) zie *Sluipwespen*, (de kleine zwarte.)

Wijze, (geaderd,) zie *Geaderd Wijze*.

Witte Vlinder, (de groote en byzonder schoone,) met ronde oogspiegels en zwarte vlakken, behoorende tot de tweede *Classe der Dagvlinders*, III. 228. enz. De grondverwe zyner 4 *vleugelen* ver-toont zich zo wel aan de boven- als aan de ondervlakte, geelachtig wit; doch, dewyl ze weinig stofvederen hebben, zyn ze meestal doorzichtig. Aan den buitenrand der beide *bovenvleugelen* ziet men eene breede, graauwachtige, slingervormige bezooming; en naby dezelve loopt 'er nog eene smaller en tederer, dwars over den *vleugel* heen;

heen. Voorts zyn 'er in deze bovenvleugelen 4 merkelyke fluweel-zwarte vlakken, van ongelijke grootte en gedaante, benevens eene kleiner van dezelfde koleur. De *Ondervleugelen* pronken, op hunne bovenvlakte, met 2 hoog carmyn-roode en ronde oogspiegels, met eene zwarte bezooming, uit welker midden, in de grootste, eene verdeelde, en in de kleinste eene enkelvoudige sneeuw witte vlak uitschittert. Aan den binnenrand, niet verre van het einde des ondervleugels, wordt men eene zwarte kronkel-vlak, en aan den buitenrand eenige uit tedere stippen bestaande graauwachtige, golvende streepen gewaar. By de inleding vallen de boven- en ondervleugels beiden in 't citroen-geele; welke koleur men ook aan den rand der eerstgemelden bespeurt. Het *Lyf* is aan het voorste, en aan het achterste deel, met lange haren begroeid, die eene graauwachtige verwe hebben. De *Sprieten* zyn kolfachtig, en even als de *Oogen* zwart. Op de *ondervlakte des Vinders* worden 3 oogspiegels, benevens eene driehoekige vlak gezien, en aan de inleding nog 4 andere vlakken van dezelfde koleur, die eenigzins hoekig, en van boven zwart bezoomd zyn, doch van onderen, tot over de helft, door de geele haren van het voorlyf bedekt worden. De 4 zwarte vlakken, van de bovenvlakte, vertoonen zich ook hier op de ondervlakte; *ald.* 230. doch de 2 achterste hebben in het midden een schoon rood stipje. De Karmynroode vlakken zyn by alle *Vlinders* van deze soort niet van eenerleie koleur, nademaal ze by sommige kaneel-rood, by andere menie-rood, en by andere weder oranje-geel bevonden worden; des deze soort van *Vlinders* mede

veranderlyk zy. Het *Voorlyf* benevens de 6 *Pooten* zyn geelachtig; het *Achterlyf* is van boven graauw, en van onderen geel, inzonderheid aan de laatste leden, daar het bykans in 't oranje-geele valt, *ald.* 231. De *Rups*, waaruit deze *Vlinder* voortkomt, zie beschreeven by *Rups*, (de fluweel-zwarte,) met oranje-roode vlakken, volgens IV. 22. enz.

Wolf, zie *Byen-motte*.

Wolfsmelk, of *Duivelsmelk*. Deze naam is, buiten twyfel, aan deze plant gegeven, om dat 'er een wit of melkachtig Sap, by het afbreken van derzelver takjes, uit voortvloeit, I. 139.

Wolfsmelk rups, (de groote, fraai getekende,) benevens haare verandering tot in een *Nachtvlinder der eerste Classe*. Deze *Rups* onthoudt zich op de *Wolfsmelk*, maar wordt ook op de *Meekrab* gevonden, I. 138. en *aann.* De allergrootste volwassé wordt ruim 3, en menigmaal 4 duimen lang. Onder alle de leden is de *Kap* het kleinste, en de *Hals* niet veel grooter. De leden of ringen zyn redelyk diep ingekroven. Het voorste gedeelte van het Hoofd is rond, en van boven met een paar zwarte ronde vlakjes, als *Oogen*, versierd. De *Ruggestreep*, als mede de *Staartklep*, en alle de 8 paar *Pooten* zyn hoog kaneelkoleurig-rood. Het *Hoornje* is tot over de helft insgelyks rood, en aan 't einde zwart. De zyde-streepen zyn geel; maar de leden op ieder ring met een helder rood vlakje voorzien. De hoofd- of grondverwe der rups is blinkend zwart, en alom met ontelbare, tedere, helder-geele en witte, verheve puntjes bezaaid of besprenkeld. Doch de gansche huid is, in 't bevoelen, zo glad als Pergament. De ovaal-ronde

zyd.

zydvlakken zyn een weinig geelachtig. Onder ieder dezer ovaal-ronde vlakken ziet men nog een wit vlakje, waarvan 'er op het laatste lid 2 à 3 nevens elkan- der staan. De *onderzyde van den buik* is rood, en hier en daar zwart besprenkeld, *ald.* 140. By haare verandering begraaft zy zich in de aarde, of maakt ten deele een uitvoerig bruin *Spinzel* om zich heen, of blyft bloot onder de dorre struikjes van het Gewas liggen. Naa 3, 4, of 5 dagen legt zy haare rupfen-huid af, en wordt eene *Pep*, wier lengte omtrent 2 duim zal wezen, *ald.* 141. Haar voorste deel, benevens de vleugelscheden, is graauwachtig-bruin, en met tedere donkere slippels besprenkeld. Haar achterdeel is helder- er, en meer rood-bruin. De meeste dezer Poppen blyven den winter over liggen, en de *Vlinders* komen eerst in *Juny* van 't volgende jaar te voorschyn, *ald.* 142. Het *wysje* is eeniglyk door de dikte van het lyf van het *mannetje* onderscheiden. De *Ondervleugels* zyn, van het lid af, tot omtrent het midden hunner lengte, pek-zwart. De *buitenrand* is een weinig uitgeschulpt, en smal geboord; naast dit boordzel is een breede bleek-bruine roodachtige dwars- streep; op dezen volgt een uitgeschulp- te zwarte streep; en van den laatste af tot aan den eerstgenoemden zwarten grond is de tusschenruimte roozen-rood; zo nogtans, dat de roozen-kleur naa den zwarten grond bleeker, en witach- tig wordt. In de *bovenvleugel* is het middelste en grootste deel van eene bleek roozen-roode kleur, die eenigzins in 't bruinachtige valt, en na den voorsten rand in het olyf-bruine uitloopt. De achterste rand is cierlyk geboord: aan den uitgeschulpten en smal geboorden

buitenrand ziet men een breeden helder graauwachtig-bruinen dwarsstreep, ver- vuld met ontelbaare donkerer stippen: van dezen af, tot aan den gemelden bleeken grond, ziet men de tusschenruim- te donker olyfkoleurig, gelyk ook de grond kort aan het lid is. Het *Voor- en Achterlyf* zyn beide olyf-bruin. Het eerste, van het hoofd af tot over de le- den der vleugelen, is wederzyds met een schoonen witten stootkant omzoomd; en het laatste heeft, behalve een diergely- ken, doch breederen, witten zoom, nog op ieder zyde een paar vierkante zwarte vlakken. Tusschen het Voor- en Achterlyf staat, boven op den rug, een breede wrong van donzige witte hairtjes. Aan het Hoofd ziet men een paar groo- te bruine *Oogen*, witachtige kolvenvor- mige *Sprieten*, en een langen slakswyze te zamen gerolden *Zuiger*, welke licht- bruin van kleur is. De *6 Pooten* zyn wit, en hebben bleke roozen roode *bovenschenkels*. Dus is ook de geheele *ondervlakte van 't lyf*, en die der *4 Vleugelen*, meerendeels roozenrood, *ald.* 144. en 176.

Wolfsmelk rups, eene andere, waaruit nogtans een zelfde *Vlinder* voortkomt, als by de vooraf beschreeve *Wolfsmelk- rups*, (de groote) geboekt is, III. 32. De grondverwe van deze is meestal bruin; maar de *ondervlakte*, benevens de *4 stompe buikpooten*, de *hals* of het eerste lid, en de geheele *naschuiver* zyn vleeschverwig. Aan elk der *4* gemelde buikpooten ziet men eene zwarte vlak, die aan andere rupfen dezer soorte zel- den bespeurd wordt. De *6 spitze klauwpooten* zyn gansch zwart, en de *Kop* is bruinachtig; doch de andere roo- de ruggestreep is hier eenigzins helder- er, dan de grondverwe. Hoe groot een

een onderscheid 'er intusschen in deze Rups met de vooraf beschreeve gezien worde; zy heeft nogtans ook de in den donkeren grond staande heldere zydevlakken op ieder lid; welke altoos voor een vast kenteken der Wolfsmelk-rups te houden zyn. De 9 *Spiegelpunten*, ter wederzyde, zyn geel, met eene zwarte bezooming, en de *Staartspits* is hoogrood, zonder een zwart einde te hebben, *ald.* 32.

Wollekruid-rups, (de *groenachtig-witte*, *zwartgevlakte*,) *benevens haare verandering tot in een Nachtvlinder der tweede Classe*, I. 310. enz. Deze vindt men volwassen in *Juny* of *July*, en is ongeveer 2½ duim lang. De tekeningen aan deze volwassenen is niet altoos eveneens; ja zelfs de grondverwe wordt by eenige dezer rupsen helderer, en by andere donkerer bevonden. De *Kop*, die eene hartvormige gedaante heeft, is by de meeste zwavel-geel, en met 8 à 10 zwarte stippen, van ongelyke grootte, in eene evenredige orde gezet, versierd *ald.* 310. Boven op ieder ring van 't lyf staan 2 geele vlakken tegen over elkander; en naast ieder vlak ziet men, omtrent op het midden van den rug, een zwart stipje. De *Hals* heeft maar eene enkele, grootte, geele vlak, in en rondom dewelke verscheide zwarte stippen staan. De 6 *spitze Voorporten* zyn geel; maar de 5 paar *stompe* hebben, in tegendeel, de grondverwe van het lyf, en zyn meestal teder, zwart besprenkeld. Op de ringen van het lyf is deze Rups met korte, graauwe hairtjes dun bewa-sen. Naa dat zy haare behoorlyke grootte en ouderdom bereikt, en verder geen voedsel meer noodig heeft, kruip ze na beneden op den grond. Hier verschuilt zy zich of in de openingen van het aard-

ryk, en bouwt aldaar een onderaardsch vertrek ter veranderinge; of blyft boven op de aarde, en bereidt zich, met eene uineemende behendigheid, een huis van de dorre bladeren; *ald.* 311. veranderende, binnen 8 dagen, in eene *Pop*, die geelachtig-rood-bruin, en zeer blinkend is. Deze blyft den winter over liggen, en de daarin verborgen *Vlinder* komt doorgaans in *Mai* ter waereld. Desselvs *Kop*, die wat diep onder den hals zit, is bruin van kleur, en heeft van boven eene geelachtige vlak. Het *Voorlyf* is zeer hoog verheven, en van vooren aan den hals met een hoogen graauwachtig-witten rand, als met een kraag, versierd. Op den *rug* is de kleur van 't voorlyf donker-bruin, doch ter wederzyde en van anderen is ze geelachtig-wit, *ald.* 312. Het *Achterlyf*, dat smal toeloopt, is met bleek-bruinachtig-graauw vederstof begroeid, en van boven, langs het midden, door de geheele lengte, met donker-bruine vlakken versierd. De 4 *vleugels* zyn, aan den buitenrand, cierlyk uitgeschulpt, en eerst met eene donkere, daarna met eene heldere linie omtoogen. De grondverwe der *Bovenvleugelen* is bleek Oker-geel, en aan den vooriten en achtersten rand met een breeder donker-bruinen streep voorzien. Dars door den vleugel loopt een paar heldere streepen. De kleur der *ondervleugels* is zwart-graauw en valt na het lid toe in 't geelachtige. De *Pooten* hebben hairige bovenschinkels, en eene okergeele kleur; doch de 2 achterste paaren zyn met donker-bruine vlakken versierd, *ald.* 313.

Wonder rups, zie *Gras-rups*, (de *grootte hairige*.)

Worm, (de,) *van de grootste soort der waternimphen, van het Eiaf, tot aan*
zyne

zyne verandering, II. 192. enz. Na de verlaating van het *Ei*, door het wyfje van de grootste foort der Waternimphen in 't water gelegd, is de *Worm* niet veel kleiner, dan een Varkens-luis, en komt 'er, ten aanzien der gestalte, ook tamelyk wel mede overeen. Hy vervelt ten minften 3 maalen. De grootste heeft de lengte van $1\frac{3}{4}$ duim. De koleur van de Wormen der grootste foorte van Waternimphen is verschillende: want zommige zyn helder-bruin, en hier en daar met donkere vlakken en punten getekend, *ald.* 192. andere zyn een-koleurig, en over het geheel zwart-bruin. Voor 't overige hebben alle die Wormen eenerlei maakzel. Indien we derhalven omtrent den zwart-bruinen het noodige opmerken; dan weten wy ook, hoe de gevlake gesteld zy. Deze *Worm* nu is met een tamelyk grooten *Kop* voorzien. Van vooren, boven de ronde en stompe bovenlip, ziet men een paar tedere en korte *Sprietjes*. De *bals* is het dunste van alle de leden. Kortby dezen is de *Rug*, aan de zyden, met 2 spits toeloopende lappen bezet; waar onder de vleugelscheden een begin nemen, die zich over den rug heen tot aan de helft van 't lyf uistrekken. Het *achterlyf* loopt, zo wel by het begin, als na achteren, spits toe. De *Staart*, of het achterste lid is met 3 groote, scherpe en harde spitzen voorzien, van welke de middelste boven staat, en tuschen die en de beide zyde-spitzen ziet men nog 2 kleine. De 6 *Pooten* zyn zo in grootte, als in getal der leden, aan elkander gelyk. Gemeenlyk vertoonen zich dezelve bruiner gevlaakt, en iets helderer, dan 't lyf; nademaal ze zo dun zyn, dat 'er het licht gemaklyk doorheen kunne schynen. Derzelver

bovenste lid is altoos het dikste; het tweede is veel dunner; en het derde, waaraan de voet zit, bestaat uit 4 kleine leden, welker laatste met 2 tedere haakjes voorzien is, die zo spits zyn, dat ze zich overal aan konnen hechten, *ald.* 193. Deze Wormen der Waternimphen zyn van achteren met geene flosvederen, of roeivinnen om te zwemmen, voorzien; ook hebben ze dergelyken niet aan de zyden van het lyf; maar hebben tuschen de spitzen, die aan het achterste lid staan, eene opening, door welke zy het water in-trekken, en ook weder uiterpen konnen; en, wanneer ze zich van de eene plaats na de andere willen begeeven, dan dryven zy het ingezooogen water, plotslyk, en met geweld, weder uit, schuivende zich, door behulp van het zelve, werwaarts zy willen, *ald.* 194. zy onthouden zich in loopende en in stil staande Wateren, en zo wel in slym op den grond, als aan het gras en 't riet. De breed uitpuilende *Oogen* versprekken ten bewyze, dat de *Worm* zeer scherp in 't water moet konnen zien, *ald.* 197. Hy behoudt bestendig zyne gestalte, veranderende in niets, dan daarin, dat hy *vleugelscheden* krygt. Tot dat einde verlaat hy zyn gewoon verblyf, het water, en begeeft zich, of in het aan den oever staande gras, of aan het veelvuldig uit het water opgroeijende riet, waaraan hy zich, met behulp van de scherpe klauwen zyner pooten, vast zet. Dus blyven zommigen een ganschen dag, anderen slechts een paar uren, stil en zonder eenige beweging zitten, tot dat naamlyk hunne huid droog geworden zy, *ald.* 198. Alsdan springt de huid, op den rug van 't voorlyf, of het

het borstfluk, van een; waarna men, uit deze gemaakte opening, allengskens een witachtig Schepzel te voorschyn ziet komen. Deze *Water nimph* begint alrede toe te neemen, en zo wel in de dikte als in de lengte te groejen, *ald.* 199. Inmiddels worden alle haare deelen, en wel voornaamlyk de *pooten*, harder en sterker, *ald.* 200. De *vleugels*, welke tot hier toe zo dicht te zamen gepakt gelegen hebben, even als de bladeren in den opengaanden knop van een boom of bloem, beginnen nu meer uit elkander te komen, en te groejen; en deze groei gaat spoedig in zyn werk. De vleugels breiden zich uit, daar ze als een nat postpapier nederhangen, en worden allengskens koleuriger. Dit heeft ook plaats ten aanzien van het *lyf*; in zo verre, dat de *Waternimph*, binnen een half uur, en by warme dagen nog spoediger, haare volkomen gestalte verkryge. Deze is van de *heldere rood-bruine soort*. De grondverve van haar yf is hier volstrekt roodachtig-bruin, en de *6 Pooten* hebben diezelfde koleur. Het dikke *voorlyf* of *borstfluk* is, ter wederzyde, met een paar helder-geele streepen verciert, en van boven, na den kant van den *Kop*, met 2 witte vlakjes getekend. De groote en helder-blinkende *Oogen* vallen, by deze soort, in 't violet-blaauwe; en het tusschen dezelve vooruistekende deel is geel. Ter plaatze, daar de *vleugels* aan het voorlyf hunne inleding hebben, ziet men 4 schuins staande, vierkante, helder-blaauwe vlakken, *ald.* 201, hoedanige 'er ook aan 't *achterlyf*, ter wederzyde, tusschen de meeste leden gevonden worden. Midden op de rug-linie is 'er van 's gelyke een klein, overdwars staande, en wederom in het midden verdeeld,

geel vlakje te zien. Het dikke en kolfvormige begin van 't *achterlyf* pronkt ook, tusschen de 2 *achtervleugelen*, met een paar overdwars loopende blaauwachtige streepjes. De doorzichtige *vleugelen* zyn geelachtig-bruin; maar de langwerpige vierkante randvlak, aan den uitersten hoek, is by eenigen bruin of zwart, en by anderen ook wit, *ald.* 202.

Wormen der Houtkevers, bunne kenteekenen, II. 108. enz. In het *algemeen* hebben deze *Wormen* een recht uitlooppend *lyf*, waar tegen de *Wormen* der in 't byzonder zo genaamde Aardkevers gewoonlyk gekromd zyn, en 'er van achteren zakvormig uitzien. Wyders hebben deze *Wormen* eenen eenigzins breedten en niet zeer grooten *Kop*, en aan de voorste leden *6 Pooten*. Doch in 't byzonder heeft men omtrent deze *Worm* in acht te neemen; dat het eerste der leden, die het *lyf* uitmaaken, en over het algemeen geelachtig-wit van koleur zyn, het dikste, en meer breed, dan rond, *ald.* 108. als ook geelachtig-bruin van koleur is. De *Kop* is niet van het *lyf* afgezonderd, en heeft een dwars staande scherp en hard *Tangzebit*, het welk, even als de *Kop*, nu donker-bruin, dan helderer van koleur is. De *Pooten* dezer *Wormen* zyn zo klein en teder, dat men in den eersten opslag zoude twyfelden, of zy 'er wel waren. Hunne verandering geschiedt niet altoos in 't hout, dewyl 'er eenigen onder zyn, die zich omtrent dien tyd in de aarde begraven. Wanneer zy eindelyk de worm-huid hebben afgestroomt, en als *Poppen* liggen, zyn ze van de anderen te onderkennen door de knobbelige hoornen, die aan de houtkevers alleen eigen zyn, *ald.* 109.

Wor-

Wormen der Waternimphen, II. 176. *aanm. enz.* Alle *wormen der Waternimphen* hebben 6 *Pooten*, en eene byzondere *Vangtang* onder den *Kop*, die zy, als roof-insecten, op andere insecten jacht maakende, sluiten, waar door zy dezelve daar mede kunnen vangen. De meeste *Wormen* dezer *Waternimphen* geeven van achteren een waterstroom van zich, waar door ze zich de noodige beweeging tot het zwemmen kunnen verschaffen. Alle *wormen der Waternimphen* hebben meer dan een jaar tot hunnen wasdom noodig, en veranderen, wanneer ze vleugelscheden krygen, in geene voedzellooze en onmagtige *Poppen*, maar gebruiken in dien toestand, nog spyze, beweegen zich ook als vooren, en kunnen alle hunne leden gebruiken, *ald.* 176. *aanm.* De *wormen der Waternimphen* hebben van achteren geene zo lange hairborstel-spitzen, of lange spitze vedervinnen, noch ter wederzyde dergelyke kleine, gelyk de *Wormen* van het *Oeveraas*, *ald.* 177.

Woudärgus, onder dezen naam is de *Vlinder*, die met veele geele vlakken en dergelyke ringen getekend is, bekend, IV. 182. *aanm.*

Woudbeide, zie *Rupsje der Woudbeide*.

Woud-rups, zie *Pynboom-rups*, (de groote.)

Woudvlinder, (de bleek bruine, oranje-geele,) met den zwarten *Oogspiegel*, behoorende tot de eerste *Classe der Dagvlinders*, III. 180. *enz.* Deszelfs *bovenvleugels* zyn in ondervlakte meendeels oranje-geel; welke oranje-koleur echter na vooren, of na de inleding toe, donkerer is, dan achterwaarts. En aan den buitenrand ziet men eene bleek-bruine bezooming van ongelyke breedte, die een ronden, zwarten *Oogspiegel* met

een wit middelpunt, staande in den heleren grond, halfwegen omringt. De *Ondervleugels* zyn overdwers, door een bruinen en okergeelen grond, verdeeld, en met veele overdwers staande, uitsiekende donkere streepjes en puntjes verciert. De *bovenvlakte* der vleugelen is meestal bleek-bruin, doch verdwynt ongemerkt, nu in 't heldere, dan in 't donkere. De voorste vleugels zyn nog iets donkerer, dan de achterste, en met eene overdwers staande, schoone, vuur-roode, of oranje-geele vlak verciert, in welke, omtrent het uiterste einde, de zwarte *Oogspiegel* met zyn witten stip staat. Deze is de *Wyffjes-vlinder*. De *Mannetjes* zyn gemeenlyk donkerer; en de *Oranje-geele vlak* is 'er, zelden, zo duidelyk, en zomtyds in 't geheel niet, in te zien. De *Eieren*, waaruit eene ongedoornde groene, ook menigmaal geele *Rups*, die alleen van achteren met 2 spitzen voorzien is, geboren wordt, en welken de *Vlinder*, meestal in *Augustus*, op het gras in de boschen legt, zyn meer rond, dan kegelvormig. Deze *Eieren* zyn in 't begin witachtig-geel, maar worden bruinachtig-graauw. De *Rupsen* overwinteren, en veranderen eerst in het volgende jaar in helder-groene *Poppen*, waaruit dan eindelyk, in de maand *July*, de boven beschreeven *Vlinder* te voorschyn komt, *ald.* 181. en *aanm.*

Woud-vlinder. (de donker bruine, okergeele,) met 2 zwarte *Oogen-spiegels* in de *bovenvleugelen*, behoorende tot de eerste *Classe der Dagvlinders*, III. 178. *enz.* Hy wordt de *woud-vlinder* genoemd, om dat hy zich enkel in de *Wouden*, zomtyds reeds in *July*, doch meestal in *Augustus*, by menigte laat vinden. Meest nogtans worden ze aan

de Dennen- en Pynboomen, zo wel aan derzelver nagelen, als schorfe, gevonden, *ald.* 178. De grondverwe zyner *bovenvlakte* is meestal donker-bruin; maar op de buitenste bruine bezooming volgt 'er een breede, helder-okergeele streep, die door alle de 4 *vleugelen* heen loopt. In dezen streep ziet men, in de 2 *bovenvleugelen*, 2 ronde zwarte Oogspiegels, welke in het midden een witten slip hebben. Aan de *ondervlakte* zyn deze *vleugels*, zo wel in 't heldere, als donkere gedeelte van den grond, overdwars, met veele zwarte, tedere en afsteekende streepjes doortoogen, en met nog dikkere donkere linien bezoomd. Ook ontdekt men hier in den *bovenvleugel*, in den okergeelen streep, slechts een Oogspiegel, en zelden aan zommigen den tweeden, *ald.* 180.

Woud-vlinder, (de groote bruine,) beboorende tot de eerste Classe der Dagvlinders, IV. 150. De *bovenvlakte* zyner 4 *vleugelen* heeft eene slechte bruine, maar iets helderder grondverwe, *ald.* 151. doch de ongelijk breede dwarsstreep, welke door de 4 *vleugelen* loopt, is wit. De *Bovenvleugels* hebben van vooren, van de inleding af, tot aan de plaats, daar de bruine grond eindigt, eenen, hoewel niet zeer breedten, okergeelen rand, welke met veele dwarspunten besprenkeld is. In de ruimte staat eene groote donkere oogvlak, met een wit punt in 't midden; en daar achter weder een witte streep, met eene insgelijks donkere, doch veel kleiner vlak. Alle 4 de *vleugelen* zyn, aan den buitenrand, met zo veele scherpe spitzen voorzien, hoewel van ongelijke lengte, als 'er aderen in bespeurd worden; waar tegen de heldere rand-bezooming ontbreekt. Het geheele *Lyf* is bruin, de

beide *Oogen* zyn groen, en de beide kolfjes aan de *Sprieten* meestal okergeel. Het gedeelte van den grond der *ondervlakte*, 't welk meer, dan de helft der *vleugelen*, van de inleding afgerekend, beslaat, en in 't bruine donker-bruin gevamd is, heeft in de voorste *vleugelen* twee, en in de achtersten eene witte vlak. Daarbenevens is de breede dwarsstreep hier insgelijks wit, inzonderheid in den *bovenvleugel*; waarin ook hier, even als op de *bovenvlakte*, de ronde en donkere oogvlak met het witte middelpunt gezien wordt, staande in een groot wit, doch zwart bezoomd veld. De overige helder-bruine grond dezer *vleugelen*, vooral die der *Ondervleugelen*, is fraai met onregelmaatige donkere dwarsstreepen en punten van verschillende grootte en vorm versierd. De 2 paar lange *Pooten*, en de beide korte voorpooten zonder klauwen zyn helderder, dan het hairig *Lyf*, en als okergeel, *ald.* 152.

*Wynhandel, } zo wordt het zo genoemde
Wynhasel, } wandelende blad in Moravie* genoemd, IV. 67.

Wynrups, (de met 2 oogspiegels versierde,) zie beschreeven by Vlinder, (de schoone, met roozenrood gevleete ondervleugels pronkende.)

Wynstok-rups, (de groote,) met een staart en spiegels, benevens haare verandering tot in een Nachtylinder der eerste Classe, I. 145. enz. De grootte en dikte dezer *Wynstok-rups* gaat die der gewoone groote *Rups* en zo ver te boven, dat men dezelve, ze nooit te vooren gezien hebbende, eer voor een Veld-slak, dan voor eene *Rups* zoude aanzien; te meer, daar ze zich ook, gelyk eene slak, kan uitrekken en inkrampen, *ald.* 145. Zy wordt op de gecele

geele *Virginische Wederik*, en op de groote roode *Wederik* gevonden. Onder deze soort van rupfen treft men zeer ongelijke Gezusters aan; nademaal men doorgaans drieërleie in koleur onderscheide soorten uit een broedzel van eene moeder ziet hervoortkomen. Zommige zyn donker- of zwart-bruin; *ald.* 146. andere zyn helder- of geelachtig-bruin; en nog andere zyn schoon helder-groen van koleur. Desnietteenstaande zyn nogtans de *Vlinders*, uit alle deze soorten van wynstok-rupfen voortkomende, aan elkander gelyk. Onder de helder-bruinen en groenen, waaruit doorgaans wyfse-vlinders gebooren worden, vindt men 'er zommige, die meer dan 4 duimen lang zyn, als ze uitgerekt zyn, *ald.* 147. De *Kop der zwart-bruine rupse* is roodachtig-grauw. Van den *Kop* af tot aan de laatste spiegelvlak ziet men, wederzyds, een breed en verheven vleeschverwigen streep of wrong; boven welken tusschen de 2 voorste spiegels, aan beide de zyden, eenige heldere streepjes zyn. De *Buik* is ter wederzyde in de lengte met okergeele punten besprenkeld, die van verre maar een enkelen streep schynen uit te maaken. Ieder ring heeft, van buiten aan elke zyde, eene dof-zwarte uitgetande vlak, en over den rug loopt een streep van diezelfde koleur. De *groene Rups* heeft even zulke zydevlakken en zodanigen ruggestreek, uit welken laatste, over de 4 voorste ringen, eene tedere zwarte linie loopt tot aan den *Kop* toe. In deze groene soort ziet men, ter wederzyde, de net geschikte Spiegelpunten zeer duidelyk. Op den laatste ring ziet men, aan ieder zyde, een geel streepje, dat, na het *hoornetje* schuins opwaarts loopende, tusschen de

2 zwarte streepen beslooten is. De *Rups*, wier grondverwe *helder-bruin* is, die slechts hier en daar in 't okergeele verdwynt, heeft geene andere, dan okergeele streepen. Van de laatste Spiegelvlak af loopt 'er, wederzyds, zodanig een breede streep tot aan de spits van 't hoornetje. Uit dezen zyde streep zyn op alle de ringen okergeele streepen schuins na vooren getoogen, en de inkervingen of verdiepingen der leden, als mede de staartklep, hebben insgelyks zulke heldere of okergeele boordzels. De *Buik* is op de ganse ondervlakte met ontelbaare kleine wratjes bezet, *ald.* 148. By haare aanstaande verandering bereidt zy haare legerstede vlak onder het kruid, of den Wynstok, waarvan zy haar voedzel genuttigd heeft. Eenige kruipen alleen onder de bladeren of struikjes; andere maaken holen in de aarde; doch beide maaken ze een dun, wydgarig, bruin, *Spinzel* om en over zich heen. In dit *Spinzel* blyven ze dan nog volkomen 8 dagen liggen, waarna zy in eene *Pop* veranderen. Het voorste deel van dezelve is zwartachtig-grauw; maar het achterste deel is helder roodachtig-bruin van koleur, en met ontelbaare donker-bruine puntjes of stippen besprenkeld. De verdiepingen tusschen de ringen van 't *achterlyf* zyn helder-grauw; en het *staartje* is hoornachtig of zeer hard, hebbende eene zwart-grauwe koleur. Rondom het lyf staan, aan de zyde van eenige leden, smalle zwarte reepjes, die uit loutere slippen te zamen gesteld schynen, *ald.* 149. Deze *Pop* blyft den winter doorgaans over liggen, en dikwyls komt 'er al in 't begin van *May* de *Vlinder* uit te voorschyn. De grondverwe van deszelfs *lyf* en *bovenleugelen* is geelachtig olyf-bruin.

bruin. De' voorste en buitenste rand der *bovenvleugelen* is geboord met een breedden streep , wiens koleur uit het roozenrood in het violet-blaauw valt. Hieraan grenst een helder roozen-rood en uitgeschulpt streepje. Naa eene niet zeer breede olyfkoleurige tusschenruimte, loopt 'er eene roozen-roode linie wat schuins overdwars. De achterste rand van den bovenvleugel is wit bezoomd, indiervoege, dat deze witte zoom aan 't lid beginne, allengskens smaller worde, en spits toeloopet. De *Ondervleugels* zyn aan den buitensten en binnen-rand met een smal wit boordzel verciert. De eene helft, te weeten van het lid af tot aan het midden, is zwart, en de andere helft hoog roozen-rood. De 3 laatste leden van het *Achterlyf* zyn geheel roozen-rood, gelyk ook de beide zyden van den *buiik*; waaraan men echter een smal wit streepje, en voor aan, kort by het voorlyf, een zwart vlakje ziet. Op den *rug* staat op ieder ring een langwerpig rood vlakje. Het *Voorlyf* is meerendeels olyf groen, en over den rug zeer cierlyk met roozen-roode streepen geborduurd. Rondom de leden der vleugelen ziet men witte wrongels of boordzels van syn vederstof, *ald.* 150. De *boven-schenkels* der 6 *Pooten* zyn roodachtig, maar de overige leden wit. De *Kop* is vry groot. Hy heeft een paar groote, groene, blinkende *Oogen*; roode baardspitzen, en witte knodsachtige *Sprietzen*, welke laatste by het mannetje en wyfje even eens zyn. De *Eieren*, door het Wyfje gelegd, zyn groen van koleur, langwerpig-rood van gedaante, en tamelyk groot, *ald.* 151.

Y.

Ysvogel, zo wordt een *Vlinder*, uit eene soort van *Doornrupsen* voortkomende genoemd by de liefhebbers der Insecten, uit hoofde van de koleuren, die hy met dezen Vogel gemeen heeft, III. 175. *aann.* en IV. 172.

Z.

Zaagvliegen, zo noemt REAUMUR (*Deel* 6. *Mem.* 3.) alle *Wespen*, uit *Bufterdrupsen* voortkomende, II. 481.

Zadel-rups, zie *Kameel-rups*.

Zandkrabbe, noemen de *Dantzigers* een zeker soort van *garnaalen*, welke niet deugt om te eeten, maar alleen gevangen wordt, om den *Vischeren* tot een aas te dienen, III. 313.

Zee-garnaal, of *Krabbe*, *beschryving* van deze, III. 310. enz. Aan de *Zee-garnaal* zyn slechts 10 *Pooten* te tellen, als men de kleine staartpootjes uitzondert, en aan den *staart* heeft ze bykans zodanige vlotschubben, als de *Kreeften*. Tusschen de 2 hairachtige lange *Sprietzen*, heeft ze nog 3 paar korte; dezelve staan voor de oogen; ieder paar is van eene andere gedaante, en een paar heeft zyn oorsprong van den bek. De 2 voorste *Vangklaauwen* zyn dik, welke haar in plaats van Schaaren dienen. Op deze volgen ter wederzyde 2 zeer dunne en tedere *Pooten*. De voorsten dier pooten leggen gemeenlyk over de vangklaauwen kort aan het lyf, en steeken tot onder den *Kop* vooruit. De 2 volgende paaren zyn dikker en langer, en hebben hunne inleding ook nog onder het lyf. Elk dezer 8 *pooten* is voortaan met een enkelen, tederen, en spitzen

zen klauw voorzien, *ald.* 311. Tot zo verre als deze pooten zich uitstrekken, gaat ook het *Voorlyf* dezer Garnaal, in voege dat de daarop volgende, naar gerade, dikke *staart*, die allengskens in dikte afneemt, en uit 6 leden bestaat, het langste deel der Garnaal uitmaake. In dezen *staart* zit het meeste vleesch. Onder den *staart* zitten nog 5 paar *vederpooten*, welke geene klauwen hebben, en allengskens in lengte afneemen, gelyk de leden van den *staart* in dikte doen. Aan 't einde van den *staart* ziet men, ter wederzyde, 2 smalle, lange en styve *Vlotschubben*, welke met korte hairen omzoomd zyn; doch tusschen deze vlotschubben is eene styve, en evenlange spits, *ald.* 312. Deze Garnaal heeft eene graauwe en doorzichtige Agaat-koleur, *ald.* 311. Anders heeft KLEIN nog *tweeërleie* Garnaalen beschreeven, die zich in de *Oostzee* onthouden. De eene noemt hy de *bruine*, en de andere de *aschgrauwe Garnaal*. De *eerste* valt ook wel in 't roodachtige, en is zelden boven de 3 duimen lang. De *Dantzigers* noemen ze *Crubenie*, en de *Hollanders* *Garnaalen*. Het eerste paar van derzelver *pooten* is kort en enkelvoudig; het daarop volgende heeft eene soort van schaare: het derde paar is 't langste en schaarvormig; de overige 3 paaren loopen ten einde in enkelvoudige steekels of klauwen. Van vooren by de *Oogen* dezer Garnaale steekt een takkige *hoorn* uit; ook ziet men 'er 2 bladvormige beweegelyke deelen, zo als 'er mede aan den *staart* zitten; en benevens deze zyn 'er insgelyk nog 4 *Sprieten*, *ald.* 312. naamlyk twee die lang en dun, mitsgaders twee die korter, en in het midden in 3 deelen verdeeld zyn. De *tweede Garnaal* is geheel asch-

grauw; half doorzichtig en blinkend, maar kleiner, dan de vorige, dewyl ze nauwlyks de lengte van 2 duimen bereikt. Zy is met geen takkigen hoorn voorzien, maar heeft, in deszelfs plaats, voor de oogen, 2 langwerpige ronde, met eene schaaie bedekte uitsteekzels, welke in 4 korte borstelhairen eindigen. Daarenboven draagt ze nog 2 lange *Sprieten*, en bezit even zo veele bladvormige snydende deelen, *ald.* 313.

Zeekeestten, zie *Hummers*.

Zee-polypen, (*de*,) bestaan, volgens het vroeger eenpaarig getuigenis van alle Natuurkundigen, in *Mannerjes* en *Wyfjes*, die te zamen paaren en *Eieren* leggen. En uit het bericht van JOHN EL-LIS, weet men nu met zekerheid, dat de *Zee polypen*, schoon in gestalte van de *Polypen der zoete wateren* onderscheiden, nogtans op even dezelfde wyze, als dezen gevoed worden, toeneemen en zich vermeerderen, III. 380. *aann.*

Zee-ster, (*de*,) zou met recht een *Polyp* genoemd mogen worden. Dit schepzel toch bedient zich van zyne veelvuldige pooten of armen, welke rondom den mond staan, om zynen buit te bemachtigen, en vast te houden. En JUSSEU en GUETTARD hebben, volgens het bericht van de REAUMUR, waargenomen, dat ook de Zee-sterren uit enkele stukken weder volkomen worden, III. 383. 384.

Zenuw- of Pecs-worm. Deze *worm* is, volgens KAUMPFERS bericht, wit van kleur, een voet lang, zomwylen ook eene Elle, en nog langer, daarby teder, rond, en niet dikker, dan eene dikke viool-snaar. Hy vertoont zich inzonderheid in den zomer, en, hoe warmer deze zy, hoe meer hy voortkome. Hy

verftrekt den inwooneren der landftreken van *Arabie*, *Perfie*, *Guinea* enz. tot eene groote plaag, III. 288. *aann.* en huisveft meeftal omtrent derzelver gewrichten, van de knie af tot aan den voer, en wel voornaamlyk aan de inwendige en uitwendige knokkels. Zomtyds zit hy ook in de armen, in de hand, in den balzak, in de heupen, delenden en zyden. Wanneer hy zich openbaart, wordt de Lyder, gemeenlyk, van eene ligte koorts aangevalt, die zelden meer, dan een dag, doch ook zomwylen tot aan den derden dag duurt, waarmede het beledigde deel dan eenigzins rood wordt en opzwellt. Des anderen daags komt 'er een teder, waterachtig, doorzichtig, ook niet zelden koolzwart blaasje, ter groote van eene Erwt, voor den dag. Wanneer dit, naa verloop van een of 2 dagen, openbreekt, of geopend wordt; vertoont zich de fuit of kop van den Worm; waarop dan eerlang het ganfche lichaam volgt; welks uitgang door eene dagelykfche, zagte uitwinding bevorderd wordt. Met de uitwinding gaat het nu fpoedig, dan langzaam voort, en 'er worden, gemeenlyk, 10 dagen mede doorgebracht. Ook moet men hiermede zeer voorzichtig te werk gaan; want als de Worm afbreekt, ontftaat 'er, benevens eene verzwearing, ook eene hevige pyn, *ald.* 289. *aann.*

Zilverftreep, zo wordt een *Paerlemoer-Vlinder*, van de grootfte foort, by LINNÆUS genoemd, IV. 135. *aann.* *Zoet water polypen*, historie van dezelve, III. 369. enz. Lyft, hoe veel Polypen en andere Water-infecten RÜSEL eigenlyk in deze historie van de Polypen der zoete wateren befchreeven hebbe, *ald.* 385.

Zonderlinge Eenboorn-rups, zie *Eenboorn-rups*, (de *zonderlinge*.

Zwaluwen, van dezen beweerd men, dat ze, wanneer ze by ons verdwynen, niet wegrekken, maar zich in holle boomten in holen, en gaten van dyken, of rotten, ja zelfs in 't water verbergen. Het voornaamfte bewys voor dit gevoelen beftaat daarin, dat men dikwyls in 't Riet ganfche klompen half doode Zwaluwen heeft gevonden. Doch, zo menigmaal als dit bewys gehoord en gelezen wordt, en de tyd gade geflagen, waarin men dezelve had gevonden, heeft men opgemerkt, dat het altoos of in de Lente, of in den Herft geweest is, en in zulke tyden kan men wel gelooven, dat men 'er eenige heeft gevonden, maar hieruit volgt geenzins, dat de *Zwaluwen* zich den ganfchen winter door in diergelyke plaatzen onthouden. Wat het verblyf der *Zwaluwen* in 't water betreft, dit denkbeeld heeft de Heer FRISCH te *Berlin* door proeven wederlegd, II. 417. Zommigen naamlyk houden fttaande, dat de *Zwaluwen* zich in het water, onder op den grond, onthouden, en echter den winter door in 't leeven blyven. Maar dit is geheel onmogelyk. Want, daar de watervogels zo veel moeite moeten doen, om onder water te komen, en 't hun onmogelyk zy, lang onder het water te blyven; hoe kunnen dan de *Zwaluwen* haare fchuilplaats op den grond onder het water neemen, daar ze niet alleen geene pooten hebben, die tot zwemmen bekwaam zyn, maar ook tuffchen haare vederen, naar evenredigheid. zo wel lucht hebben, als andere vogels, *ald.* 418.

Zwaluwenftaart-vlinder, zo wordt de *Vlinder*, uit de eenzaam, fchoone, groen

groet geelachtige *Venkelrups* voortkomende, genoemd, om dat de vleugels nu met langer, dan met korter, uitsteekende punten voorzien zyn, l. 74. en 81.

Zwartachtige, gezellige Doornrups, zie *Gezellige zwartachtige Doornrups*.

Zwarte Beer, dezen naam draagt by LINNÆUS de ongemeen schoone, koolzwarte *Vlinder*, met witte vlakken en oranje-geele zwartige vlakke ondervleugelen, IV. 155. aanm.

Zwarte, bruin gestreepte en gekoornde Doornrups, zie *Lenzame bruine Doornrups*.

Zwartkoppige, (de,) vaal-bruine Rups, met den geel gevulden *bals*, aazende op de *Maluwe* of *Winterroos*, berevens hare verandering tot in een *Dagvlinder* der tweede *Classe*, I. 113. enz. Haare lengte belooft niet boven $1\frac{1}{4}$ duim. Haar *hoofd* en *bals* zyn dof zwart, en de laatste is daarby met 3 à 4 schoone, hoog-geele vlakken bezet, zo dat men gevoegelyk kan zeggen, dat deze *Rups* met een halsband voorzien is. Het *Lyf* heeft doorgaans eene bleke rosachtig-grauwe of vaal-bruine grondverwe, en, benevens de inkervingen der gewoonlyke leden, nog meer tedere dwarsvouden, waarop veele verheve en met haitjes bezette punten staan. Over het midden van den *rug* loopt eene donkere linie, en op ieder zyde, in de lengte, een wat helderer streep, *ald.* 113. De 6 spitze *Voorpooten* zyn zwart, en de overige hebben dezelfde koleur als het lyf. De *Pop* heeft in 't begin eene blinkende zwart-bruine koleur, maar naa verloop van eenige dagen verandert zy geheel en al in eene dof-blaauwe. Haar *lyf* is niet zeer dik; het *voorlyf* is verheven rond, en de *rug* van 't achterlyf is wat ingedrukt en als uitgehold. Aan den *Kop*

vertoonen 2 glinsterende zwart-bruine vlakjes de plaats der oogen. Aan het uiterste achtereinde zit een klein *staartpunt*. Na 11 dagen komt 'er de *Vlinder* uit voort, *ald.* 114. De grondverwe der bovenzide is by de meeste olyf-koleurig. De 4 *vleugels* zyn aan den buitenrand met donkere zwart-bruine punten getand, tusschen welke eene heldere vulling is. Deze punten zyn aan de voorste vleugels niet zo lang, als aan de achterste, waarin men, behalven twee, na den buitenrand schuivende, dwarsreien donkere vlakken, niets byzonders bespeurt, dan dat de iets helderer aderen der vleugelen tusschen deze vlakken doorloopen, en daar door verbinden, dat die vlakken geen volkomen donkeren streep uitmaaken. In de *voorvleugels* ziet men insgelyks 2 zulke reien donkere vlakken, daar de aderen tusschen loopen, en dezelve van elkander afzonderen. De ruimte tusschen deze 2 reien heeft eene soort van koper-verwigen glans, en de achterste rand is met een diergelyken streep overtoogen. By gemelde tusschenruimte, ziet men, benedenwaarts, na den buitenrand toe, eenige witte vlakken, van ongelijke grootte, en daar tegen over nog een paar kleiner, *ald.* 115. Het *Hoofd* en *Voorlyf* zyn aan deze soort breeder, dan aan de overige: waardoor ook de zwarte *Oogen* hier zo veel verder van elkander staan. De *Onderzyde* heeft een helderer grond, dan de bovenzide, en verscheide, ongeresgeld door elkander staande, bruine vlakken. Aan den buitenrand ziet men, insgelyks, tandswyze punten, en het *lyf* is, benevens de 6 *Pooten*, hier lichter van koleur, dan van boven, *ald.*

116.

Zy-worm, zie *Moerbeziën-rups*.

Zywormen, (De,) zegt GEOFFROY, zyn den *Grieken* en *Romeinen* een langen tyd onbekend geweest; ook hebben de *Franschen* ze niet dan zeer laat leeren kennen; en derzelver weefzel of spinzel tot de Manufactuuren gebruikt. MEZARAY eigent de uirvinding daarvan toe aan de *Oosterfche* Volken, III. 34. *aanm.* en inzonderheid aan de *Persianen*. Deze zegt, dat de *Romeinen* dezelve veracht hebben; en dat de *Zywormen* eerst ten tyde van JUSTINIAAN, na klein *Azien* in *Griekenland* gekomen zyn: alsmede hoe het, onder de Regeering van eenen ROGERUS VAN SICILIE, omtrent den jaare 1130, (anderen zeggen 1148.) gebeurd is, dat men de *Zywormen* op dit eiland en in *Calabrie* gezien heeft, welke *Zywormen* een gedeelte waren van het broedzel, dat deze Koning zo van *Athene* en *Corinthen*, als van *Theben* gebragt hadt. Eindelyk voegt 'er die Historiefchryver nog by, dat de inwoonders van *Italie* en *Spanje* het opkweeken dier Wormen, benevens het spinnen en bereiden der Zyde geleerd zouden hebben, van die van *Sivilie* en *Calabrie*. En dat daarop de *Franschen*, uit hoofde van hunne nabuurschap, op de gedagten vielen, om hen na te volgen. JOHN JACK-

SON zegt in zyne *Chronologifche ouaerden*, dat *Luy-Su*, Gemalin van den beroemden *Chineefchen* Keizer, HOANG-TI, den *Chineezzen* geleerd zou hebben, de *Zywormen* op te kweeken, de zyde af te winden, dezelve te weeven, te verwen, en 'er kleederen van te maaken, *ald.* 35. *aanm.* CAJUS PLINIUS SECUNDUS heeft, ten tyde van VESPASIANUS, reeds geweeten, dat de Zyde, van eenen Worm, die in *Assyrie* te vinden was voortkwam. In *China* heeft men, behalve de bekende foort, nog eene andere grooter, in de bosschen leevende *wilde foort van Zywormen* ontdekt, die eene graauwe gebruikbaare Zyde spinnen. Eene dergelyke ontdekking zou 'er ook, in *Noord America*, en wel in *Pensylvanien* geschied zyn. Doch de *Zywormen* zullen mogelyk, in geen gewest der waereld, zo menigvuldig gevonden worden, als in *Cochin China*, alwaar, volgens het getuigenis van PATER CHRISTOPHORUS BOR, die 'er in 't jaar 1620 geweest is, gansche velden met Moerbezien-boomen gevonden worden, welker bladeren krielen van *Zywormen*, die hun Spinzel in de open lucht maaken, *ald.* 38. *aanm.*

EINDE VAN HET VIERDE DEEL,

Taf: vert. 285. Orig. 384

KLEEMANNI VERVOLG

1925

+ TAB 1-XXVI

TITELBL. SAUNAS

MEN DE TVÅ SISTA

SIDURNA ÄR MKT

OVANLIGA !

V E R V O L G
O P D E
N A T U U R L Y K E
H I S T O R I E
D E R
I N S E C T E N
V A N
AUGUST JOHAN RÖSEL.

Beschryving van twee zeldzaame INDIAANSCH E VLINDERS.

§. 1.



y den aanvang van dit myn Vervolg op de Natuurlyke Historie der Insecten, zullen zich mogelyk eenige myner geachte Leezeren verwonderen; en allerlei gedachten maaken, daarover dat zy op beide deeze Plaatē *Indiaansche* Vlinders zien. Waarom, dunkt my, zullen zy vraagen, moet men met de Uitlandsche Insecten een begin maaken? zyn 'er dan geene Inlandsche meer? is derzelver menigte reeds tot zo verre uitgeput, dat men tot een ander Werelddeel toevlugt moet neemen? wie zal ons in zulke duistere omstandigheden verzekeren, dat zy naar waarheid voorgesteld zyn; en dat men derzelver Afbeeldsel, niet veel eer aan de kunst van 't Pensseel, dan aan de Natuur zelve

A

te

te danken hebbe. Deeze en dergelyke vraagen kunnen my, door myne geachte Leezers, by de eerste beschouwing van deeze en de volgende Plaatte te gemoet geworpen worden. Het is des noodzaaklyk, my terstond te schikken, om 'er een gegrond antwoord op te geeven, en de reden aantetoonen, waarom ik deeze *Indiaansche* Vlinders tot de Voorwerpen myner eerste Beschryvinge en Afbeeldinge verkooren heb.

§. 2.

Drie redenen, zullen, hoope ik, voldoende zyn, om dit myn gedrag eenigzins te kunnen verontschuldigen en rechtvaardigen. Eerstelyk, ik weet, dat hier door wezenlyk dienst gedaan wordt, aan verscheidene Liefhebberen van Insecten, welken zodanige zeldzaame Schepselen, als kostbaarheden, in hunne kabinetten bewaaren; want zy kunnen, door eene vergelyking, van hunne Origineelen, tegen myne Afbeeldingen, ontdekken, of zy dezelve reeds bezitten, dan nog ontbeeren; en in het eerste geval oordeelen, of myne Tekeningen, met de Natuur zelve overeenkomen. Ten tweeden, 't is bekend dat de Uitlandsche en vreemde Insecten, byzonderlyk de Vlinders, in tyd en wylen door den nu zaligen Heer RÖSEL uitgegeeven, eene algemeene goedkeuring weggedraagen hebben. Ten derden, is ook de gelegenheid, om Uitlandsche Insecten te erlangen, te zeldzaam en te veel waardig, om dezelve als zy voorkomt, niet greechtig te omhelzen. Het geluk zou my mogelyk op een anderen tyd niet weder zo gunstig geweest zyn, als 't my nu omtrent deeze Vlinders geweest is; vooral daar ik ze zelf niet in eigendom bezit, maar derzelver gebruik te danken heb, aan de goedhartige mededeeling van eene weleer my zeer toegenegen Begunstigster, naamelyk de nu zalige Vrouw, FREDERICA MARGARETHA SCHELER te Coburg*; en ik deezen schat, derhalven, niet lange kan behouden, maar verplicht ben dien, aan de waardige Erfgenaamen der gemelde groote Liefhebster van Insecten, ten behooryken tyde te rug te zenden.

§. 3.

Elk zal, hoop ik, deeze beweegredenen laten gelden, en my derhalven niet houden voor iemand, die tegen de algemeene Historie der Insecten opstaat; noch dit myn Vervolg van wanorde beschuldigen, om dat ik aan deeze gevleugelde Vreemdelingen eene plaats, en wel de eerste plaats, in myne Verzameling geef. Intusschen zal ik evenwel zo vyandig niet zyn tegen onze bontgeschakeerde *Europeaanen*, dat ik hen den voorrang boven de Uitlandschen zoude ontzeggen, en hen

* Ik heb de mededeeling van dezen Vlinders eigenlyk te danken, aan de ongemeene vriendelykheid van den nog in den Haag leevenden, voortreffelyken, Geleerden en Wydberoemden Heer C. F. Meuschen; welke zich, door zyne groote verdiensten, kennis en onvermoeide vlyt, om de Natuurleer uittebreiden, by alle Liefhebberen dezer wetenschap, alle billyke hoogachting verworven, en dus zyn naam onsterfelyk gemaakt heeft. De gemelde Geleerde Heer heeft de beschreevene Vlinders, aan zyne Zuster, Mevrouw Scheler, overgezonden.

hen, op zyn' tyd, ook geen plaats in myne Insecten-beschryvinge geeven. Neen; zy verdienen dezelve in allen opzichte; want zy hebben, schoon kleiner zynde, en het oog niet zo zeer, als de Buitenlandsche Vlinders, inneemende, echter ook hunne schoonheden. Nimmer zal ik hen der vergeetelheid overgeeven, maar vlytig onderzoeken, afbeelden, en dezelve, van hunnen Oorsprong, Wasdom en Verandering, grondig en genoegzaam onderricht zynde, te voorschyn doen treden*.

§. 4.

Dit voorafgezegd hebbende, ga ik tot de beschryving der op de eerste Plaat afgebeelde Vlinders over; verzoekende den toegenegen Leezer my te vergunnen, van ook de Koleuren, Vlekken en Streepen, waar mede deze schoone Vlinders pronken, inaanmerkinge te mogen neemen. Ik houd zulks niet voor geheel overboodig: eensdeels, om dat, uit derzelver menigvuldige veranderingen, orde en onregelmatigheid, de wonderbaare en wyze inrichting des Scheppers zo wel in het kleene als in het groote doorstraalt; en anderdeels om dat ook uit die Beschryving geoordeeld kan wordes, over de echtheid en eenstemmigheid van het afgebeelde, met het Origineel zelve. Wegens den oorsprong deezer Vlinders, benevens die van hunne Rupsen en Poppen, zal ik, door gebrek van genoegzaam bericht en ondervinding, evenwel weinig of niets dan gissingen kunnen voorstellen; want, ter voldoeninge van deeze nieuwsgierigheid eene gevaarlyke reis naar beide de Indiën te doen, zou der mocie niet waardig zyn, en door niemand geprezen worden. Ik wil deezen roem liever aan de onvermoeide Mevrouw GRAF of MERIAN over laten, en 'er slegts zo veel van te berde brengen, als ik 'er met zekerheid van zeggen kan.

A 2

De

* By de drie in §. 2. gemelde redenen heb ik nog als eene vierde te voegen, dat ik ook daarom op de X eerste Tab. van dit myn Vervolg, op *Röfels* Natuurlyke Historie der Insecten, de afbeelding der Uitlandsche Vlinders, medegedeeld hebbe; dewyl men, uit dergelyke buitenlandsche Vlinders, de welgeschiktheid van *Röfels* natuurlyke Rangschikking duidelyk kan afneemen: vermids hier uit blykt dat men dezelve, naar zyne voorgestelde Kentekenen, zo wel als de Europeischen, onder hunne, en dezelfde vastbepaalde Classe brengen kan. Op de XI en XII Tab. stel ik nog eene groote Amerikaansche Spinne voor; maar verder heb ik totaan de XLIV. Tab. (want tot zo ver heb ik dit Vervolg uitgegeven,) alleen Europeische Insecten, die meendeels in Rupsen en Vlinders bestaan, met derzelver veranderingen, benevens hunne vergroote Eieren, en andere merkwaardigheden afgebeeld. Myn arbeid in dit alles heeft zo veel goedkeuring weggedraagen, dat ik niet alleen eene nieuwe uitgave hebbe moeten vervaardigen, maar my teflessen verplicht vinde, myne taak voortzetten. Ook beloove ik zulks, onder Gods hulp, te zullen doen; op dat langs dien weg, byzonder mede door veelvuldige Mikroskopische vergrootte afbeeldingen, alle de merkwaardigste en zeldzaamste deelen der Insecten recht bekend mogen worden; ten einde de achtingswaardige Natuuronderzoekers te opmerkzamer te maaken op de grootheid en almacht van God, in zyne werken, ook in het kleene zichtbaar. In het een en ander zal ik alles aanwenden wat van myne zyde mogelyk is, om derzulker goedkeuring te verdienen. Wyders sta het my vry te melden, dat zy, die het Werk van *Röfel* bezitten, dit Vervolg niet wel ontbeeren kunnen; want ik hebbe my dikwyls, op verscheide plaatsen, in het zelve, hier op beroepen, als op een daar toe behoorend Werk, dat nadere opheldering van verscheidene byzonderheden zou verleen.

*De hoogkaneelbruine, bruingerande en met kleene witte Vlekken
versierde WESTINDISCHE DAGVLINDER der eerste
Classe.*

§. 5.

TAB. I. Deeze kan, dunkt my, voegelyk dus genoemd worden; schoon de bovenge-
Fig. I. noemde Liefhebber hem, in haare my toegezonden Aantekeningen, eenen Kaneelbruinen, met witte Vlakken getekenden Vlinder uit de Westindiën noemt*.

§. 6.

Deeze van grootte middelmaatige Vlinder, welke myns oordeels wel onder de fraaie soorten geteld mag worden, heeft, op zyne vier Vleugelen, een schoon hoog kaneelbruin ten grondverwe. Ter betere onderscheidinge, zullen wy dezelven met uitgespreide Vlerken beschouwen; en met de beide bovenste voorsten een aanvang maaken. Deezen vindt men op hunne bovenste zyde, aan den voorsten en buitensten rand, met een breed en schaduwachtigbruin boordzel omzoomd, 't welk van vooren tegen het bovenste des Vleugels door den kaneelbruinen grond verdeeld is, en zich in de grondverwe verliest. In dit bruine boordzel, zo wel als in den kaneelbruinen grond, staan in iederen Vleugel zeven groote en vyf-en-twintig iets kleinere dof witte ongelijke vlekken, die zich niet wel tot aan het midden des Vleugels uittrekken.

§. 7.

De achterste of onderste Vleugelen hebben mede eene hoog kaneelbruine grondverw, met dat onderscheid, dat dezelve iets helderer is, dan die op de bovenste Vleugelen. Even zo zyn ze ook met een schaduwachtig bruinen boord omzoomd, in welken, op ieder Vleugel, dertien zeer kleene witte punten of vlekken staan. Vervolgens ziet men, op den helder kaneel-bruinen grond, de groote witte punten, welken zich op de onderste zyde van deeze Vleugelen bevinden, als uitgewischte dof-oranjegeele vlekken, in eene half ronde rei, dwars door de Vlerk heen loopende, doorschynen.

§. 8. De

* Linn. *Syst. Nat. edit. XII. p. 767. sp. 119. Pap. dan.* noemt deezen Vlinder, *Chrysippus*, den *Kaneelvleugel*. Men zegt dat hy ook in Egypten gevonden wordt; doch de Missionaris *Schultz*, heeft hem in Dalmatien gevangen. 'Er zyn nog meer soortgelyke Uitlandsche Dagvlinders, die veel gelykheid met elkander hebben, en welken ook tot de eerste Classe der Dagvogels behooren; doch eene naauwkeurige beschouwing doet zien, dat hier niet slechts een *varieteit* plaats heeft, maar dat ze daadlyk eene byzondere soort zyn.

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.



§. 3.

De Rug van deezen Vlinder is donker kastanjenbruin, en vertoont overlangs TAB. I. een smallen witten streep; tegen ieder Voorvleugel aan, heeft hy eene middelmaatige bruinroode Vlek, in wier midden zich een kleen wit puntje vertoont. Indien deeze vlekken grooter en niet rond waren, zou ik dezelve met de schouderbladen van een doodgeraamte vergelyken; aangezien zy derzelver plaats en werking schynen te vervullen: echter kunnen zy ook tot een ander einde dienen, of wel slechts tot sieraad verstrekken. De Kop en beide de Oogen zyn donkerbruinrood, met verscheidene kleine witte punten voorzien: de Pooten en Voelhoornen zyn zwart; doch het Lyf, heeft eene geelachtige kaneelbruine verw.

§. 9.

Vermits deeze Vlinder op de onderste zyde byna juist zodanig is, als op de voorbeschreeven bovenste zyde; met dit onderscheid, dat de grondverw niet zo schoon is, en dat men de boven aangehaalde doorschynende Vlekken, op de achterste Ondervleugelen, in derzelver waare koleur, naamelyk wit, de kleenen echter verdubbeld, en het Lyf wit besprenkeld ziet; zo oordeelde ik het overtoellig gemelde onderzyde afzonderlyk te beschryven.

§. 10.

De gestalte van deezen Vlinder geeft my te kennen, dat hy, als zynde een Dagvogel, zittende, zyne vier Vleugelen naar de hoogte richt. En schoon ik van zynen oorsprong, of afkomst, geene toereikende kennis hebbe, durf ik echter uit deeze kentekenen, welken hy met de Dagvlinders van de eerste Classe gemeen heeft, beweeran, dat hy voortkomt uit het Ei van eene Doornrupse, en Grynsgelykende Pop: van het sap der Bloemen leeft; met zyns gelyken paart; en, eindelyk, als alle anderen Insecten sterft.

De zwartbruine geelgevlakte en met twee Oogspiegels versierde
OOST-INDISCHE DAGVLINDER der tweede Classe.

§. 11.

Deeze schoone en groote Vlinder vertoont zich in de 2de Fig. met uitgespreide TAB. I. Vleugelen, welken eenpaarig van eene zeer donkere coffybruine koleur, die Fig. 2. meer naar het zwarte dan het bruine helt, zyn; reden, waarom hy in de meer- en 3. genoemde aantekeningen, een *Chineesche Vlinder**, met geelzwarte, en eenig-

A 3

zins

* Volgens *Linn. Syst. Nat. edit. XII. p. 753. sp. 46. Pap. Eg.* zoude het de *Demoleus*, de *Bon-*

TAB. I. zins roode Vlekken, genoemd wordt. Ik sta desaangaande zeer in bedenkinge, om dezen Vlinder door die benaaming aan te duiden; vermits het niet uitmaakt is, of dezelve zich alleenlyk in *China*, dan ook in andere *Oostindische* gewesten onthoudt.

§. 12.

In ieder voorsten of bovensten Vleugel vertoonen zich twee-en-twintig groote en kleene helder zwavelgeele vlekken; die zich nu in eene hoekige, dan in eene lange en spitstoelopende, en ook weder in eene breede en in twee deelen afgescheiden gedaante vertoonen; en zich van den buitenrand af tot aan het midden der Vleugelen uitstrekken. Tusschen de twee groote hoofdaderen, en by de inleding der Vleugelen, zyn, overlangs, eenige reien zeer kleine heldergeele punten. Het gewricht van den boven- en onder-vleugel is hairig, en met een geel stof bestrooid. Ook vertoonen zich aan de buitenranden van ieder Vleugel, acht zeer snalle kleine doffe of ledergeele Vlekken; welken veroorzaaken, dat de zwartbruine grond zich uitgeschulpt vertoont. De achter- of onder-vleugelen hebben, gelyk de eerstbeschreevenen, eenen donker coffy-bruinen grond, op denwelken zich, in ieder Vleugel, elf helder zwavelgeele hoofdplekken vertoonen; van welken de vyf grootsten door aderen afgescheiden worden; en een zwarten oogspiegel sluiten; die, met eene maans- of sikkelswyze helderblauwe plek pronkt, en aan den voorsten rand van den achtervleugel geplaatst is. De overige kleinere Vlekken staan naar den buitenrand des Vleugels toe, in twee deelen verdeeld. De Rand zelf is donker coffybruin, zcsvoudig uitgeschulpt, en met eene heldergeele tusschenruimte gevuld. Aan den achtersten of buitensten Vleugelhoek, staat in ieder Vlerk eene langwerpige groote bruinroode spitstoelopende, en met blaauw en geel omtoogen Vlek; welken deezen Vleugel mede eene zeer sierlyke gedaante geeven. De Kop, Rug en het Lyf van deezen Vlinder is donker coffybruin, en, van vooren en tusschen de Oogen, met twee snalle geele streepen omvat.

§. 13.

De onderste en schoonste zyde des Vleugels zien wy in de 3^{de} Fig. waarin wy deezen Vlinder, met om hoog opgeklapte Vleugelen beschouwen. De bo-

Bonte Chinezer, zyn. Ik ben bezitter van eenen uit Africa, van de Kaap de goede Hoop, welke denzelven zeer gelyk is. By deezen zyn de geele Vlekken, in de achtervleugelen, niet alleen iets kleiner, maar ook zyn de vyf grootsten, door de Vleugeladeren genoegzaam niet van elkanderen gescheiden, maar zo wel te saamen verbonden, dat zy eene enkele geele Vlek uitmaaken. Deeze Vlek, welke zich van den voorsten rand des achtervleugels, tot aan de bruinroode vlekken aan den binnensten rand, by den achtersten Vleugelhoek, uitstrekt, is met een helder-bruinen zwarten en blaauwen Oogspiegel versierd. Daare: tegen is de op den bovensten rand staande Oogspiegel, in de by ons afgebeelde 2 Fig. op den bovensten Vleugel te zien, alleen geheel zwart, met eene sikkelvormige helderblauwe Vlek om zich. Onze tegenwoordige Vlinder zou ook op de Antillische Eilanden aan te treffen zyn. Die, welken ik bezitte, is een Wyfje; want ik vond in het Achterlyf nog geele Eieren, welke eene langronde gedaante hadden.

bovenste of voorste Vleugel vertoont ons een schaduwbruinen grond, benevens TAB. I. alle de Vlekken, welken wy op de bovenzyde in aanmerkinge genomen hebben. Zy staan in dezelfde orde, uitgenomen dat zy zich hier helderer, iets grooter en veranderd vertoonen; ook vermeerderd met eene enkele kleene hartswyze Vlek, die zich boven over het midden des Vleugels, onder eene groote heldergeele Vlek, in den bruinen grond opdoet. Vervolgens, meer opwaarts, staan insgelyks, in den bruinen grond, eene iets grooter, en drie kleene, meest half-ronde, en drievoudig spitstoeloopende okergeele Stofvlekken, welken men op de bovenste zyde des Vleugels niet bemerkt. De buitenste bruine rand is achttmaal uitgeschulpt, en de tusschenruimte, daar van, met geel aangevuld. Het gewricht des Vleugels is mede geel, en met vier lange smalle witachtige zwavelgeele streepen versierd; welke streepen wy, op de bovenzyde, als eene lange rei van kleene geele punten beschouwd hebben. De onderste zyde van den achtersten of onderste Vleugel, is de schoonste, en pronkt met zeer veele dof-witte en oranjegeele Vlekken. De eerste staan by het gewricht des Vleugels, en worden door den donkerbruinen grond overdwars doorsneden; de anderen, even als die, welken wy op de bovenste zyde des Vleugels reeds beschouwd hebben, vinden wy voor en achter het midden van denzelfden: zy omvatten een grooten oranjegeelen met helderblauw omtoogen oogspiegel, op eenen zwarten grond; en zyn, naar den buitensten rand des Vleugels, met een dof-geelen rand omzoomd. Daarentegen, ziet men de zes oranjegeele, en helderblauw gevatte Vlekken, niet op de bovenste zyde van den Vleugel, maar alleenlyk op de onderste, alwaar zy eenen zwarten grond insluiten, en het midden des Vleugels vullen. De zesvoudige uitgeschulpte buitenrand is ook hier bruin; doch de tusschenruimte dof en heldergeel. De langwerpige bruinroode en in blaauwe rande gevatte Vlekken, die zich mede op de bovenste zyde, aan het buitenste einde van den Vleugel, vertoonen, zyn ook hier te zien; doch iets korter, niet spitstoeloopende, en schooner van verwe, naamelyk, donker-oranjegeel, hebbende eene fikkelswyze helderblauwe Vlek op eenen zwarten grond voor zich, doch achter zich slechts eene dofgeele toegespitste. Voor 't overige zyn, zo wel de voorste als achterste Vleugelen, met sterke aderen voorzien; waar uit ik besluit, dat deeze Vlinder eene zeer snelle en hooge vlugt moet hebben.

§. 14.

Het Voor- en Achterlyf is hairig, en benevens de Baardspitsen bleek zwavelgeel. Op beide de zyden van het Lyf loopen twee smalle bruine streepen nederwaarts. De zes Pooten zyn boven geel en onder bruin. De Voelhoornen en Zuiger zien zwart, doch de Oogen zyn violetbruin.

§. 15.

Of deeze Vlinder tot de eerste dan tot de tweede Classe der Dagvogelen behoort, is

TAB. I. is met geen zekerheid te bepalen; vermits de Pooten in het Origineel vergaan, en 'er alleenlyk de tekens en schenkels van te zien waren. Echter houde ik voor het waarfchynlykft, dat hy een Vlinder van de tweede Claffe zy; aangezien ik niets van de Voelpooten kan ontdekken; en de gefteltenis der achtervleugelen zulks ook fchynt aantetoonen; want met dezelve kan hy zyn achterlyf niet geheel bedekken; dat evenwel had moeten kunnen gefchieden, indien hy een Dagvogel van de eerfte Claffe ware: des men wel denken moge, dat hy uit eene Rups en Pop van de tweede Claffe hervoort gekomen zal zyn. Dat vervolgens deeze Vlinder op dezelfde wyze als andere paart, en zyne Eieren, (die zeer wel kogelrond en geel kunnen zyn,) op zulk eene plaats legt, daar de aanftaande Rupfen daadelyk hun Voedzel vinden, is aan geen twyffel onderworpen; vermits wy zodanig eene natuurlyke neiging en zorgvuldigheid, gemeenlyk, by onze Inlandsche Vlinders, gewaar worden.



Befchryving van een zeldzaamen Oost- en dergelyken
WESTINDISCHEN VLINDER.

§. 1.

TAB. II. **E**er ik den Vlinder, op *Tab. II. Fig. 1.* voorgesteld, befchryve, moet ik mynen Leezer berichten, dat het dezelfde Vlinder is, welken de beroemde Mejjuffrouw MERIAN, in haar groot en uitvoerig Werk, over de Surinaamsche Insecten, op de *XXIX Tab.* vliegende en zittende afgebeeld en befchreeven heeft. Een ieder, die dat Werk bezit, zal, wanneer hy deeze afbeelding met de tegenwoordige vergelykt, een merkelyk onderscheid tuffchen dezelve befpeuren. Dit is bovenal zichtbaar in de grondverwe en vlekken; de eerfte fchynt in de afbeelding van Mejjuffrouw MERIAN zwart; en de laaften zyn aldaar veel grooter en ongefchikter, dan ze zich in myne afbeelding vertoonen. Gevolglyk zou men vraagen kunnen, wie van ons beiden, in de afbeelding van dien prachtigen Vlinder, de Natuur het naaste gevolgd heeft; en of Mejjuffrouw MERIAN, die deezen Vogel in zyn Vaderland, Surinamen, gezien en afgefcheut heeft, niet beter geflaagd zy, dan ik? Ik antwoorde, dat myne afbeelding, zo wel als die van Mejjuffrouw MERIAN, goed uitgevallen zou kunnen zyn; fchoon ze van elkander verfchillen; gemerkt ik in die beiden, welken my ter aftekening toevertrouwd waren, deels in de grootte, en deels in de grondvlekken, een merkelyk onderscheid ontwaar geworden ben. De grondverwe der beide Vlinders komt voorts vry wel met elkander overeen; alzo dezelve niet zwart, maar donker violet-bruin was; gelyk uit de volgende afbeelding en befchryving blyken zal.



C. F. C. Kleemann fecit et exc.

*De donker-violet-bruine, en groen gestreepte Westindische
ZWALUWENSTAART; zynde een Dagvlinder der
tweede Classe*.*

§. 2.

Deeze schoone Vlinder wordt in de beschryving, die my met deszelfs toezien- TAB. II.
ding medegedeeld is, genaamd, een zwarte met groene lichtblauwe streepen ver-
fierde Pagie uit Surinamen: doch ik geef aan myne hierboven gestelde beschry-
ving de voorkeur. Ze komt beter met zyne gestalte, verwe en Vaderland over-
een; want hy wordt niet alleen in Surinamen, maar ook in andere Gewesten van
Amerika gevonden; daarbenevens heeft hy zeer veel overeenkomst met den Vlin-
der, dien de Heer RÖSEL, in het I Deel op de II Tab. onder de tweede Classe
der Dagvogels, in zyne Natuurlyke Historie der Insecten, beschreeven, en met
den naam van *Zwaluwenstaart* benoemd heeft. Ze zyn zo in gestalte, als ten
aanzien der streepen, uitgenomen in de koleur, zeer gelyk aan elkanderen.

§. 3.

Myne eenmaal aangenomen orde van beschryving volgende, zal ik met de be-
schouwing van de bovenvleugelen een aanvang maaken. Deeze vertoonen zich in
de eerste Fig. uitgespreid, en zyn in den grond donker violet-bruin. Ieder vleu- Fig. 1.
gel heeft, in zyn donkeren grond, negen hooggroene streepen, die allen dwars
over den vleugel heen loopen, en meerendeels in eene gelyke wyde van elkan-
deren afstaan. De breedste derzelven verdeelt zich, tegen den voorsten vleugel-
rand, in drie takken. Onder de genoemde negen streepen, zyn 'er twee, één
lange en één korte, welken boven den breeden en in drie takken verdeelden
hoofdstreep, tegen den voorsten vleugelrand, en den uitersten vleugelhoek, haak-
vormig krom staan.

§. 4.

De Achtervleugel, de prachtigste zynde, heeft een veel donkerer grond dan
de voorste, en pronkt met de volgende sieraaden. By de inleding des Vleugels
loopt een lange smalle blaauwgroene streep, die, naar den binnenrand, tot aan
het midden des vleugels doorloopt; zich aldaar omkromt, en vervolgens tot aan
den binnenrand des Bovenvleugels te rug keert; vertoonende dus de gedaante van
eene lange groote V. Achter deezen streep ziet men eene korte smalle zeegroene
vlek; welke, by de toevouwing der vleugelen, eene boogvormige gedaante
heeft. Op deeze volgt eene zeer schoone groene geele en blaauw-schitterende

B

bree-

* In Linn. Syst. Nat. edit. XII. p. 750, sp. 31. Pap. Eg. heeft hy den naam van *Leilus*, of
de *Surinaamsche Pagie*; hy wordt ook dikwyls de Amerikaanse Groenstreepige genaamd.

TAB. II. breedte en in zes deelen afgedeelde vlek; welke aan den binnensten vleugelrand begint, eenigzins geboogen dwars door den vleugel heen loopt, en aan deszelfs buitensten voorsten rand eindigt. Verder ziet men, by het einde en aan den hoek des vleugels, eene eenigzins grootere, in viere verdeelde helderblauw-groene vlek; die by den binnen-vleugelrand aanvangt, dwars in het midden staat, en tegen den buitenrand uitloopt. Deeze buitenrand is aan ieder zyde des vleugels driewerf uitgeschulpt; met eene lange witte vleugelspits, of Zwaluwentstaart, en een wit omboordfel versierd. In ieder uitgeschulpt deel staat eene heldergroene vlek, waar van de eerste half rond, de tweede hoekig en de derde half rond en driehoekig is.

§. 5.

Het Lyf van deezen Vlinder heeft even dezelfde donkere grondverwe, als de vier vleugelen; en op dezelve staan drie schoone groene smalle streepen, die zich van den Kop, langs den Rug, tot aan het Achterlyf uitstrekken. De Oogen zyn violet-bruin; de Baardspitzen groen, en de Voelhoornen zwart: doch den laatsten heb ik deeze koleur gegeven, op het voetspoor van Mejuffrouw MERIAN, welke dezelve by haaren afgebeelden Vlinder aldus beschreeven heeft. De twee Vlinders, welken ik ter aftekening had, waren niet alleen van hunne Voelhoornen, maar ook van hunne Pooten beroofd, en over het geheel zeer slegt bewaard; zo dat ik werk hadde, om eene voldoende afbeelding van deezen schoonen en prachtigen Vlinder te kunnen maaken. Ik heb het niet noodig geoordeeld, hem aan de onderste zyde, met om hoog opgeklapte vleugelen, te beschryven; om dat de grondverwe, zo wel als de vlekken, de V gelykende streep in den Achtervleugel uitgezonderd, in alles gelyk zyn aan de bovenste zyde, zo als wy die beschreeven hebben.

§. 6.

Vermits ik gezegd hebbe, dat myne Vlinders geenzins in de beste orde waren, zo zou het kunnen gebeuren, dat eenige Liefhebbers aan de volmaaktheid myner afbeeldingen, zo wel als aan de juistheid der Classe waar onder ik hen plaatste, twyfelden. Maar dit wantrouwen kan ik ligtlyk uit den weg ruimen, door den Leezer te verzekeren, dat ik onlangs, na dat myne tekening gereed was, deezen Vlinder, in eene alhier zynde Verzameling, welbewaard gezien hebbe. Dezelve had mede de genoemde grondverwe, maar eenigzins andere streepen, waarin de mynen ook onderscheiden waren; en voorts bemerkte ik aan dezelve uitgespreide achtervleugelen, benevens drie paar pooten. Ondertusschen heb ik nog gade geslaagen, hoe Mejuffrouw MERIAN, welke het noch aan vlyt noch aan bekwaamheid ontbrak, deezen Vlinder, welken zy zelve met drie paar pooten voorstelt, uit eene groene Rups, met een hemelsblauwen hartvormigen Kop, en buitengemeene lange, als stevige yzerdraaden, of naar doornen gelykende Hairen, doet voortkomen; en vervolgens zegt, dat zich deeze Rups op boomen onthoudt, welker vruchten die van Suriname *Pompelmoes* heeten; en dat zy zich met

met derzelver bladeren geneert; als mede, dat deeze Vlinder, de Rups in eene TAB. II.
 Pop veranderd zynde, in zestien dagen daar uit te voorschyn zou komen. Maar
 elk die, benevens my, de naauwkeurig bepaalde orde der Vlinder-Claffen, door
 den Heer RÖSEL aanvangelijk vastgesteld, aangenomen, en regtmatig bevonden
 heeft, zal aan de gemelde Beschryving weinig geloof geeven; en gereedlyk be-
 grypen, dat onze beroemde Kunstkenster gedwaald, en de beschreeven Rups
 daarom alleen voor het Insect van deezen Vlinder gehouden heeft, om dat die
 Rups met gelyke groene streepen van dezelfde koleur versierd is. Veelligt heeft
 zy dezelve ook, in gezelschap met deezen Vlinder, op dezelfde vrucht aangetrof-
 fen; en, haare verandering onmogelyk kunnende naspooren, zal zy door een
 verkeerd bericht misleid zyn geworden.

§. 7.

Indien men haar wilde verontschuldigen, met te zeggen, dat, zo wel de verre
 afstand, als de hitte van dat Werelddeel, eenig onderscheid, deels in de verande-
 ring, deels in de kentekenen der Insecten, konde te weeg brengen; en dat ge-
 volglyk, met betrekking tot deeze Merktekenen van onze Inlandschen, uit eene
 enkele, geen besluit te maaken zy; zo zoude nogthans deeze voor Mejuffrouw
 MERIAN zo voordeelich schynende gedachte, haar niet verontschuldigen; de-
 wyl men haar uit haare overige afbeeldingen zou kunnen wederleggen. Wanneer
 men alles naauwkeurig beschouwt, dan zal men aan ieder Rups en Pop, ja aan
 ieder Vlinder, de waare kentekens vinden, door welken wy, volgens de gron-
 den van RÖSEL*, in staat zyn om het onderscheid tusschen het een en ander Insect te
 bepaalen. Vermits zich nu, by de Uitlandsche, even zulke kentekens, als by onze
 Inlandsche Insecten opdoen, waarom zouden zy dan niet uit dezelfde soort, en in
 dezelfde Poppe, als onze Inlandsche veranderen kunnen? En de waarheid deezer
 stelling geeft ons Mejuffrouw MERIAN zelve, in haare overige afbeeldingen,
 ten volle te kennen. Maar dat eene Rups, die tot de Classe der Dagvlinders be-
 hoort, in een Nachtvlinder, of, omgekeerd, dat eene Rups van de Classe der

B 2

Nacht-

* Hier mede wil ik niet zeggen, dat 'er in het Ryk der Natuur, in weerwil der Classen-kente-
 ken van Rôfel, geene uitzondering zou kunnen plaats hebben. Zodanige uitzonderingen
 moeten, zo wel by alle andere schrandere uitgedagte Rangschikkingen, als by die van Rôfel,
 toegestaan worden. Wanneer echter de ervarenis bevestigde, dat deeze Vlinder, door Mejuf-
 frouw Merian afgebeeld, uit eene met lange stevige gedoornde hairen bezette Rups voort-
 kwam, zo zou de Vlinder daarom slegts onder eene Tusschensoort kunnen behooren; vermits
 hy, om de doorgelykende hairen der Rupse, volgens Rôfels eerste Classe der Dagvlinders,
 wel onder de eerste, maar, om zyne gevleugelde geitalte, tot de tweede Classe moeten gebragt
 worden.

Tot zodanig eene Tusschensoort behoort de door den Heer Rôfel beschreeven schoone *Ven-
 kel-Vlinder* of *Papilio Macbaon*, Linn. (Zie Rôfel I Deel I Tab. onder de tweede Classe der
 Dagvogels) De Rups van den *Macbaon* toch is, voor haare laatste vervelling, met korte
 doorntjes bezet; en zy verandert desnietteenstaande in een Dagvlinder van de tweede Classe.
 Voorts heeft de *Papilio Macbaon* met den tegenwoordigen Vlinder, de koleur alleen uitge-
 zonderd, veel overeenkomst

TAB. II. Nachtvinders in een Dagvlinder zou kunnen veranderen, (gelyk haar Ed. op de 6, 7, 20, 23 en veele andere Platen, die in pracht en schoonheid uitmunten, ons voorgesteld heeft,) is, myns bedunkens, even onmooglyk, als of men beweeren wilde, dat 'er, uit den Worm van een Maikever, een Goudkever zou kunnen voortkomen. Om haar Ed. nogthans recht te doen, moet men in acht neemen, dat de Rangschikking der Vlinders ten haaren tyde nog op geen vasten voet stond; en dat het haar, doordien zy zich niet langer dan twee jaaren in Surinamen heeft opgehouden, niet wel mooglyk was, de verandering der haar voorkomende Insecten, op eene voldoende wyze, na te speuren. Wy zullen daarom, in plaats van eene verdere wederlegging, haar onzen verdienden dank, voor haare zo verre Reize, mitsgaders voor het door haar in 't licht gegeven fraaije Insectenwerk, toewyden; terwyl we echter zorge zullen draagen, om van de by ons vastgehouden Rösfeliche Rangschikking niet af te dwaalen.

§. 8.

Eindelyk moet ik hier nog aanmerken, dat de donker-violet-bruine grond overal met glimmende koperverwige aderen doorsneden is; 't welk zich, by het koleuren der afbeeldingen, zo sterk niet laat uitdrukken. Daarbenevens dient men te weeten, dat de groene vlakken en streepen gezamenlyk zo schoon, als die van onzen Goudkever, glimmen; en dat ze, als zy met den Vlinder gedraaid en van ter zyde beschouwd worden, eene andere, en wel eene hoog blaauwe koleur verkrygen. Vermoedelyk ontstaat die verandering der koleuren, op dezelfde wyze, en uit dezelfde oorzaak, als die van den zogenoemden *Changeant*, of *Weerfchyn-Vlinder*.*

§. 9.

Volgens de berichten van Mejuffrouw MERIAN, zou deeze Vlinder zeer hoog en snel vliegen; van waar men dit Insect, een Vlinder geworden zynde, niet wel onbeschadigd kan bekomen. Deeze snelheid zal, grootlyks, uit zyne digtgevederde en met sterke aderen voorziene Vleugelen ontstaan. Hy geneert zich met het sap der bloemen; paart met zyns gelyken, en sterft even als andere Insecten.

De

* Zie *Rösfel* III Deel bladz. 223-225.

*De schaduwachtig-bruine, op den Achtervleugel heldergeel
gevlekte, en met twee ronde vleugelspitfen versierde OOST**
INDISCHE DAGVLINDER, der tweede Classe*.

§. 10.

In de bovengemelde my toegezonden beschryving wordt deeze tamelyk groote TAB. II.
Vlinder een zwarte Pagie, met een geelgevlekten rand, uit China, genaamd;
dan 't komt my voor, dat myne beschryving beter aan deszelfs geheele gestalte
beantwoordt. — In de 2^{de} Fig. is hy met uitgespreide vleugelen afgebeeld; Fig. 2.
welken over 't geheel eene schaduwachtige bruine koleur vertoonen, en met
sterke aderen voorzien zyn. De Voorvleugel is geheel bruin, en heeft geene an-
dere vlekken, dan die zeven, welke den buitensten uitgeschulpten rand vullen
en eidoojer-geel van verwe zyn. Daarentegen ziet men, op het midden, in den
bruinen grond des Achtervleugels, zes groote heldergeele vlekken, in eene gely-
ke rei, dwars door den Vleugel heen loopen; waar van die geen, welke hier aan
den eenen rand des vleugels staat, eene stroogeele, de volgende eene okergeele
en de vier overigen eene helder zwavolgeele koleur hebben. Deeze zes vlekken
zyn langer dan breed, en hebben eene eenigzins hoekige gedaante; voor dezel-
ven staat, tegen den buitenrand des Voorvleugels, nog eene Maanvormige vlek
van dezelfde verwe. Eindelyk volgt na deeze zes groote vlekken, nog eene
kleene fikkelvormige, en eene iets grootere menie roode en halfgeele vlek; wel-
ke aan den binnenrand en den buitensten hoek des Vleugels te voorschyn komen;
hebbende de kleinste eene helderblauwe stofvlek, voor en nevens zich. Beide
de vleugelen zyn aan den buitenrand, als men de vleugelspitfen medetelt, zeven-
maal uitgeschulpt, en tusschen beide heldergeel ingezoomd. Het Voorlyf is met
veel hair bewassen; en benevens het Achterlyf sterk schaduwachtig-bruin.

§. 11.

In de 3^{de} Fig. is deeze Vlinder zittende en met hoog opgeklapte Vleugelen Fig. 3.
afgebeeld; waar van wy de Voorvleugels eerst zullen beschouwen. Wat derzelver
koleur betreft, deeze is hier wat helderer dan op de bovenste zyde; maar volkomen
bruin, en om den buitenrand uitgeschulpt; zynde de tusschenruimte met eene
stroogeele koleur opgesierd. Niet alleen de groote maazenvormige hoofdader,
maar ook alle de overigen zyn zeer kenbaar, en zelfs veel duidelyker dan op de
bovenste zyde.

§. 12.

De Achtervleugel is donkerer dan de Voorvleugel, en vertoont ons, behalven
B 3 de

* Linn. Syst. Nat. edit. XII. p. 746. sp. 8. Pap. Eg. noemt hem Pammon, den Kamerdien-
naar, de Asiatische Randvlek.

TAB. II. de reeds beschreevene heldergeele en vermillioen-roode vlekken, nog zes anderen, welke men op de bovenste zyde niet gewaar wordt. (Hier by kan ik niet onaangeroerd laten, dat de boven beschreeven zes heldergeele langer dan breed, en meestal hoekige vlekken, op deeze zyde, iets breeder en bleeker van koleur zyn.) De vier middelste vlekken zyn aan het eene einde, tegen den uitgeschulpten Vleugelrand, heldergraauw ingevat, en zomtyds, even als de anderen, van eene helderbleekgeele koleur. Alle deeze opgenoemde vlekken staan, achter en tusschen de hoofdaderen des Vleugels, welken zich hier zeer duidelyk vertoon- nen, en uit de groote hoofdader, welke by de inleding des Vleugels begint, en zich tot over de helft uitstrekt, hervoort komen. Boven aan den voorsten rand des Vleugels staan twee Maanvormige kleene dofgeele vlekken, van de eene hebben wy op de bovenste zyde reeds melding gemaakt. Vervolgens bespeurt men by den uitgeschulpten rand, en tusschen ieder ader, eerst eene kleene okergeele Maanvormige, voorts nog eene wat kleinere, van dezelfde gedaante, eidooijer-geele, en wyders eene spoelvormige vlek, op welke eene nog veel kleinere, en eindelyk nog eene halfgeboogen oranjegeele volgt. Onder de laatste groote vlek staan nog twee vlekken, die wat grooter zyn, dan de voorgenoemde kleene vlekken; de kleinste is eidooijer-geel, de grootste is menie-rood, en met een kleen bruin stipje in het midden versierd. Onder deeze vlekken ziet men nog eenige kleene bleekblauwe stofvlekken in den bruinen grond; hoedanigen zich ook op de bovenste zyde van den Vleugel vertoon. De ruimte tusschen den buitensten uitgeschulpten rand is hier, even als boven, bleekgeel omgezoomd. Het Voor- en Achterlyf is bruin; en heeft van achteren twee bleekgeele zystreepen. De drie paar Pooten zyn helderbruin; de Baardspitsen bleekgeel; de Voelhoor- nen bruinachtig, en van boven met zwarte kolfjes voorzien; daarentegen hebben de groote heldergeel geboorde Oogen, en de Zuiger eene violetbruine koleur.



*Beschryving van een Oost- en drie soortgelyke WEST-
INDISCHE VLINDERS.*

§. I.

TAB. III. **N**aauwlyks was ik ter volvoeringe van de beschryving der op de beide vol-
 en IV. gende Plaatn afgebeelde Vlinders gereed, toen my het uitgegeeven Werk van den Heer D. SULZER, *Systema der Insecten* genaamd, onder het oog kwam. Hetzelve doorbladerende, vond ik eene ontmoeting aangetekend, die te kennen geeft, dat het in onze dagen geenzins aan Menschen ontbreekt, die bezwaarlyk te voldoen zyn; en, uit allerlei vooroordeelen, van de beste Schriften en Afbeeldingen van deezen of geenen Natuuronderzoeker, de onrechtmatigste, ja, ik durf zeggen, de belachelykste denkbeelden vormen; zich niet schaamende een

cor-

Fig. 2.



Fig. 1.



Fig. 3.



oordeel te vellen, dat met de gezonde Reden, en een onpartydig Onderzoek, stry- TAB. III.
en IV.
dig is.

§. 2.

Het voorbeeld, 't welk de Heer SULZER te berde brengt, is aanmerkelyk; en ik acht het der moeite wel waardig, hetzelfde hier te plaatfen.

„Onlangs, „ (schryft de even genoemde Geleerde aan zynen Vriend, den Heer D. SCHINZ,) „zeide een Man van aanzien, toen ik hem het Syftema der In-
„fecten met de afbeeldingen verroonde: „myn Vriend, „(my tevens met een
„schimpd oog befchouwende,) „gy verricht wonderen, door uwe ledige uren
„op deeze wyze te befteeden! De kinderen, kunnen, in plaats van langs de ftraat
„te zwerven, diergelyke Boeken leezen. „(a.)

Een andere Spotter zeide, „dat de Vrouwen 'er Patroonen naar konden af-
„tekenen. „ — Zo verfchillend en ongerymd zyn dikwils de beoordeelingen
over de werken en de vlyt van verdienftelyke Mannen. De een houdt hun yver
voor een middel om onwillige Jongens van de ftraat te houden; en een ander be-
weert, dat de gefchilderde afbeeldfels van Vlinders bekwaame Modellen zyn,
naar welken de Vrouwen haare kleederen, met afbeeldingen van Infeften, in
plaats van Bloemen, kunnen opfieren.

§. 3.

Hoe flegt gemelde oordeelvellingen ook weezen mogen, ze zyn nogthans draa-
gelyker dan de bevooroordeelde meening van zulken, die, uit een haat tegen al-
les wat den naam van Infeften draagt, de pooging van die geenzen, welken zich
met de befchryving en het onderzoek dier Schepzelen bezig houden, onder de
nuttelooft bezigheden tellen; beweerende dat de zodanigen zich verhevener voor-
werpen moeftten verkiefzen, en geenzins het uifchot van Gods Schepzelen, dat
met voeten vertreedten wordt, tot het onderwerp hunner befchouwingen maaken.
Houdt deeze gedachte ftand, dan mogt men billyk alle Natuuronderzoekers raan-
den, zich liever toe te leggen, op de befchryving en afbeelding van Offen en
Ezels, of Kalveren; als Dieren, welken grooter en nuttiger zyn; die meer voor
het gezicht van zodanige Lieden komen, en hun beter bekend zyn, dan de In-
feften; dit zou hun beter aanftaan, dan dat men den tyd nog langer met het
onderzoek van verachtelyke Infeften verkwift. — De Pastoor LESZER, werd
eens van iemand gevraagd, „om welke reden hy dergelyke beuzelingen verza-
„melde?, „waar op die Leeraar verftandig antwoordde: — „Nadien het
„Gode behaagd heeft, dergelyke beuzelingen te fcheppen, zo acht ik, dat ze
„wel verdienen door verftandige Menfchen befchouwd te worden. „(b.)

§. 4. Maar

(a.) Zie D. Sulzer *Syft. der Infeften*, pag. XVII. en XVIII.

(b.) Zie J. H. Chemnitz, in zyne *Beytrage zur Testacothologie*, pag. LXI.

§. 4.

TAB. III. Maar het is niet noodig over dit onderwerp breeder uit te weiden. Het getal
 " IV. van de Liefhebbers der Insecten-kennis is toch sterker, dan dat van derzelver verachters; des zal ik my, dan eerst, met een antwoord, als dat van LESZER, behoeven te wapenen, wanneer my eene dergelyke vraag gedaan wordt, en men myne werkzaamheid mede onder het nuttelooze en tydverkwistende telt. Het is voor tegenwoordig genoeg dit slegts in het voorbygaan aangemerkt te hebben; op dat het niet schyne zoude, als hadde ik dat geene, 't welk ik verplicht was te zeggen, vergeeten; en my aan een mislag schuldig gemaakt, dien de Geleerde BUFFON in verscheiden Schryvers, en zelfs in den by alle Natuuronderzoekers hooggeachten ALDROVANDUS, berispt heeft. (a.)

§. 5.

De okergeele zwartbruin gevlekte, en met twee groote hoog-blaauwe weerschyn-vlekken versierde OOSTINDISCHE DAGVLINDER, van de eerste Classe.*

TAB. III. Ik geef aan dezen Vlinder die benaaming, naar zyne hoofdverwe en vlekken, met welke hy op de bovenste zyde zynen Vleugelen pronkt. De onderste zyde is met zodanig eene hoofdkleur niet voorzien, en kan gevolglyk met geene kentekenende benaaming uitgedrukt worden. Het reeds meermaals aangehaalde bericht noemt hem, *een geelen Vlinder, met eene zwarte Bandeering, en violet-blaauwe oogen*, uit de Oostindien. Maar het schynt my toe, dat deeze benaaming de hoedanigheid der kleuren niet volkomen uitdrukt.

§ 6.

Fig. I. In de 1ste Fig. van Tab. III. vertoont zich deeze Vlinder met uitgespreide Vleugelen, in eene vliegende gestalte. Ieder Voorvleugel is met eene zeer groote hoog-okergeele grondvlek voorzien; dezelve neemt by de inleding des Vleugels haar begin, en spreidt zich over deszelfs gantsche lengte uit. In 't midden van den Vleugel is de vlek het breedste; vervolgens kromt zy om, en wordt smaller; en, aan het einde van den buitensten vleugelrand, heeft zyeene hoekige gedaante. Deeze groote grondvlekken worden, in het midden, door de hoofdadereu des Vleugels doorsneden; en van rondsom aan alle zyden door eene zwartbruine vlek omringd; die by de inleding des Vleugels aanvangt, en aan den buitensten uit-

(a.) Zie *Algemeene Hist. der Natuur*, pag. XVIII.

* Linn. noemt hem in zyn *Syst. Nat. edit. XII. p. 770. sp. 135. Pap. Nimph, Oenone*, den *Kleinoog*, den *Brandvleugel*. Myne afbeelding is naar een Wyfje gemaakt.

uitgeschulpten rand eindigt; bleeker wordt; den gemelden rand een smal boord- TAB III.
 zel geeft; en aan den voorsten rand, mitsgaders aan den bovensten hoek des en IV.
 Vleugels, twee kleene ongelyke helder-okergeele grondvlekken in zich besluit.

§. 7.

De Achtervleugels van deezen Vlinder zyn de schoonste, en, even als de voorsten, met zeer hoog-okergeele grondvlekken versierd; welken hier echter niet den gantschen Vleugel, maar alleen deszelfs achterste helft beslaan; zich tot aan het einde van den bruingeboorden rand uittrekken, en in de laatste dubbele bruingeboorde uitschuiping wegsmelten. De beschreevene groote grondvlekken worden van eene andere zeer donkerbruine omringd; die zyn oorsprong aan de inleding des Vleugels neemt, en in den uitgeschulpten rand eindigt. Het geen de schoonheid deezer groote donkerbruine vlekken ongemeen doet uitmunten, zyn de, in het midden geplaatste, twee taamlyk groote peervormige hoogblauwe weerschyn-vlekken; die, naarmate dat men den Vlinder tegen het licht houdt, en draait, zich nu blaauw, dan roozenrood, en violet of groenblauw, vertoonen. Uit gemelde veranderingen, zou men kunnen besluiten, dat deeze schoone en glansryke vlekken, met dezelfde vederen, of, om de taal van den Heer REAUMUR te gebruiken, kleene schubbetjes belegd zyn, als die van den *Changeant* of *Weerschyn Vlinder* door den Heer RÖSEL, in zyn III Deel by *Tab. XLII* en *XLIV.* zynen Natuurlyke Historie der Insecten beschreeven. Nadien het dan ook, met de oorzaak der genoemde merkwaardige veranderinge van kleur, even zo gelegen moet zyn, als met die van den laatst gemelden Vlinder, zo zend ik voorts mynen geachten Leezer, naar de aangehaalde beschryving van den Heer RÖSEL.

§. 8.

Het is niet mooglyk, de schoonheid dier koleuren met het penfeel naar het leven uitdrukken; 't welk ons op nieuw bewyft, dat men dikwils met geen verwe dat geen kan nabootsen, 't welk de Meester der Natuur aan het geringste Schepzel kan schenken. Het alvoortreffelykste blaauw, de zo moeijelyk toe-bereiden *Ultramarin*, verliest zyne schoonheid, en komt het oog flets voor, indien men deeze kleur, tegen eenen in zynen pracht en glansryk schitterenden *Changeant*, vergelykt. Hier moeten de grootste en scherpzinnigste Geesten voor den Vinger van Gods Almagt verbaazen; en, by het beschouwen van zulke wonderen, uitroepen: hoe verheven moet die God zyn, die dit maakt, en zo veel schoonheid uit eene Rups, uit een verachten Worm, ten toon spreidt!

§. 9.

De Rug en het Achterlyf van deezen Vlinder heeft, met de donkerbruine vlekken, eenerleie kleur, naamlyk donkerbruin. Wyders heb ik, aan de twee

C

groo-

TAB. III. groote okergeele vlekken, zo wel in den voorften als achterften Vleugel, opgemerkt, dat zy ter plaatfe, daar zy door de donkerbruine vlekken ingeflooten worden, zich met eene dunne oranjebruine koleur vereenigen; waar door de Vleugel de vertooning maakt van een fterk geblakerd of gezengd ftuk papier.

§. 10.

Fig. 2. In de tweede Afbeelding verfchynt de gemelde Vlinder in eene zittende geftalte, met om hoog opgeklapte Vleugelen: laat ik met de befchryving van den voorften Vleugel een aanvang maaken. Hier befpeuren wy weder die groote okergeele grondvlek, welke wy reeds op de bovenfte zyde waargenomen hebben. Dé koleur is hier veel helderer okergeel; ook heeft zy, by de inleding en den voorften rand des Achtervleugels, eenige gantfch okergeele vlekken, die tuffchen de hoofdaderen ftaan, en van onderen af door den geheelen Vleugel heenloopen. Dan de Vleugel is hier niet van alle zyden, maar alleen boven en achter tegen den binnenrand, donkerbruin; en met verfcheiden bruin en graauwachtige vlekken gevuld. Voorts is de Vleugel nog met twee ronde zwartbruine vlekken verfierd; welken aan de beide zyden van de heldere of okergeele vlek ftaan; hebbende de kleinften derzelven in 't midden een helder okergeel puntje. De uitgefchulpte vleugelrand, eindelyk, is, met een dubbelen fmallen bruinachtigen rand, omzoomd.

§. 11.

Wat den Achtervleugel betreft; op denzelven ziet men, van het gewricht af, eene groote geelgraauwachtige, bruingemengde grondvlek, die de helft des Vleugels beftaat; nog eene andere kleinere peervormige geelachtigbruine vlek in zich fluit, en, tot in 't midden des Vleugels, met eenen fmallen bruinen zoom kapswyze eindigt. Onmiddelyk op deeze volgt eene graauwachtigbruine vlek, waarin drie halvemaaſwyze bruine vlekken ftaan; en eindelyk ziet men nog twee groote grondvlekken, zynde de bovenfte graauwachtig, en de onderfte bleek-okergeel. In de laaft befchreevene vlekken ftaan zes kleine bruine stippen, waar op een fmalle ſlangſwyze ſtreep, en eene dubbele bruine omzooming, aan den uitgefchulpten buitenrand volgt.

§. 12.

Her Lyf, de Voelpooten en Baardſpitfen des Vlinders, zyn graauwachtig okergeel, en, benevens de Voelhoornen, zodanig, als by de meeste Vlinders deezer Claſſe, die uit eene Doornruppe hunnen oorſprong hebben, plaats heeft. Hierom is het hoog waarſchynlyk, dat hy uit eene Doornachtige Rups en eene foort van grynſvoerende Pop voortkomt. Van de Voelhoornen moet ik nog zeggen, dat zy zwart, en derzelver kolfjes helderbruin zyn; de Oogen, eindelyk, vindt men bruinrood.

De

De geelachtige witte VLINDER, met bruin ingelegde Vleugelen, zynde een DAGVOGEL van de tweede Classe.*

§. 13.

Schoon deeze Vlinder weinig merkwaardigs schyne te bezitten, zo houde ik ^{TAB. III.} het nogthans der moeite wel waardig 'er eene afbeelding van te geeven; om dat ^{Fig. 3.} hy, (gelyk zulks by veele andere Indiaanschen meermals plaats heeft,) zeer gelyk is aan een Europischen Vlinder, dien de Heer RÖSEL, onder deeze zelfde Classe brengt. In de koleur echter, wordt men een merkelyk onderscheid gewaar; zynde de koleur der vlekken by die van RÖSEL zwart, maar by deezen schaduwachtig bruin. Ook ontbreken in den onzen, die ronde zwarte vlekken in den Voorvleugel, welken by den opgemelden gevonden worden. Behalven dat, zo heeft die groene, en deeze roode oogen. (a.)

§. 14.

Vermits ik deezen Vlinder in eene vliegende gestalte afgebeeld heb, zo ziet men dat zyne vier uitgespreide Vleugelen bleekgeel van grondverwe zyn. Ieder Voorvleugel is aan den buitenrand bruin uitgemonsterd; en aan de bovenste en buitenste hoeken zyn dezelve met schaduwachtigbruine, en tegen den witten grond des Vleugels spitstoeloopende vlekken getekend. Aan den buitensten rand van den Achtervleugel staan insgelyks vyf kleene vlekken; die tegen den witten grond, by de aderen des Vleugels, spitsachtig toelooopen, en met de voorheen beschreevenen eenerleie koleur hebben. Voorts zyn de vier Vleugelen van deezen Vlinder met tedere aderen doorweeven.

§. 15.

Het Voorlyf is zwart, en op de zyden met witte haren bewaßen. Het Achterlyf helt meer naar het bruine dan het zwarte. De Kop is dof okergeel; de Baardspitsen zyn van koleur als het Voorlyf; de Oogen zyn donkerrood; en de Voelhoornen, welken zo dun als een hair zyn, vertoonen zich zwart, zyn bovenaan helder okergeel, en hebben eene kolfachtige gedaante. Van de onderzyde heb ik deezen Vlinder niet voorgesteld, vermits hy grootendeels eenverwig en wit is.

C 2

§. 16. Al-

* By Linn. in *Syst. Nat. edit. XII. p. 760. sp. 80. Pap. Dan.* heet hy *Mouffe*, de *Barbarische witte Vlinder*, of de *Africaansche Nonne*. In *Seelingmanns*, Edwardsche Verzameling van Uitlandsche Vogelen. VI Deel, pag. 184. wordt hy voor een Chincefschen gehouden.

(a.) *Rösel Nat. Hist. der Insecten*, I Deel, *Dagvlinders* II Classe, Tab. IV.

§. 16.

TAB. III. Alhoewel nu aan den beschreeven Vlinder de Voeten, het waare kenteken der
 en IV. Classe, onder welke hy behoort, ontbraken, zo geloove ik nogthans niet te zullen dwaalen, wanneer ik hem, de gesteltenis zyner Achtervleugelen, waar mede hy zyn Achterlyf niet volkomen bedekken kan, in aanmerking neemende, onder de tweede Classe der Dagvogels plaatse; en vaststelle, dat hy uit eene zonder doornen, en met een kleenen Kop. voorziene Rups; als mede uit eene met een dwars over het Lyf gesponnen draad, en niet uit eene grynsvoerende Pop doe afstammen. Ik moet intusschen evenwel, met den Heer RÖSEL, erkennen, dat het moejelyk valt, eenen Vlinder, aan welken de rechte kentekens ontbreken, en welks Rups, noch Pop, men niet gezien heeft, onder zyne juiste Classe te plaatsen. Ik zal my derhalven hier mede niet langer ophouden, maar liever den toegenegen Leezer, met de beschryving van den volgende Vlinder, dienst trachten te doen.

*De donkerbruine WESTINDISCHE DAGVLINDER met
 oranjegeele vlekken versierd, behoorende onder de eerste
 Classe*.*

§. 17.

TAB. IV. De Vlinder, in de 1^{ste} en 2^{de} Fig. afgebeeld, heeft men in de my toegezonden aantekeningen, genaamd, een grooten *donkerbruinen Vlinder, met kaneel gekoleurde streepen* uit Surinamen. Schoon ik nu tegen deeze benaaming wel niets hebbe intebrenghen, zal ik echter myne eenmaal vastgestelde manier van beschryving volgen.

§. 18.

Fig. I. In de 1^{ste} Fig. zien wy de bovenste zyde des Vleugels, zodanig als ik den Vlinder in eene vliegende gestalte heb afgebeeld; in welke ik denzelven nu voorts zal beschouwen. De vier Vleugelen zyn over het geheel met eene bruine grondverwe belegd. In ieder Voorvleugel staat eene groote oranjegeele vlek, welke aan den voorsten rand, en in het midden van deszelfs groote hoofdader, zyn begin neemt; in eene tamelyke breedte, dwars over den Vleugel heen loopt; en aan deszelfs buitensten hoek eindigt; wordende, overal, van de vry sterke Vleugeladeren doorfneeden. Wat verder dan de genoemde vlek staat, boven tegen den buitenrand, by den hoek des Vleugels, eene middelmaatige zwarte vlek, in wel-

* Hy wordt by Linn. *Syst. Nat. edit. XII. p. 767. sp. 121. Pap. Dan. Sophorae*, de *Sophora-Vlinder*, genaamd, naar eene Plant in Amerika, op welke men zegt, dat de Rups haar voedsel vindt.


Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.



welker midden men een ovaalrond streepje ziet; en kort aan dezelve volgen nog drie kleenere witte vlekken. TAB. III.
en IV.

Op den Achtervleugel ziet men eene, langs den buitenrand omloopende, en overal gelykbrede halfronde oranjebruine vlek, welke zich, onder eene roodbruine koleur, met de grondverwe des Vleugels vermengt, en voorwaarts, tuschen de aderen, in den bruinen grond, een ongelyken ovaalen donkerbruinen ring heeft. Het bruine Voor- en Achterlyf vertoont niets byzonders, dan alleen twee kleene oranjegeele stippen, welken achter de Oogen geplaatst zyn.

§. 19.

In de 2de Fig. heb ik deezen Vlinder nog eens als een zittenden Dagvogel, met om hoog opgeklapte Vleugelen afgebeeld. In deeze gestalte zien wy de onderste zyde der Vleugels. De grond is hier niet zo donker van koleur, als op de bovenzyde, maar eenigzins helder schaduwachtigbruin.

§. 20.

Op den voorsten Vleugel staan dezelfde groote oranjegeele vlekken, als op de bovenste zyde; ook ziet men, ter zelfder plaats, in gelyke grootte, en van de eigenste koleur, die kleene witte vlekken, welke ik reeds in de 18 §. beschreeven hebbe. De zwarte ovaalronde kleene vlek, die in den bovensten Vleugel staat, heeft hier een smallen okergeelen kring om zich, welke men op de bovenste zyde niet gewaar wordt: ook zyn de witte vlekken over het geheel helderer. Voor 't overige is de oppervlakte en het onderste gedeelte, met eene zeer fyne witte stof, en dubbele slangswyze hairdunne streepen doorweeven, dat men niet wel met koleuren kan uitdrukken.

Vervolgens zien wy, boven de zwarte ovaale vlek, twee lange smalle gekronkelde linien, welken zich, naar de uiterste breedte des Vleugels, over dwars ombuigen, en, met eene donkerbruine verwe, aan den buitensten hoek eindigen. De grond eindelyk, beneden de oranjegeele hoofdvlekken, naar de inleiding des Vleugels toe, is niet helder maar donkerbruin.

§. 21.

De achterste insgelyks helder schaduwachtigbruine Vleugel is, overal, met kleene okergeele stippen besprenkeld, en met twee helder geelachtig-bruine ongelyke ovaalronde vlekken versierd. De grootste deezer vlekken heeft een witten zwarten en oranjegeelen kring om zich; doch de kleinste, eene smalle maanvormige vlek, is alleen met een bruinen grond omzoomd. De Borst en de Baardspitzen van deezen Vlinder zyn helder bruin, en vry langhairig. Voorts is

TAB. III. de Vlinder van twee Voelpooten en twee paar volkomene Pooten, benevens twee
 en IV. kolfachtige hairdunne zwarte Voelhoornen voorzien. De Oogen en de Zuiger
 zyn roodbruin.

§. 22.

Volgens alle deeze aangehaalde kenekenen, kan deeze Vlinder, uit geene andere dan uit eene Doornrupse, en eene soort van grynsvocerende Pop, die loodrecht nederhangt, zynen oorsprong hebben.

*De hoog-zwavelgeele WESTINDISCHE DAGVLINDER,
 van de tweede Classe*.*

§. 23.

TAB. IV. Thans ga ik over, tot de beschouwing van den in de 3^{de} Fig. afgebeelden
 Fig. 3. Westindischen Dagvlinder; welken ik, om zyne zwavelgeele koleur, de bovengestelde benaaming gegeven hebbe. Ik heb denzelven in eene zittende gestalte, en met om hoog opgeklapte Vleugelen voorgesteld, om dat hy op deeze zyde schooner dan op de bovenste is; zynde de verwe aldaar veel bleeker.

§. 24.

De Voor- en Achtervleugelen hebben overal eene zeer schoone zwavelgeele grondverwe; zynde doorgaans met tedere aderen doorweeven; waar van de grootste en sterkste zich het duidelykst vertoonen. Ook ziet men op het einde, en in het midden des Vleugels, eene zonderlinge kleene roodachtige stofvlek; die in den voorsten Vleugel is eene overdwars liggende 8; en die in den achtersten Vleugel vormt eene onregelmaatige 6.

In den Achtervleugel staat, by den binnenrand, tegen het Achterlyf eene kleene stofvlek van dezelfde koleur, die de gedaante van eene O heeft. De overige kleene bleeke, en alom op den Vleugel verspreide stofvlekken zyn niet wel naar vereisch aftebeelden.

§. 25.

Het Lyf van deezen Vlinder is van vooren met hair bewassen. Het Achterlyf, de Baardspitsen, en de drie paar Pooten, welke laatste aan elk gelid eenigzins roodachtig zyn, hebben voorts over het geheel dezelfde koleur als de Vleugels.
 En

* In Linn. Syst. Nat. edit. XII. pag. 767. sp. 105. zou hy de benaaming hebben van *Cleopatra*, de *Oranje-Vaan*, Simillimus *P. Rhamni*. Ik twyffel zeer of hem deeze benaaming van *Linnaeus*, schoon verscheide Schryvers daar in met hem eens zyn, wel toekomt, ik geloof voor 't naaft, dat *Linnaeus* deezen Vlinder eigenlyk niet heeft.

En vermits deeze Vlinder zes volkomen Pooten heeft, zo mogen wy hem met recht voor een Dagvogel van de tweede Classe houden. De Oogen zyn tamelyk groot; en zo wel als de saamgerolde Zuiger, gelyk ook de hairdunne kolfvormige Voelhoornen, meer rood dan bruin. Die zich een juist denkbeeld van de Röselsche Classen-ordening gevormd heeft, zal, buiten myne herinnering, ligt begrypen, dat deeze Vlinder zyn oorsprong neemt, uit eene ongedoornde Rups met twaalf ringen of leden en een kleenen Kop voorzien, mitsgaders uit eene overdwars hangende vast gesponnen Pop, zonder gryns: en dat hy waarschynelyk uit een kegelvormig ei voor den dag gekomen is. TAB. III.
en IV.

§. 26.

Ik verneem, wyders, met een ongemeen genoeg, dat het begin van mynen arbeid, een goeden uitslag, en eene zo wel onverwagte als onverdiende goedkeuring veeler Liefhebberen heeft weggedraagen. Ik zou toonen, dat ik deeze toegenegenheid niet recht wilt te waardeeren, indien ik de gelegenheid voorby liet gaan, om, op de nederigste wyze, mynen dank voor dezelve te betuigen.

Dan vermits my geen laakbaare Eigenliefde bezielt, zo moet ik betuigen den lof niet te verdienen, welken my eenige myner gunstige Leezeren gegeven hebben; wanneer het hun behaagd heeft myne afbeeldingen by die van den vlytigen Heer RÖSEL te vergelyken. Want, schoon ik by de bearbeiding van ieder *Tab.* en inzonderheid by die van de tegenwoordige derde en vierde, alle myne pooging aangewend hebbe, om de Natuur ten naauwkeurigste na te bootsen, en de uitneemende bekwaamheid van den Heer RÖSEL op 't spoor te volgen; zo zou ik echter niet gaarne, met anderen, de dwaasheid en den mislag begaan, van myne afbeeldingen *gelyk te stellen met die van den Heer RÖSEL*; welke zich, van zyne jeugd af, door een onvermoeiden yver, geen geringe plaats onder de voortreffelykste en beroemdste Kunstenaars verworven heeft. Veel minder zal ik my, die geen Meester in de Schilderkunst ben, diets laten maaken, dat *myne afbeeldingen, met die van Rösel, om de voorkeur sryden kunnen*; want deszelfs Vlinders zyn, volgens het oordeel der grootste Geleerden, en der beste Kunstkenneren, byna onverbeterlyk. Ik ben veeleer overtuigd, dat 'er een meer gevorderde ouderdom, dan de myne, noodig is, om een merkelyken trap ter volmaaktheid te bereiken: ondertusschen zal ik alles aanwenden, om, door verdere vlyt en aanhoudende oefening, steeds bekwaamer te worden.

*Beschryving van een zeldzaamen WEST-en dergelyken
OOSTINDISCHEN VLINDER.*

§. 1.

TAB. V.

Zo zeker als het is, dat, onder alle Natuuronderzoekers, die afbeeldfels van Vlinders vervaardigd hebben, de Heer RÖSEL in zyn uitmuntend Werk over de Insecten, ons de beste en keurigste tekeningen en narichten, van de kleuren, heeft medegedeeld; even zo overeenkomstig is het met de waarheid en de ervarenis, 't geen hy in het Derde Deel van zyn Werk, *bladz. 207*, aantekent; dat, hoe algemeen de groene koleur aan de Rupfen zy, men dezelve nogthans, inzonderheid de blaauwachtige of celadongroene, zeldzaam aan de Vlinders zelve bespeurt. Onder meer dan 199 verschillende soorten van Vlinders, die hy afgebeeld en beschreeven heeft, vinden wy 'er niet meer dan 19, welken met groenachtige vlekken en verwen getekend zyn. Deeze waarneeming van RÖSEL zal nog des te meerder toestemming verwerven, wanneer men nagaat, dat 'er, onder de 79 Surinaamsche Vlinders, welken door de bekwaame hand van Mejuffrouw MERIAN in haar groote Werk afgebeeld zyn, maar 9 à 10 gevonden worden, waar aan men iets groenachtigs ontdekt.

§. 2.

*Fig. 1.
en 2.*

Gemerkt men nu daar uit de zeldzaamheid der groenverwige, byzonder der blaauwgroene Vlinders, niet onwaarschynlyk mag afleiden, zo meene ik wel bevoegd te zyn, om den op *Tab. V. Fig. 1 en 2* afgebeeldten Vlinder, onder de allezins zeldzaamen te tellen. Intusschen kan ik echter wel toestaan, dat hy mooglyk in zyn Vaderland even menigvuldig te vinden is, als de by ons zo talryke hoogblauwe Dagvlinder (*a.*) der tweede Classe; welks afbeelding men in het Derde Deel van RÖSELS Natuurlyke Historie der Insecten *Tab. XXXVII. Fig. 3, 4 en 5* afgemaakt vindt. Men treft deezen Vlinder toch alle Zomers, op de Weiden, in de Tuinen en de Moerassen, overvloedig aan. 't Zou ook wel kunnen zyn, dat 'er by dien Vlinder zo veel verscheidenheid, ten opzichte van de vlekken en de hoogte der koleur, plaats had, als 'er by onzen Inlandschen bespeurd wordt. Ja 't is niet vreemd, te denken, dat deeze Vlinder tot de-

(*a.*) Mooglyk zal ik vervolgens den Liefhebberen, die gaarne een grondig bericht, nopens de veranderingen van ieder Rups tot in een Vlinder, hadden, met betrekking tot deezen schoonen Inlandschen Dagvlinder, genoegen kunnen geeven. De Heer *J. N. Korner* te Frankfort, myn waardste Vriend, welke my reeds verscheidene Rupfen, door *Rösel* niet beschreeven, heeft medegedeeld, welker afbeelding ik myne gunstige Leezers by gelegenheid onder 't oog zal brengen, heeft my althans eenigen grond van hoop hier toe verleend.

Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 4.



Fig. 3.



dezelfde soort behoort; vermits hy 'er eene groote overeenkomst mede heeft, en TAB. IV. 'er meer naar gelykt, dan die, welken de Heer RÖSEL, in 't Eerste Deel van zyn opgenoemde Werk, op *Tab. IX.* van de tweede Classe der Dagvlinders geplaatst heeft; en dien hy, in het Derde Deel, onder deeze soort betreft. Dit zou zeer wel kunnen zyn, schoon ik hem, niet met eene blaauwe, maar groene grondverwe afgebeeld hebbe; in welken weerschynde hy my schooner en prachtiger, dan in het blaauwe, toefcheen; terwyl my ook het blaauwe, den Vlinder in het sterkste licht beschouwende, niet zo natuurlyk voorkwam. Wanneer eenige Liefhebbers, die zelf deezen Vlinder natuurlyk bezitten, aan deszelfs vlekken en koleuren eenig onderscheid, met myne afgebeelde Vlinders, bespeuren; zo verzoeken ik, dat zy zulks aan geen mislag, maar aan eene speeling der Natuur, die dikwils by Schepzelen van eenerleie aart dergelyke veranderingen te wege brengt, toefschryven; en dat zy teffens zyne groene koleur in het sterkste licht beschouwen.

§. 3.

De prachtige Celadongroene zwartbruine, en met twee paar zwarte kleene Vleugelspitzen voorziene WESTINDISCHE
DAGVLINDER *der tweede Classe.*

Ik zal met de beschryving van de voorste en achterste vleugelen deezes Vlin- TAB. V. ders, welke zich in de 1ste *Fig.* op de bovenste en schoonste zyde vertoont, aan- *Fig. 1.* vangen.

§. 4.

De Vleugels van deezen Vlinder (zie *Fig. 1.*) hebben gezamentlyk, zo wel als het Lyf, eene schoone hoog-blaauw-groene koleur; die, als men den Vlinder, in een schuinvallend licht, beschouwt, zich niet meer groen, maar volkomen blaauw vertoont. Dit blaauw is zelfs van die hoogte, dat het den grootsten kunstenaar, met behulp der schoonste verwen, niet mogelyk zy, die natuurlyke schoonheid naar 't leven uittedrukken; en even zo min kan hy den sterk schitterenden stand, in welken de groene glans, in de tegenoverstaande stelling, den Vlinder doet voorkomen, door het Penfeel volkomen afinaalen. Wyders vertoont zich die koleur niet alleen groen en blaauw, maar ook, naar men den Vlinder draaije en keere, wel volmaakt violet; waar uit men kan afneemen, dat hy onder die soorten geteld moete worden, welken een veranderlyken weerschyngloed bezitten. Deze koleur is verder, voor zo veel ik aan den eenigzins beschadigden origineelen heb kunnen bemerken, aan den rand van den voorsten en achtersten Vleugel, met eene zwart-bruine Vlek versierd, die aan den binnensten hoek van den voorvleugel begint, en tot aan de eerste spitse van den achtervleugel voortloopt. Beide de vleugelspitzen zyn zeer smal, klein en zwart van koleur, met welke verwe ook de Vleugelrand aldaar bezoomd is. Voor de Vleugelspit-
D fen

TAB. V. ſen ſtaan twee kleene zwarte Vlekken; de eene ſtaat nog in een blaauwachtigen groenen grond; maar de andere in eene witachtige Vlek, die zich met den genoemden grond vereenigt, en aan den binnenrand van den Vleugel eindigt.

§. 5.

Fig. 2. In de 2^{de} *Fig.* ziet men deezen Vlinder zittende, en geheel anders van koleur. Zyn Voor- en Achter-vleugel heeft grootendeels een roodgrauwen grond, waar in verſcheidene kleene zwarte, en ten deele met een witten rand omboorde Vlekken ſtaan. De Vleugelpitſen zyn ook hier, even alſop de bovenſte zyde, zwart, en ſchynen uit het ſmale zwarte boordzel voorttekomen. Met dit boordzel is de vleugel hier ter plaatſe omzoomd, en 't eindigt aan deſzelfs binnenrand, by het Lyf. Voor deeze Vleugelpitſen ziet men mede de twee bovengemelde zwarte Vlekken; doch ze zyn iets grooter. Ze ſtaan inſgelyks in eene Vlek, die in 't groenachtige valt, en met twee overdwars ſtaande zwartachtig-grauwe ſtoflekken doorweeven is; welke men, voor 't overige, met een ſmal ſlangswyze boordzel omzoomd ziet, dat zich naar het Lyf omkromt, en rugwaards loopende in eene der genoemde Stofvlekken eindigt.

§ 6.

Het eenigzins hairige Lyf van deezen Vlinder, benevens zyne drie paar volkomen Pooten, en taamlyk lange Baardpitſen, ſchynt my toe wit te zyn; waarom ik dezelven ook in die koleur voorgedraagen heb. De Voelhoornen zyn zwart; en de kolfjes aan derzelver einde wit. Byaldien de oogen, die ik zwartbruin geſchilderd hebbe, in zulk een leevendigen Vlinder niet van deeze koleur, maar, gelyk ik geloove, min of meer groenachtig zyn; dan mag men vermoeden, dat de koleur by den uitgedroogden Vlinder verſchooten zy; het welk my te minder vreemd doen zou, om dat ik een dergelyk onderſcheid van koleur, zelfs aan de oogen van een inlandſchen te vooren leevendigen Vlinder, waargenomen heb. Ondertuſſchen wilde ik liever de gemelde koleur der doode oogen in dit geval behouden, dan een miſlag begaan, met dezelven als geheel groen, of gantſch rood te beſchryven.

§. 7.

Vermits ik reeds in de voorgaande §. gemeld hebbe, dat deeze Vlinder zes volkomen Pooten heeft, zo moet het volgen, dat hy tot geene andere, dan tot de tweede Claſſe der Dagvlinders, kan behooren; als by welken zich even dat zelfde kenteken opdoet. Voorts kan ik, dewyl hy niet in ons, maar in een verafgelegen gewest voortgeteeld zy, de gedaante zyner Rupſe niet voorzeker melden; maar 'er alleen giſſender wyze van zeggen, dat hy waarſchynlyk voortgekomen zy, uit een Ey, oorfpronglyk van eene ſoort dier Rupſen, welke de Heer RÖSEL, in het Eerſte Deel zyner Natuurlyke Hiſtorie der Inſecten, by de Dag-
vlin-

vlinders der tweede Classe, op *Tab. VI. VII. en IX.* afgebeeld, en onder den *TAB. V.* naam van *Schildrupfen* beschreeven heeft; om welke reden hy dan ook by die soort van Vlinders geplaatst moet worden. In de voorheen meermaals door ons gemelde Aantekeningen wordt hy *een kleene Westindische Vlinder* genaamd; het geen ik niet heb kunnen nalaaten hier nog op te merken. Onder de Vlinders, die my goedgunstig toevertrouwd waren, was 'er echter ook nog een veel kleiner van dezelfde soort, hoewel van eene verschillende koleur; maar hy was te zeer beschadigd, om hem af te beelden; ook had hy, door een ongelukkig toeval, zyn Kop verloren.

§. 8.

De donker-oranje-bruine, drierzerv bruin bezoomde, en met twee kleene en groote Oogspiegels versierde OOSTINDISCHE, en wel CHINEESCHE, DAGVLINDER van de eerste Classe.

Op den voorbeschreeven kleenen en byzonder schoonverwigen Vlinder, volgt thans een grooter, die zich wel met zulke schitterende en heerlyke koleuren niet voordoet; maar echter om zyne groote Oogspiegels, boven anderen, eene plaats in de Historie der Insecten verdient, en onzer nadere beschouwinge overwaardig is. In de zo even gemelde Aantekeningen, wordt hy *een geele Chineesche Vlinder, met een zwart boordzel, en Pauwenooogen voorzien, genaamd.* Schoon ik nu denke, dat deeze Vlinder zich niet alleen in het wyduitgestrekte Ryk van China ophoudt, maar ook het nabuurige Tartaryen bezoekt, en mooglyk aan deeze Barbaaren, zo dikwils, en in zulk eene menigte voorkomt, als de Vlinder, door RÖSEL, in zyn Eerste Deel op *Tab. II. III. en IV.* afgebeeld, (tot welke soort, aldaar beschreeven, hy het best te brengen is,) zich in onze Gewesten zien laat, zo wil ik hem de eer van een Chineeschen Vogel te zyn geenzins betwisten; en hem daarom dien bynaam wel laaten behouden.

§. 9.

In de 3^{de} *Fig.* ziet men deezen Vlinder met uitgespreide vleugelen. Zyne *Fig. 3.* grondverwe, die meer naar het bruine dan het geele helt, zal ik zo lang donkerbruin noemen, tot dat men een kunstwoord uitvinde, om deeze byzondere koleur naauwkeuriger en eigenlyker uit te drukken. Ieder Voorvleugel, welks grondverwe wat meer, dan die der Achtervleugelen, in 't Oranjegeele valt, is aan den bovensten rand, tot aan den voorsten hoek van den buitenrand, bruin bezoomd. En deeze bezooming heeft achter zich, in den Oranjebruinen grond, vier bruine Vlekken van ongelyke gestalte; waar van die, welke het naast aan het gewricht des Vleugels staat, alleenlyk zwart omzoomd is. Die 'er op volgen schynen bykans geheel zwart; terwyl de laatste en grootste deezer Vlekken, in de gedaante

Tab. V. van een kleenen ronden, zwart en geelbruin omzoomden Oogvlek, versmelt. Behalven deeze Vlekken, is de Oogspiegel, welke in den oranjebruinen grond alleen staat, boven de andere groot en zichtbaar; zy heeft eene ronde gedaante; een geel en zwart boordzel; vertoont zich ook grootendeels zwart, en heeft in 't midden een klein dof wit puntje. Eindelyk volgt een drievoudig zwart-bruin, en, by den rand des Vleugels, in en uitwaards uitgeschulpt boordzel, waarmede deszelfs buitenrand bezoomd is.

§. 10.

De grondverwe des Achtervleugels heeft meer van het geele dan van 't oranje-bruine; en pronkt, met een zeer grooten, niet volmaakt ronden roodbruinen Oogspiegel; waarin twee zwarte heuvelachtige vlekjes staan, op welker top zich twee kleene witte streepjes vertoonen. De buitenrand van deezen Vleugel is niet zo sterk uitgeschulpt, als die des voorsten vleugels; nogthans is hy, op dezelfde wyze, met een drievoudig zwartbruin boordzel versierd. Voor het overige zyn deeze Vleugels, even als het geelbruine Lyf, tamelyk met hair begroeid, en by de inledingen met een bruin geel stof bestrooid.

§. 11.

Fig. 4. De 4^{de} Fig. vertoont ons deezen Vlinder zittende, en, volgens den aart van alle Dagvlinders, met om hoog opgeklapte vleugelen. Vermits ons nu in deeze gestalte de onderste zyde der beide Vleugelen volkomen zichtbaar is, zo zal ik met de beschouwing van den voorsten vleugel beginnen. Dezelve heeft, gelyk ook de Achtervleugel, een helder bruinachtigen grond, die, met de koleur van Eikenhout veel overeenkomst heeft, en op verscheidene plaatsen met donkere Stofvlekken vermengd is. In den genoemden grond, en tusschen de twee groote hoofdaderen des Vleugels, staan overdwars twee bruinachtig-grauwe, ongelyk-vormige, en zwart bezoomde Vlekken; zynde die geenen, welken wy als bruin, op de bovenste zyde, beschouwd hebben. In het midden, boven deezen, en dwars door den Vleugel, staan twee heel smalle, iets van elkander afgescheiden, uit- en inwaards geboogene streepen, waar van de onderste helderbruin, en de bovenste zwart-bruin is. Op deezen volgt wyders de eenigzins groote Oogspiegel, die zich mede op de bovenste zyde vertoonde. Hy is rond, zwart, en met een helder bruinachtig-geelen en gantsch zwarten rand omzoomd. Omtrent deszelfs midden ziet men een wit puntje. Voor deezen Spiegel, wat hooger op, tegen den voorsten rand des Vleugels, staan nog twee kleene ronde zwartbruine vlekjes, waar van het grootste mede een klein wit puntje heeft. Het drievoudige in- en uitgeschulpte boordzel deezer vleugels is ook op deeze zyde, doch iets smaller en in een donkerbruinen grond, te zien. Voor het overige is de Vleugel overal met eene soort van roodbruine vlekken bezaaid; die den gunstigen Leezer kennelyker zullen voorkomen, op de beschouwing der Afbeeldinge zelve, dan op het nagaan eener wydloopige beschryving.

§. 12. Op

§. 12.

Op den achtersten Vleugel, welke dezelfde grondverwe als de voorste heeft, TAB. V. wordt men eene, iets helderer Vlek, dan de grondverwe gewaar; die wel niet ver van de inleding des Vleugels afstaat, doch echter by den voorsten Vleugel zyn aanvang neemt. Dezelve is van eene boogswyze gedaante, heeft achter zich eene min of meer uitgeschulpte smalle bruine bezooming, en loopt voort naar den binnenrand des Vleugels. Bovendien vertoont zich nog eene andere Vlek, die veel helderder en smaller is, aan den voorsten rand des Vleugels begint, dwars door deszelfs midden heen loopt, eene uitgeschulpte smalle bezooming heeft, en in den uitersten hoek van den Vleugel versmelt. Achter deeze Vlekken nu vertoonen zich eerst die groote Oogspiegels, welken wy, op de bovenste zyde, maar grooter en anders afgedeeld, reeds beschouwd hebben. Hierby komt nog een kleiner Oogspiegel, die zich op de bovenzijde niet bevond. De groote Oogspiegel verkrygt alhier, door zynen bruinen en helder bruinachtig-geelen rand, de gedaante van een Peer: ook ziet men de twee daar in zynde zwarte vlekken van elkanderen afgescheiden; staande in een oranje-bruinen grond; voorts zyn ze, als op de bovenste zyde, met twee witte kleene streepjes bezet. De kleene Oogspiegel heeft dezelfde gedaante als de groote, met dat onderscheid, dat 'er geen twee, maar slechts ééne zwarte Vlek ingezien worde. De buitenrand van deezen Vleugel is ook hier weder met het drievoudig bruin boordzel omgeeven, waar van het eerste het breedste is, en van de twee overigen wat verder afstaat; het loopt voort tot in den uitersten vleugelhoek, alwaar het te gelyk eene kleene witte Vlek vervangt.

§. 13.

De twee paar volkomen Pooten, benevens de twee Voelstompen en Baardspitsen van deezen Vlinder hebben dezelfde doffe wirachtig-geele koleur. En aangezien de Vlinder, ter oorzaake van deeze kentekenen, de pooten en stompjes, in de eerste Classe der Dagvlinders te plaatsen is, zo kan men ook gegrond vermoeden, dat hy zyn oorsprong verschuldigd geweest zal zyn aan eene met doornspitsen voorziene Rups; die haar aanwezen insgelyks te danken had aan een vrouwelyken Vlinder deezer Classe. Het komt my derhalven ook als zeker voor, dat eene Pop, met een grynsvormig voorkomen, welker voorzyde een Gryns verbeeldt, die, mogelyk geheel, en veelligt ook niet, goudverwig was, de laatste wooning van deezen Vlinder geweest is, welke hem by 't leven behouden zal hebben. De koleur der Oogen, (te weeten van myn gedroogden Vlinder,) is roodbruin; de Voelhoornen, die, schoon ze nu aan mynen Vlinder ontbraken, 'er zekerlyk aan geweest waren, hebbe ik naar myne gedachten, doch zo als ze vermoedelyk geweest zyn, afgebeeld; want ik wilde hem niet gaarne gebrekkig voor den dag laaten komen.

§. 14.

TAB. V. Voorts staat my in deezen nog te melden, dat ik, met tot hier aan toe de kentekenen en Classen-orde, door den Heer RÖSEL opgegeeven, op de uit de andere Werelddeelen overgebragte Vlinders toetepassen, geenzins eene bloodyk opgevatte zucht voor de rechtmatigheid dier Rangschikking ingevolgd hebbe. Nog minder wil ik eigenzinnig staande houden, dat deeze Classen-orde, (hoe richtig zy ook indertyd bevonden moge worden,) zonder eenige uitzondering, zo nauwkeurig met de Natuur overeenstemme, dat men dezelve volstrekt op alle zodanige Schepzelen zoude kunnen overbrengen. Ik ben wel verre van te beweeren, dat zy altoos onbedriegelyke Kentekenen uitlevert, die, zonder ooit te missen, bestendig plaats hebben, door alle de drie veranderingen, volgens welken die Insecten als eene Rups uit een Ey voortkomen, vervolgens in eene Pop veranderen, en eindelyk uit dezelve, in de gestalte van een Vlinder, voor het licht verschynen. Ik wil my hier over in geen twist inlaaten, met dezodanigen, die my zouden willen tegenwerpen, dat 'er evenwel gevallen konden plaats hebben, (a) (t welk noghans zekerlyk maar zeer zeldzaam zal gebeuren,) in welken die kentekenen niet alleszins voldoende zouden zyn. Ik heb alleenlyk, nopens dit onderwerp, nog maar te zeggen, dat my RÖSELS Classen-orde en Kentekenen, schoon zy niet altoos, in de Rupsen en Poppen, zo kennelyk als in de Vlinders zelven zyn, boven die van anderen, welken mede eene dergelyke Rangschikking gemaakt, maar dat nauwkeurig onderscheid in hunne verdeelingen, niet zo bepaald in acht genomen hebben, het beste is voorgekomen. Ik heb althans tot tegenwoordig, langs dien weg, niet alleen de Vlinders, maar ook grootendeels derzelver Rupsen en Poppen, onder haar eigen Geslacht kunnen brengen; en daar ik zulks, ten opzichte van de Vlinders voldoende getoond heb, zal ik het vervolgens, ook ten opzichte der Rupsen, by de uitgave van nieuwe ontdekte Rupsen, indien God my 't leven en de gezondheid spaart, insgelyks trachten te bewyzen.

§. 15.

Eer ik deeze myne beschryving van den thans beschouwden Vlinder besluite, achte ik my verplicht, myne dankbaarheid, met de verschuldigde eerbied, te beuigen, aan de Bezitter der tot hier toe afgebeelde Oost- en Westindische Vlinders, Mejuffer D. S. C. SCHELER, van Coburg; waardige Dochter van de voorgemelde benoemde overleedene Mevrouw SCHELER; en Kleindochter van den vermaarden, in den Heere rustenden, Superintendent MEUSCHENS. Aan haare goedhartige mededeeling hebben myne geachte Leezers het des dank te weeten, zo zy door de Afbeelding en beschryving deezer zeldzaame Vlinders eenigzins vermaakt zyn geworden. Echter zullen deezen nog de laatste Indische Vlin-

(a) Dat dergelyke gevallen mooglyk zyn, zal ik vervolgens by de beschryving eener Rups, my door den beroemden Heer Körner uit Frankfort medegedeeld, zelf bewyzen.

Fig. 1.



Fig. 6.




Fig. 2.





Fig. 5.



Fig. 3.



Fig. 4.



Vlinders niet zyn, dien ik in dit Vervolg op RÖSELS Werk eene plaats zal gee- TAB. V.
 ven; 'er zullen nog eenigen, om derzelver fraaiheid, volgen. Maar hierop zal
 ik, (op dat men my niet verdenke, dat ik het 'er maar op toelegge, om het
 Gezicht myner Leezers door untheemfche Vlinders te vermaaken, zonder aan hun
 Verftand voldoening te geeven; of dat ik my geheel en al door die bontgefcha-
 keerde Schepzels heb laaten inneemen;) my bepaalen tot de befchryving van
 eene groote Amerikaanfche Spinnenfoort; en my vervolgens met het nagaan van
 andere Inlandfche Infeften bezig houden.



Befchryving van een zeer byzonderen Indifchen VLINDER.

§. 1.

Onder meer dan tweehonderd Vlinders, waar mede des Heeren RÖSELS TAB. VI.
 Werk pronkt; als mede in het groot en fchoon Werk van Mejuffrouw MERIAN,
 in het welke de meeste Indifche Vlinders zyn afgebeeld; en even zo in het geen
 BLANKERT over de Infeften gefchreeven heeft, heb ik geen één eenigen Vlin-
 der aangetroffen, die zo veel byzonders, en zich, om zo te fpreken, zo eenig
 in zyne foort vertoont, als deeze, w lken ik hier op de *Vle Tab.* voorftelle.
 Uit dien hoofde zou ik, wanneer my iemand eene afbeelding van deezen Vlin-
 der, zonder het origineel te laaten zien, had medegedeeld, deszelfs beftaan wel
 niet volftrekt ontkend, maar het toch ten minft in bedenking genomen hebben,
 om die afbeelding den Kenneren en Liefhebberen onder 't oog te brengen. Zyn
 r'eenemaal onbeftofte, of met geen het minfte vederftof bedekte, Vleugels zou-
 den my in dat geval reeds een genoegzaamen grond ter twyffeling toegefcheenen
 hebben. Dan, daar de Heer RÖSEL (a) eene foort van Vlinders befchryft,
 die met half doorzichtige en half beftofte Vleugelen voorzien zyn; zo zal het
 veelen ligtlyk vreemd voorkomen, dat ik, om de onbeftofte Vleugels alleen,
 het daadlyk aanwezen van den tegenwoordigen Vlinder in twyffel getrokken zou
 hebben. Intuffchen zou men my onregt doen, wanneer men myne twyffeling
 aan eigenzinnigheid wilde toefchryven, of my dezelve als een mislag wilde toereke-
 nen, daar dezelve alleen uit liefde voor de waarheid en eene begeerte, om iets
 overtuigelyk te weeten, in my opkomen kon. 'Er zou toch hier omtrent eene
 misleiding plaats kunnen hebben: want dat het mogelyk zy, een Vlinder van
 zyn vleugelftof te ontblooten, en deszelfs vleugels zo doorzichtig als Muggen-
 vleugels te maaken, kan ieder Kenner door het in 't werk ftellen der volgende
 Proefneeminge leeren. Men behoeft alleenlyk een teder Penfeeltje in water of
 boomoly te doopen, 'er den vleugel des Vlinders mede nat te maaken, en 't
 pen-

(a) Nat. Hift. der Infeften III. Deel, *Tab.* XXXVIII. en IV. Deel. *Tab.* II.

TAB. VI. penfeeltje vervolgens, (doch zeer voorzichtig,) 'er zacht en lenig over heen te ftryken; dit doende zal de ftof 'er fchoon afgaan, en men zal de waarheid van myn zeggen, zichtbaar voor 't oog bevestigd vinden. De groote REAUMUR en nauwonderzoekende RÖSEL hebben, reeds voor langen tyd, dergelyk eene mooglyke afstoffing der Vlindervleugelen waargenomen, en 'er zelfs eene afbeelding van gegeven (a).

§. 2.

Dat nogthans de Vlinder, dien ik thans befchryven zal, geen konftig afgestofte, maar dus uit eene Pop voortgekomen, en door de Natuur alzo gevormd is, kan ik genoegzaam bewyzen; deels door te melden aan wien ik deszelfs mededeeling te danken heb; en deels door een bericht te geeven van 't onderzoek, daaromtrent door my in 't werk gesteld.

§. 3.

Onlangs had ik het geluk de ongemeene talryke en fchoone Infeften-verzameling van den Heer Hofraad J. G. VAN HAGEN te bezichtigen en te bewonderen. By deeze gelegenheid, toonde my deeze groote Kenner en Liefhebber van natuurlyke Zeldzaamheden, onder andere merkwaardige Infeften, ook deezen Vlinder, 'er byvoegende, dat hy een uitlandsche, te weeten een Indifche was. Ik verkreeg van dien my zeer toegenegen Begunstiger de vryheid, om den Vlinder nader te onderzoeken, en myn Gefchrift daar mede te verryken; voor welke uitfteekende toegenegenheid ik hem hier mede openlyk myne onderdanige dankbaarheid betuige.

§. 4.

Schoon nu deeze Vlinder van wegens zyne eenpaarige koleur niets prachtigs hebbe, fcheen hy my echter, om de gemelde oorzaak, der befchouwinge wel waardig; vermits hy, gelyk ik reeds gezegd heb, uit hoofde van zyne onbestofte en doorzichtige Vleugels, zo aanmerkelyk van de anderen onderscheiden is. Evenwel wilde ik denzelven niet eerder afbeelden, voor dat ik door eene gegronde nafpooring overtuigd was, of zyne Vleugels wezenlyk natuurlyk zo naakt en doorzichtig waren, dan of wat 'er anders met hem mogte zyn voorgevallen.

§. 5.

Ik befchouwde daarom zyne vier Vleugels, niet alleen met het bloote oog, maar óók door twee zogenaamde Cuffiaanfche Mikroskooopen, door den Heer RÖSEL zelve op het nauwkeurigfte vervaardigd en te faamen gesteld. Myne moei-

(a) Zie Reaumur *Memoires pour servir, a l'Hift. des Insectes*, T. I Planché VII. En Rösel *Nat. Hift. der Insecten*. I. Deel, IIde Tab. van de tweede Classe der Dagvlinders. bl. 81.

moeite werd terstond in zo verre beloond, dat ik tot myn genoegen ontdekte, TAB. VI. dat deeze Vlinder eene geheel byzondere soort onder de Dagvlinders der eerste Classe uitmaakt. Daarenboven kon ik, behalven dat hy doorzichtige Vleugels had, reeds met het bloote oog aan deszelfs gestalte iets opmerken, 't welk men by de inlandscne Vlinders der eerste Classe niet gewaar wordt; als hebbende zy geene zo zeer lange, smalle en onuitgeschulpte Vleugels als deeze tegenwoordige Vlinder. Met dit alles, behoort hy echter, naar uitwyzen van zyne stompjes of voelpooten en twee paar volkomen pooten, zynde dit een onfeilbaar kenteken van zyn geslacht, tot geene andere dan de bovengenoemde eerste Classe.

§. 6.

Al eens gesteld zynde, dat iemand hem onder eene Classe van onbestofte en doorzichtig gevleugelde Vlinders wilde brengen, en 'er dus gevolgelyk eene nieuwe Classe voor wilde maaken, dan zou hy wel, door dit kenteken, het voornaamste onderscheid deezer Vlinders boven die van andere Classen bepaalen; maar hy zou evenwel in geen deele het onderscheid tusschen de Rupfen der bestofte en onbestofte Vlinders kunnen opgeeven; en zich dus genootzaakt zien, om beiderleie Rupfen en Poppen, ja zelfs die van de Nachtvinders, op het ongeschiktste onder elkander te vermengen. Ik vertrouw daarom voldoende reden te hebben, om de Classen-verdeeling van RÖSEL niet alleen boven die van anderen den voorrang te geeven; maar ook dezelve, vermits zy natuurlyk en ongedwongen is, tot myn geleide te blyven verkiezen, en dus zyn spoor te volgen. Laat ons nu voorts deezen Vlinder naauwkeurig beschouwen; die, myns oordeels, best genoemd wordt

*Een zeer zonderlinge INDISCHE DAGVLINDER, met
doorzichtige Vleugelen en vederachtige Oogspiegels, behoorende tot de eerste Classe.*

§. 7.

Alvoorens van myn aangewend onderzoek op de Vleugels van deezen Vlinder TAB. VI. te spreken. zal ik den toegenegen Leezer, met eene korte beschryving van deszelfs natuurlyke gedaante, in welke hy op de *VIde Tab.* vliegende afgebee'd is, onderhouden. Men zal daar uit kunnen oordeelen of de benaaming, onder welke ik hem voorgesteld heb, met zyne gestalte overeenkomt. Wat zyn Vaderland betreft; gemerkt men waarfchynlyk vermoeden mag, dat hy een Indische Vlinder is, zo laat ik hem dien bynaam behouden, tot dat het tegendeel blykt, of dat men met meer zekerheid kunne bepaalen, uit welk Gewest hy herkomstig zy.

§. 8.

TAB. IV.
Fig. I. By de beschryving zyn'er Vleugelen, (zie Fig. I.) zal ik alleen op de bovenste zyde acht geeven; vermits men tusschen deeze en de benedenste zyde geen onderscheid bespeurt. De Vleugels zyn overal zo doorzichtig als het zogenaamde Vrouwen- of Moscoviesch - Glas; en ze komen ten opzichte van de koleur, die eenigzins in het bruinachtige valt, nergens beter dan met dun geolyd papier overeen. Voor het bloote oog schynen zy wel zo glad niet, als de Vleugels der Muggen, en die der *Libellen* of Waternimphen, maar iets ruiger, ja min of meer bestoft; doch dat het met de zaak anders gelegen is, zal de beschryving der 2^{de} Fig. in welke de Vleugel vergroot afgebeeld is, in een helder licht plaafsen. De gesteldheid dier Vleugelen is veel langer en smaller dan by andere Vlinders deezer Classe; en aan den rand zyn ze niet tandswyze uitgeschulpt, maar volkomen glad.

§. 9.

De Achter-vleugel onderscheidt zich van den voorsten, door twee Oogspiegels van eene middelmaatige grootte; die eene zwarte koleur hebben, en in welke midden een kleen wit stipje staat; zynde voorts rondsom met een doffen oranjegeelen kring omgeeven, die nog met een smal bruin boordzel omzoomd is. Naast deezen vertoonen zich wyders in ieder Vleugel, tusschen de opgenoemde Oogspiegels, in een geelachtigen doorzichtigen grond, twee zeer kleene witte vlekken, die, benevens de Oogspiegels, de eenige vlekken zyn, welken uit fyn vederstof schynen te saamen gesteld te weezen. De overige drie helder-bruine vlekken, voor en tusschen de Oogspiegels, waren doorzichtig; en ik kon 'er, zelfs met het Vergroot-glas, geen vederstof op ontdekken.

§. 10.

De gestalte van het Lyf, dat van achteren smal, gevederd en wat hairig is, heeft met die van andere Vlinders eene tamelyke overeenkomst, en is, zo wel als de Kop, van eene kaneelbruine koleur; maar de Oogen zyn donkerbruin. 't Is spytig, dat de Pooten en de beide Voelhoornen van deezen zeldzaamen Vlinder grootendeels verlooren waren; nogthans heb ik 'er de kentekens, benevens de nog onbeschadigde Voelpooten en Baardspitsen aan ontdekt; en de Voelhoornen daarbenevens zo goed als my met mooglykheid te giffen was, afgebeeld. De twee paar verlooren pooten moeten zekerlyk, met de Borst, het onder- en achter-lyf, de baardspitsen en voelpooten, van eenerleie, te weeten dof wit-achtig-geele koleur, geweeft zyn.

§. 11.

Na dus den Vlinder in zyne natuurlyke grootte en uitwendige gedaante beschree-

schreeven te hebben; zal ik één zyner Boven-vleugelen, door het Vergroot-^{TAB. VI.}glas, beschouwen; ten einde te onderzoeken in hoe verre ik het zorgvuldig wantrouwen, of naamlyk deszelfs doorschynendheid niet eer aan een kunstig bedrog, dan aan de Natuur, toe te schryven zy, uit den weg kan ruimen.

§. 12.

De bepaaling onder welke de tegenwoordige *Tab.* my brengt, liet my niet toe, deezen Vleugel in die grootte voortstellen, als hy zich onder het saamengestelde Cuffiaansch Microscop vertoonde. Ik heb my daarom vervolgens slegs van een goed Vergroot-glas bediend; en den Vleugel naar die vergrooing in de 2^{te} *Fig.* afgebeeld. By deeze naspooring ontdekte ik, dat de geheele *Fig. 2.* Vleugel, in plaats van met vederstof, met eene menigte van kleene, wat lange kromme hairen, overal bezet was; als mede dat dezelve styf, borstelachtig, en van eene donker-bruine koleur waren; zynde derzelver wortel, even als die der vederen van de bestofte Vlinders, in zo veel kleene wratjes of holletjes vastgehecht. De onder deeze hairtjes hier en daar ledig schynende openingen zyn ook deels weezenlyk ledig, maar deels niet; vermits zy de hairworteltjes van de onderste zyde des Vleugels insluiten; en ze vertoonen zich maar niet duidelyk, om dat de doorzichtige huid des Vleugels 'er tusschen beiden komt.

§. 13.

Op den geheelen Vleugel kon ik nergens eenig vederstof bespeuren, behalven alleen dat weinige, dat aan den buitensten en voorsten rand en op de aderen zichtbaar was; het welke ik, zo als het my door het enkel Vergroot-glas voorkwam, dus beschryve. Dit vederstof is doorgaans van eene bruine koleur; in de gedaante en grootte is het naamlyk van elkander onderscheiden; doch het is niet half zo lang als de voorbeschreeven hairen.

In de 3^{de} *Fig.* heb ik dit hair, en vyfderleie verschillende vedertjes, met *Fig. 3.* hunne kleene gaatjes, in de eigenste grootte afgebeeld, zo als ik die door tweederleie saamgestelde Microscopen gezien hebbe. Hier uit nu is 't blykbaar, dat de eene anders gevormd is, dan de andere; en dat de hairen de kleene vedertjes in lengte verre overtreffen. (a.) Ik heb omtrent dezelve verders nog aantemerken, dat de drie, welken bruinverwig zyn, en drie a vier spitzen hadden, alleen op den voorsten Vleugel staan; en dat daarentegen de twee anderen, die ik wit en zwart afgebeeld heb, twee en driehoekig zyn, in de Oogspiegels en in de witte vlekken des Achter-vleugels gevonden worden.

E 2

§. 14. Tot

(a.) De Leezer die eene breeder beschryving van de gesteldheid, en de verschillende soorten van vederstof begeert, verzende ik naar de voortreffelyke Werken van *Reaumur*, *Rüfel*, *Bonani*, enz. en bovenal naar het Derde Deel van *Ledermüllers Microscopischen Gemuths- und Augener-genotzungen*; waar in hunne begeerte van navorfching eene genoegzaame voldoening zal vinden.

§. 14.

TAB. VI. Tot dus verre ben ik met myne ontdekkingen door middel van enkele en saamgestelde Microscoopen, gevorderd. Maar zullen nu opletende beschouwers van natuurlyke voorwerpen hier mede vergenoegd zyn, en het voor eene uitgemaakte zaak houden, dat de Vleugel van deezen Vlinder uit de natuur doorzichtig, en niet door konst afgestoft zy? Daar twyfel ik zeer aan; en ik wil my daarom bevytigen, om nog zodanige tegenwerpingen uit den weg te ruimen, die, wel niet zo zeer tegen myne beschouwingen, als wel tegen de gemelde natuurlyke doorzichtigheid, kunnen gemaakt worden.

§. 15.

Ik vooronderstelle, dat iemand deezen Vleugel niet voor natuurlyk doorzichtig, maar voor afgestoft houdt; en dat hy deeze zyne gedachten, ook op de door my beschreeven kleene gaatjes, ja zelfs op de hairtjes, betrekkelyk maakt; beweerende dat 'er in die ledige hollerjes Stof-vedertjes gestoken kunnen hebben; dat de Oogspiegels die zich op den Achter-vleugel vertoonen, 'er de ongeschonde overblyfsels van konden zyn; dat de veelvuldige hairen, hier en daar op den Vleugel verspreid, misschien de steeltjes der afgestofte Stof-vedertjes zyn; die dan overgebleeven zouden wezen, om dat ze eenigzins styf waren, en te vast in hunne gaten ingeworteld stonden, waar door men ze niet had kunnen afstoffen; en wat dies meer zy. Edoch hoe gewigtig deeze tegenbedenking, in den eersten opslag, schyne, dezelve kan echter, door de duidelykste en grondigste wederlegging tegengegaan, en, door een welingericht onderzoek, ten eenemaal krachteloos gemaakt worden.

§. 16.

Ik heb reeds gezegd en beweezen, dat alle, zelfs de grootste Stof-vedertjes, die ik op den Vleugel gevonden heb, geenzins met de hairen in grootte en lengte overeenkwamen; het geen zo zou hebben moeten zyn, indien men deeze hairen voor de overgebleeven steeltjes dier vedertjes te houden had. Dit is eene genoegzaame en tamelyk sterke verdediging, tegen hen, die de natuurlyke doorzichtigheid van den Vleugel deezes Vlinders in twyfel willen trekken. Dan 't geen nog verder gaat, en alle bedenking hieromtrent doet ophouden, is de proefneeming zelve. Indien men, gelyk ik deed, eene proef met een anderen Vlinder neemt, de Stof-vedertjes van den Vleugel afstrykt, en denzelven vervolgens, in die naakte gestalte, onder een goed saamgesteld Mikroskoop legt; dan zal men geen één eenig hair nog steeltje van de daar op geweest zynde Stof-vedertjes ontdekken; men zal dan bevinden, dat ik de waarheid voorgesteld heb, en my dus geen geloof weigeren. Dat toch eene zo kunstige afstopping der Vleugelen, waar by men opzettelyk de steeltjes der Stof-vedertjes zou laten
over-

overblyven, mooglyk is, kan ik my zo gemakkelyk niet laten dietsmaaken; en TAB. VI
 ik zou hem, die dit beweeren wilde, verzoeken, my van deszelfs mooglykheid,
 door eene proefneeming, te overtuigen. My althans, is die proefneeming niet
 gelukt; en myne mocite, met de afstopping der Vleugelen van verscheiden Dag-
 vlinders, is ten deezen opzichte altoos vruchteloos geweest. Ik nam, met dit
 oogmerk, twee Vlinders uit de eerste Classe der Dagvogels, naamlyk, den Vlin-
 der, te vinden in RÖSELS meermaals genoemd Werk, Eerste Deel, 11de Tab.
 en den Pauwen Spiegel; in het zelfde Deel, Tab. III. beschreeven; komende
 my deezen, tot bereiking van het door my bedoelde, het bekwaamste voor;
 vermits zy beiden met den tegenwoordigen Vlinder uit die eigenste Classe waren,
 en de laatstgenoemde, ook met betrekking tot de Pauwen- of Oogspiegels, 'er
 mede overeenkwam. Uit de tweede Classe nam ik den bekenden witten Vlinder,
 welks afbeelding Tab. IV. en V. gevonden wordt; wier Vleugels ik op het
 nauwkeurigte van alle Stof-vedertjes ontblootte. Schoon zy nu hier door zo
 doorzichtig als Muggen- of Libellen- vleugelen, en dus doorzichtiger dan die
 van den voorbeschreeven Vlinder werden; zo kon ik echter noch door Vergroot-
 glazen, noch door de vlytigste naspooringen, geene zodanige haren, maar wel
 nog kleene Stof-vedertjes en eene menigte reien ledige en doorschynende gaatjes
 ontdekken; waar door ik dan volkomen overtuigd werd, dat geene konstige
 Menschenhand dezelve ontbloot had; maar dat de alles vermogende Hand des
 wyzen Scheppers van het Heelal deezen Vlinder dus gevormd, en deszelfs
 Vleugels niet, gelyk die van anderen, met een zeker vederstof gedekt heeft.

§. 17.

Het onderscheid, 't welk tusschen deezen Vlinder en de anderen plaats heeft,
 heb ik in de 4de Fig. door de afbeelding van een klein gedeelte van den afge- Fig. 4
 stosten voorsten Vleugel des Pauwen Spiegel-Vlinders, en in de 5de Fig. door en 5.
 die van een stuk van een Libellen-vleugel, zo als die zich onder een te saamen-
 gesteld Mikroskoop vertoonde, willen voorstellen; ten einde een ieder, zonder
 myne nadere aanduiding, de verschillendheid deezer Vleugelen, van die welken
 met haren bezet zyn, mogte leeren kennen. Wyders staat my nog kortlyk te
 melden, dat deeze Vlinder naar myn vermoeden, wegens zyne kentekenen,
 welken in zyne twee paar Pooten, en twee volkomen Voelpooten, (door my
 in de 6de Fig. vergroot, afgebeeld,) bestaan; dat deeze Vlinder, zeg ik, niet Fig. 6.
 alleen uit een Ei voortkomt, maar mooglyk ook uit eene met doornen bezette
 Rups, en eene loodrecht hangende grynsvoerende Pop, afstamt; als mede dat
 dezelve, uit hoofde van de synheid zyner Vleugelen, het naastdenkelyk zelden
 anders, dan by nacht en stil weder, zal durven waagen om te vliegen en zyne
 weide op te zoeken.

§. 18.

Voor het overige houde ik deezen Vlinder, (schoon ik zyne Teeldeelen niet
 heb-

TAB. VI. hebbe kunnen ontdekken,) ter oorzaake van het tenger Achterlyf, voor een Mannerje. Myne Vrienden, die hem origineel by my gezien hebben, en hem noch Manlyk noch Vrouwelyk, maar eer een Basterd noemen, of wel hem voor een zeldzaamen tweeflachtigen Vlinder houden, gelieven het my niet kwalyk te neemen, dat ik my niet met hun gevoelen vereenige. Want, gesteld zynde, hy was een Basterd; dan zou men billyk mogen vraagen, welke twee onderscheidene soorten van Insecten hebben dien zeldzaamen Vlinder, door hunne vermenging, voortgebracht. En hier op te antwoorden zou zo gemaklyk niet wezen, als men zich verbeeldt. Intusschen zy het my, zo lang men op deeze vraag geen grondig antwoord geeven kan, geoorloofd, geene andere gedachten deswegen dan die van den Heer RÖSEL (a.) te omhelzen. RÖSEL, naamlyk, houdt het voor eene zekere waarheid, „dat geen Dier zich met eene vreemde „soort zal vermengen, ten zy het, by gebrek eener Gade van zyne soort, door eene „overmaatige drift en gailheid daar toe gedreeven worde;” gelyk men dit uit de voorbeelden der Ezeliene, die van het Wyfje van een Canarie-vogel en anderen bewyzen kan. Indien hy anders een zogenaamde tweeflachtige Vlinder zy, dan doet het my vreemd, dat hy niet even zo gevormd zy, als de Vlinder, welken de in de onderzoeking der Natuur voor lang beroemde en vlytige Heer Pastor SCHÄFER, nog kortlings, onder de benaaming van *wonderbaaren*, en mogelyk tot nog in de Natuur niet verscheenen *Uilen-Hermaphrodiet*, (b.) beschreeven en afgebeeld heeft; als zynde van natuure, van de eene zyde half een Mannerje, naamlyk met kleene Vleugelen; en van de andere zyde half een Wyfje met groote Vleugelen

§. 19.

Ik weet wel dat myne twyfelng aan meer dan ééne gewigtige tegenbedenking onderhevig is, die nothans niet krachtig genoeg zyn, om my dezelve te ontneef-

(a.) Zie *Nat. Hist. der Insecten* Eerste Deel, onder de tweede Classe der Dagvlinders, *bladz.* 96. vergl. *bladz.* 87 en 90.

(b.) De Pastor Schäfer zegt, dat hy de afbeelding van dezen tweeflachtigen Vlinder, van den zich in den Haag ophoudenden Hoogvorstlyken Saxischen Coburgschen Legations Secretaris, den Heer Meuser, (met wien ik insgelyks de eer heb van Briefwisseling te houden,) ontvingen heeft. Dat deszelfs gelukkige Bezitter, de Heer Karel Burkhart Voet, Med Doctor, en Opzichter over het Zegel van 's Lands gemeene Middelen der Provincie Holland, te Dordrecht, is; welke den genoemden Vlinder, in het jaar 1756, uit een broed Rupfen en derzelver Poppen bekomen had. Deeze Rupfen behoorden to. die soort; welke onder den naam van Ruige Rupfen in Holland bekend is. De Heer Rösel heeft dezelve in zyn meermaals genoemd Werk, in 't Eerste Deel, onder de tweede Classe der Nachtvlinders, op de IIde Tab. afgebeeld, en *bladz.* 193-204 beschreeven; noemde hier de *schadelyke, haitige, bruine Rups, met den grooten Kop, en met roode en blaauwe buitjes*. De Heer Voet had dezen Vlinder aan eene naalde gestoken, hem aldus drie dagen leevenlyg gehouden, en aan verscheidene Liefhebbers vertoond. Men zie verder myne aantekening op Rösel als boven, *bladz.* 204.

neemen. Men kan, by voorbeeld, zeggen, dat de onuitspreekbaare ryke Na-^{TAB. VI.} tuur, in de vorming en voortbrenging der Schepzelen, (zy moge daar in haare werkzaamheid op deeze of geene wyze vertoonen,) nooit zal dwaalen; en daar by niet verhouden is, om aan elk tweeflachtig Dier, twee volkome half Manne-lyke en half Vrouwelyke deelen, zo zichtbaar te maaken, dat men, daar door, de sporen en merktekenen van beiderleie geslacht dermaate duidelyk ontdekke, dat 'er verder geen twyfeling overblyve. Men zal my mooglyk de Slakken en Boomluizen voorleggen; die, volgens het getuigenis van eenige Natuuronderzoekers, onder de tweeflachtige Insecten behooren. Zy zeggen, dat men aan de genoemde Insecten, ten minsten aan de eerstgenoemde, geene zodanige uitwendige tekenen kan ontdekken; waaruit men op eene evenredige wyze zou kunnen afleiden, dat onze Vlinder juist even zo gevormd en verdeeld moest zyn als de Hollandsche Vlinder van den Heer SCHÄFER; en dat ik derhalve geene voldoende reden heb, om my tegen het gevoelen der geenen te verzetten, die hem voor een tweeflachtig Insect gehouden willen hebben. Ik begryp zeer wel, dat het, by soortgelyke tegenbedenkingen, veel ligter valt, af te breeken dan te bouwen: en wil 'er my niet zeer aan stooren, by aldien iemand den gemelden Vlinder onder de tweeflachtigen wil plaatsen, of hem geheel uit die soort uitsluiten. Men zy maar zo goed van myne kleene Eigenzinnigheid, waar door ik hem voor geen tweeflachtig Insect houde, wat in te schikken, tot zo lange, tot dat de duidelyke ervaarenis beslisse, of deeze Vlinder Manlyk of Vrouwlyk, dan of hy een Manwys zy. Onderuiffchen moet ik hier nog aanmerken, dat ik hem, wanneer hy weezenlyk tweeflachtig ware, in zeker opzicht voor volmaakter zou houden, dan de Hollandsche *Uilen-Basterd*; vermits hy aan beide de zyden twee even groote Vleugels heeft, welken hem in 't vliegen dienstiger moeten zyn, dan die ongelyke Vleugels den anderen. Doch in een ander opzicht moet onze Vlinder voor dien van SCHÄFER zwichten, en de zyne volmaakter geacht worden; om dat dezelve de kentekens van zyn tweederleie geslacht onbetwistbaar doet zien; welken de onze daarentegen in 't geheel niet toonen kan. Jammer is het, dat de Bezitter van den *Uilen-Basterd* ook deszelfs inwendige deelen niet heeft laaten onderzoeken. Mooglyk zouden daar door die geenen, welken, (in weerwil van SCHÄFER's duidelyke bewyzen,) het onbegrypelyk voorkomt, dat dit tweeflachtige Insect geleefd zou hebben, krachtiger van de waarheid overtuigd zyn geworden: en veelligt zouden dan alle de zodanigen die de tweeflachtigen uit het Ryk der Natuure verbannen, (beweerende, dat alle Schepzels, die men voorgeeft tweeflachtig te zyn, slechts een deel te groot of te kleen hebben,) zich genoodzaakt gezien hebben, hunner stellinge vaarwel te zeggen, en het andere Gevoelen te omhelzen.



*Beschryving van drie zeldzaame WESTINDISCHE VLINDERS,
twee groote, en één kleenen.*

§. 1.

TAB. VII
en VIII.

De twee groote Vlinders, hier op de zevende en achtste Plaat afgebeeld, zyn, wel is waar, reeds voor meer dan vyftig jaaren, door de bekwaame hand van Mejuffrouw MERIAN, in haar groot Werk over de Surinaamfche Infeften, Pl. XXXI en LXVII. voorgesteld. Zulks zal echter, hoope ik, de zodanigen, die 't gemelde beroemde en prachtige Werk bezitten, mynen tegenwoordigen arbeid niet voor nutloos en overtollig doen houden; beweerende, dat ik, in derzelver plaats, liever onbekende, en nog door niemand beschreeven Schepzelen had moeten afmaalen. Ik vertrouw althans, dat ik my, tegen zulk eene bedenking, zal kunnen verontschuldigen, door de getrouwe navolging der Natuur, welke ik hieromtrent in acht heb poogen te neemen; gelyk een ieder, die deeze Vlinders oorspronglyk bezit, uit eene vergelyking derzelven, en uit eene geringe beproeving van 't verschil, tusschen de afbeeldingen van Mejuffrouw MERIAN, en die van my, ligtyk zal ontdekken. Want, niettegenstaande ik haar de uitnemend schoone behandeling van het konstig Graveer-zyer geenszins ontzegge, durf ik nogthans een ieder wel laaten oordeelen, wie van ons beiden der Natuur het naaste kome; en wanneer men bevindt, dat haare afbeeldingen de mynen, in dit opzicht, overtreffen, dan zal ik my gewillig laaten beschuldigen, van overtolligen arbeid gedaan te hebben. Maar, gesteld zynde, dat ik my, ook op deezen grond, volstrekt geen voordeel en gunstig onthaal van myne Platen konde belooven, dan zou ik evenwel nog daar in vergenoeging vinden, dat ik den Liefhebberen van myne bladen, die het Werk van Mejuffrouw MERIAN niet bezitten, op deeze wyze iets ter hunner voldoeninge kan voorleggen, 't welk zy buiten dat niet zouden gehad hebben. Ja ik zou het voor my zelven niet hebben kunnen verantwoorden, indien ik nagelaaten hadde, deeze schoone Uidlandsche Schepzelen aftebeelden. De grootste Natuuronderzoekers, onder welken ik thans alleenlyk eenen REAUMUR wil noemen, hebben zich niet geschaamd, zulke Infeften, te onderzoeken, en te beschryven, waar mede reeds anderen voor hun zich bezig gehouden hadden.

§. 2.

Wyders geloof ik ook niet, dus doende tegen den aart der inrichtinge myner Bydraagen, (die ik, niet met betrekking tot andere Werken, Bydraagen tot de Na-

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 4.



Natuurlyke Historie * genaamd heb; doelende met die benaaming alleen op de ver- TAB. VII
en VIII.
meerdering van RÖSELS Werk;) te handelen. Want door den mond van twee getuigen wordt eene zaak of sterker bevestigd, of sterker ontkend; en de Liefhebbers der Natuurlyke Historie kunnen, op de onderzoeking van een tweeden, de waare gesteldheid der zaake altoos nog beter inzien. Dus bevestigde, by voorbeeld, ZWAMMERDAM de gegrondheid der waarneemingen van MALPIGHIIUS, en wederlei integendeel, aan den anderen kant, de valsche opmerkingen van GODART.

§. 3.

Op dat my intusschen niemand zoude kunnen beschuldigen, dat ik de Plaatën van Mejuffrouw MERIAN slechts nagemaakt zou hebben, zo heb ik aan de tegenwoordig afgebeelde Vlinders niet alleen in de vlucht eene andere houding gegeven; maar hen ook op de onderste zyden afgebeeld; het welk de opgenoemde Kunstenaars, omtrent den tegenwoordigen zwartbruinen en geelgevekten, niet gedaan heeft. Men zal daarbenevens nog wel te meer willen gelooven, dat ik myne Vlinders naar de oorspronglyken afgebeeld heb, daar ik den geenën kan noemen, aan wiens gunstige mededeeling, ik zulks te danken hebbe. Het is, naamlyk, de in onze vorige bladen reeds genoemde zeer ervaren Insecten-Kenner, de Heer J. N. KORNER, te *Frankfort* †; die my niet alleenlyk reeds veele schoone Inlandsche Insecten medegedeeld, maar my ook met de aangenaame hoop op meer geveid heeft.

*De groote buitengemeen schoone, zwartbruine, en geelgevekte
WESTINDISCHE DAGVLINDER; behoorende tot
de tweede Classe.*

§. 4.

Nu voorts tot de beschryving deezer schoone Vlinders zelve overgaande, zal TAB. VII
ik een aanvang maaken met dien, welke op *Tab. VII. Fig. 1* en *2.* is afgebeeld. *Fig. 1.*
De Vlinder is in de 1ste *Fig.* vliegend, en gevolglyk op de bovenste zyde zyners en 2.
vier Vleugelen te zien. Deeze Vleugelen hebben, over het geheel, eene zeer

F

don-

* De Hoogduitsche Tytel van dit Werk naamlyk is, *Beyträge zur Natur-oder Insecten-Geschichte.*

† Aan deezen dienstvaardigen Liefhebber heb ik ook te danken de verklaring der woorden *Pages* en *Capel*, waarmede men zoms onderscheidene soorten van Vlinders benoemt; en ik oordeel my verplicht te zyn, die verklaring in deezen te melden; op dat een ieder, noemens dit onderscheid tusschen die beide soorten van Vlinders, kundig zy. Een *Page* is dan een Vlinger, die lange en uitgeschulpte, maar een *Capel* een, die ronde Vleugels heeft. Volgens deeze onderscheiding zouden de twee tegenwoordige groote Vlinders tot de *Pages*, maar de kleinste onder de *Capellen* behooren.

TAB.
VII.

donkere zwartbruine grondverwe; waar in, in ieder Voorvleugel overdwars, zeven, door de Aders der Vleugelen afgedeelde, zeer groote en aanmerkelyke dooiiergeele vlekken staan. Voor en onder dezelve, zyn nog zeven of acht andere en veel kleinere vlekken van dezelfde koleur. De beide Achtervleugels, die zeshoofdig uitgeschulpt, en met eene niet zeer lange vleugelspits versierd zyn, fluiten eene gantsch groote dooiiergeele vlek in; welke zich, van de inleding des Vleugels af, tot byna over het midden, uitbreidt, en in die gedaante dwars door den geheelen Vleugel loopt. Wyders staan, voor den uit-en-ingeschulpten vleugelrand, tusschen de Aderen, behalven eene kleine Peerswyze dooiiergeele, vyf fikkelvormige bleek-okergeele vlekken, benevens nog eene dergelyke oranjegeele vlek. Voor deezen ziet men verder vier andere duister-graauwachtig-geele stofvlekken; welken, by eene opmerksaame beschouwing der afbeeldinge, beter, dan door de beschryving, te kennen zyn. Het bovenste Voor- en Achterlyf, zo wel als de Kop, aan welken men echter eenige zeer kleine dooiiergeele vlekken ziet, heeft, over het geheel, eene zwartbruine verwe.

§. 5.

De 2de *Fig.* vertoont deezen Vlinder zittende, in welken stand de onderste zyde der Vleugelen zichtbaar is; en deeze geeft de bovenste zyde zo min in schoonheid toe, dat zy, wegens de meerdere en schoondere vlekken, veel eer met dezelve om den voorrang stryde. Men merke daaromtrent slechts aan, dat de grond des Voorvleugels hier niet zwart, maar helderer, naamlyk schaduwwachtig-bruin is. De op de bovenste zyde reeds beschreevene, en door de Aderen in zeven deelen verdeelde vlekken, zyn, benevens de overige kleineren ook hier weder zichtbaar; doch ze hebben eene helderer, naamlyk, eene bleekdooiiergeele verw. Achter of tegen over dezelve staan, in eene rechte lyn, aan den buitenrand, tien kleine dooiiergeele vlekken, die men op de bovenste zyde van den Vleugel niet gewaar wordt. De Achtervleugel is de schoonste; dezelve pronkt met eene zeer groote helder-geele vlek; welke zich hier wat grooter, dan op de bovenste zyde, vertoont, en den Vleugel, van de inleding af, tot over het midden, vervult: zynde vervolgens daarenboven met eene driedubbele rei van zeer schoone vlekken, in een donker zwartbruinen grond, en tusschen de Aderen versierd. De eerste rei bestaat uit zes halfronde tweespitfige oranjegeele vlekken; waarop zeven andere grootendeels maanvormige heldere dofblauwe, en voorts nog zeven andere ook maanvormige, maar dofgeele vlekken, (waar van echter de helft der kleinste oranjegeel is,) volgen. Alle deeze vlekken geeven den Vleugel een prachtig aanzien, en leveren ons een voortreffelyk blyk van de onmeetbaare wysheid des Scheppers; die deeze, anderzins zo gering geschatte Schepzelen, boven veele anderen, zo uitermaate versierd heeft.

§. 6. Het

§. 6.

Het Voor-en het lange smalle Achterlyf, (uit kracht van 't welke deeze TAB. Vlinder voor een Mannetje te houden is,) benevens de twee Baardspitsen, en VII. drie paar volkomene Pooten, (die, wel is waar, aan het oorspronglyke ontbraken,) zyn van eene bleek-okergeele verwe; en de Vlinder behoort, volgens deeze kentekenen, onder de tweede Classe der Dagvlinders. De beide Voelhoornen en de Zuiger zyn zwart; maar de Oogen donker-rood-bruin. Van wegens de gestalte zyner Achtervleugelen, en inzonderheid van wegens de drie paar Pooten, kan hy zynen oorsprong aan geene andere, dan aan eene mede tot de tweede Classe behoorende Rups; en overdwars vast gesponnen Pop te danken hebben.

§. 7.

Van deezen Vlinder nu zegt Mejuffrouw MERIAN, dat hy dezelfde zy, met dien op de naastvolgende VIII^{de} *Tab.* afgebeeld, schoon hy in de koleur zeer veel van denzelven verschille. In hoe verre dit voorgeeven gegrond zy, zal ik gevoeglyker onder by §. 12. en vervolgens aantoonen; en gaa nu eerst over tot het beschryven van den kleenen Westindischen Dagvlinder, mede op deeze VII^{de} *Tab.* afgebeeld; dien ik, naar de bovenste zyde zyner Vleugelen, aldus omschryve.

De kleene graauwachtig-bruine, met twee kleene zwarte Vleugelspitsen versierde WESTINDISCHE DAGVLINDER, behoorende tot de tweede Classe der Dagvlinders.

§. 8.

De 3^{de} *Fig.* vertoont ons de zyde zyner Bovenvleugelen, die, zo wel in TAB. den Voor-als Achtervleugel, eenen iets donkeren graauwachtig bruinen grond VII. heeft, in welken slechts twee kleene zwarte vlekken zyn; staande aan den buitenrand van den Achtervleugel. Elke Achtervleugel heeft daarbenevens twee zwarte, met een wit eindje versierde Vleugelspitsen; welker eene langer is dan de andere; men ziet ze beiden aan den buitensten rand der Vleugelen. De Kop, even als het Voor-en Achterlyf, heeft eene zwarte koleur. Fig. 3. en 4.

§. 9.

In de 4^{de} *Fig.* zien wy deezen Vlinder in eene zittende gestalte, en ontdekken dat de onderste zyde der Vleugelen, over 't algemeen, eene helder bruinachtig-graauwe gronoverwe heeft. Hierin ontdekken wy, eerstlyk, in den Voorvleugel, eene geelachtige bruine gehakkelde dwarsvlek, die zwart en wit

TAB.
VII.

geboord is; daarbenevens eene heen en weder getande graauwachtig-bruine linie, en een zeer klein zwart streepgelykend vlekje. De Vleugel zelve is zeer final, en bruin bezoomd. De Achtervleugel heeft, in denzelfden grond, verscheidene ring- en maanvormige bruinachtig-geele vlekken, die grootendeels zwart en wit omzoomd zyn. Behalven deezen staat, in den buitensten Vleugelhoek, nog eene zwarte vlek; en eene oranjegeele, met een zwart stipje bezet, aan den buitensten bruinen zwart en wit geboorden rand, voor de beide zwarte Vleugelspitzen; en daar nevens eene gehakelde graauwe wit geboorde dwarslinie; welke aan den voorsten Vleugelrand begint, en in den witachtigen binnenrand aan het Achterlyf eindigt. Het Voorlyf, de drie paar Pooten en de twee Baardspitfen, hebben eene dofachtig witte, en het dikke Achterlyf, volgens 't welke de Vlinder onder de Wyfjes behoort, eene geele koleur. De Voelhoornen zyn zwart, en de Oogen zwart-bruin. Ongetwyffeld moet men zyn oorsprong uit ééne der soorten van de zogenaamde Schild-Rupsjes afleiden; en om die reden zou ik wel durven beweerén, dat zyne Pop, volgens den aart van allen, tot de tweede Classe behoorende Poppen, niet loodrecht gehangen heeft; maar, door middel van een draad, over dwars aan een Boom, Heester of ander Gewas, vastgesponnen moet geweest zyn.

De groote donker-olyf-groene, Fluweel gelykende WESTINDISCHE DAGVLINDER, met zwart-en helder-groen ge-vlekte, uitgeschulpte Achtervleugelen, uit SURINAMEN, behoorende tot de tweede Classe.

§. 10.

TAB.
VIII.
Fig. 1.
en 2.

In de 1ste Fig. ziet men de bovenste zyde der Vleugelen; en bemerkt dat beide de Voorvleugelen, voor het grootste gedeelte, eenen donker-olyfgroenen grond hebben, die, naby de inleding des Vleugels, in eenen donkerbruinen grond wegsnelt. Deze grond echter gelykt, ter plaatse, daar hy helderer en blaauwachtig-groen begint te worden, door deszelfs glans vry wel naar Fluweel. Hier uit gis ik, dat, of de grond, of de zelfstandigheid der vederstof, by deezen Vlinder anders moet zyn, dan by de overigen zyner Classe; of dat 'er, op de vlakke des Vleugels, iets byzonders moet weezen, dat, om zo te spreken, eene soort van Vooren of Groefjes maakt, welken de verandering der verwe, of het Fluweelachtige veroorzaaken. (*) Voorts zyn de Vleugels niet uitgeschulpt; schoon derzelver buitenrand eenigzins in- en uitgesneede schynen te weezen.

(*) Ik zou de mosite genomen hebben, om de oorzaak deezer lichtspeeling, door goede Vergrootglazen, te ontdekken, indien de Vlinder my in eigendom toebehoord hadde. Dan, naar dergelyke onderzoekingen, hoe behoedzaam men ook zy, zeer ligtyk eene beschadiging kun-

Fig. 1.



Fig. 2.



C. F. C. Klemann fecit et exc.

zen. Niet verre van deezen rand is slechts ééne éénige smalle helder-geel-groene vlek, van eene slangachtige gedaante. De Achtervleugels zyn, kort by de inleding, donker- olyf- groen; en hebben, in 't midden, eene groote glinsterende helder-geelachtige, groene, overal by de Vleugeladeren spits-toeloopende vlek; in welke zich, tusschen de Aderen, nog zes anderen, van vooren spits-toeloopende zwarte vlekken vertoonen; die, naar den olyf- groenen uitgeschulpten rand, in eene fikkelswyze helder-groene vlek, ingevat zyn, en overal eene helder- blaauwachtige groene vlek, van dezelfde gedaante, in zich sluiten. 'Er staat eene dergelyke fikkelvormige, doch purperroode vlek, in den buitensten hoek, aan den binneurand des Vleugels. De Kop, met eenige kleine dof-geele punten bezet, is, benevens het Voor-en Achterlyf, geheel donkerbruin.

Taf. VIII.

§. II.

In de 2^{de} Fig. vertoont deeze Vlinder zich zittende; en dus valt de kleur van den Voorvleugel meer in het bruine, dan in 't olyf- groene; echter speelt in dezelve hier en daar nog een dof- groen licht; ook ontdekt men, naby den buitensten Vleugelrand, de kronkelende helder-geel- groene vlek, die wy op de bovenste zyde waargenomen hebben; doch dezelve is hier wat kleiner. De Achtervleugels hebben, van de inleding af, tot over het midden, een koffy-bruinen grond; daar op volgt nog een andere recht zwart bruine grond; die zich tot aan 't einde des Vleugels, in alle de uitschulpingen uitbreidt; en drie reien, deels hart-, deels fikkel- en deels ook maanvormige vlekken, tusschen de Vleugeladeren heeft, welke reien, te saamengenomen, deezen Vleugelen tot een heerlyk sieraad verstrekken. De eerste rei vervat zeven vlekken, die allen eene bruinroode kleur hebben; de tweede bestaat mede uit zeven iets smallere en dof- helder- blaauwe vlekken; en de derde rei, die aan den buitensten Vleugelrand is, heeft slechts zes, en wel schoone hoog- zwavel- geele vlekken. Vervolgens ziet men in den buitensten hoek, en in de laatste uitschulping des Vleugels, dezelfde fikkelvormige vlek, die ter eigenster plaatse op de bovenste zyde, purperrood was, doch zich hier wat grooter en helderrood vertoont. Deeze Achtervleugels hebben een achtvoudigen, meerendeels spitsachtig uitgeschulpten rand, op deeze zyde voorzien van een dof- witachtig zoompje, tusschen de spits-toeloopende uitschulpingen, van welken de vyfde eene kleine Vleugelspits heeft. Het Voor- en het dikke korte Achterlyf, een kenken van 't Vrouwelyk geslacht, benevens de drie paar Pooten, zyn bruin. De Borst is van voren, en in het midden, geel gestreept. Het Achterlyf is, over langs, met een dof-geelen zystreep gerekend. Aan de Baardspitsen vertoont zich eene geele, aan de Oogen eene donker- rood- bruine en aan de Voelhoornen en Zuiger eene gantsch zwarte kleur.

F 3

§. 12. By

kunnen veroorzaaken; zo zal de genegen Leezer zo lang geduld gelieven te neemen, tot dat ik mogelyk de gelegenheid bekome, om de reden van die lichtspeeling nader te kunnen onderzoeken.

§. 12.

TAB.
VIII.

By de Beschryving van den grooten zwartbruinen en geelgevekten Vlinder, heb ik §. 7. gezegd, dat Mejuffrouw MERIAN deezzen laatst beschreeven, met den eerstgemelden, voor een en denzelfden Vlinder hield. De reden voor dit haar gevoelen is, dat ze beide de Vlinders, volgens haar voorgeeven, uit eenerleie Rupfen heeft zien voortkomen. Zy laat zich deswegens in haar groot Werk *bladz.* 31. aldus uit. "Ik heb den 26^{ten} *Augustus* 1700, in *Surina-men*, etlyke violet-bruine schoon gevlekte Rupfen aangetroffen, die zich „onthielden op kleene Limoen-boomen, en ook op eene soort van witte Roozen, die TOURNEFORT met recht *Kermias Sinensis*, met eene roode vrucht, „noemt. Ik heb ze met de Bladeren van opgemelde Gewassen onderhouden, „tot op den 30^{ten} *Augustus*; wanneer ze veranderden in aschverwige Poppen; „die my, op den 14^{den} *September* van het zelfde jaar, deeze twee zo zeer „verschillende Vlinders gegeven hebben." Den op myne VIII^{ste} *Tab.* afgebeelden vertoont zy zittende; en den vroeger beschreeven vliegende, op de XXXI^{te} *Tab.* van haar Insectenwerk, benevens de Rups en Pop; welke beiden, tot de tweede Classe der Dagvlinders behooren.

§. 13.

Ik zou dit bericht zonder verdere onderzoeking in zyne waarde gelaten hebben; te meer, daar ik my niet gaarne bezig houde, met het wederleggen van eene zo groote, en, met opzicht tot het Ryk der Insecten, zo geagt Kunstkenster, als Mejuffrouw MERIAN geweest is; indien men my, by een volkomen stilzwygen, niet billyk zou hebben kunnen tegenwerpen, dat ik, hier, ter oorzaake van het groot onderscheid tusschen beide deeze Vlinders, desaan gaande eenige opheldering had moeten geeven. Men zou my met recht gevraagd hebben, of 'er, by eene zelfde soort van Schepzelen, zulk een groot onderscheid van koleur plaats kon vinden? of 'er dergelyke voorbeelden voorhanden zyn? en, indien ze gevonden worden, of dan zulke soorten van Vlinders eene bestendige verandering onderworpen zyn? en of zy ook niet zomtyds, in eene geheel andere koleur, dan de beide boven beschreeven, verschynen kunnen, gelyk zulks in het Bloemen-en Planten-Ryk dikwyls geschiedt? als mede, of deeze twee verschillende koleuren niet veelligt het onderscheid der Geslachten aanduiden? dan of de Indiaansche Vlinders in dat opzicht iers byzonders boven de Inlandschen hebben? Nadien men deeze en soortgelyke vraagen zou hebben kunnen doen, zo heb ik het niet ondienstig geoordeeld, myne gedachten hieromtrent nederig open te leggen; vertrouwend dat dezelve, schoon zy al niet sterk genoeg zyn voor eene volkomene wederlegging, nogthans veel waarschyntlyker zullen weezen, dan die, welken Mejuffrouw MERIAN te berde brengt.

§. 14. Het

§. 14.

Het verschil van koleuren heeft wel eens, doch zeer zelden, by het geslacht *Tab.* van Vlinders, die van eenerleie soort zyn, plaats; waar van onder de Inlandschen *VIII.* zekerlyk meer dan één voorbeeld, zo wel onder de Dag-als Nachtvinders, voor handen is. En welken Insecten-Kenner en Liefhebber zyn deeze soort van Vlinders onbekend, of niet reeds onder het oog gekomen? Zelfs in de Natuurlyke Historie der Insecten van RÖSEL, zien wy, op verscheidene plaatsen, dergelyken in de koleur onderscheidene, doch voor het overige tot eenerleie soort behorende, Schepzelen, door eene getrouwe navolging afgebeeld. (*) Maar hier omtrent staat aan te merken, dat ze evenwel alle jaaren weder met dezelfde, en geene andere koleur, verschynen: anders toch zou men hen eindelyk niet meer, van anderen, hun eenigzins gelykende, en echter verschillende soorten, kunnen onderscheiden. Zy vertoonen zich even als in de voorgaande tyden, en ongetwyfeld zelfs zo, als ze sedert het scheppend woord des Almagtigen, — DAAR ZY — enz: geweest zyn. Alle deeze soorten van levendige Schepzelen zyn gevolgelyk aan zulk eene groote verandering, als de Bloemen, Planten, enz: niet onderworpen. De Oostindische Vlinders hebben hier in ook niets byzonders; en 't Mannetje onderscheidt zich, by voorbeeld, van het Wyfje, door dezelfde kentekenen, als het vry groot getal van Inlandsche Vlinders, welken door den Heer RÖSEL, in het Eerste en Tweede Deel van zyn meergenoemd Werk, afgebeeld zyn.

§. 15.

Mejuffrouw MERIAN schynt des beide deeze Vlinders, met recht, voor Schepzelen van eenerleie soort te houden; schoon zy niet zegt, dat het Mannetje zich door de koleur van het Wyfje onderscheidt. Ook zou ik aan haar gevoelen myne toestemming geeven, ware het niet, dat zy zichzelve, door het voortstellen van twee Rupsen en Poppen, die zy op *Tab.* XVII en XXXI. afbeeldt, en, gelyk § 7. gezegd is, op *blad.* 31. voor eenerleie Rupsen gehouden, en, behalven op de witte Roozen, ook op de kleene Limoen-Boomen aangetroffen zou hebben, wedersprake. Elk toch, die deeze twee Afbeeldingen beschouwt, moet terstond erkennen, dat beide de Rupsen en Poppen twee zeer van elkander onderscheidene Schepzelen zyn. De Rups op *Tab.* XXXI. is glad; en die op *Tab.* XVII. is doornachtig; ook heeft derzelver Pop eené grynsvormige gedaante. Uit deeze laatste nu heeft geene der beide Vlinders kunnen voortkomen, doch wel uit de eerste: vermits zy, van wegens de die paar Pooten en de beide Achtervleugelen, tot de tweede en niet tot de eerste Classe, waar

(*) Zie Eerste Deel onder de tweede Classe der Dagvinders, *Tab.* VIII. *Fig.* 5-8. en onder de tweede Classe der Nachtvinders, *Tab.* III. *Fig.* 5-7. Zie ook Derde Deel, *Tab.* XLVI. *Fig.* 1-3.

TAB.
VIII. waar onder de Doornrupsen behooren, gebragt moeten worden. Ondanks dit alles, heeft Mejuffrouw MERIAN ze echter voor eenrele Schepzelen gehouden.

§. 16.

Buiten dat, ze heeft op de LXVII^{te} *Tab.* ook nog eenen Vlinder in de vlucht voorgesteld, dien ik, wegens zyne verwen en vlekken, voor dien, welken ik hier op *Tab.* VIII. afgebeeld heb, houde; niettegenstaande zy hem, gelyk op de aangewezen plaats blykt, volstrekt onder de Nachtvogels geplaatst, en eene *Phalene* genoemd hebbe. Intusschen schynt de daarbyznde Rups, die zy als veelverwig en gemarmerd beschryft, en waar van ze voorgeeft, dat dezelve zich den 31^{sten} *Juny*, ingesponnen heeft, en in eene geele Pop (*) veranderd is, benevens derzelver Pop, veel eer onder de Dag- dan Nachtvinders te behooren. Van deeze Rups, welke, met die op *Tab.* XXXI. door haar voorgesteld, veel meer gelykheid heeft, dan met de op *Tab.* XVII. verbeelde Doornrups, zegt zy: — "Dat de Kop met twee hoornen voorzien is; die „ze uittrekken kan, waar mede zy zich verweeren, en vergiftige steeken toe-, brengen kan." De gelykheid, welke deeze Rups met die van *Tab.* XXXI. heeft, kan Mejuffrouw MERIAN wel tot die dwaaling, en dit denkbeeld gebragt hebben, dat zy eenerleie Schepzelen zyn. Zo kan ook onze tegenwoordige Vlinder, (te meer daar hy by deeze Rups afgebeeld is,) wel uit deeze gehoornde en geene andere Rups voortgekomen zyn; en niet minder kan ook de op *Tab.* VII. afgebeelde Vlinder afstammen uit de Rups, welke op de XXXI^{te} *Tab.* van Mejuffrouw MERIAN vertoond wordt. Maar de Doornrups, op de Limoen-Boomen gevonden, kan echter volstrektlyk niet tot deeze soort van Vlinders behooren. Eindelyk, indien deeze beide Vlinders eenerleie Schepzelen zyn zouden, dan moesten zy ook uit eenerleie, naamlyk, uit eene gladde en niet uit eene Doornrups voortgekomen wezen. Het zy my derhalven geoorloofd, dezelve zo lang voor twee verschillende soorten te houden, tot dat ik door een gegrond onderzoek van het tegendeel overtuigd worde.

B.Y.

(*) Deeze is op dezelfde Plaat, op een Vygenblad liggende, doch niet ingesponnen te zien.

BYVOEGZEL.

Behelzende eenige Aantekeningen van den Heer
KLEEMANN, nog behoorende tot
TAB. V — VIII.

Vermits de navolgende aantekeningen van den Heer KLEEMANN ons te laat ter hand gekomen zyn, zo hebben wy 't raadzaamst geoordeeld, dezelve, by 't afsloopen der beschryvinge van TAB. VIII., als een Byvoegzel te plaatsen.

Bladz. 25. §. 3. WESTINDISCHE DAGVLINDER *der tweede Classe.*] By Linn. in *Syst. Nat. Edit. XII. p. 788. sp. 223. Pap. Plebej Rural.* heet hy den naam van *Marsias*, den Indischen blaauwgroenen zwartgestippelden Tweestaart.

Bladz. 27. §. 7. by die soort van Vlinders geplaatst moet worden.] Ik vermoed echter, dat de Eyeren van die soort van Uitlandsche Dagvlinders zo min eene kegelachtige of langwerpig ronde gedaante zullen hebben, als de meeste van onze Inlandsche Dagvlinders, tot deze soort behoorende. Hunne Eyeren zullen naastdenkelyk veeleer half rond, en met veele groeffjes of holligheden voorzien zyn. Door zulk eene gedaante althans, laten zich de Eyeren deezer Dagvlinders, van veele anderen, die mede tot de tweede Classe van den Heer RÖSEL behooren, onderscheiden. Ik hoop dit onderscheid met den tyd, door eene naauwkeurige afbeelding, duidelyk te doen zien.

Bladz. 27. §. 8. CHINEESCHE DAGVLINDER van de eerste Classe.] Linnæus haalt in zyn *Syst. Nat. Edit. XII. op Pap. Nymph. G. by Almana* p. 769 No. 132. aan, *Rös Add. of Kleem. Beytr. T. V. F. 3. 4;* doch deeze aanhaaling behoorde veelligt beter by de volgende No. 133 *Pap. Aferia*, de *Chineesche Pauw*, het *Chineesche Pauwenoo*. Nogthans wil ik, met den Heer LINNÆUS, deezen Vlinder den naam van *Almana* of *Afatischen Pauwen Spiegel* wel laten behouden. Ik heb het Wyfje afge-

beeld: want het Mannetje heeft een veel dunner en buigzaamer Achterlyf; en, in de Voor-vleugelen, twee zwarte, met een geelen en zwarten kring omzoomde, Oogvlekken: waarvan de eerste, die niet ver van den voorsten bovenhoek des Vleugels afstaat, de kleinste is. Deeze Vlinder zal niet alleenlyk in *China*, maar ook in geheel *Oostindien* te vinden zyn. 'Er is nog eene andere soort, die, op de bovenzijde des Vleugels, veel gelijkheid met deeze heeft; maar derzelver Vleugelrand loopt in meer spitzen uit; en op de beneden zijde des Vleugels vertoont zich eene donkerer en bruiner grondverwe. Ook ziet men in deezen Vleugel van de Oogvlekken geheel niets. Mogelyk is deeze de *Almana* van den Heer LINNÆUS.

Bladz. 32 §. 3. ook deezen Vlinder] Ik heb sedert nog eenen anderen dergelyken Uidlandschen Dagvlinder gezien; die, gelyk deeze, op zyne Vleugelen geene vederen of schubbenstof had: — gevolgelyk is deeze niet de eenigste van die soort.

Bladz. 33. §. 7. INDISCHE DAGVLINDER met doorzichtige Vleugelen en vederachtige Oogspiegels.] By LINNÆUS in *Syst. Nat. Edit. XII p. 754. sp. 52. Pap. Equef.* heet deeze Vlinder *Piera*, den *Glasvleugel*. Ik heb in *§. 1. bladz. 31.* wel gezegd, dat ik onder de Indische Vlinders, door de beroemde Mejuffrouw MERIAN, in haar groot Werk over de Surinaamsche Insecten afgebeeld, deezen niet gevonden heb: doch wat laater dit Werk met alle opmerkzaamheid weder doorgezien hebbende, moet ik nu bekennen, dat ik heb kunnen dwaalen. Want Mejuffrouw MERIAN schynt het Wyfje van deezen Vlinder afgebeeld te hebben op de XVI^{de} Plaat, vliegende boven, by een bloeienden en vruchtdraagenden tak van een Amerikaanschen Caschouboom, benevens eene hairige op het blad van den gemelden tak zittende Rups; welke Rups zy, doch zeer waarachynlyk geheel verkeerd, voor die van deezen Dagvlinder opgeeft. — "Ik vond, zegt zy, in het jaar 1701, op „deezen boom tweeërleie soort van Rupfen, waar van de eene zo wit als „sneeuw, en zo hairig was, als die op het blad ligt; deeze heb ik met dit „loof gevoed tot den 3 Maart, wanneer hy veranderd is in eene bruine Pop, „waar uit den 18 Maart een doorzichtige Vlinder te voorschyn kwam, gelyk „deeze hier vliegend vertoond." Dan hieromrent heb ik aantemerkten, dat haare afgebeelde Rups nog langere haren heeft, dan die, welke ik, in dit *Vervolg* op *Tab. XVII. Fig. 1 en 2.* zal voordraagen; en waar mede zy, (de Pyramiedswyze Hairborstel uitgenomen,) veel overeenkomst heeft. — Verder, my is, onder de Dagvlinder Rupfen, niet één eenige bekend, die, volgens deezen aart van veele Nachtvlinger Rupfen van RÖSELS tweede Classe, met lange haren bezet is. Hierby komt nog, dat de Pop, in welke zy veranderd zou wezen, wegens de over zich heen gesponnen dwarsdraaden, tot de tweede Classe der Dagvlinders; en wegens haaren loodrecht hangenden stand, en reffens bultige grynsvormige gedaante, tot de eerste Classe der Dagvlinders schynt te behooren. Dit alles doet my denken, dat Mejuffrouw MERIAN, (gelyk haar meermaalen gebeurd is,) de waare Rups, die zy bo-

boven op den tak van den Caschou-boom, afgebeeld schynt te hebben, en die zy als rood, en zeer raslopende beschryft, ongelukkiglyk, met eene andere, die zich insgelyks op de bladen des Caschou-booms bevond, verwisseld heeft: en de verandering der Poppe zelve niet gezien hebbende, kan zy, gevolgelyk, de waare Pop, zeer ligtyk verkeerd voor de Pop der met lange hairen bezette Rups, (die zich waarschynlyk, in den op het zelfde blad zittende afgebeelden kleinen Nachtvliinder veranderd heeft,) genomen hebben. Naar myn vermoeden heeft Mejuffrouw MERIAN de rechte Rups van deezen Vliinder, boven op den bloeienden Caschou-tak afgebeeld. Deeze Rups, heeft korte hairen, en van achteren, overeenkomstig met den aart der zogenaamde, tusschen de tweede en eerste Classe der Dagvlinders, behoorende Midden-Insecten, twee horizontaal uitsteekende doornspitsen. Deeze nu schynt derhalve in de waare Pop van deezen Vliinder, die Mejuffrouw MERIAN, verkeerdlyk, voor de Pop der langhairige Nachtvliinder Rups opgeeft, veranderd te zyn.

Bladz. 39. §. 19. onder de tweeslachtige Insecten behooren.] Van de Bladluizen weet ik tegenwoordig, uit eigene ondervinding, zeker, dat zy zo wel zonder paaring, als door middel van dezelve, voortteelen; en dat zy in de Lente en den Zomer leevendige Jongen baaren, doch in den laaten Herfst Eyeren leggen. Of zy nu daarom voor tweeslachtig gehouden kunnen worden, wil ik anderen laten beslissen.

Bladz. 41. §. 4. WESTINDISCHE DAGVLINDER; behoorende tot de tweede Classe.] Deeze Dagvliinder is den Insectenkenneren thans onder den naam *Polycæon* bekend.

Bladz. 43. §. 8. WESTINDISCHE DAGVLINDER, behoorende tot de tweede Classe der Dagvlinders.] By Linn. in *Syst. Nat. Edit. XII. pag. 788. sp. 224. Pap. Plebej Rural* heeft hy den naam van *Echion*, het roode Hoekoog. Zyne verblyfsplaats zou in Amerika te NieuwYork; en in Afrika op de Kaap de Goede Hoop zyn.

Bladz. 44. §. 10. uit SURINAMEN, behoorende tot de tweede Classe.] Men heeft deezen Dagvliinder zeer verkeerdlyk voor den *Glaucus* van Linn. *sp. 9.* en voor den *Polydorus* van Linn. *sp. 10.* gehouden. Hy is geen van beiden; maar is tegenwoordig onder den naam *Piranthus* bekend.

Bladz. 48. §. 15. voor eenereleie Schepzelen gehouden.] Schoon ik nog blyve vermoeden, dat de Vliinder door Mejuffrouw MERIAN, op haare XXXI^{te} *Tab.* boven aan in een zittenden, benevens die op haare LXVII^{te} *Tab.* boven aan, in een vliegenden stand, (welke die door my op *Tab. VIII* afgebeeld schynt te wezen,) met dien, door haar op *Tab. XXXI* onder aan, en door my op *Tab. VII* afgebeelden Dagvliinder, niet uit eenereleie soort van Rupsen, gelyk zy op *bladz. 31.* verzekert, voortgekomen zyn; ben ik echter tot eer van Mejuffrouw MERIAN verplicht, de dwaaling te herroepen, in welke my, de Vertaaler, die haar in 't Latyn en Fransch gedrukte Werk, over de Surinaamsche Insecten voor zich had, gebragt heeft. Want ik zie in de Hollandsche

uitgave op *blad.* 31. dat Mejjuffrouw MERIAN, in 't geheel niet zegt, dat de op *Tab.* XXXI. afgebeelde Rups, dezelfde is, als die, welke zy op de XVII^{de} *Tab.* vertoont: zy zegt alleenlyk: "op deeze Roofen, desgelyks op „kleene Limoenen-boomen, *fol.* 17. vindt men diergelyke witte, met brui-, „ne vlekken versciide Rupsen, als een op het blad zit, enz." Gevolglyk vervalt, met betrekking tot deeze Rups, myne tegenspraak, als niet wel gegrond zynde.

Bladz. 48. §. 16. dan Nachtvinders te behooren.] De Vertaaler heeft my ook hier doen dwaalen, doot Phalæne in plaats van Capellen te schryven: want in het Hollandsche Werk *blad.* 67 heeft Mejjuffrouw MERIAN, niet Phalæne, maar Capel gezet. Gevolglyk vervalt ook hier myne tegenbedenking.

Bladz. 48. §. 16. met twee hoornen voorzien is.] Men treft deeze soort van hoornen, waar van de Heer SCHÄFER, in zyn Werk, *Nieuw ontdekte deelen aan Rupsen en Kapellen*, *blad.* 7. in de aanmerking zegt, "dat zy zich „alleenlyk op het aanraaken vertoonen," ook in een paar Inlandsche Rupsen aan; by voorbeeld, in de bekende Venkelrups, waaruit de zogenaamde Venkelvlinder voortkomt: (zie den Heer DE REAUMUR, *Tom. I. P. II. Mem. XI. p. 151. sqq* en RÖSEL in zyn Insectenwerk, Eerste Deel tweede Classe der Dagvlinders, *Tab. I. Fig. 1 en 2.*) welke inderdaad met onzen boven beschreeven Indischen Vlinder, *Tab.* VII. veel overeenkomst heeft. Niet minder ontdekt men deeze hoornen in die Rups, welke de Heer SCHÄFER de Huislookrups, doch de Heer RÖSEL de Fluweel-zwarte Rups, met kleene oranjegeele vlekken noemt, en uit welke de in het Derde Deel, op *Tab.* XLV. voorgestelde, zeer schoone geelachtigwitte Dagvlinder, met hoogroode Oogspiegelen, te voorschyn komt. Zie den Heer SCHÄFER als boven, *blad.* 8. *Tab. I. Fig. 1.* en RÖSEL Vierde Deel, *blad.* 29. *Tab. IV. Fig. 1 en 2.* Maar noch RÖSEL, noch SCHÄFER, hebben opgemerkt, dat dergelyke Rupsen met hunne hoornen zo schadelyk steeken kunnen, als Mejjuffrouw MERIAN van de op *Tab.* LXVII. voorgestelde verhaalt; maar alleenlyk, dat zy een ten hoogsten ongevalligen reuk van zich geeven. De door RÖSEL in het Eerste Deel, de tweede Classe der Dagvlinders op *Tab. II. Fig. 1.* afgebeelde Pruimgeele Rups, die ook van eene groene koleur gevonden wordt.) en welke in den *Papilio Linn. Podalirius*, den *Zegelvlinder* of *Zwaluwenstaart* verandert, kan ook dergelyke hoornswyze deelen uitsteken, doch zy kan daar mede niet kweten. Ik zal in dit myn Vervolg 'er nog eene naauwkeurige afbeelding van mededeelen. Voorts staat my hier nog te melden, dat de opgenoemde Huislookrups zich, even als de Populierups, by haare verandering, met eenige draaden in een blad spint, doch niet zo sterk als de Nachtrupsen doen. 't Is dus wel mogelyk, dat de gehoornde Rups van Mejjuffrouw MERIAN zich dus inspinne, doch hier uit volgt niet, dat de daar uit komende Vlinder tot de Nachtvinders behoort.

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.





Beschryving van een zeldzaamen OOSTINDISCHEN
VLINDER; mitsgaders van eene Pop, uit welke de
inlandsche buitengemeen schoone WEERSCHYN-
VLINDER voortkomt.

§. 1.

Op deeze IX^{de} Tab beschouwen myne gunstige Leezers, nogmaals, een uit- TAB. IX.
 landschen Vlinder, dien ik mede van den Heer KÖRNER te *Frankfort* beko-
 men heb. Zyn Vaderland is, gelyk myn gemelde begunstiger verzekert, het
 ver afgelegen *China*; en ik geloove dit bericht te eerder, vernits het zeker is,
 dat 'er, in het groote Werk van Mejuffrouw MERIAN, over de Westindische
 Insecten, niet één Vlinder gevonden wordt, die met deeze eenige gelykheid heeft.

§. 2.

Vermits nu de Heer KÖRNER dien Vlinder den naam van de blaauw geverwde
Page geeft; doch een *Page* zulk een Vlinder is, die lange en uitgeschulpte Vleu-
 gels draagt, zo zal ik, ier ophelderinge en meerdere duidelykheid der benaamin-
 ge aeezes Vlinders, 'er nog iets byvoegen, en hem noemen,

Den donker-bruinen, met eene hoogblaauwe weerschynvlek ver-
sierden, witgevekten OOSTINDISCHEN DAGVLINDER
*der eerste Classe uit China.**

§. 3.

De eerste Fig. op de negende Plaat vertoont ons deezen Vlinder, in eene vlie- TAB. IX.
 gende gestalte; en in die houding zien wy de bovenste zyde van deszelfs vier Fig. 1.
 vleugelen. Dazelve heeft overal een donkerbruinen grond, waarop, in ieder en 2.
 Voorvleugel, omrent dertig, zo groote, als kleene witte vlekken staan; die
 zich, van het midden des vleugels, tot aan den buitenrand uitstrekken; en deels

G 3

* In Linn. *Syst Nat Edit. XII Pap. Danaus F p. 765. sp. 108.* wordt hy genaamd *Mida-*
mus, de Aziatische witgeprikkelde zwarte blaauwglaazige Vleugel, of de *Weerschyn-Vlinder*.
 'Er is nog eene andere soort, deeze zeer gelyk; welke in den voorsten Vleugel mede een
 blaauwen glans heeft; doch welke zich verder en byna tot aan het gewricht des vleugels uit-
 strekt; ook zyn by deezen de witte streepen, in den achtersten Vleugel, niet zo lang. — Ik
 zal denzelfen in dit myn *Vervolg* mede nog afbeelden.

TAB. IX. eene hartswyze, deels eene onregelmaatige, en niet wel te beschryvene, gedaante hebben. De kleinste der genoemde vlekken, gelyk aan den buitensten vleugelrand te zien is, maaken eene eenvoudige rei uit. Van de grooteren daarentegen staan de meesten in eene zeer groote schoone hoogblauwe weerschynvlek, die, over het midden van elken Vleugel, in een gantsch donkerbruinen grond pronkt, en zich op ieder beweging anders vertoont; naamlyk, nu eens donkerkoffybruin, en dan weder blauw, (gelyk hier op den rechter- en linker-vleugel te zien is;) waardoor deeze Vlinder een buitengemeen sieraad verkrygt; terwyl hy, zonder deeze groote blauwe vlek, zo schoon niet zoude weezen*. Wyders heeft ieder Achtervleugel, op den donkerbruinen grond, mede 29 of 30 witte vlekken, waar van de meesten en grootsten, deels naar lange en deels naar korte smalle streepen gelyken; die zich, van het gewricht des Vleugels af, tot over de geheele ruimte uitbreiden. De kleineren daarentegen hebben, meendeels, eene ongeschikte ronde gedaante, en loopen in eene rei langs den buitensten Vleugelrand om. Alle deeze genoemde vlekken staan, gelyk die van de voorste Vleugelen, tusschen de Vleugeladeren.

§. 4.

De Kop en Hals van deezen Vlinder is zwart, en met witte punten getekend. De kastanjebruine en met een smallen streep voorziene Rug is van vooren, als de, op de eerste Plaat van dit Deel, *Fig. 2.* reeds afgebeelde, Westindische kaneelbruine Vlinder, aan het gewricht van den Voorvleugel, met twee schildswyze donker-zwart-bruine plekken versierd; welken ieder, in het midden, een klein wit stipje hebben. Dezelve wezenlyke nuttigheid weet ik niet voldoende te bepalen; het zou kunnen zyn, dat ze iets toebrengen tot de beweging of de stevigheid van den Vleugel. Het lang en smal Achterlyf is van eene donker-koffybruine koleur, en dient teffens ten teken, dat hy tot het Mannelyk geslacht behoort.

§. 5.

In de 2^{de} *Fig.* heb ik deezen Vlinder eene zittende houding gegeven, en daaraan de ondervlakte der Vleugelen afgebeeld. Hy heeft in den Voorvleugel een lichtbruinen grond; maar in den Achtervleugel is deeze koleur nog iets helderder. Op denzelfen vertoonen zich overal die witte vlekken en streepen weder, welken wy reeds op de bovenste zyde gezien hebben; maar de groote hoogblauwe weerschynvlek komt op deeze zyde niet te voorschyn. Vermits nu deeze witte vlekken zich hier met geene merkelyke verandering, maar byna in dezelfde gedaante en orde, als de bovenste zyde, vertoonen, zo zou eene nadere beschryving

* Deeze sterke en merkwaardige verandering van verwe heeft geen anderen oorsprong, dan die, waar door onze inlandsche *Changeant*, of *Weerschyn-Vlinder*, zich van alle anderen zyns gelyken zo aanmerkelyk onderscheidt, en waar van men, in het IIIde Deel van *Röfels Nat. Historie der Insecten*, bl. 224-226. breeder kan leezen.

ving van dezelve veel eer eene noodelooze herhaaling zyn, dan mynen toegene- TAB. IX.
gen Leezers eenig genoegen geeven. Hierom zal ik my slechts op myne afbeel-
ding, waar in ik de Natuur, zo na mogelyk, gevolgd hebbe, beroepen; en al-
leen nog aanmerken, dat de beide Oogen van den gemelden Vlinder helder- rood-
bruin; zyne Baardspitsen wit, de beide hairdunne kolfswyze Voelhoornen, zo
wel als de Zuiger zwart; de hairagtige en met witte vlekken bezette Borst, kas-
tanjebruin, en de twee Voelpooten, benevens de twee paar Voeten donker zwart-
bruin zyn.

Voor het overige schynt het, dat deeze uitlandsche Vlinder, zo wel als andere
van zyne soort, naar uitwyzen zynere kentekenen, uit eene met doornen bezette
Rups, en eene Grynsvormige loodrecht gesponnen Pop oorspronklyk is; des hy,
om die reden, onder de eerste Classe der Dagvlinders geplaatst kunne worden.

Grondig en volkomen bericht van de Rups en Pop van den
inlandschen en overschoonen CHANGEANT of WEER-
SCHYN-VLINDER.

§. I.

Ik zou onbillyk handelen, indien ik voor myne geachte Leezeren verzwegg,
aan wien zy de ontdekking, waar mede ik hen thans zal onderhouden, verschul-
digd zyn. Het is de boven reeds gepreezen Heer KÖRNER; en ik twyffele te
minder aan het genoegen, dat deeze ontdekking zal veroorzaaken, daar de meeste
Liefhebbers van Insecten, met een ongeduldig verlangen, de nadere kennis van
de Pop eenes Vlinders van den eersten rang reeds voor eenigen tyd te gemoete
gezien hebben. De onderzoekgraage RÖSEL kan hier, buiten anderen, ten be-
bewyze daarvan verstrekken; als welke in het IIIde Deel zynere *Nat. Hist. der*
Insecten, Tab. XLII. Fig. 1. 2. 3. 4. deezen buitengewoonen prachtigen
hoog en veelverwigen Dagvlinder, wel is waar, zeer leevendig en natuurlyk,
maar echter zonder deszelfs Rups afgebeeld, en op *bladz. 220—226.* uitvoerig
beschreeven heeft. — In het begin dier beschryvinge zegt hy: "Schoon my
„bekend geworden zy, dan dat hy in 't *Museum Richterianum*, pag. 336.
„onder de groote Dagvlinders gesteld, en aldaar genoemd wordt, *Papilio colo-*
„*ribus varians, Iris diffus, ex quercu*, (*de Eikenbooms Vlinder; le Changeant,*
„*de Vlinder met regenboogverwige koleuren.* ") Ter zelfder plaatse, wenschte
hy ook, eenig naricht van de Rups deezer Vlinders te bekomen: en ik zelve kan
my, even zo min als de Heer RÖSEL, beroemen, van ooit in een ander Werk,
dan alleenlyk nog in dat van den Heer Dr. SULZER, genaamd. *Nieuw Insecten-*
Stei-

TAB. IX. *Stelzel*, eene afbeelding van deezen Vlinder gezien te hebben; waarby nogthans, (gelyk by alle de daarin afgebeelde Insecten,) noch zyne Rups, noch Pop gevonden wordt.

§. 2.

Ondertusschen is de Heer RÖSEL evenwel eindelyk zo gelukkig geweest, van door een zyner waardste Vrienden uit *Jena*, naamlyk den Heer Dr. GLADBACH, die zich tegenwoordig in *Vrankryk* bevindt, de echte Rups te bekomen; en hy heeft 'er eene naauwkeurige afbeelding van voor 't licht gebragt, in het IV^{de} Deel zyner *Nat. Hist. der Insecten*, Tab. XXXI. Fig 6; maar voor 't overige is het hem niet gelukt, dezelve in eene welgevormde Pop te zien veranderen.

De Heer RÖSEL, welke niets minder geloofde, dan dat een *Changeant*, of *Weerschyn-Vlinder*, uit deeze Rups konde voortkomen, vermits hy haare beide Kopspitsen voor geene doornen aanzag, plaatste dezelve toen, ten onrechte, onder de tweede Classe der Dagvlinders, en noemde haar, *bladz. 163. het Rheeboekje**, twyfelende *bladz. 176. niet* aan zyne onderstelling, "dat dit Insect tot „de tweede Classe der Dagvlinders behoorde". — Zulks deed hem ook vermoeden, dat de Vlinder, dien hy reeds in het III^{de} Deel op Tab. XLVI. Fig. 4 en 5. afgebeeld had, uit deeze Rups voortkwam. Doch dat hy, anderszins een zo beroemd en zeer ervaren Insectkenner, hier in gedwaald hebbe, zal het volkomen bericht van den Heer KÖRNER ten overvloede bewyzen.

§. 3.

Ik zal het gemelde bericht, zo als ik het uit *Frankfort*, den 23 Juny 1761. ontvangen heb, hier in zyn geheel laten volgen.

"Myne menigvuldige en herhaalde poogingen om de zeldzaame Rups in het „IV^{de} Deel op Tab. XXXI. Fig. 2 en 3. afgemaald, te vinden, waren tot he- „den toe vruchteloos; nogthans heb ik, tot myne vergenoeging, eene andere „ontdekking gedaan, die ik noodig achte mede te deelen. Ik vond het zoge- „naamde *Rheeboekje* van die Tab. XXXI. Fig. 6; 't welk tamelyk kleen was, „en tot heden toe zyne volkomene grootte nog niet verkreegen heeft; en kort „daar op ontdekte ik 'er nog een geheel volwassen. De tekening op Tab. XXXI. „is goed en wel getroffen; maar met het in den tekst bygebragte vermoeden, we- „gens een Dagvlinder van de tweede Classe, is het geheel anders gelegen. Het „voedzel deezer Rups is, door den Heere Dr. GLADBACH te *Jena*, ook zeer „wel aangewezen; echter is haar het Eschenloof mede niet onaangenaam. By „,haa-

* Schoon het zogenaamde Rheeboekje niet zo veele kenbare Doornspitsen hebbe, als de overige Rupsen der eerste Classe, behoort het echter tot eenzelfde rang. Want de beide Kop en Naalshuiver-spitsen zyn doornwyze, en de eertien hebben zelfs nog kleene zydoornen aan zich, als in haare afbeelding ten duidelykste gezien kan worden.

„haaren langzaamen gang, laar zy bestendig een dunnen witten draad uit den bek TAB. IX.
 „gaan; en maakt dien aan beide de zyden van den weg, welken zy verkiest, vast.
 „Deeze draad dient haar, om met de stompe pooten den voorgenomen loop, te
 „zekerder en zonder afvallen, te volbrengen*. Vermoedelyk hebben deeze draa-
 „den den Heer RÖSEL op het denkbeeld gebragt, dat de Rups dezelve, ge-
 „lyk andere Rupsen der Dagvlinders van de tweede Classe, tot haare verandering
 „gesponnen had, om die vervolgens over het lyf te trekken. Ik heb op al haar
 „doen naauwkeurig geteld, byzonderlyk haare verandering gade gessaagen, en
 „ontdekt, dat het zogenaamde *Rbeebokje* zich aan de naschuivende pooten vast
 „spon. De verandering gelukte wel haalt; en 'er vertoonde zich eene witgeel-
 „achtige groene Pop; (welker juiste verw eenige thans vliegende Vlinders heb-
 „ben, die alhier het witgeele blad genaamd worden,) gelyk de bygevoegde
 „afbeelding der Rups, zo veel het vermogen der tekenpenne toelaat, ver-
 „toont†. Zo dra ik geloofde dat zy stevig genoeg was, nam ik haar, met het
 „voeder, uit de doos, om alies met meerder naauwkeurigheid te kunnen be-
 „schouwen. Toen ontdekte ik, dat deeze Pop zich niet loodrecht en beweeg-
 „lyk gehangen had; derzelver achterspitsen waren integendeel gantsch styf en
 „vast aangesponnen; zo dat de Pop, als ik het blad op de tafel lag, in de hoog-
 „te stond, en zig beweegde; hield ik het blad vervolgens, zo als het aan den
 „boom zit, dan was de stand der Poppe voorwaards. Veertien dagen behield
 „zy haare witgeelachtig-groene verwe; en ik maakte verscheidene gissingen over
 „den Vlinder, welken ik daar uit verkrygen zou; want volgens de Pop kon
 „die, waarop de Heer RÖSEL gedacht had, 'er niet uit voortkomen. Op den
 „vyftienden dag schemerde eene zwarte verw door de Pop heen; en des avonds
 „omtrent zes uren zag ik, tot myn groot genoegen, den zeer schoonen blaau-
 „wen Weerschyn-Dagvlinder, van de eerste Classe, met witte vlekken voor den
 „dag komen. Myne vreugde was ongemeen groot; doch ze werd eenigzins ver-
 „minderd, uit hoofde dat de Vlinder, aan den eenen Bovenvleugel, iers bescha-
 „digd was, 't welk waarschynelyk veroorzaakt zal zyn, doordien de Pop, by
 H „haa-

- Of deeze witte draad werkelyk uit den mond der Rups voortkome, dan of dezelve, (gelyk by de Zywormen,) mogelyk uit een wrat, dien men omtrent denzelven bespeurt, ontslaa, zullen wy, tot eene nadere onderzoeking, aan zyne plaatse laaten.

† Ik heb deeze ontvangene tekening, op de daarnevensgaande ledige schel der Poppe, zo naauw-
 keurig als my doenlyk was nagevolgd, in myne afbeelding op *Fig. 3.* in deeze *IX Tab.* De
 Heer Körner heeft wyders aangemerkt, dat de Pop op haar krom geboogen lyf, (dat eigenlyk
 het achterste gedeelte des lyfs is, door my niet *a* getekend,) niet rond, maar scherp zy, ge-
 lyk het buitenste gedeelte van een Karper zich vertoont. Hier benevens had ook de Pop eene
 van de anderen haarer Classe onderscheide gedaante; vermits haar aan dat gedeelte de puntige
 hoogzels ontbreken. Dewyl ik echter alleenlyk de ledige hulze ter aftekening had; zo geeve
 ik de tegenwoordige afbeelding nog niet voor geheel volkomen op; en zal derzelver nadere
 beschryving bespaaren, tot dat ik eene volmaakte afbeelding bekomen zal hebben. Alleenlyk
 merke ik nog aan, dat ik deeze Pop loodrecht, en niet zo als de Heer Körner haar vastge-
 sponnen gevonden heeft, heb voorgesteld; om dat ik denke, dat de Pop, alleenlyk wegens de enge
 plaats in de doos, geen gelegenheid genoeg gehad zal hebben, om zich loodrecht vasttefpinnen.

TAB. IX., „haare verandering, geen plaats genoeg had; waar door zy aan die Vleugel-
 „schede eene kleene drukking zal bekomen hebben. Deeze Vlinder is door den
 „Heer RÖSEL in het III^{de} Deel Tab. XLII. zeer schoon afgetekend; doch ik
 „durf wel verzekeren, dat het blaauwe veel hooger en sierlyker is.”

”Hier by heb ik nog te melden, dat de voornoemde blaauwe Vlinder een
 „wit reinigend vocht liet vallen: dit kan een lustig onderwerp zyn, voor de
 „verdere ontvouwing van de Natuurlyke Historie der Insecten. Ik heb de P
 „penhulze bewaard, om dezelve, wanneer het van dienst mogte zyn, met den
 „Vlinder overtezen. Laastelyk dient nog ten onderrichunge, dat het Man-
 „netje niet zo donker blaauw is, maar in het roodachtige valt; en, in plaats van
 „witte, roodachtigbruine vlekken heeft.”

Tot dus verre het bericht van den Heer KÖRNER; denwelken ik hier deswe-
 gen myne dankbaarheid openlyk beruige. Men kan de oprechtheid van dit be-
 richt zekerlyk in geen twyffel trekken, vermits de waarheidlievende gezindheid
 van deezen onvermoeiden beminnaar der Natuurlyke Historie by veelen overbe-
 kend is*.

* Ten einde de Natuurlyke geschiedenis van deezen schoonen Vlinder zo volledig mogte bekend
 worden, als het heden, naar myne verkreegene ondervindingen, mogelyk is, zo zal ik het
 volgende 'er nog byvoegen. De Heer R^ösel heeft, gelyk reeds gezegd is, de Rups van den
 zeer prachtigen Vlinder *Iris*, (by Linn. p 775. Sp 161) op de XXXIste Pl. Fig. 6. in het
 Vierde Deel; maar den Vlinder zelve in het Derde Deel op de XLIIste Tab. afgebeeld. Vol-
 gens de ongedoornde Rups, die op den Kop alleen met twee doornachtige hoornwyze deelen,
 en met twee op de verhevenheid van den Natshuiver horizontaal naar vooren staande spitzen,
 voorzien was; als mede volgens derzelver bultlooze Pop, heeft R^ösel, wel is waar, kunnen
 vermoeden, dat het de Grins van een Dagvlinder der tweede Classe was. Maar, vermits het
 voortbrengzel der Puppe een Dagvlinder der eerste Classe is, en de Rups, zo wel als de Pop,
 eenige merktekenen van zulke, die tot de eerste Classe behooren, heeft, zo zou ik, zonder
 my daar door belachelyk, of R^ösels naauwkeurige Classen-orde verwerpelyk te maaken, wel
 duiven zeggen, dat ik dit Insect, naar deszels gantche gestalte bechouwd, verklaar voor
 een Middel-Insect, tusschen de eerste en tweede Classe der Dagvlinders, terwyl men echter
 den Vlinder, wegens zyne vier pooten met, en twee zonder klauwen, met welke laasten hy zich
 reinigt, zeer wein de eerste Classe kan stellen. De Eyeren, waaruit de Rupsen van deezen Vlin-
 der te voorichyn komen, zullen groen, langwerpig, holgekorven, of met groeve en voornt-
 jes vercierd zyn. De Rupsen komen in den Herft uit, groeijen langzaam en leeven den Win-
 ter over. Men heeft dezelve op Weiden en Vlaslanden, mitsgaders op de Espen, (*Populus*
tremula L. A. C. B.) de Eichen, en de Bockenboomen gevonden; ook heeft men hen met
 den zelve loof gespyt; en zy gebruiken daarbenevens mede het loof van den Eikenboom. Met
 het afloopen van den Winter komen zy weder te voorichyn, en zoeken hunne spyzen. Nog
 jong zynde, laten zy zich by draaden af; en zy zyn verder van de traagte soort. Wanneer
 zulk eene Rups, op het blad, waarop zy zit, wil voortkruipen, dan maakt zy op het zelve
 een spinzel voor zich uit, zet haare pooten daarop, en kruip al langzaammerhand voort. Den
 meesten tyd slaapt zy, en zit als op haar spinzel vastgehecht. Als een blad verteerd is, begeeft
 zy zich zeer langzaam op een ander. En hier vertoont zich een uitteekend blyk der wysheid
 van den Schepper der Natuur; want nadien dit Insect een vasten grond onder zich maakt, waar
 op het rust en knuip; zo kan het zich, op de afhangende en altoos beweegende bladen, te be-
 ter vasthouden. Deeze soort verwisselt verscheidene maalen van huid; en dan gaat deze, veerft
 van

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 1.



Beschryving van twee zeldzaame WESTINDISCHE
DAGVLINDERS.

§. 1.

Op deeze Xde Tab. deel ik twee Vlinders mede, welken ik, insgelyks, TAB. X. aan den meermaalen genoemden Heere KÖRNER te danken hebbe. Zo min als het deezen toegenegenen Begunstiger verdriet, myn Werk door zyne Bydragen te verryken, zo min kan en zal ik ook vergeeten den dank, welken zulk eene buitengemeene dienstvaardigheid van my vordert.

H 2

§. 2. Het

van den Kop en de Hoornen los; den vernieuwden Kop legt zy op de afgelegde huid, als op een Kussen, en trekt dan vervolgens het overige van 't lyf door dezelfde opening uit. Eenigen veranderen reeds in *Mai*, anderen eerst tegen het einde van *Juny*, en worden tegen dien tyd witachtig-groen. In de vryheid leevende, verkiezen zy, ter plaatse haarer veranderinge, of de kleenite Espentelgen, of kruipen af naar een Grashalm, of iets dergelyks, en overrippinnen het verbylf, waar in zy veranderen willen. Zy hechten zich met hun achterste gedeelte vast, blyven dus vry hangen, en maaken eindelyk, door verscheidene bewegingen, waar by hetschynt als of zy zich zelven van boven neder willen storten, haare laatste Rupfenhuid los. Daarna vertoonen zy zich in de gedaante der Pop, welke op Tab. IX. Fig. 3. afgebeeld is. Na veertien dagen komt de ongemeen schoone blaauw-weerschynende *Iris* te voorschyn; loozende, na het ontvouwen van den prachtige Vleugel, een witachtig reinigend Sap. Vermits my verder verscheidene kundige Liefhebbers van Insecten onderrichten, dat zy uit het Rheeboekje, door *Rüfel* in zyn Vierde Deel, Tab. XXXI. Fig. 6. afgebeeld, niet allen den donkeren en helderen blaauwglanzigen Vlinder, maar ook de donkere en heldere soort van den Vlinder *Iris*, welke in 't geheel geen blaauwen weerschyn heeft, verkreegen hadden, zo komen my de gedachten van den Heer *Rüfel*, by zyne beschryving van den gemelden Vlinder, op §. 4. voorgesteld, waarschynlyk voor: dat, naamlyk, die zeldzaamer Vlinders, welken den anderen volkomen gelyk zyn, uitgenomen dat ze niet in 't blaauwe speelen, de Wyfjes van de blaauwglanzigen zyn kunnen. Maar dewyl zy beiden, zo wel de donker-, als de helder-blaauwglanzige, en de niet glanzige soort, geene bloote variëteit, maar weezenlyk verschillende soorten schynen te weezen; zowenschte ik dat de Liefhebbers van Insecten, die het geluk hebben van 'er meer op te voeden, zich der moeite gaven van te onderzoeken, of 'er, aan de Rupfen en Poppen van het Rheeboekje, in 't geheel geen weezenlyke kentekenen van eene verscheidenheid te ontdekken zyn. Want deeze Vlinders verschillen dikwerf zo veel van elkanderen, dat men in verzoeking geraake, om veeleer drie dan tweëerleie blaauwglanzige en niet glanzige soorten, in plaats van loutere variëteiten, uit hun te maaken. Voor 't overige schynt deeze schoone Vlinder *Iris* in Europa t'huis te behooren; vermits hy in talien, Vrankryk, Rusland en Hongaryen, als mede in het Styriaarsche, het Oostenryksche, het Zwabische, het Saxische en het Byersche, omtrent Regensburg, Frankfort, en over 't algemeen in de meeste strecken van Duitschland, doch in veelen anderen, by voorbeeld, omtrent Neurenburg, maar zeer zelden, gevonden wordt. Evenwel heeft hy zich, in het jaar 1781, 't welk, wegens eene sterke en ongemeene vruchtbaarheid, merkwaardig was, in gezelschap van den Vlinder *Populi*, benevens de Rups van den *Sphinx Metropos*, in onze strecken meermaalen vertoond. — Dit Insect onthoudt zich gaarne op de hoogste Espen- en Wilgenboomen.

§. 2.

TAB. X. Het verlangen veeler Liefhebbers is tot hier toe de beweegreden geweest, waarom ik de afbeelding en beschryving van buitenlandsche Vlinders, ten onderwerp van dit myn Werk, verkoozen hebbe. 'Er zullen voorts nog twee *Tab.* tot dergelyke Insecten, als mede, gelyk ik reeds gezegd heb, tot eene groote Spin betrekkelijk zyn. Dan, daar ik ook gaarne genoeg wil geeven aan den smaak van hun, die liever op andere foorten van Insecten hunne opmerkzaamheid vestigen, zal ik, zo dra de buitenlandschen afgehandeld zyn, my tot de Insecten van ons Vaderland wenden, en derzelver merkwaardigheden, die niet minder onze beschouwing vorderen, tot voorwerpen myner waarneemingen stellen — Op deeze wyze zullen de Liefhebbers van andere Insecten hunne begeerte vervuld zien; en zy, die bovenal de Vlinders gadeslaan, zullen 't, hoop ik, niet afkeuren, dat zy in myn Werk, eene zelfde vermengende afwisseling, als in het Derde en Vierde Deel van dat van RÖSEL, aantreffen. Hier door zal ik my kwytten, van myne beloften, (*bladz. 3. §. 3.*) dat ik my, met het verhandelen van de Oostindische Insecten, niet te lang zou ophouden; maar ook, door een genoegzaam getal van inlandschen, het genoeg van myne waarde Leezers zou trachten te bevorderen. Om niet te melden, dat ik, door my langer oprehouden met buitenlandsche Schepzelen het ontydig verwy't vreezen had, dat ik die geenon volgden, welken in hunne ontvouwing der Natuurlyke Historie toonen, dat ze meer kennis hebben, van den Olyphant, den Drommedaris en den Vogelfruis; dan van ons inlandsch Rundvee en Lastdieren, van den Leeuw, den Nachtegaal, enz.

§. 3.

Na deeze niet ondienstige voorafpraak, zal ik nu overgaan, tot de beschryving der Vlinders op *Tab. X.* afgemaald. 't Zal niet noodig zyn een breedvoerig bericht te geeven van de zich daar op vertoonende vlekken en derzelver gedaante, nademaal ik my ten getrouwste bevylygd hebbe, om dezelve overeenkomstig met de natuur aftebeelden, 't welk in dit geval meer afdoet, dan de nauwkeurigste beschryving. Vooraf moet ik hier slechts nog aanmerken, dat de Vlinder op *Fig. 1.* afgebeeld, meer dan eenige andere van zyne Classe, bezienswaardig en zeldzaam is; vermits hy met zo veele groene Vlekken versierd is; welke kleur, volgens myne aanmerking op *bladz. 24.* by de Dagvlinders, zeldzaam, en nog veel zeldzaamer dan by de Nachtvinders bepeurd wordt; waarom ik ook oordeele hem gevoeglyk te kunnen noemen: *

*Den zeer zeldzaamen donker-zwartbruinen groen- en witge-
vlekten WESTINDISCHEN DAGVLINDER der eerste
Classé, uit Surinamen.*

* Hy wordt in *Linn. Syst. Nat. Edit. XII. p. 779. sp. 176.* genoemd *Nymph. Phal. Amphinome*, de Zuid-Amerikaansche *Amphinome*; de Blaauwvlok; de Gemarmerde *Amphinome*; en de Hieroglyphen-Vlinder.

§. 4.

De eerste afbeelding vertoont ons den Vlinder met uitgespreide Vleugelen; TAB. X. Fig. 1. welken, over het geheel, een zeer donker zwartbruinen grond hebben. Op ieder Voorvleugel ziet men, in dien grond, eene groote breede, en, door de zwarte aderen des Vleugels, zasmaal verdeelde witte dwarsvlek; welke zich byna door het midden des Vleugels uitstrekt, en van achteren aan den eenigzins uitgeschulpten buitenrand eindigt. In deezen zelfden Vleugel staat, boven aan den rand, nog eene kleene, witte, byna maanswyze vlek. Ook zyn in ieder Achtervleugel, naar den buitensten rand, die eenigzins uitgeschulpt is, tusschen de eerste schulpen, twee dof witte vlekken; buiten welken de helder-groene vlekken, waar van alle de Vleugelen ryklyk voorzien zyn, den Vlinder, het grootste sieraad geeven. De vlekken hebben in de voorste Vleugelen meestendeels eene onregelmaatige gedaante; waartegen zy zich in de Achtervleugelen veelal geschikt, regelmatig, voorwaards puntig, en achterwaards tweekoekig vertoonen. Voorts zyn ze door vyf zwarte aderen van elkander gescheiden, en sluiten in haar midden eene byna hartswyze groene vlek in zich. De uitgeschulpte buitenste rand is, benevens de binnenste halve vleugelruimte, mede met groene, doch meest onregelmaatige vlekken bezet.

Wyders zyn de Vleugelen van deezen Vlinder, tegen den binnensten en naar het Achterlyf toeliggenden rand, bruin en haarg; de Kop en Hals zyn roodachtig-bruin; maar de Rug en het korte dikke Achterlyf, een kenmerk dat hy tot het Vrouwelyke geslacht behoort, zwartbruin.

§. 5.

Op de benedenste zyde is deeze Vlinder, welke in de tweede *Fig.* zittende, Fig. 2. en met om hoog geklapt Vleugelen, afgebeeld gezien wordt, gantsch anders gesteld dan op de bovenste zyde. Men ontdekt hier ook, zowel op den Voor- als Achtervleugel, eene andere, naamlyk eene bruine grondverwe, die zich in den Achtervleugel veel donkerer vertoont dan in den Voorvleugel. Want de Voorvleugel, dien ik nu nader beschryven zal, heeft, alleenlyk boven over de witte dwarsvlek, die zich alhier byna even als op de bovenste zyde vertoont, eene eenigzins donkerbruine koleur, die echter onder deeze vlek helder en meer geelbruin wordt. Behalven de groote witte dwarsvlek staan 'er nog twee andere kleene witte, en ééne groene vlek; van welken de grootste witte ook op de bovenzide gezien wordt. Aan den buitensten rand van deezen Vleugel, ziet men nog vyf dof witte en ééne groene stofvlek.

Niet ver van het gewricht des Vleugels bespeurt men, tusschen de twee Hoofdaderen, nog eene wat grootere vuurroode vlek.

TAB. X. Met dergelyke, doch veel meer, en wel tot zestien toe, vuurroode vlekken, pronken ook de Achtervleugels. Deezen neemen by het gewricht des Vleugels een aanvang, en spreiden zich tot over het midden van denzelven uit. Ze zyn zeer zichtbaar, groot, en, gedeeltelyk, slechts door de Hoofdaderen des Vleugels van een gescheiden. Eenige dier vlekken zyn puntig, eenigen breed, en eenigen smal, maar anderen, en wel de kleensten, die voor aan by den buitensten Vleugelrand staan, hebben eene hartswyze gedaante*. Behalven deeze vlekken ziet men nog negen andere kleenen, (waar van zes groenachtig, en drie witachtig zyn,) inden grond, tusschen de schulpen, en aan den buitenrand van den Vleugel.

Het hairige Lyf, de Baardspitzen, de Voelpooten, en de Schenkels der twee paar Voeten zyn wit; de Voeten zelve zyn okergeel; de saamgerolde Zuiger is donkergeel, maar de Oogen zyn hooggeel; en de hairdunne Voelhoornen, zo wel als hunne pluimachtige kolfjes zyn zwart. Mejussrouw MERIAN heeft deezen Vlinder, benevens zyne Rups en Pop, in haar Werk over de Surinaamsche Insecten, *Tab. VII.* voorgesteld, en van de Rups gezegd: dat zy heldergroen en bruinachtig is, witte streepen en een glad voorkomen heeft; maar dat ze de kentekenen der doornen/spitzen, door acht spitzen aan den Kop, en twee lange spitzen aan de Naschuivers, of den Staartklep, vertoont. Haar voedzel, zegt zy, bestaat in de bladeren van den Oostindischen Jasmynboom†; en ze verandert, volgens haar bericht, in eene loodrecht hangende, helder- okergeele Gynsvormige Pop; uit welke, in één-en-twintig dagen, deeze schoone Vlinder te voorschyn komt. ‡

§. 6. Op

* Bygeloovige Menschen, en zulken, die in alle zeldzaame voorwerpen der Natuur steeds voorspellingen en treurige lotgevallen meenen te bespeuren, zullen mooglyk, by de verschyning en beschouwing van deezen Vlinder, het geluk, of liever het ongeluk, hebben, van zo zeer te verschrikken, als wanneer hun de, in het Eerste Deel van *Rüfel, Nat. Hist. der Insecten*, *Tab. VII.* afgebeelde, en, wegens zyne zwart-blauwe, vuur- en bloedroode vlekken, door sommigen de Vlinder van *Mars* genaamd, voor oogen kwam. Want zo gemakkelyk als hun zwakke geest op denzelven allerlei Krygstuig vinden kan, zo ligt zouden zy zich overreeden, dat de verschyning van zulk een Vlinder de voorbode van een yselyken brand moet zyn. Het is voor onze tyden gelukkig, dat het verlicht verstand in de Natuurlyke Weetenschappen niet alleen de onweetendheid, maar ook het dwaallicht des Bygeloofs, reeds merkelyk verdoofd, hoewel nog niet geheel uitgebluscht heeft.

† Van deezen boom, zegt zy; dat hy in Amerika zeer hoog groeit; zwaare en dikke bloemen draagt, die een aangenaamen reuk van zich geeven: dat hy dikke en sappige bladeren heeft, zo dat 'er uit een afgebroken tak een melkachtig sap vloere. Hy is ligtyk te bekomen, en groeit in weinig maanden zeer hoog. De inwoners noemen hem, *Quautble Parti*.

‡ In de Hollandfche uitgave van haar Werk, noemt zy (*blad. 8*) deeze eene gekroonde Rups; vermits dezelve op haar Kop met spi-zige hoogzelen versierd is. De Rups veranderde den 20sten *September* in eene Pop; en den 11den *October* kwam 'er deeze kleene zeer schoon gewolkte Vlinder uit voort; van welken zy zegt, dat dezelve, door een vergrootglas beschouwd, ver-

§. 6.

Op den voorschreeven Vlinder volgt een ander, die wel niet zo schoon; maar TAB. X. nogthans onze oplettendheid niet geheel onwaardig is. Hy verdient dezelve te eerder, alzo hy in het Werk van Mejuffrouw MERIAN niet gevonden wordt. Volgens het getuigenis van den Heer KÖRNER, is zyn Vaderland in de Westindien. Ik noem hem daarom,

*Den helder-bruinen met witte en blaauwe vlekken, in een donker-violet-bruinen grond, versierden WESTINDISCHEN DAGVLINDER der eerste Classe.**

§. 7.

In de 3^{de} Fig. deezer Tab. heb ik hem vliegend afgebeeld, om dat de bo- Fig. 3.
venzyde der Vleugelen dan duidelyk in 't oog valt. Men ziet des terstond, dat die en 4.
der Voorvleugelen van deezen Vlinder eene dof schaduwbruine grondverwe heeft, waar in, boven voorwaards, een klein zwart stipje staat. Evenwel verspreidt zich deeze grondverwe niet over den ganschen Vleugel; maar ze wordt doorsneden, door twee heen en weder getande iets donkerbruine dwarsstreepen; die zich, wat hooger dan in het midden des Vleugels, aan den voorsten rand beginnen te vertoonen, dwars over den Vleugel gaan, naby den achtersten hoek van den buitensten rand eindigen, en van eene doffe helderrood-bruine verwe zyn; welke koleur de andere helft van den Vleugel geheel beslaat, en zich naby het gewricht van den Vleugel, en de Borst van den Vlinder uittrekt. De Achtervleugels hebben eene schooner gedaante dan de voorsten, en geeven den Vlinder het meeste sieraad. Ook hier valt de grondverwe wel in 't bruinachtige; maar ze wordt door het daar tusschendoorschynend blaauw eenigzins gebroken, en is dus door het perseel niet natuurlyk aantewyzen. De eerstgenoemde bruinachtige met blaauw doormengde grondverwe van den Vleugel strekt, van deszelfs gewricht, tot byna aan het midden; alwaar men, tusschen de Vleugeladeren, eenige helderblaauwe vlekken bespeurt, die echter, naar de verscheidene buiging der lichtstraalen, in de verschillende standen van 't voorwerp, in 't bruine vallen. Op deezen volgt eene zeer groote donker-violet-bruine breede grondvlek, in welke twaalf

verwonderlyk schoon is. Myne afbeelding vertoont een Wyfje; het Mannetje zou van onder aan de Vleugelen byna geheel bruin, en alleenlyk by de gewrichten, en aan den onderrand des Achtervleugels, rood gevlekt zyn. In Surinamen behoort dit Insect niet onder de gemeenten; en 't wordt ook in China gevonden. Wyders ontmoet men in Surinamen noch Bysoorten, die met deezen veel overeenkomst, maar eer blaauw- dan groenachtige vlekken hebben.

* Deeze heeft in Linn Syst Nat Edit XII Pap. Nymph. Phal. p. 784. sp. 206. den naam van *Lena*, de Zuid-Amerikaansche Nymph, bekomen.

TAB. X. twaalf witte blaauwingevatte, drie kleene ronde met een wit middelpunt bezette zwarte, en vyf hoogblauwe, en, naar derzelver verschillenden stand, in 't bruine vallende, vlekken gezien worden. Verder vertoont zich, by den een weinig uitgeschulpten buitensten Vleugelrand, eene andere, iets helderer en kastanje-bruine grondverwe, die, tusschen de randschulpen, eene dof-blaauwe stofvlek insluit.

De Kop van deezen Vlinder is zwart, en met twee kleene zwavelgeele stippen bezet; waar op de twee hairdunne, met pluimachtige kolfjes voorziene, helderbruine Voelhoornen, haare plaats hebben. De Rug en het korte Achterlyf, het teken van zyn Mannelyk geslacht, is geheel donkerbruin.

§. 8.

Fig. 4. vertoont onzen Vlinder zittende, volgens den aart van alle Dagvlinders, waar door men de onderste zyde zynrer Vleugelen kan beschouwen; en aan welke de donker- violet- bruine en de hoogblauwe vlekken te voorschyn komen. Wy zien daar teffens, dat de voorste Vleugel hier, byna even zo als op de bovenste zyde, verdeeld is; maar de onderste helft vertoont zich nogthans meer helder- bruin, en heeft twee nog helderer doffe dwars- vlekken. Daarbeneffens is de kleene ronde zwarte vlek die, in den bruinen grond, boven naar het voorste einde te zien is, hier niet zwart, maar helder- bruin. Daarentegen ontdekt men, naby het gewricht des Vleugels, een klein zwart rond stipje, 't welk men op de bovenste zyde niet gewaar wordt.

De Achter- Vleugel is, tot aan de helft, met een helder- bruinen grond gedekt, welke in het midden, door een smallen slangswyze, donker- roodachtigen graauwen streep, overdwars doorsneden wordt, en ook met verscheidene kleene tedere donker- roodachtig graauwe streepen en vlekken als bezaaid is: wy zien verder in deezen grond, naby het Vleugel- gewricht, drie kleene ronde zwarte vlekken. Aan 't einde van dien grond, of in het midden des Vleugels, vertoonen zich twee smalle in- en uitgesneden donkerbruine streepen, die een helder- bruinen grond, en vier heldere dofgeele vlekken in zich bevatten, overdwars in den Vleugel staan, aan deszelfs voorsten rand beginnen, en aan den binnenrand eindigen.

Ten laatste volgt, in de andere helft van dien Vleugel, een iets meer donker- bruine met tedere stippen en streepen bezaaide grond. Deeze is versierd met twee zwarte Oogspiegels, waar van de een geheel, en de ander ovaal- rond is; ze hebben in 't midden een klein wit stipje, worden door een hoog- okergeelen, en donker- bruinen kring omvat, en rondsom dezelve staan voorts nog eenige helder- graauwachtig- geele stofvlekken. Behalven de Oogspiegels ontdekt men verder beneden, in het midden des Vleugels, en tusschen de aderen, ook de hel-

helder-dof-geele vlekken, waar achter men nog eene rei lichte-dof-bruine en TAB. X.
met den grond vermengde vlekken bespeurt, die dezelfde zyn, welke wy op
de bovenste zyde in 't hoogblauwe gezien hebben. De buitenste rand heeft een
zeer smal donkerbruin boordzel of omzooming. Het eenigzins hairige Lyf is
bruin; de twee Voeten zyn donkerbruin; de twee Baardspitten en Voelpooten
helder-okergeel; de Zuiger is zwart, maar de beide Oogen zyn donkerbruin.

§. 9.

Volgens alle kentekenen behoort deeze Vlinder tot de Eerste Classe der Dag-
vlinders. Zyne vier Voeten, twee Voelpooten en Achtervleugels, waar mede
hy het Achterlyf niet volkomen kan bedekken, zyn toereikende merktokens, dat
men hem onder geene andere Classe kan brengen. En als we zyne Rups ken-
den, zouden wy zien, dat zy, gelyk alle die geenens, welken tot deeze Classe
behooren, zo niet geheel, ten minsten met twee doornpunten voorzien is. Wy
zouden dan ontdekken, dat zy, by het naderen haarer aanstaande veranderinge,
eene plaats, voor wind en regen veilig, zou opzoeken; zich in eene loodrecht
hangende grynsvormige, met of zonder goudkoleurige vlekken, versierde Pop,
veranderen, en, na eenigen tyd, den voorschreeven Vlinder zou voortbrengen.
Dit alles zou ons overtuigen, hoe zeker men zich op de rangschikking van den
Heer RÖSEL kan verlaaten.

In 't vervolg van tyd zal ik, (zo my de Heere de gezondheid en 't leven
schenkt,) eene proeve daar van voor 't licht brengen. Want, schoon het thans
myn voorneemen zy, de afgifte van de Indische Vlinders te staaken, is het ech-
ter myne meening niet, den Uitlandschen Insecten, geheel en al, geene plaats in
myne bladen te vergunnen. Veel eer zal ik, na een geruimen tusschentyd, my
ook op de beschryving van Uitlandsche Nachtvinders toeleggen; en ik geloove
dat die arbeid mynen waardsten Leezersen te minder mishaaen zal, aangezien de
Heer RÖSEL, in zyn meergemeld Werk, nog geheel geene derzelven beschree-
ven heeft; hoewel hy het zelve met een genoegzaam getal van Springhaanen,
Scorpioenen en Kevers opgesierd hebbe. Hier by komt ook, dat dit ons eene
schoone gelegenheid geeven zal, om zyne rangschikking mede met de Uitland-
sche Vlinders te volgen, en dus te beproeven of dezelve ook daarin ten volle
toereikende zy.

~~~~~

*Befchryving van eene zeer groote, fchadelyke, ruige,*  
WESTINDISCHE HOEKSPIN.

## §. 1.

TAB. XI.  
en XII.


**D**e verscheidene foorten van Spinnen, zo wel als de menigte van dergelyke Schepzelen, zyn zo talryk, dat ieder Werelddeel, ja ieder byzondere Landstreek, daar van bewyzen kunne geeven. Veele beroemde Schryvers en Natuuronderzoekers hebben zich ook reeds met derzelver beschryving bezig gehouden; en getracht hunne verschillende foorten door eigenaartige benaamingen aantewyzen; of dezelve door juiste afbeeldingen voor ons gezicht kenbaar te maaken. Ik zou om die reden byna in twyfel gestaan hebben, om mynen geachten Leezere eene verhandeling van dergelyken inhoud te leveren, ware ik niet door eenige Liefhebbers daar toe aangemoedigd, en in het denkbeeld gebragt, dat zulk eene onderneeming verder zou aanvullen, het geen de Heer RÖSEL in het Derde Deel zyner *Nat. Hist. der Insecten*, bladz. 138-144, en in het Vierde Deel, bladz. 191 en verv. van de Spinnen gezegd en aangemerkt heeft. Ik hoope des hier mede geen onaangenaamen dienst te zullen doen, den zodanigen, denwelken de gemelde Beschryving van RÖSEL geene voldoening heeft gegeven; zonder my evenwel te vleien met het denkbeeld, dat ik op een weg zo moeijelyk, als de onderzoeking der Spinnen, alle struikelblokken uit den weg zal kunnen ruimen.

## §. 2.

Ik gaa met stilzwigen voorby alle de vreemde benaamingen der Spinne; vermits men daaromtrent in verscheidene Werken, en zelfs in Woordenboeken, genoegzaam onderricht kan worden: alleenlyk gebiedt ons de goede orde de zaak, waar van wy spreken, by haar rechten naam te noemen; en de welleevendheid vordert, dat wy den Leezer van eene onnoodige moeite ontheffen. ISIDORUS verklaart het Latynsche woord *Araneus*, als ware het zo veel als *Aërenatus*, dat is, in de Lucht gebooren; het welk evenwel door JONSTON\*, als eene gedwongen en te ongegronde afleiding, met reden verworpen wordt. Hy houdt het liever met BECMANNUS, die *Araneus* van het Hebreuwfche *Arag* (weeven) natuurlyker afleidt. De Griekfche benaaming ἀράχνη en ἀράχνης, zo veel als *draaden in de lucht trekkende*, ondersteunt deeze afleiding, en stelt dezelve buiten allen twyfel. In de Griekfche taal vindt men nog de volgende benaamingen: μυροχάντη (de *Vliegenvangster*.) θήραφος σίβη, ὀκίσσ, φαλαγξ en φαλάγγιον. De Dichters hebben goedgevonden den oorsprong van het woord ἀράχνη te zoeken

\* Zie Jonston, *Hist. Natural. de Insectis*. Francof. ad Moen. 1653. Fol. Lib. II. art. 2. p. 13F.





C. F. C. Kleemann fecit et exc.

ken in den naam eener Vrouwe, die, ter oorzaake haarer vermetelheid, van met <sup>TAB. XI.</sup> PALLAS om stryd te willen weeven, in een Spinnekop veranderd is. Maar vermits ik niet bevoegd ben, om buiten myn kring te gaan, en in de taak der Taalgeleerden te treden, zal ik my hier over niet breedvoeriger uitlaaten, en 'er dit blad, dat tot gewigtiger aanmerkingen geschikt is, niet mede opvullen. Het zy genoeg, dat myne Landgenooten weten, welk een Insect zy onder den naam van Spin te verstaan hebben.

## §. 3.

'Er zullen weinig menschen zyn, die niet de eene of andere soort van Spinnen gezien hebben; doch weinigen hebben dezelve met opmerkzaamheid beschouwd; daar het bekend is, dat deeze Insecten, die, gelyk de Heer SULZER zegt, zonder vooroordeel beschouwd, zo min als de Vlinders, onze afkeerigheid verdienen, door de meeste menschen, of uit afkeer, of uit bygeloof vervolgd worden. De oude, en zelfs PLINIUS\*, waren van deeze vooringenomen meening niet vry; zy zagen de Spinnekoppen en hun weefzel aan als voortekens, van ongelukkige lotgevallen, ja zelfs van Pest; en waanden, onder deeze gedaantens, zekere soort van booze geesten of schadelyke *Spiritus familiares*, gemeenzaame geesten, te zien†. Daarom zegt de Heer SULZER zeer wel; "wy verlichter „Nakomelingen belachen dit bygeloof: ja, men vindt hier en daar wel een „Waaghals, die niet eens gelooven wil, dat de Spinnen vergiftigend zyn‡.

Welk een affchrik zou, in die vroegere dagen, onze bygeloofige Voorvaderen bevangen hebben, indien hun deeze groote ruige Spin, welker gedaante en beschryving ik thans den Leezer mededeelen wil, onder het oog gekomen ware? Hunne sluimerende verbeeldingskracht zou dezelve ligtlyk voor een der kwaadste geesten aangezien hebben.

## §. 4.

De vrees der Ouden voor de Spinnen ware nog eer te vergeeven, indien dezelve alleen uit eene voorzorge, om 'er niet door vergiftigd te worden, zyn oorsprong had genomen; schoon men de Heeren BON en CLERK, die van Spinnen gestoken zyn, zonder beschadigd te worden §, zo wel als den Heer RÖSEL, onder die Waaghalzen moete plaatfen, welken de Spinnen voor niet vergiftigend hielden. RÖSEL grondde zyne gedachten op waarneemingen, welken hy, in het byweezen van verscheidene Perfoonen, op de Vangpooten van onze Kruis-

I 2

spinnen,

\* Plin. Hist. Natural. L. VIII. C. 24. en L. I. C. 24.

† Zie Hubners, *Naturkunst - Berg-gewerkend Handlungend Lexicon*, p. 1982.

‡ Zie Sulzers *Insecten - Syllema*, p. 189.

§ Zie het naauwkeurig bericht van eene nieuwe Zyde-Fabriek. Frankf. en Leipz. 1711. p. 38. als mede Caroli Clerki Hist. aranei Suëcici, Stockholm 1754. 4°. p. 6. §. 15.

TAB. XI. Spinnen, door vergrootglazen, naauwkeurig in 't werk gesteld had. Hy vond  
 en XII. naamlyk aan dezelve geene opening; waar uit, volgens het getuigenis van den  
 Heer LEEUWENHOEK\*, een vergiftigend en schadelyk vocht ontvloeide. Ook  
 kende hy twee bejaarde Mannen, die dikwyls de Spinnen voor een afdryvend  
 middel ingezwolgen hadden†. Ik zelve moet ook betuigen, dat ik, eer ik hunne  
 schadelyke wapens onderzocht had, deeze Schepzels mede voor onschadelyk ge-  
 houden hebbe; en in die meening wierd ik gesterkt, door de beschouwing van  
 den scherpzienden ZWAMMERDAM§; die de Steekers, waar door hy de Vang-  
 pooten verstaat, van verscheidene groote Spinnen, by welken dezelve wel zo  
 lang waren als het eerste lid van een duim, onderzocht heeft; en zegt, daar aan  
 geene opening gevonden te hebben. Ik zou nog van dat gevoelen zyn, indien  
 de onderzoeking van deeze groote Uitlandsche Spin, waar van ik in 't vervolg  
 breedvoeriger spreken zal, my niet tot andere gedachten gebragt hadde. Het  
 geluk van dezelve, gelyk eenigen der alvorens reeds beschreeven Insecten, te  
 bekomen, hebbe ik te danken aan de ongemeene goedgunstigheid van den Vorst-  
 lyken Sax-Coburgschen Saalfeldschen Legations-Raad, den Heer MEUSCHEN.

### §. 5.

Het zal by den aanvang niet ondienstig zyn, eer wy dezelve beschouwen, de  
 Classen van RÖSELI, welken hy, met betrekking tot de Spinnen, op vyf soor-  
 ten bepaalt, hier met weinige woorden aantehaalen; en dan in de volgende Pa-  
 ragraaphen te toonen, onder welken van dezelve deeze Oostindische Spin geplaatst  
 moet worden.

De eerste Classe maaken by hem die Spinnen, welke een geschikt radswys  
 weefzel, om zo te spreken, in de ruime lucht, en in 't gemeen loodrecht zaa-  
 menstellen; die ons onder den naam van *Kruis/spinnen* bekend zyn.

Tot de tweede Classe behooren die, welken zo in hoeken en gaten van Muu-  
 ren, als in Rotfen, haar digt hangrad, van de eene zyde tot de andere, uitspan-  
 nen; en van daar *Hock- of Hool-Spinnen* genaamd worden.

De

\* Zie *Anth. van Leeuwenboek, Epistolas &c. Continuation. mirandarum naturæ arcanor. de-  
 scriptar. Lugd. Bat. 1719. 4°. p. 318. 199.*

† Een deezer mannen is mooglyk nog in leeven; en ik geloove dat hy nog zo stoutmoedig is,  
 als voor 19 jaaren: toen hebbe ik, als een Kind, hem het uitbroedzel van jonge Spinnen, in  
 plaats van een afdryvend middel, zien inzwelgen.

§ Zie *Zwammerdam, Bybel der Natuur, volgens de Hoogduitsche vertaaling. Leipz. 1752  
 Fol. in de eerste Classe. p. 22.*

¶ Zie *Rösel, Nat. Hist. der Insecten, Vierde Deel, bladz. 193 en 194.*

De derde foort zyn die Spinnen, welken haar vangnet, uit een lang, onge-<sup>TAB. XI.</sup>schikt, verward weefzel van draaden vormen; en het zelve over het laage Gras,<sup>en XII.</sup> of ook wel over Distelen en Doornen heen trekken.

Onder de Vierde Classe telt hy de *Spring- of Wandel-Spinnen*; welken zich meestentyds op de aarde onthouden, en, by 't rondsom wandelen, haare Eyeren en Jongen met zich sleepen.

In de Vyfde Classe, eindelyk, plaatst hy de *Kleef-Spinnen*, en geeft haar dien naam, om dat zy zich gaarne aan muuren, stammen en planken vasthechten.

Onder welke van deeze vyf Classe behoort nu onze Spin? Deeze vraag is zo gemaklyk niet te beantwoorden, als het zich wel laat aanzien. De bloote uiterlyke gedaante derzelve voldingt toch het stuk niet; want men bemerkt dikwyls aan zeer veele Spinnen seene gelykheid van gedaante die zy met elkanderen gemeen hebben, zonder daarom tot dezelfde Classe te behooren. Haar verblyf en manier van spinnen alleen kan ons juist toereikende onderscheidstekenen aan de hand geeven; zo dat ik myne waarde Leezeren, op hunne vraag, dan eerst voldoende kan antwoorden, wanneer ik vooraf dat geene te baat neeme, 't welk ik by de voornaamste Schryvers, die zich met het beschryven der Spinnen bezig gehouden hebben, daar van aangetekend vinde.

## §. 6.

De voornaamste, en my tot nog toe bekende Schryvers, welken onze Spin beschreeven en afgebeeld hebben, zyn de volgende. GEORG. MARCGRAAF, (a), GUILIELMUS PISO, (b), Meijuffrouw MERIAN, (c), ALB. SEBA, (d), en STEPH. BLANKAART, (e), welke ook gewag maakt van NEHEM. GREW, die dezelve in het *Museum Reg. Societatis* beschreeven heeft. De Heer BAKER, (f),

I 3

schynt

- (a) Zie *Georg. Marcgravii Hist. rerum natural. Brasiliæ. Lib. VII. Cap. 3. p. 248.*
- (b) *Guil. Pisonis Indiæ utriusque rer. natural. medic. Amstel. 1658. fol. Lib. V. Cap. 10. p. 284. fq.*
- (c) *Mar. Sybille Merian dissert. de generatione et Metamorphosis Insectorum Surinamensium &c. Hagæ 1736. Med. fol. p. 18. Tab. XVIII.*
- (d) *Alberti Seba Locupletiss. rer. natural. thesauri accurat. description. Tom. I. Amstel. 1734. Med. fol. p. 109. fq. Tab. LXIX. n. 2. a. 3.*
- (e) *Dr. Steph. Blankaart, Hoogduitsche overzetting van het Schouwtoneel der Rupsen, Wormen en Maden. Leipz. 1690. p. 99. Tab. XVII.*
- (f) *H. Baker, Hoogduitsche overzetting van het Mikroskoop gemakkelyk gemaakt. Iide Deel. Augsb. 1754. 8°. Cap. 30. p. 531-539.*

TAB. XI. schynt ook van deeze Spin te spreken; schoon hy, met betrekking tot de ko-  
en XII. leuren, eenig onderscheid van dezelve melde. JONSTON gewaagt ook van deeze  
Spinne, (g), doch hy heeft zyn bericht woordelyk uit MARCGRAVII Historia  
rer. Natural. Brasiliae overgeschreeven, en geene afbeelding medegedeeld.

MARCGRAAF en PISO, (b), zeggen, dat deeze Spinnen haare nesten in  
oude muuren en holle boomen maaken; zeldzaam spinnen, en van Vliegen en  
andere Insecten leeven\*.

BLANKAART (i) geeft, in zyn verslag van deeze Spin, mede bericht van  
anderen, en zegt: dat de groote Brasiliaansche Spin, (welke zekerlyk dezelfde is  
met die, waar van ik spreek,) draaden spint zo sterk als zyde.

Mejuffrouw MERIAN (k) zegt daarentegen: — "Lange weefzels maa-  
ken deeze Spinnen niet, zo als ons eenige Reisbeschryvers willen opdringen:  
„Ik heb zeer veele soortgelyke Spinnen op den boom *Quajava* gevonden; al-  
„waar zy zich in een, door eene groote hairige Rups vervaardigd, eivormig en  
„ruim weefzel, (dat benevens de Rups op *Tab. XIX.* afgebeeld is,) onthiel-  
„den; loerende op zekere soort van groote Mieren, welken voor Boomen,  
„Menschen en 't Vee zeer schadelyk zyn; en waar mede zy in eene onophou-  
„delyke vyandschap leeven."

SEBA (l) verklaart zich, in zyn kostbaar Werk, hier over byna op dezelfde  
wyze, met dit onderscheid, dat hy zegge: — "Weefzels vervaardigt deeze  
„soort van groote Spinnen in 't geheel niet; vermits zy, wegens haare grootte  
„en zwaarte, 'er geen gebruik van zoude kunnen maaken†. Intusschen trekken  
zy,

(g) Zie *Jonston Hist. Natur. de Insectis. Lib. II. p. 140.*

(b) *Marcgraaf in Historia Natur. Brasil. Lib. VII. p. 248. en Piso in Indiae utriusque re naturalis & Med. Lib. V. p. 284. fq.*

\* De Hoogleeraar *Ph. L. St. Muller* zegt, in het Tweede Deel zynrer Hoogduitsche overzettinge  
van het *Systema der Natuurlyke Historie van de Insecten*, door *Linn. bladz. 1080.* — Deeze  
Spinnen onthouden zich in de Amerikaansche Wouden en Bosschen; en leeven [onder anderen]  
van de *Surinaamsche* Woudmieren, Kakkerlakken, (*Blattæ Gigantes Linn.*) en andere Insecten.

(i) Zie het bovenaangehaalde *Schouwtoneel der Rupsen enz. p. 105.*

(k) Zie *M. S. Merian de Metamorphosis insector. Surinam. p. 13. Tab. XVIII.*

(l) Zie *Seba in Thesauro rer. natural, Tom. I. p. 109.*

† Wat de zwaarte betreft, een spinzel dat, volgens *Blankaarts* bericht, zo sterk als een zyden  
draad zou zyn, zou deeze Spin zeer wel kunnen draagen; en zulks kan ik door eene genomen  
proef bewyzen. Myne uitgedroogde Spin heb ik met huid en hair gewoogen, en dezelve niet  
bo-

„zy, wanneer ze zich van een hoogen boom willen nederlaten, een dikken draad, langs welken zy langzaam nederzakken, even als de Rupfen\*; welken zy ook daarin gelyk zyn, dat zy van haar spinzel een ovaal nest vormen; waarin ze zich verbergen, Eyeren leggen en uitbroeden; op eene dergelyke wyze als onze Kruisspinne†. Zy hechten deeze nesten, (waar van men 'er een ziet aan den stam van een boom, *Tab. LXIX. Lett. A*, alwaar onder *num. 3.* mede deeze groote Spin, beneffens twee andere Oostersche, die haar gelyk zyn, afgebeeld is,) „zo vast aan de takken des booms, dat men dezelve niet ligtlyk van af kunne trekken” §.

## §. 7.

MARCGRAAF, PISO, JONSTON en BLANKAART beweerden dan, dat onze Spin spinnen, en een Webbe maaken kan. Dit laatste wordt door SEBA wedersproken; doch hy ontzeget haar de bekwaamheid van te kunnen spinnen niet. Maar MEJUFFROU MERIAN schynt haar zo wel voor het één als het ander onbekwaam te houden. Welken deezer Schryveren nu moet men geloof geeven? indien de meerderheid van stemmen de zaak beslissen zal, dan overhaalt het bericht der vier eersten, dat van den Heer SEBA en MEJUFFROU MERIAN. Doch het

boven een half drachma zwaar bevonden. Vervolgens heb ik een stuk Wasch vyfmaal zwaarder dan de Spin genomen; haar zeer gelykend daar uit afgebeeld; en die Figuur gezet op het Webbe van eene onzer grootste Hoekspinnen; zonder dat de Spin van wasch door het spinzel gevallen, of voor hetzelfde te zwaar geweest is. Indien wy gevolglyk de draaden deezer buitenlandse Spinne slechts drie- of viermaal zo dik en sterk als de draaden van onze Hoekspinnen stellen, en toegeeven, dat de Spin tien- of vyftienmaal zwaarder, leevendig dan dood en uitgedroogd, is, zo zou haar spinzel, dat, naar onze vergelyking, echter nog de dikte van een zyden draad niet zou hebben, haar lichaam zeer wel kunnen draagen; en men kan hier uit gemaklyk van de kleenen tot de grooten een besluit opmaaken. Ja, indien het waar is, 't geen *Blankaart* zegt, dan zouden 'er op de Bermudische Eilanden Spinnen zyn, die haare nesten tot op acht vaders wyd uitspinnen; en welken ook zo sterk zouden zyn, dat een Tortelduif, (anderen zeggen een vogel,) 'er in kan blyven hangen; waartoe bykans een Reuzen-geloof behoort. Indien 'er intuulchen iets van dien aart min of meer plaats heeft, dan behoeven wy ons niet te verwonderen, dat deeze Spin door haar spinzel gedragen kan worden.

\* De Rupfen trekken haare draaden, waar by zy zich nederlaten, niet van achteren, maar van vooren, uit eenen onder haar Kop zittenden en daar toe ingerichten Klier of Wrat.

† De Heer *Rüfel*, die de Kruisspin, benevens haaren oorsprong en Eyeren, uitvoerig beschryft, zegt niet, dat zy haare Eyeren uitbroeden, maar wel dat zy, kort na dezelve gelegd te hebben, sterven. Zie het Vierde Deel zyner *Nat. Hist. der Insecten*, bladz. 214. Ik ken wel is waar, eene soort van Spinnen, die zich meest op de beomen onthouden, en, even als deeze groote Uitlandische Spin, van achteren voorzien is, met twee staartswyze deelen; die onder een digt wefzel, dat zy over en om zich heen maakt, op haare Eyeren zit; dan of dezelve op deeze wyze uitgebroed worden, kan ik nog niet met zekerheid bepalen. Ik hoop echter, wanneer ik over deeze soort van Spinnen handelen zal, 'er iets meer van te zullen kunnen zeggen.

§ Zie *Seba* als boven, pag. 109. *f. q.*

TAB. XI. her zal met dat alles moeilijck vallen, eene stellige uitspraak te doen, en zich,  
 en XII. zonder eenige bedenking, voor ééne der partyen te verklaren: aangezien de Heer MARCGRAAF, zo wel als Mejjuffrouw MERIAN, deeze Spin leevendig gezien, ja dezelve een geruimen tyd opgekweekt heeft\*. Ik zal het daarom niet op my neemen, om my voor één dier verschillende gedachten by voorkeus te verklaren. Ik hel nogthans zeer over om te gelooven, dat, schoon de berichten van Mejjuffrouw MERIAN niet altoos de volkomenste zyn, het echter wel mogelyk kan weezen, dat deeze groote Spin geen lang Webbe maakt. Doch, wanneer zy de Spin ook het spinnen ontzegt, en het Nest, waarin dezelve zich verbergt, voor een Rupfen-spinzel houdt, zo twyffel ik, niet zonder reden, aan dit haar voorgeeven; en slaa liever geloof aan het zeggen van den Heer SEBA, dat zy zich aan een draad van boven naar beneden kan aflaaten, 't welk my grond geeft, om te denken, dat het gezegde eyvormige Nest geen Rupfen-spinzel maar het eigen werk der Spinne geweest is†.

## §. 8.

Ik houd het ook wezenlyk daarvoor, dat deeze Spin draaden van zich kan afgeeven, om dat niet alleenlyk het gedroogde origineel, naar 't welke ik myne afbeelding vervaardigd heb, maar ook eene andere Spin van dezelfde soort, welke, in *Spiritus* bewaard, my door myn geëerden Begunstiger, den Hofraad Dr. TREW, ter onderzoekinge medegedeeld is, onder aan den buik, schoon niet volkomen duidelyk, eenige deelen vertoonen, die een spinnewrat, waar uit deeze Insecten hunne draaden haalen, schynen te weezen. Hier mede is 't wel niet geheel, maar nogthans tamelyk waarschyndelyk voldongen, dat onze Spin spinnen en Netten maaken kan. Doch dewyl de tot hier toe aangehaalde Schryvers ten minsten daarin overeenstemmen, dat zy zich in hoeken en gaten, in muuren en op boomen onthoudt, als mede dat zy, ten opzichte van haare gestalte, (hoewel ze gansch hairig zy,) den inlandschen op boomen leevenden, doch mede niet geheel gladden soorten van Hoekspinnen, veel nader dan aan eenige andere soort schynt te komen, zo zal ik wel op de volkomene zekerheid haarer Classe niet roemen; doch haar evenwel in de tweede Classe, (waaronder de Heer RÖSEL alle soorten van Hoek- of Hool-Spinnen brengt,) voor anderen plaatsen. Had deeze Spin zo veel gelykheid met de Spring- of Wandel-Spin, (die zich zelden in boomholen of in de hoogte onthoudt,) als met onze Hoek-Spinnen; ja, hield zy

\* Zie *Marcgravii* Hist. rer. natural. Brasl. Lib. VII. p. 248; gelyk ook *Pisonis* Hist. natural. et Med. Lib. V. Cap. 10. p. 284. fq.

† In dit vermoeden word ik, door de Heeren *Marcgraaf* en *Piso*, versterkt; die zeggen, gelyk ik reeds in §. 6. aangehaald heb "deeze Spin bouwt haar Nest in oude muuren en holle boomen. „Zy schynt derhalven tot die soort van Hoekspinnen te behooren, welken de Heer *Rüfel* by „het beschryven van *Tab. XXIV.* des Derden Deels §. 1. *Hool-Spinnen* noemt; als welken „zich alleenlyk in holen, of reeten en gaten onthouden, dezelve met haar weefzel bekleeden, „en het ook eenigzins buitenwaarts daar over trekken."

zy zich niet in de hoogte en op de boomen op, dan zou ik haar vrylyk TAB. XI. en XII. plaatzen onder de Clafse dier Spinnen, welken niet fpinnen; en in zo ver- re met den Heere SEBA en Mejuffrouw MERIAN, naar wier gedachten zy onbekwaam zou weezen, om een Webbe te maaken, van één gevoelen zyn. Wanneer echter eene nadere ontdekking my mogte overtuigen, dat ik gedwaald heb, zal ik my niet fchaamen mynen misflag te verbeteren.

## §. 9.

Volgens de verdeeling van den beroemden ZWAMMERDAM, \* behoort deeze Spin, gelyk alle anderen, tot zyne eerfte Clafse, of onder den rang, waar in hy alle fchepzels plaatst, welken onmiddelyk uit een Ey voortkomen, en hunne eerfte gedaante, door geene volgende verandering, afleggen. Daar wy nu uit de berichten van andere Schryvers vernomen hebben, dat ook deeze groote Spin Eyceren legt, uit welken jonge van dezelfde foort voortkomen; zo vervalt derhalven ook hier mede de belachelyke en dwaaze ftelling van eenige oude Schryvers, die den oorsprong van eene ongewoone menigte van Spinnen, welke men fomtyds ontdekte, aan een in de lucht befmettend Saturnisch gift toefchryven. PARACELsus zelf zou, volgens HUBNERS getuigenis, gemeend hebben, dat de Spinnen, uit het bloed der maandelykche vrouwlyke reinigingen voortkwamen. Anderen meenden beter het doel te treffen, door eene verdikte, en ongezone lucht als de voortteelfter dier fchepzelen te befchouwen; trachtende hun ydel voorgeeven hier door fchynbaar te maaken, om dat men in zulke gebouwen, die in moerasfige en dergelyke oorden ftaan, alwaar de lucht met vuile nevelachtige dampen opgevuld is, doorgaans meer Spinnen dan elders zal vinden. Kan iemand intusfchen wel belachelyker en ongerymder droomen, nopens de voortteeling deezer fchepzelen; daar dezelve zo regelmatig faamgefteld zyn, dat men in alle derzelver Ledemaaten den grooten Schepper der Natuur ontdekken kunne? Zou niet een ligtgeloovige Oude de talryke voortplanting deezer Infecten, veeleer, aan die natuurlyke neiging tot voortteelen, welke allen fchepzelen is ingefchapen, toegefchreeven hebben; dan verkleefd te blyven aan gemelde dwaaze invallen, waarover zy van hunne nakomelingen belacht worden? Maar genoeg van een onderwerp, waar van ik reeds meer gezegd heb, dan deszelfs waarde verdient; tyd en papier zal beter befteed worden, wanneer ik ze tot de verdere befchryving van deeze uitlandfche groote Spin gebruik.

Be-

\* Zie zyn *Bybel der Natuur* Bl. 20.



## §. 10.

TAB. XI.

*Beschryving van eene groote zeer schadelyke bruinbairige achtoogige WESTINDISCHE HOEKSPIN. \**

Deeze naam is voor de gemelde Spin het best geschikt; schoon ik geloove dat zy mede in de Oostindiën gevonden wordt. De afbeelding van de groote Ceilonfche Spinnen, welken de Heer SEBA in zynen prachtige *Thefaurus*, Tab. LXIX. noot 1 en 2 voorstelt, bevestigt my in dit vermoeden. Zyne afbeelding num. 2. is aan de myne veel gelyker, dan die der Surinaamsche Spinne, zo als dezelve, op die Plaat num. 3. voorgesteld wordt; welke dezelfde is als die, door Mejuffrouw MERIAN beschreeven en afgebeeld; en die gevolgelyk met de myne eenerlei zou weezen; doch men kan zyne afbeelding geenzins de beste noemen.

Volgens het bericht van MARCGRAAF en PISO wordt deeze foort van Spinnen door de Brasiliaanen NHAMDU GUACU genaamd.

## §. 11.

Fig. 1. In Fig. 1. deezer XIde Tab. heb ik myne Spin in de eigenste grootte afgebeeld, die het uitgedroogd origineel had. Het is ligt te begrypen, dat deeze Spin, wanneer ze leevend en volwasfen is, en dus haar volkomen Lichaam en Leden heeft, myne afbeelding, in grootte, verre moet overtreffen; ook was de Spin, die onze doorgeleerde Dr. TREW, my vriendelyk toevertrouwde, waarlyk veel grooter dan de myne. En indien de anders zeer geleerde Heer Dr. RICHARD MEAD † te gelooven is, dan zouden 'er, onder deeze foort van Spinnen, zulken gevonden worden, die meer dan vyftigmaal grooter zyn, dan de grootfte Spinnen van Europa; dat naar myne meening de *Tarantula* is. Dit echter komt my bykans ongeloovelyk voor; vermits ik weet, dat eene *Tarantula* onze grootfte Kruisspinnen verre in grootte te boven gaat. Zo derhalven deeze Spin tegen de *Tarantula*, staat als vyftig tegen één, dan moest zy nog grooter omtrek hebben, dan die foort van Spinnen, waar van OVIEDUS zegt, dat zy zo groot als een speelbal waren. §.

Ik

\* In Linn. Syst. Natur. Edit. XII. p. 1034. p. 31. wordt zy *Aranea Avicularia*, de Kolibriedooder genaamd.

† Zie, *Mechanical, Account of Poisons*. p. 88.

§ Zie JONSTONS *Hist. Natur. de Insectis*. Lib. II. Punct. 2. p. 135. en Dr. GEORG ABRA-

Ik wil om die reden haare eigenlyke grootte niet naauw bepaalen, TAB. XI, maar alleenlyk nog melden, dat een *Cirkel* om alle haare pooten getrokken, eene lengte van meer dan veertien duimen bedraagt.

## §. 12.

De gantsche Spin is zeer met hairen bezet, behalven op het voorlyf, alwaar ze 'er van ontbloot schynt te wezen. Haare koleur is ten grooten deele donker-bruin; en men ontdekt alleenlyk aan het einde der pooten, omtrent de klauwen, eene oranjegeele verwe. Meijuffrouw MERIAN en MARCGRAAF zeggen, dat zy zwart is; doch in het werk van Meijuffrouw MERIAN is ze niet zwart, maar bruin afgebeeld. BLANKAART schryft haar mede eene donker-bruine koleur toe. \* MARCGRAAF en BLANKAART zeggen, dat de hairen deezer Spinne, op het gevoel, zo zagt zyn, als zyde; en PISO schryft aan dezelve een brandig prikkelend vermogen toe, wanneer zy de bloote huid van een mensch aanraaken. Of dit laatste door de ondervinding beweezen kunne worden, weet ik niet te zeggen; vermits ik nooit eene soortgelyke leevende Spin aangeraakt, en van het behandelen der doode, aan myn vel, die uitwerking niet bespeurd heb.

## §. 13.

Het lichaam van deeze Spin bestaat uit twee deelen, het Voorlyf en de Buik, welken aan elkanderen verbonden zyn, en te saamenhangen. Het eerste is van achteren breeder en kantiger dan van vooren, en bevat den vooraanstaanden iets verheven breeder en van achteren als eene V spits toeloopenden Kop, benevens den Mond en het gebit, welk onder aan denzelfen is, in zich. Boven in 't midden van het Voorlyf, eenigzins tegen deszelfs einde, vertoont zig eene navelswyze holte, waar in, buiten den Kop, zo veele insnydingen zyn, als de Spin pooten heeft.

Boven op den Kop ziet men, voorwaards by den Mond, een klein, met meer dan vier hoeken, in- en uitgeschulpt gedeelte, of hoogte, waar  
op

ABRAHAM MERKLEINS. *Historisch-Medicynsch-Dieren-Boek. Neurenberg, 1714.* 8°. in het Vierde Deel. Cap. 18. p. 709.

\* Uit dit onderscheid van koleur volgt niet, dat de Spin, waar van Meijuffrouw Merian en Marcgraaf spreken, eene andere dan de myne zou wezen: het is eerder te gelooven, of, dat zy de koleur niet wel beschreeven hebben, of, dat de veelmailige verwiseling van huid by deeze Schepzelen die verandering te wege brengt: want dat zy, zo wel als de onze, van huid verwiselen, getuigen beiden Merian en Marcgraaf, dat ze zekerlyk op goeden grond gedaan zullen hebben.

op acht kleene blinkende Oogen ftaan; welk hoogzel ik, duidelykheids-  
 TAB. XI. halve, *Fig. 2.* van hairen ontbloot, en fterk vergroot, afgebeeld heb.  
*Fig. 2.* Het heeft, even als het voorlyf, een huid, in hardigheid aan eene kreefts-  
 fchale gelyk; 't is zeer donkerroodachtig-bruin van verwe; en met eene  
 groote menigte van kleene wratten voorzien, welken het, dus vergroot,  
 eenigermate eene bultige gedaante geeven.

De gemelde blinkende acht oogen zyn over het algemeen zeer donker-  
 rood-geel, en niet allen van eene zelfde grootte en vorm. Want die  
 twee, welken boven, byna in het midden, op ieder helft van het befchreeven  
 gedeelte ftaan, die de vertooning maaken van een in een ring ingevatte  
 Edel-gefteente, en met een geelen kring omgeeuen zyn, vertoonen zich  
 volkomen rond, en overtreffen, ten aanzien hunner verhevene ligging' en  
 grootte, de zes overigen, welken ovaal-rond zyn en laager liggen. De  
 twee grootften van de zes ftaan in de beide voorhoeken; de andere vier,  
 (waar van de zevende en achtste weder iets kleiner dan de vyfde en zes-  
 de fcheen te weezen,) ftaan wat verder tegen de twee achterhoeken van  
 't gezegde hoogzel; maar niet zo naby den rand dier hoeken, als die twee,  
 welken men aan beiden de vooreinden gewaar wordt. Alle deeze acht oo-  
 gen fchyne vast en onbeweegelyk te weezen.

#### §. 14.

Ze zyn niet, als by andere Infecten, by voorbeeld, Waternimphen,  
 Vliegen, Vlinders en anderen, uit veele oogjes faamengefteld, maar maa-  
 ken ieder op zich zelve één ééinig volkomen oog uit, dat gefchikt is om  
 te zien.

Het fchynt intusfchen dat de wyze Schepper der Spinne haar meer Oo-  
 gen, dan aan andere Schepzelen, gegeeven en dezelve in eene verhevene  
 plaats gezet heeft, op dat zy voor en achter, over en nevens zich, over  
 en tusfchen haare pooten door zou kunnen zien; en op zulk eene manier  
 niet alleen haare fpyzen, maar ook haare vyanden ontdekken. Hierdoor  
 is ze altoos in 't eene en andere geval gereed; waar toe ze met twee, en  
 dan nog onbeweegelyke oogen, niet zo wel in ftaat geweest zou zyn.

Ik ken onder onze foorten van Spinnen, welken my voorgekomen zyn,  
 geen, wier oogen in zulk eene orde ftaan, als die deezer buitenlandsche.  
 Ook heb ik 'er onder de Zweedfche, welken de Heer CLERK \* laat af-  
 beelden, en wier verfcheidenheid zich tot 60 foorten zal uitftrekken,  
 gee-

\* Zie zyn reeds aangehaalde Tractaat, over de Zweedfche Spinnen, in de Voorre-  
 den p. 4.

geenen gevonden, wier oogen in deeze orde verdeeld waren. De afbeel- TAB. XL.  
dingen van MARCGRAAF en PISO, (die eenerei zyn,) vertoonen  
ons slechts vyf Oogen; en schoon Mejuffrouw MERIAN deeze Spin  
met acht oogen afgebeeld hebbe, zo heeft zy dezelve niet in de rechte or-  
de maar zeer verward voorgesteld. De Heer SEBA \* die Mejuffrouw  
MERIAN tegen spreekt, en maar twee oogen aan de Spin toekent, moet  
of niet wel gezien, of een zwak gezicht gehad hebben.

BLANKAART † heeft deeze schikking der Oogen mede aangewezen;  
maar het zevende en achtste weggelaaten. Daarentegen stemt BAKERS  
afbeelding §, zo wel met betrekking tot de orde, als ten aanzien van het  
getal en de gestalte, boven alle de andere tot hiertoe aangehaald, met de  
onze best overeen; waarom ik ook geloove, dat zyne, schoon geheel anders  
gekoleurde Spin, met de onze dezelfde is.

## §. 15.

De Proef, welke BAKER met deeze oogen genomen heeft, heb ik na-  
gedaan. Ik heb den oogheuvel van zyne plaats genomen, dien inwendig  
van zyn bloedvaten en vezels, (of wat het anders mag zyn,) gereinigd;  
toen, door de daar nu zynde twee groote, kogelswyze, en sterk gewelfde  
oogen, eenige voorwerpen beschouwd; en, even als hy, 'er eene merke-  
lyke vergrooting in ontdekt \*†; schoon de bewolkte of verslaauwde doode  
oogen der Spinne, dezelve eenigzins onduidelijk vertoonden.

Niet minder heb ik ondervonden, dat de overige zes oogen geene zo ko-  
gelronde, maar eer eene lensvormige bolronde gedaante hebben; en dat ze  
alle met een geel doorzichtig huidje, waar aan zy gehecht schynen te weezen,  
omgeeven zyn. Van het om te zien zo noodzaakelyke netswyze huidje,  
(*retina, tunica retiformis amphiblestroides*,) kon ik niets ontdekken; of  
om dat de gedroogde oogen reeds bedorven waren; of om dat ik het zelve,  
by

\* Zie SEBA in *thesauro* Iste Deel. p. 109.

† Zie zyn *Schouwtooneel van Rupsen Wurmen en Maaden*. p. 100.

§ Zie BAKERS *Vervolg op 't nuttig gebruik van 't Microscop*. IIde Deel. p. 536. Tab.  
XV. Lit. 4.

\*† Dezelfde sterk-vergrootende kracht heb ik in het Christallyne Vocht van 't oog  
der Kikvorschen insgelyks waargenomen; en ik twyffel niet, of alle oogen, welker  
Christallyne Vocht in een gewelfd gezichtstuijng ingeslooten is, hebben het zelfde ver-  
mogen. Weshalven de Spinnen, in dit geval, niets byzonders boven andere Schep-  
zelen bezitten.

TAB. XI. by de zuivering van de binnenste oogzyde, reeds ongelukkig weggenomen had.

§. 16.

Wy zullen nu ook de acht pooten van onze Spin, op *Tab. XI.* voorgesteld, wat nader beschouwen.

Dezelven zyn allen aan het Voorlyf ingewricht; en het voorste en achterste paar is langer dan de vier middelsten. Ieder poot bestaat uit zes, sterk met lange bruine haren bewasfen, geleden, of gewrichten; tot op het gelid, het welk met korte oranje geele haren, en met een kleenen dubbelden zwarten klaauw voorzien is. Deezen kleenen dubbelden te saam gevoegden klaauw heb ik, in de 3de *Fig.* tweemaal afgebeeld; eens geopend, zo dat die zich als een dubbelden klaauw vertoone, en eens geslooten, in welke laatste afbeelding dezelve slechts één enkele klaauw schynt te zyn.

*Fig. 3.*

*Fig. 4.*

Van boven, daar die klaauwen zich als twee gekromde puntige haaken vertoonen, zyn ze zwart; maar wat laager worden ze rood-bruin en glanzig. Ze schynen hoornachtig te wezen, en der Spinne te dienen, om 'er zich mede vast te houden. En, vermits zy die klaauwen naar goedvinden kan openen en weder sluiten, zo geloof ik, dat haar dezelve ook dienen, ter bereidinge der draaden, langs welken zy kan opklimmen of nederdaalen; en wel voornaamlyk om de draaden uit den Spinwrat te trekken, en zich daar aan vast te houden: op dat, als de hoogte te groot ware, de zwaarte van haar Lichaam niet zoude veroorzaaken, dat haar alle draaden ontgingen; wanneer zy, of vallen, of langs denzelfden draad zou moeten terugkeeren.

*Fig. 5.*

*Fig. 5.* Vertoont, in eene mindere vergrooting, de twee uiterste leden van één der grootste Voorpooten, op de onderste zyde; of de met de reeds genoemde Klaauwen voorziene Voetzool.

Deze Voetzool, indien ik dit gedeelte zo moge noemen, is overal met veele dicht byeenstaande stompe en styve Hairen bezet; zo dat ik dezelve, sterk vergroot zynde, best by eene met zwynsborstels opgevulde borstel vergelyken kunne. Haare nuttigheid weet ik niet te melden, ten ware dat die ruigte de vlugheid van den gang der Spinne beter bevorderde, dan zo 'er de klaauw niet in de voorzien was. Want voor een sponsachtig deel of vochtig zwam, dat der Spinne het vermogen zou geeven, om zich aan een glad lichaam vasttehechten, (gelyk de Heer HOMBERG 'er aan meent waargenoomen te hebben \*,) kan ik zulks niet houden. Te minder daar ik

aan

\* Zie les *Memoires de l'Acad. Royal. des Sciences* 1707. in 't VIIde Deel. p. 7.

aan eene onzer inlandfche Hoekspinnen reeds ontdekt heb, hoe en op welk TAB. XI.  
eene wyze de Spinnen zich aan een glas, of eenig ander glad Lichaam vast  
kunnen houden; dat geenszins door middel van een sponsachtig gedeelte ge-  
fchiedt; waar van ik ter zyner plaatze een nader bericht zal geeven, wanneer  
ik onze inlandfche Spinnen zal befchryven.

Voorts heb ik, wat hooger aan de beide Voorpooten, onder aan het  
derde lid deezer Spinne een kwastig, ruig, en als een achterklaauw gekromd  
uiftteekzel waargenomen, 't welk ik *Tab. XII. Fig. 1.* by A vertoon; doch ik TAB. XII.  
heb het zelve, aan eene andere dergelyke Spin, welke ik bezat, niet ontdekt. Fig. 1.  
De begeerte, om de eigenlyke hoedanigheid van dit kwastachtig uiftteekzel, Lett. A.  
en wat 'er in verborgen ware te ontdekken, fpoorde my ter verdere onder-  
zoekinge aan. Ik ontblootte daarom dat Lid, waar by het geplaatst was, van alle deszelfs hairen, (*Lett. B.*) en befchouwde het vervol- Lett. B.  
gens door een goed vergrootglas. Dit deed my gewaar worden, dat het  
met een gantsch bosch van zulke ftyve doornachtige borstels bezet was,  
als 'er eene met eene fterke vergrooting by *Lett. C* afgebeeld is. Lett. C.  
Ik nam vervolgens ook die borstels ter zyde weg, en blies water in  
het lid, om te zien, of het uiftteekzel zo hol als dit ware, en 'er het  
water door heen liepe. Maar, fchoon ik het water, uit alle de kleine ga-  
ten, waarin voorheen de Hairen geftaan hadden, zo menigvuldig als zweet  
zag heen druipen, kon ik toch niet ontdekken, dat het zelve ook aan 't ge-  
melde kwastachtige uiftteekzel een uitgang zocht. Ik giste derhalven dat het  
mifchien met eene digte ftof opgevuld zou zyn; en fcheidde het daarom, Lett. D.  
door eene fneede, van het Lid af; maar bevond het hol, gelyk het by  
*Lett. D* vertoond wordt.

Ik weet niet welk eene verrichting of nuttigheid ik aan dit uiftteekzel zal  
toefchryven, of het moest zyn, dat alleen het Mannefje, zo als het fchynt,  
en niet het Wyfje daar mede voorzien is. Ik heb het althans aan eene ande-  
re dergelyke Spin, maar die eene fmalle Borst had, en welke ik voor een  
Wyfje hield, niet kunnen ontdekken. In dit geval zou het by de paaring  
der Spinnen, die, volgens *Piso*, met omgekeerde Lichaamen ge-  
fchiedt \*, op de eene of andere wyze nuttig kunnen zyn; offchoon het,  
naar deszelfs gedaante, niet fchyne 'er iets aan toe te kunnen brengen.

## §. 17.

\* De Heer *Clerk* befchryft de paaring van die foort van Spinnen, welke hy *Montani*  
of *Bergfpinnen* noemt, in zyn werk van de *Zweedfche Spinnen*, p. 64. op de zelfde wy-  
ze; en ik hebbe, eerst in de ontwikkelende Lente deezes jaars 1762, eene zekere  
foort van Hoekspinnen op die eigenfte manier zien paaren; 't welk my het bericht  
van *Pifo* als welgegrond doet voorkomen.

## §. 17.

**TAB. XII.** Na de tot hier toe breedvoerige beschouwing van de 1<sup>ste</sup> *Fig.* op *Tab.* XI. en van de daar toebehoorende merkwaardigste deelen op *Tab.* XI en XII voorgesteld; zullen wy nu verder het oog slaan op de 1<sup>ste</sup> *Fig.* der XII<sup>de</sup> *Tab.* en de daarmede verbondene deelen; om na te gaan, wat hier verder aanmerkenswaardig zy.

**Fig. 1. a.** De eerste *Figuur* van *Tab.* XII. vertoont ons weder onze Spin, maar zonder pooten, en op de onderste zyde te zien. Haare uiterste gewrichten zyn met de acht Letters *a* getekend. In deeze ligging ziet men ook de twee Vangklaauwen, den Mond, de Voelpooten, het Borststuk, den Buik en den Spinwrat.

**Fig. 1. b.** By Letter *b.* ontdekt men, tusschen de voelpooten, de met vermilioen-roode Hairen bezette, en met twee groote kromme Vangklaauwen gewapende Kaak, benevens haare aan de Borst staande Lippen. Vermits nu de Vangklaauwen vooral onze opmerkzaamheid verdienen, en de schadelykheid of onschadelykheid der Spinne van derzelver gesteldheid afhangt, zo zullen wy ons niet terstond verwyderen van de deelen die tot den Mond behooren, maar dezelve nog wat onderscheidenlyker gadeslaan.

De beide Vangklaauwen liggen niet lynrecht voor den mond der Spinne, als een paar schaaren, of zo als by onze groote Kruisspinnen; maar neffens elkander met onderwaards omgeboogene spitzen, welken de Spin, naar goedvinden, kan uitflaan en weder intrekken. Ze zyn zwart, en hebben hun steunpunt en beweeging op een groot, breed hardhuidig en glanzig zwart-bruin gedeelte, het welk van onderen met eene enkelvoudige van acht kleine zwarte tanden, en van boven met een bosch bruine, doch wat laager, benevens de acht kleine tanden, met veele vermiljoen roode haren bedekt is. Ik kan dit, met tanden bezette gedeelte, niet beter dan met een Kaakenbeen vergelyken; vermits de Spinnen haaren roof met die Vangklaauwen op deeze deelen niet alleenlyk vermaalen, maar denzelven ook voorts in het daar onder zynde Keelgat brengen kunnen.

## §. 18.

**Fig. 2.** In de tweede *Figuur* zien wy zulk eene kaak met een geslooten, of stil-  
 3 " 4 liggenden Vangklaauw, benevens de acht kleine Tand; **Fig. 3.** ver-  
 toont ons den Klaauw uitgeslaagen; en **Fig. 4.** is eene sterk vergroote af-  
 beelding van één der laatste achterwaardsstaande groote Tand; zynde één  
 van de acht, welke wy beschreeven hebben. — Men oordeele nu daar uit  
 of





of het gebit aan zulk eene Spin in het klein 'er niet zo vreesfelyk uitziet, als TAB. XII.  
 ons de verschrikkelyke welgewapende, en met tanden sterker bezette kaak,  
 van een Leeuw, in 't grootte voorkomt. Doch wy hebben nog niet alles op-  
 gemerkt, wat voor ons, behalven de Kaak, in dit scheepzel zelve, te vree-  
 zen zy; en de ontvouwing hiervan ontbreekt nog aan aan onze beschryving  
 van de Vangklaauwen. Wy moeten desaangaande zien, of dezelve, ge-  
 lyk PISO, NIEUHOF, MERIAN, LEEUWENHOEK, BAKER en  
 anderen beweerden, vergiftigend zyn, dan niet?

## §. 19.

Ik heb boven reeds gezegd, dat de beschryving van den Heer RÖSEL  
 en SWAMMERDAM, welken de Vangklaauwen der Spinnen onderzocht,  
 en 'er geene opening aan ontdekt hebben, my tot een wantrouwen, omtrent  
 de waarneemingen van LEEUWENHOEK, en de vergiftigende eigenschap  
 der Spinnen in 't algemeen, gebragt hadden. Ik hoopte dus, dat deeze vry  
 groote Vangklaauwen, door middel van eene naauwkeurige onderzoeking, my,  
 myne twyfelmoedigheid geheel zouden beneemen, of my in dezelve nog  
 meer versterken.

Ik beschouwde gevolgelyk deeze Vangklaauwen eerst met het bloote oog,  
 van alle zyden ten naauwkeurigste, en wierd weldra gewaar, dat zy my,  
 geheel naar vooren, niet ver van het uiterste punt, iets vertoonden, het  
 welk my eerder toefcheen eene holte dan een plat stipje te zyn. My echter  
 op het ongewapende gezicht alleen niet willende verlaaten, beschouwde ik  
 dat schynbaare stipje door een enkel vergrootglas; en dit bevestigde my nog  
 meer in myn denkbeeld. Hierop verzuimde ik niet dien klaauw, in eene  
 behoorelyke richting, en by helder weer, onder een goed saamgesteld ver-  
 grootglas te brengen, en denzelven met alle opmerkzaamheid te bezichtigen.  
 Maar hoe verheugde ik my, toen ik dezelfde opening zag, die de waarheid-  
 lievende LEEUWENHOEK ontdekt, en waar van hy gezegd had, dat uit  
 dezelve waarfchynlyk die stoffe moest vloeijen, welke wy gewoonlyk ver-  
 gif noemen. (\*)

Ik zag die opening zo duidelyk, ja byna nog duidelyker dan op den An-  
 gel van een Schorpioen, welken de Heer RÖSEL in het III<sup>de</sup> Deel *Tab.*  
*LXVI. Fig. 5.* voorgesteld heeft; doch met dit onderscheid, dat die op den  
 Angel twee openingen, maar onze Spin, op haare Vangklaauwen, slechts  
 ééne

\* Zie zyne reeds genoemde *Continuation. arcanor natural. T. IV. epist. 138. p. 318. sq.*  
 als mede N. 272. der *Philosoph Trans. p. 868.*

Taf. XII. ééne enkele opening, of spleetje had. Dezelve is niet rond, welke gedaante de Heer LEEUWENHOEK haar geeft; ook niet zo onduidelijk als dezelve in het Werk, van den Heer BAKER afgebeeld is: maar langwerpig-ovaal, als die op den Angel van den bovengenoemden Schorpioen. Zy staat ook niet op zyde als by deezen, maar boven op het snydend gedeelte van den Klaauw, eenigzins naar de binnenste zyde hellende; gelyk men in *Fig. 5.* by *Letter c.* zien kan. Ik moest my derhalven zeer verwonderen, dat noch de anders scherptziende Heer SWAMMERDAM, die echter veel grooter vangklaauwen, dan die waar van ik spreek, beschouwd heeft; noch de beroemde en arbeidzaame Heer RÖSEL, die veel kleinere, naamlyk de Vangklaauwen van ééne onzer Kruisspinnen, heeft onderzocht, deeze opening niet hebben kunnen vinden, welke ik alleenlyk met het bloote oog reeds ontdekt had.

§. 20.

Op dat echter niemand vermoede, als of ik, zonder eenigen grond, uit de Vangklaauwen deezer uitlandsche Spinnen, een besluit wilde opmaaken, tot alle anderen, die mogelyk geheel niet schadelyk zyn; zo moet ik in de eerste plaatse zeggen, gaarne te gelooven, dat niet alle Spinnen schadelyk zyn; en dat men dus dezelven, met MOUFET, gevoeglyk in *schadelyken en onschadelyken* verdeelen kan. Dan ik moet nogthans teffens tot naricht melden, dat ik, in myne verdere naspooringen, niet alleen by de Vangklaauwen dier groote Kruispin, welke RÖSEL in het IV<sup>de</sup> Deel van zyn werk *Tab. XXXV.* heeft voorgesteld, gebleeven ben; maar ook een zelfde onderzoek van de Vangklaauwen der groote Hockspinnen, die zich in onze huizen onthouden, en van eene andere kleinere soort van Hockspinnen in 't werk gesteld heb; en dat ik, ook aan ieder deezer, die opening zeer duidelyk ontdekt hebbe.

Ik twyfel daar beneffens niet, of ik zal, zo God my het leeven en een scherp gezicht laat, nog meer dergelyke ontdekkingen doen, aan andere soorten van Spinnen, welken ik, met de beschouwing der Tarantula, in 't licht hoop te geeven. Ondertusfchen wil ik echter niet beweeren, dat onze Spinnen zo schadelyk zyn, als die geen, welken in eene heetere Luchttrekk haar verblyf hebben. Of het bericht van MERKLEIN, dat de Schotlandsche Spinnen geen vergif hebben, \* naar waarheid zy, zal ik, by gebrek van genoegzaame ondervinding, aan zyne plaats laten. En ik ben niet voorneemens, om, op het voorbeeld van de Heeren BOR en CLERK, het te waagen, my van Spinnen te laten steeken; veel minder zal my, met den alhier nog leevenden Burger, de lust bevangen, haar

voor

\* Zie D: GR. ABR. MERKLEIN *Hist. Medicyns Dierboek. Part. IV. c. 18. p. 711.*

voor een geneesmiddel te gebruiken, noch by zulke Indiaanen ter maalyd TAB. XII. te gaan, welken die Spinnen als eene kostelyke Lekkerny schafften. †

Dat evenwel de Heer RÖSEL deeze opening niet heeft kunnen ontdekken, daar van zal noch zyn gezicht, het welk scherp genoeg was; noch het duistere weder; (want by zulk weder zal hy de Vangklaauwen niet beschouwd hebben;) maar welligt eene verkeerde plaating dier klaauwen, de waare oorzaak geweest zyn.

§. 21.

Gemerkt wy nu gezien hebben, dat deeze Spin met zulk een schadelyk werktuig, waar mede zy kwetzen kan, voorzien is, zo kan men PISO, NIEUHOFF, BAKER, Mejuffrouw MERIAN, en andere Schryvers, in dit geval beter gelooven, dan den Heer SEBA, welke van Mejuffrouw MERIAN, doch verkeerdlyk, voorgeeft, dat zy van deeze vergiftige steekers, (zo noemt hy de Vangklaauwen,) niets meldt; daar zy nogthans op Bladz. 18 van haar fraaie werk zegt, „ dat die Spin met puntige tanden, den voorzien is, waarmede zy gevaarlyk byten en wonden kan; laten- „ de tegelyk zekere vochtigheid in de gebeetene wonde komen.” \*

De

† Zie SEBA in 't eerste Deel van zyn *Thesaurus*. p. 110.

\* Het is voorwaar te bewonderen, dat de alleszins scherpziende en naauwkeurige Heer Dr. SWAMMERDAM, in zyn *Bybel der Natuur*. §. 22. zegt: — „ Ik heb „ ook nooit, hoe vlytig ik 'er altoos acht op gegeven hebbe, bemerkt, dat de Spin- „ nen, wanneer ik haar tot gramschap aanporde, eenig vergiftig vocht door de „ Steekers van zich gaven.” Hy stemt daarom het gevoelen van den beroemden Heer Pastor S. A. E. GOEZE in *Quedlinburg*, in eene Hoogduitsche overzetting van Dr. MARTIN: LISTERS *Natuurlyke Geschiedenis der Spinnen*, bl. 2, 3, en 45, toe, en gelooft zelfs, dat de Spinnen die Knypers, gelyk de Micrenleeuw, veel eer tot Zuigers, dan tot loozing van eenig vergif gebruiken; te meer, dewyl die Steekers naar de tanden toe eindigen. Dan ik moet deswegens hier nog melden, dat ik, toen ik eene van onze groote Spinnen onder het Mikroskoop bragt, deeze werktuigen van haare wraak, met de daar aan zynde opening, duidelyk ontdekken konde; en de Spin, zelf verscheidene maalen door tergende behandelingen, zichtbaar toornig geworden was; dat ik evenwel, in weerwil van dat alles, niet eerder eenige vochtigheid uit de opening haarer Vangklaauwen zag voordkomen, dan toen ik haar gevoelig kwetste; wanneer ik uit de gemelde opening duidelyk genoeg eenig vocht zag voortvloeijen. Dit zo zynde zo wil ik, wel is waar, den Heer SWAMMERDAM gaarne gelooven als hy zegt, dat hy uit de opening van deeze Vangklaauwen geen vocht heeft zien vlieten: maar ik geloove ook, dat hy zyne spinnen, die buiten haar weefzel zeer vreesachtig zyn, en sterkere schepzels dan zy alleenlyk trachten te ontvluchten, niet genoeg tot gramschap aangezet heeft. Ik kan om die reden ook de gedachten van den Heer Pastor GOEZE, die deeze opening meer voor een werktuig om 'er doortezuigen, dan om 'er eenig vergiftend vocht door uit te storten, houdt, nog niet toestemmen. Middelerwyl is, uit het bygebragte gemaklyk te begripen, waarom alle Spinnesteeken geen kwaade gevolgen hebben.

TAB. XII. De Heer BAKER zegt ook, dat hy, eer hy nog deeze opening ontdekte, met den Heer Dr. MEAD geloofde, dat de Heer LEEUWENHOEK gedwaald had: en vermoëdde, dat de steek of beet allcen eene wonde kon veroorzaaken; in welke dan vervolgens een giftig vocht gebragt werd, door een korten witten snuit, die uit den mond der Spinnen voortkwam. \*

Hierom zegt hy vervolgens zeer wel: „het zou niet volkomen oprecht „gehandeld zyn, indien ik van dit onderwerp wilde aftappen, zonder „den Heer LEEUWENHOEK recht te laten wedervaaren; aangezien ik „nogthans, schoon ik wel eens gedacht hebbe, dat hy, in de beschry- „ving der dingen, welken hy door vergrootglazen beschouwt, gedwaald „had, (’t geen echter zelden gebeurt,) vervolgens ondervonden heb; „dat zyne beschryvingen naar waarheid zyn; en dat de onderwerpen, „waar over ik te vooren oordeelde, niet volmaakt van dezelfde foort, „of in de zelfde juiste volkomenheid waren, als de zynen. Ik hoop der- „halven, dat dit anderen voorzigtiger zal doen zyn; om in stukken van „die natuur, zonder eene genoegzaame onderzoeking, geen besluit op te „maaken; het geen ik echter geloof dat maar al te dikwils gebeurt † MARCGRAAF en BLANKAART zeggen; dat men deeze Vangklaauwen in ’t goud gezet wel voor oorlepeltyes en tandestookers gebruikt heeft.

### §. 22.

Nu zullen wy ook de beide Voelpooten welken op *Tab. XI. Fig. 1.* met *Fig. 1. d. E.* en op *Tab. XII. Fig. 1.* met *d* getekend zyn, § in opmerking neemen.

Deeze ziet gy aan het Lichaam der Spinne voor aan het Borststuk, neffens den Mond, en schynen uit vyf leden te bestaan.

Zy zyn zeer sterk met donker bruine hairen bewasfen; welken van vooren

\* Zie R. MEAD *Mechanische beschryving der vergiften.* p. 88. in ’t zesde Deel.

† Zie BAKER *Vervolg op ’t nuttig gebruik van ’t Mikroskoop.* Deel III. bl. 535. enz.

§ Vermits de Spinnen deeze Voelpooten, wanneer zy een Insekt bemagtigd hebben, ook gebruiken, om het zelve, wanneer zy ’t willen uitzuigen, ’er mede vast te houden en het indiervoegte te keeren of te draaijen, als tot het uitzuigen noodig is, zo schynen deeze Voelpooten veeleer den naam van Hulpooten te mogen draagen. By de Manlyke Spinnen heb ik ’er het teellid aan ontdekt; dat van het Wyfje heeft daarentegen zyne plaats onder en voorwaards aan den Buik.

ren aan het eerste lid oranje geel zyn, en uit digtere hairboschjes bestaan, TAB. XII. dan op de overige leden.

Ik heb aan deezen dergelyke kleene Klaauwen, gelyk de andere acht pooten hebben, niet bemerkt, maar wel geheel anderen en ongelyke grootere bespeurd; welken van vooren, onder een bosch oranje geele en brui-ne Hairen, genoegzaam verborgen lagen, en met hunne scherpe punten rugwaards naar de Borst gekeerd worden, gelyk te zien is in *Fig. 6*; al- *Fig. 6.* waar ik een Voelpoot van de binnente zyde met den Klaauw voorzien afgebeeld heb.

Maar, vermits deeze Klaauw zich daar niet zo volmaakt vertoont, als hy 'er waarlyk uitziet, wanneer hy van den Poot afgescheiden wordt; zo heb ik denzelven *Fig. 7.* nog eens in zyne natuuryke grootte voor- *Fig. 7.* gesteld; welke afbeelding ons dan eene zwartbruine, dikke, ronde, hoornachtige flakswyze geboogen, zelfstandigheid vertoont; uit welke een lange, tedere, zeer puntige uit en inwards geboogen Klaauw hervoort komt.

### §. 23.

Op de eerste beschouwing hield ik dit dik flakswyze gedeelte voor eene bewaarplaats van vergif; en geloofde, dat de daaraan zynde puntige Klaauw met ééne opening, waar door dit gif kon uitkomen, voorzien zou weezen; waarom ik hetzelfde, in allerlei richtingen, onder een goed Vergrootglas bragt. Maar myne naauwkeurige waarneemingen ontdekten my niets anders, dan zulk eene onkenbaare spleet, als by *Lett. e* aange- *Fig. 2.* duid wordt, (alwaar ik slechts het uiterste spitsje van deezen Klaauw sterker vergroot heb,) en welke ik voor geene opening wil uitgeeven.

Doch waar toe dient dan der Spinne die scherppuntige en onder zo dik gevormde Klaauw? Is dezelve daar toe geschikt, op dat de Spin 'er zich van zou kunnen bedienen, tot bemachtiging van haaren roof? Of is dit gedeelte een kenteken van haar manlyk geslacht; en gebruikt zy het ter voortplantinge van het zelve? Ik wil geen van beiden beweeren, maar geloove, dat de Spin, ingevalle van nood, dien klaauw uitflaan, in haaren prooi indringen, en 'er zich zelve mede vasthouden kan. Dit is te waarschynelyker, nadien deeze Spinnen, volgens het bericht van Mejuffrouw MERIAN, niet alleen op insecten aazen; maar ook op de eyeren van den kleenen vogel *Colibrie* komen, die verbreeken en uitzuigen; ja zelfs dat vogeltje in zyn nest wel overvallen, dooden en mede uitzuigen; 't welk de bekwaame Mejuffrouw MERIAN, in haar groot werk over de Surinaamsche Insecten, *Tab. XVII.* zeer aartig beschreef.

TAB. XII. De Heer FESDORFF heeft dit, in een fierlyk Gedicht op dit schoone vogeltje, (welke onder alle foorten van vogelen byna de kleinste is,) naar eene ruime navolging aldus bezongen. \*

DE ZONNEVOGEL, † FRAAI GEVORMD DOOR 'S HEEREN HAND,  
BOUWT ZYN UITMUNTEND NESTJE IN HOOGGETAKTE BOOMEN;  
MAAR 'T ZIDDELT BY ZYN GADE, IN 'T BLY VERWELLEKOMEN,  
WYL DE TARANTULA, § HEM DOODSCHE STRIKKEN SPANT.  
DEEZ' SPIN BLOEDGIERIG, EN DOOR ROOFZUCHT AANGEDREEVEN,  
BRENGT MAN EN GADE EN KROOST MEDOOGENLOOS ON 'T LEEVEN.

Middeleryl is het evenwel niet onmogelyk, dat deeze klauwen, by de paaring der Spinnen, hunnen bepaalden dienst verrichten.

### §. 24.

Aan de knoepige Voelpooten van zekere foort onzer inlandfche Manlyke Hoek-spinnen heb ik ook wel, (maar verder achterwaards,) een Klauwswyze en tegelyk rugwaards liggend deel gevonden, van welke nuttigheid ik nog niets met zekerheid zeggen kan. Doch dewyl ik dit klauwswyze gedeelte by het Wyffe van onze inlandfche Spin, zo min als by de bovengenoemde andere Spin, welke ik voor een Wyffe en voor eenerleie foort met deeze houde, vinden kan; zo is het wel mooglyk, dat de bovengenoemde knoepige Klauw, by deeze buitenlandfche Spin, het Mannetje van het Wyffe onderscheidt. \*†

't Ver-

\* Zie dit Gedicht van den fchoonen en bykans kleinften Vogel, welke onder den naam van *Colibrie* bekend is. Lubech 1753 in 4. p. 413.

† Dus noemt de Heer FESDORFF dit by verfcheide naamen bekende Vogeltje.

§ Indien men onder den naam van *Tarantula* alleenlyk eene fchadelyke Spin verftaat, zonder op het onderscheid der foorten te letten, dan heeft de Heer FESDORFF ongetwyffeld gelyk, met deeze Spin alzo te noemen. Maar als men onder dezen naam alleenlyk die Spinnen betreft, die, even als de *Tarantula*, haar verblyf in de Holen der Aarde hebben, (even als zekere foort van onze Spinnen, welken haare jongen met zich vervoeren,) dan is die benaaming niet voor deeze Spin gefchikt; vermits zy niet tot de foort van Aard- maar tot die der Hool-Spinnen behoort; het welk ik echter niet bybreng, om den Heer FESDORFF te wederleggen; maar flechts om te melden, dat deeze foort van die der *Tarantula* geheel onderfcheiden is.

\*† Thans, daar ik aan onze inlandfche Manlyke Spinnen, aan derzelver Voelpooten, fchoon eenigzins verder achterwaards, de Mannelyke Teel leden ontdekt, en derzelver gefchiktheid gezien heb, zo twyffel ik 'er in het minfte niet aan, of de Slakswy-

't Verdient zyne opmerking, dat geenen van de hier boven aangehaalde <sup>TAB. XII.</sup> Schryvers van deezen byzonderen Klaauw gewag maaken; schoon zy de Voelpooten, met even zulke kleene Klaauwen, als de overige acht pooten bezitten, en die ik aan de myne niet heb kunnen ontdekken, hebben laaten afbeelden.

## §. 25.

Wat verder den Buik van onze Spin betreft, dezelve is, *Tab. XII. Fig. 1.* <sup>TAB. XII. Fig. 1.</sup> terstond achter het Voorlyf te zien; en heeft, met de overige deelen der Spin, eenerleie, naamlyk, eene donkerbruine koleur. Hy is zeer hairig, schynt in meer dan drie deelen verdeeld te zyn, en is, behalven een Spinwrat gelykend gedeelte, van achteren, even als onze groote Hoekspinnen, met twee staartswyze leden voorzien, welke ik met † getekend hebbe.

De Heer 'SEBA meent, dat deeze twee staartswyze leden deelen zyn, die het Teellid van de Spin bedekken. Maar vermits hy niet zegt, of 'er de Mannelyke of Vrouwelyke Teelliden onder verborgen zouden zyn, zo laat ik dit, (dewyl ik aan de waarheid van zyne meening nog twyffel,) zo lange onbeflist, tot dat my de ondervinding zelve 'er van overtuigt.

Intusschen helle ik over, om te denken, dat het beiderleie geslacht deezer Spinnen, 'er mede voorzien is; en dat deeze leden, als de Spinnen haar rach maaken, of haar nest vervaardigen willen, de draaden, die uit den daar achter liggenden Spinwrat voortkomen, de behooryke richting en ligging geeven kunnen. Voor 't overige heeft men zich niet te verwonderen, dat ik aan den Buik van deeze Spin, geen kentekenen van Teelliden heb kunnen ontdekken: aangezien ik vermoede, dat ik geene Spin van het Vrouwelyke maar van het Mannelyke geslacht, welks Teelliden niet altoos aan den Buik schynen te zitten, onderzocht hebbe.

## §. 26.

wyze deelen, door my aan de Voelpooten van deeze uitlandsche groote soort van Spinnen ontdekt, en op *Tab. XII. Fig. 6, en 7.* voorgesteld, wezenlyk de Teelliden van het Mannelyk geslacht dier soorte zyn. Ik heb sedert werkelyk eene Mannetjes-Spin afgebeeld, die geen zo groot agterlyf laat zien, als de Wyfjes; by welke laatste deeze Teelliden aan de Voelpooten geheel ontbreken. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Wyfjes deezer soorte, even als onze Europische Spinnen, de Teel-deelen onder aan het Achterlyf, naby het Borststuk of Voorlyf. — Deeze, gelyk ook de voorgaande aantekening op § 22, zie mede op § 21, steunt op latere waarnemingen van den Heer KLEEMANN. Wy hebben dit noodig geacht te herinneren, om dat deeze byzonderheid in den tekst, of in de Hoogduitsche uitgave, nog in 't onzekere gelaten was. — Voortaan zullen we, duidelykheidshalve, alle zodanige aantekeningen, die dus van later tyd zyn, met de letteren (a) (b) (c) aanwyzen.

DE VERTAALER.

## §. 26.

TAB.XII. Hoe oud deeze Spinnen mogen worden, kan ik niet bepaalen. Het fchynt echter dat zy tot een hooger en ouderdom, dan de Europifche, en althans langer kunnen leeven, dan de Zweedfche Spinnen; waar van de Heer CLERK zegt, \* dat zy niet boven het jaar oud worden.

MARCGRAAF verzekert, † dat hy eenigen van dezelve twee jaaren in het leeven had behouden; en de Heer Dr. MART: LISTER zou aan de Engelfche Spinnen hebben waargenomen, dat die den ouderdom van twee jaaren bereiken moeten, om ter voortteeling bekwam te zyn.

Zo veel hebbe ik voortegenwoordig van myne waarneemingen nopens eene buitenlandfche Spin kunnen en willen mededeelen: beloovende verder 'er meer van te zullen zeggen, wanneer ik myne befchryving van onze inlandfche Spinnen, en van de zo zeer bekende Tarantula, zal afgeeven.



*Eene Rups wier Kapel, en ook eene Kapel, wier Rups, in het werk van RÖSEL befchreeven en afgebeeld zyn, beiden tot de 2de Clafse der Nachtvinders behoorende.*

## §. 1.

TAB.  
XIII.

Vermits ik, tot hier toe, een vry aanzienlyk getal van Uitlandfche Infeften medegedeeld heb, zo zal ik my nu eens by de Inlandfche bepaalen. Deezen tog zyn inderdaad niet minder onze aandacht waardig; zo wel wegens hunne bewonderenswaardige veranderingen en eigenfchappen, als wegens hunne veelvoudige gedaanten en verfcheidenheid van kleuren; terwyl zy ook de heerlykfte blyken draagen, van de grootheid van Hem, die elk gedeelte van 't Heelal heeft voordgebracht. Dan, gelyk ik, in het Voorbericht voor deeze Bydraagen, gezegd heb, dat ik geene zulke Infeften ter afmaalinge zoude verkiezen, die in het werk van den Heere RÖ.

\* Zie CAROLUS CLERK over de Zweedfche Spinnen. bl. 6.

† Zie MARCGRAVIL. *Hift. rer Natural. Brasil. Lib. VII. p. 248.*




*Fig. 2.*



*Fig. 1.*



*Fig. 4.*



*Fig. 3.*



*Fig. B.*



*Fig. A.*



RÖSEL reeds beschreeven zyn, zo zullen 'er ook of geheel anderen in <sup>TAB.</sup> deze bladen verhandeld worden; of althans geenen, dan zulken, waar- <sup>XIII.</sup> van of slechts de Rups, zonder de Kapel, of de Kapel zonder haare Rups, met derzelver veranderingen, in 't gemelde Werk gevonden worden, ten ware dat byzondere merkwaardige ontdekkingen zodanig iets vorderden; of dat de Rupsen, van de my bekende en nog niet beschreevene Kapellen, door my niet ontdekt konden worden.

## §. 2.

Op de XIII<sup>de</sup> Tab. Fig. 1. ziet men eene Rups, wier Kapel eene der <sup>Fig. 1.</sup> schoonsten van onze Inlandschen genaamd mag worden; voornaamlyk wegens derzelver hoog roode onder - en zwart gevlekte boven - vleugelen. De kundige Heer RÖSEL heeft dezelve, in zyn IV<sup>de</sup> Deel, Tab. XXVII. Fig. 1 en 2. zeer natuurlyk afgebeeld; \* en ten dien tyde reeds vermoed, dat zy voordgekomen zou zyn van eene digt met hair bezette, zogenaamde Beerenrups; in welk vermoeden hy zig zekerlyk niet bedrogen heeft, gelyk deze afbeelding dier Rupsle overtuigend doet zien.

Ik zelf heb deze Rups in onze landstreek slechts éénmaal gevonden, en ben in haare voeding niet gelukkig geweest; zo dat ik maar kwalyk in staat zoude zyn dezelve alhier medetedeelen; ware het niet dat myn Frankforder vriend my, in het afgelopen jaar, eene dergelyke Rups had toegezonden; welke vriendlykheid ik by deezen dankbaarlyk erken.

*Ik noem des deze Rups, De met bruinachtig graauwe  
bairen bezette Beerenrups; tot de tweede Clasfè der  
Nachtwinders behoorende.*

## §. 3.

Volgens het bericht, door den Heer RORNER my medegedeeld, vindt men deze foort van Rupsen meest op de hooge in zandige gronden

\* Deze Kapel heet in Linn. Syst. Nat. edit. XII. p. 820. sp. 40. Hebe, de Weluwe. Rôfel heeft alleenlyk het Wyfje afgebeeld, vermits echter het Mannetje zodanige hoogroode ondervleugels niet heeft, maar zulken, die helderer of bleeker zyn, zo zal ik de afbeelding van het zelve vervolgens ook nog mededeelen.

TAB.  
XIII.

den staande, *Honds- of Wolfs-melk*, (Efula.) Uit de eieren van den Wyfjes vlinder, welken, in de maand Juny, wel ten getale van 250 stuks, op het gezegde kruid liggen, komen in September daaraan volgende de Rupfen voort; welken gewoonlyk hun voedsel op die plant zoeken; schoon zy, by gebrek daarvan, ook de wilde Byvoet (*Artamifam*.) en het kweekgras eeten. Zy verwisfelen, gelyk alle andere Rupfen, drie-maal van huid, doch veranderen daarby niet van gedaante noch kleur. Naar maate dat het ruwe weêr vroeger of laater in valt, zorgen zy, na haare eerste huidverwifeling, reeds voor een bekwaam winterverblyf. Zy vinden hetzelfde wel dra, fomtyds in de hollen der zogenaamde Veldhamels, by welken zy echter slegt bewaard zyn; want deeze diertjes zien de inkuartiering aan, als verleende hun een buit welken zy het voorjaar niet laten beleeven: betere fchuilplaats verleent haar een uitgedroogde fruik van de bovengemelde Wolfsmelk, of Byvoet, die haar ruim genoeg is; want zy rollen zig in een; en neemen, ieder afzonderlyk, of fomtyds ook twee of drie te zamen, daarin haare wykplaats.

Zy leeven op die wyze zonder voedsel, tot dat de verkwikkende Lente en verwarmende Zonneftraalen haar doen herleeven; doende tevens haare voedingsplanten uitspruiten. Dan beginnen zy weder naar de gewoone fpys om te zien; en verwisfelen nog tweemaal van huid; waar mede zy eindelyk haaren volkomen wasdom bekomen.

## §. 4.

Deeze foort van Rupfen heeft veel overeenkomst met die geene, welke wy by den Heer RÖSEL afgebeeld vinden, in zyn I<sup>te</sup> Deel, de tweede Clafse der Nachtvinders. *Tab. I.* en die hy de zwarthairige Beer-rups noemt. Zelfs zoude men ze voor éénerleie kunnen houden, indien men geen acht gawe, op de drie eerste met geelachtig roode hairen bezette leden, welke deeze niet heeft; te meer, om dat zy beiden even snel kruipen, en zig, als men ze aanraakt, op eene zelfde wyze kunnen oprollen.

Dat evenwel deeze Rups met die van den Heere RÖSEL geheel verschillende, en niet voor eene slechts wat verbasterde foort te houden zy, blykt, niet alleenlyk uit het zichtbaar verfchil der kleuren van beiderleie Kapellen, en derzelver eieren; maar ook uit het verfchillend voedsel dat zy gebruiken. De Rups van den Heere RÖSEL eet byna alle gewasfen, welken men haar ter spyze voorlegt; daar de onze liever fchynt te willen fterven, eer ze eenig ander, dan haar gewoon voedsel, zoude gebruiken. Dit alleen heb ik waargenomen, dat zy de tuinfalade (*Lactucum hortense*.)

sem,) nog wel na zig neemt, als men haar dezelve, uit gebrek van haar TAB.  
XIII.bovengemeld gewoone voedsel, geeft. \*

## §. 5.

Eer ik met myne eigene beschryving verder voortga, moet ik nog iets zeggen wegens eene dwaaling van den Heere FRISCH, die insgelijks de Kapel deezer Rups, in zyn VII<sup>de</sup> Deel. *Tab. IX. Fig. 1.* zo goed hem mogelyk ware afgebeeld, en op bladz. 14 en 15 beschreeven heeft. Hy zegt dat uit deeze Kapel, in bloeimaand, eieren, en uit die eieren groene rupsjens, met twee groote zwartachtige oogen in het bovenste gedeelte van den kop, (die zy echter by de derde verwiseling van huid nimmer hadden,) voortkwamen; als mede dat die rupsjens allerlei voortten van groene keuken-kruiden gegeten hebben.

By de laatste vervelling, of verwiseling van huid, hadden zy eene geel-groene kleur, en eenen dikken, geelen, eenigzins hairigen kop bekomen; op haar achterste gedeelte zag men twee vermillioen roode spitfen. De zes voor-en agt buik-pooten hielden naar het roode; op iedere afdeeling stonden zes of agt bultjes; en over den rug, die met eenige zeer kleine, en enkele zwarte, hantjens bezet was, zag men den slagader heen-loopen, in de gedaante van een zwarten streep. Op dat nu niemand moge vermoeden, of dat ik, in myne waarneeming, eenen misflag begaan, en mogelyk eene andere Rups voor de bovengemelde aangezien heb; of dat de Heer FRISCH in 't geheel van deeze Kapel niet spreekt, zal ik my nader verklaren, en wel duidelyk aantoonen, dat niet ik, maar hy gedwaald heeft; niettegenstaande hy zelf de Rups uit het eitjen ontvangen hebbe. — Dat hy wel zeer zeker van deeze Kapel spreekt, bewyst niet alleen zyne afbeelding, maar ook de beschryving welke hy daarby gevoegd heeft. Doch hem zal gebeurd zyn, 't geen by de veelvuldige waarneemingen, welken in deeze foort van navorschingen noodzakelyk gedaan moeten worden, zeer gemaklyk gebeuren kan; naamlyk dat hy de eieren van deeze Kapel, met anderen, die 'er naar geleeken, verwisfeld heeft; dit geeft zyne Rups zichtbaar te kennen. Volgens de Kapel moest zy eene Beerenrups zyn; 't welk deeze ondertuschen niet is. Liever houde ik haar voor zulk eene, als ons de Heer RÖSEL, in zyn eerste Deel, onder de 2<sup>de</sup> Clasfe der Nachtvinders *Tab. XXVIII.* met

\* Volgens eene latere aantekening van den Heer Kleemann, neemt zy, in zodanig een geval, ook het Boschgras, dat op zandige velden groeit, en het Duizendblad voor lief.

TAB.  
XIII.

met haare verandering medegedeeld heeft; en wel om haare groene kleur, en de twee roode spitsen, welke op haare achterste leden gevonden worden; doch uit de Rups van den Heere RÖSEL kwam eene geheel andere Kapel voort. In deeze gissing worde ik te meer bevestigd, daar de Heer FRISCH geen gewag maakt, van de verandering deezer Rups in een poppen; noch in 't vervolg verklaart, of hy de Kapel werkelyk daaruit bekomen hebbe of niet.

Zoude men intusfchen ten zynen voordeele willen aanvoeren, dat hy, zo wel als ik, de rechte Rups beschreeven kan hebben; aangezien myne foort van Rups onder meer dan ééne kleur voorkomt; zo kan ik evenwel, wat haare kleur betreft, niet zo veel afftaan; dat dezelve, na volkomenen wasdom, in haar geheel zou kunnen verbasteren, als waarvan men geen voorbeeld kan bybrengen. Indien ook zulks waarlyk plaats hadde, dan zou men niet meer in staat zyn, van de eene foort van Rupsen van de andere te kunnen onderscheiden.

Daarby staan ook de oogen van myne Rups, niet in het bovenste gedeelte, maar aan de beide zyden van den kop boven den mond; en ze maaken geen twee, maar twaalf zwarte stippen uit; die echter zo klein zyn, dat ik ze in myne afbeelding niet heb kunnen plaatfen; en van welken ik by nadere gelegenheid breeder zal fpreken. Blyft 'er nog eenige twyfel ten mynen opzichte overig, dezelve kan best weggenomen worden, door zelf zulk eene Rups optevoeden; \* Eigene ondervinding zal den opmerkzaamen van de waarheid myner gezegden overtuigen; en tevens een zichtbaar bewys opleveren, dat men allerlei vreemde waarnemingen niet terfcond voltrekt moet gelooven; maar dat eigen onderzoek de zekerste overtuiging geeft.

#### §. 6.

De grootte van deeze Rups wil ik niet bepalen: aangezien ik geloof, dat die geenens, welken zig in 't open veld onthouden, en zelve haar voedsel kunnen zoeken, beter groejen dan die geenens, welken men binne kamers opvoedt. Ik zal my dan alleenlyk verledigen tot het beschryven van haare gedaante en kleur. Haar kop is glanzig zwart en van boven eenigzins gedeeld, voorts heeft haar lyf, zo als alle de Rupsen van deeze Clafse, twaalf leden of afdeelingen, wier grondverwe zwart is.

\* De Heer RORNER heeft, zo wel als ik, zulk eene fchoone Kapel uit deeze Rups bekomen.

is. Ze zyn eenpaarig, zo wel boven op als aan beide de zyden, bewas-<sup>TAB. XIII.</sup> sen met bruinachtig graauw, en, naar den buik toe, met roodachtig geel haar; 't welk voortkomt uit de kleine wratjens, die op ieder lid of afdeeling gevonden worden: Deeze haartjens schynen onzer Rupse (gelyk by alle andere Beerenrupsen) te dienen, om fijn te kunnen gevoelen; want zo dra worden dezelyen niet aangeroerd, of zy rolt zig op, en valt van het gewas, waarop zy zig bevindt, af; of zy toont haare gevoeligheid aan door eene verhaaste vlugt, waarmede zy zig tracht te verbergen.

Onder aan de drie eerste gewrichten staan, gewoonlyker wyze, zes spitse zwarte voorpooten, en van het zesde tot het negende gewricht hebben zy agt stompe buikpooten: aan het laatste gewricht zyn de beide nasleppooten, met de buikpooten, van eene zelfde kleur, naamlyk bruin.

## §. 7.

Als deeze Rupsen haare volkomene grootte bekomen hebben, dat gemeenlyk in April en Mai geschiedt, gebruiken zy geen voedsel meer; maar reinigen zig van hun vuil, en voorbereiden zig tot de verandering. Met dit oogmerk zoeken zy tusfchen de gewasfen eene bekwaame plaats, alwaar zy zig in een zelf vervaardigd, groot, ongeschikt, helder-graauw weefzel inwikkelen, haare rupsenhuid afstryken, en eenige dagen daarna veranderen in zulk eene glanzige zwart-bruine pop, als ik *Fig. 2.* benevens den afgestroopten huid, in het spinzel liggende, heb afgebeeld. Deeze pop vertoon ik *Fig. 3.* nog duidelyker, naamlyk buiten het spinzel; en zo ook *Fig. 4.* den afgestroopten huid.

De omtrek deezer poppe is tamelyk dik; zy heeft op die deelen, welken den buik aanwyzen, eenige hoogzels, en men kan de plaats van den kop, van de voelhoornen, van de pooten en vleugelen, welke de aanstaande kapel zal hebben, zeer duidelyk aan haar ontdekken.

Midden op haar laatste lid, heeft zy eene fleespits uit eenige zeer kleine haakjens bestaande, gelyk men door middel van een goed vergrootglas waarneemt. Als men haar aanraakt, blykt, uit haare beweeging, duidelyk dat zy gevoelt. In deezen staat heeft de kapel drie weeken noodig, om tot volkomene rypheid te geraaken; en, na verloop van dien tyd, bekomt men, ter belooning van de moeite in het opvoeden der Rups aangewend, den schoonften vogel; indien anders de vliegen of sluipwespen haare eieren niet op de Rups gelegd hebben.

Nu volgen een popjen en eene kapel, wier rups, (die men zeldzaam, en alleenlyk op Eiken vindt,) in het III<sup>de</sup> Deel van den Heere RÖSEL, *Tab. XLVIII, Fig. 3.* afgebeeld, en van bladz. 240 tot 242. beschreeven is, onder den naam van

*De ongemeen schoon getekende, groen en wit-gestreepte  
EIKEN-RUPS, met geele en roode zylstreepen.*

Om dat dezelve van achteren geen hoorn-of staartspits heeft, (als een kenmerk van de nachtvinder-rupsen tot de eerste Clasfe behoorende,) plaatst de Heer RÖSEL haar onder de tweede Clasfe derzelven. Dat hy ook daarin niet gedwaald heeft, toont onze afbeelding der pop, zo wel als die der kapelle. Het popjen schynt geheel geen steel-spits te hebben, welke tog aanwezig moest zyn, zoude zy tot de eerste Clasfe gebragt kunnen worden: de kapel heeft ook niet zulke smalle uit-en-inwaards loopende bovenvleugelen, als de kapellen van laatstgemelde Clasfe gemeenlyk hebben. Als zy zit, bedekt zy haar geheel achterlyf met haare vleugelen: die zy dakswyze draagt; dit doen de anderen niet; en haare voelhoornen zyn ook niet zo bytelvormig, als zulks by die van de eerste Clasfe plaats heeft: denkelyk zyn zy by de mannetjes vederswyze, en by de wyffjen in tegendeel hairdun.

*Letter B.* Die, welke wy onder Letter B vertoonen, is een wyffjen: waarvan het dikke achterlyf een zeker merkteken is; behalven dat de ondervinding my desaangaande volkomen overtuigd heeft. Ik heb naamlyk de kapel, benevens derzelver popjen, reeds in het afgeloopen jaar, van myn boven-gemelden vriend in *Frankfort* ontvangen; de kapel terstond afgetekend, en het popjen van aarde voorzien. Daar nu de kapel, die ik 'er uit verwachtte, vyf vierendeel jaars, en derhalven veel te lang weg bleef, nãm ik het popjen, korts geleden, eens op, en vond het van buiten wel geheel onbeschadigd, maar een ondraagelyke flank overtuigde my echter, dat het bedorven moest weezen; 't welk ik, na 't geopend te hebben, inderdaad ook alzo bevond. Zo weinig als dit gezicht my verheugde, zo weinig geviel het my terstond daarop, by 't openen van het doosjen, waarin ik de kapel bewaard had, om 'er my, by de nadere beschryving van te bedienen, gewaar te worden, dat haar achterlyf, slechts op weenige eiëren na, die zy by zig gehad had, opgegeeten en vernield was.

Dit

Dit ongeluk was my toegebracht, door zeker hairig insect, 't welk in een kleinen kever verandert. Edoch deeze is echter niet de eenigste vyand, die de verzamelaars der kapellen plaagt; want de *papierluis* en de kleine *scorpioen*, \* door den Heer RÖSEL, in zyn III<sup>de</sup> Deel *Tab. LXIV. Fig. 1.* en *2.* afgebeeld, zyn even onaangenaame gasten; gelyk zo de laatst genoemde onlangs een myner ingesponnen poppen bedorven, en tot de vernieling van de tegenwoordige kapel, ook het zyne toegebracht heeft. Op een anderen tyd zal ik nog wel eens gelegenheid hebben, om van deeze bedervers der insecten breeder te spreken.

## §. 10.

Thans keere ik my tot het popjen, 't welk, onder *Fig. A*, in deszelfs *Fig. A.* natuurlyke grootte, afgebeeld is; en waarin de bovengenoemde Eikenrups onder de aarde verandert.

Het zelve is recht donker-violet-zwart, alleenlyk zyn de finalle infneden der geledingen, op welken gemeenlyk de luchtgaatjens geplaatst zyn, eenigzins geelachtig. Aan het voorste gedeelte, kan men, door zyne schaal heen, reeds gewaar worden, de gevormde leden der kapelle, welke men daaruit verwacht, die zig zeer duidelyk vertoonen. Dat dit popjen, hoe zeer het dood schyne te weezen, echter leeft, blykt voords daaraan, dat het zig beweegt, wanneer het aangeraakt wordt.

Daar nu de bovengemelde Rups, in de maanden July en Augustus haaren volkomenen wasdom bereikt, en de Heer RÖRNER eerst in het voorjaar, uit een dergelyk popjen, eene kapel gekreegen heeft, zo is daaruit te besluiten, dat deeze soort van kapellen, slechts éénmaal 'sjaars te voorschyn komt; en dus zig ook niet meermaals vermenigvuldigen kan.

## §. 11.

Onder *Fig. B*, zien wy eene, ook in haare natuurlyke grootte afge-*Fig. B.* beelde, en uit de gemelde pop voordgekome ne kapel, met uitgestrekte vleugelen. De grondkleur der voorvleugelen is wel niet bont, en zelfs slechts bruinachtig graauw; echter ontvangen zy een aanmerkelyk sieraad door

\* Zodanig eene kleine *scorpioen*, of *scorpioen-spin*, (*Reit-spin*, zo als de Heer FRISCH haar noemt,) heb ik eens gevonden, die zeer schoon helder groen van kleur was, en roode schaaren had: ze was zo groot als die, welke in het bovengemelde II<sup>de</sup> Deel afgebeeld is; en schoon die 'er roodachtig bruin uitziet, houde ik haar tog voor eene van dezelfde soort met deeze.



TAB.  
XIII.

door de heen en weer getande, deels donkere, deels heldere dwarslynen en streepen, welken daarop gevonden worden; en niet minder door de daartusschen liggende vleugeladeren; mitsgaders door de, wel weinig, echter zeer regelmaatig uitgehulpte randen.

Haare achtervleugelen hebben, aan derzelver inwendige of achterste randen, die byzonderheid boven andere kapellen, dat zy, in het midden eenen bruinen uitgekapt, en met eenige lange zwarte pluimen verfierden hock hebben. De kleur der beide achtervleugelen is voords helder geelachtig graauw; de rand is niet uitgekapt, maar verfiend met een bruinachtig graauw boordzel, 't welk zig aan den voorkant, en voorhock, met eenige ook bruinachtig-graauwe stofvlekken, vereenigt.

Deeze achtervleugels zyn niet zo dicht met pluimen en hair bedekt, als de voorvleugels; ja zy schynen zelfs in 't geheel niet met pluimen, maar eer met lange hairen bezet te zyn.

#### §. 12.

In den diep voor haar borst liggenden kop, aan welken ik, (waarschynelyk wegens deszelfs korthed, en diepe ligging,) geen en zuigsnavel heb kunnen gewaar worden, zyn bruin-graauwe oogen, helder-geel bruine en hairdunne Voelhoornen; en dezelve is, benevens den hairigen rug, en het achterlyf bruinachtig graauw van kleur. Intusschen ziet men, op den rug, een zwartachtig gekleurd gedeelte, byna in de gedaante van eene M. Ook is het eerste lid van het achterlyf, met eenige zwarte, doch het tweede en derde met bruinachtig roode hairen bezet.

Hoe de eiëren, waarnit deeze kapellen geboren worden, van grootte en kleur zyn, kan ik niet met zekerheid bepaalen; maar ik vermoed dat zy in het geele vallen, en niet zo groot als een gierstekorl weezen zullen.

*Drie*

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 3.



*Drie Kapellen, waarvan twee tot de derde Clasfe der Nachtvinders, en één tot de tweede Clasfe der Dagvinders behoort.*

§. 1.

Op onze XIV<sup>de</sup> Tab. vertoonen wy, onzen geëerden Leezers, drie-<sup>TAB. XIV.</sup>ërle Kapellen, welke gezamenlyk onze Gewesten voor haar vaderland erkennen. Men zal zig mogelyk verwonderen, waarom niet met een haare rupfen daarby zyn. — Het doet my inderdaad leed, dat ik in deezen gevalle den liefhebberen slechts van ééne zyde kan vergenoegen, betuigende geene moeite of tyd gefpaard te hebben, om de rupfen tot deeze kapellen behorende optefpooren, maar ik ben niet gelukkig genoeg geweest, om in myn oogmerk te slaagen, en wie weet, of ik immer zo gelukkig zal mogen weezen! — Dan zoude ik nu zulke fchoon getekende inwooneresfen van ons vaderland, om het ontbreken van haare rupfen, die, behalven dat, der veranderinge tóg onderworpen zyn, niet bekend maaken? Dit zeker, geloof ik, zoude de Hiftorie der Infeften meer tot verarming dan verryking verftrekken: mogelyk zyn de rupfen deezer kapellen, by den een of anderen myner hooggeachte Leezeren, wel bekend; of mogelyk zullen zy dezelve, in 't vervolg van tyd, hier of daar wel ontdekken; in welken gevalle ik de my medegedeelde berichten des aangaande met dezelfde oprechte dankbaarheid zal erkennen, als ik my verplicht cordeel te zyn, om de goedheid te melden van die geenen myner begunstigers, aan welken ik het bezit der bovengenoemde drie kapellen te danken heb. Eén van die myner begunstigers is de Heer J. G. GLADBACH, *Med. Doct. & Pract. ordin.* te *Frankfort am Main*, aan wien ik de kapellen *Fig. 1. 2. 3.* en *4.* verschuldigd ben; en de gunstige mededeeling van de zeer aartige kapel *Fig. 5.* heb ik te danken aan eene reeds voorheen genoemde begunstigster van mynen arbeid.

§. 2.

Daar de gedaante van de vleugelen der kapellen *Fig. 1* en *2.* duidelyk *Fig. 1.* te kennen geeven, dat zy behooren tot eene foort, die, zittende, haare <sup>en 2.</sup> vleugelen niet aan 't lyf gefloten houden, of, (gelyk andere nachtvinders,) niet dakswyze, maar uitgespreid draagen; en 't ook duidelyk blykt dat haar achterlyf fmaller is dan dat van anderen, is daar uit gereedlyk te

N

bg-

TAB. XIV. befluiten, dat zy voordgekomen zyn van eene Span-rups, welke zig mogelyk in het woud, en wel bepaaldlyk op den pynboom heeft onthouden; zulks komt my des te waarfchynelyker voor, om dat ik eens het wyfje van deeze Kapel, aan den ftam van zulk een boom, heb vinden zigten. Ik meen haar derhalven te kunnen noemen;

*De, tot de derde Claffe der Nachtolinders behoorende, bruinachtig graauwe, en met veele kaptrekken verfierde Nacht-kapel. TAB. XIV. Fig. 1. en 2.*

### §. 3.

Fig. 1. Fig. 1. verleent ons de afbeelding van het mannetjen van deeze kapel, zo als het zig in de vlugt vertoont. Daar ik nu, by het afbeelden deezer kapelle, alle mogelyke moeite heb aangewend, om haare onderscheide ne tekeningen, Vlekken, Kaptrekken, en Stippen, waarmede derzelver vleugelen verfierd zyn, overeenkomstig de natuur af te maalen; en myn geëerde Leezer zig haare gedaante ook beter uit eene afbeelding, dan uit derzelver befchryving kan voorftellen, zou het overtollig zyn, met breede woorden daarover uitteweiden.

Fig. 2. Ik merke hierom deswegens alleenlyk nog aan, dat het mannetjen en wyfjen (Fig. 2. afgebeeld) van deeze kapellen byna eenerlei zyn; hebbende deeze flechts wat helderder, bruinachtig-graauwe grondverwe, vlekken, stippen, enz. dan geene. Ook komen ze beiden daarin overeen, dat de buitenfte rand van den achtervleugel eenigzins, en de rand der voorvleugels in tegendeel geheel niet uitgekapt is; en dat beider voeten met eene zekere foort van borstels bezet zyn. Het mannetjen onderscheidt zig voorts van het wyfjen, en van veele andere kapellen, voornaamlyk daardoor, dat het, in plaats van de haardunne voelhoornen, en een dik achterlyf, (welken kenmerken van het wyfjen zyn,) veel breeder baards-, of pluims- wyze voelhoornen bezit, en dat daarenboven het lange finalle achterlyf, op deszeifs laafte gewricht, een bosch ftevige hairen heeft; welken ik niet geloof ergens beter by te kunnen vergelyken, dan by het hoofdlicraad onzer Duitfche Vrouwen 't welk federt eenigen tyd in gebruik gekomen, en onder den naam van *Sultane* bekend is, betaande naamlyk uit eenige glazen hairbuisjens.

## §. 4.

Hoewel 'er nu veele kapellen met staarten zyn, ken ik echter onder <sup>TAB.</sup> dezelve slechts één eenigen kleinen nachtvlinder, die, zo wel als het <sup>XIV.</sup> wyfjen, een dergelyken boschachtigen staart heeft; en welken ik ook wegens zyne doorschynende vleugelen, en allerfchoonste staal blaauw-weerschynende kleur, en hoogroode vlekken op het lyf, den liefhebberen gaarne medegedeeld zoude hebben, wase het dat ik zyne rups magtig had kunnen worden.

Of deeze boschachtige staart onzer kapellen tot een tegenwigt dient, en haar noodig is om recht te kunnen vliegen, zo als SWAMMERDAM \* SENGUERDIUS, † en andere schryvers, van dergelyke staartkapellen gissen, kan ik niet verzekeren; vermits ik nog geene gelegenheid gehad heb, om haar te zien vliegen. Zo zulke staarten intuschen geene andere nuttigheid mogten hebben, zoude ik geen oogenblik aarzelen, om deeze gisting te omhelzen. Wyders had ik, betreffende de oogen dier beide kapellen, alleenlyk nog aan te merken, dat dezelve 'er zwartachtig bruin uitzien.

## §. 5.

De vliegende kapel *Fig. 3*, die *Fig. 4*. zittende vertoond wordt, be- <sup>Fig. 3</sup> hoort tot de 2<sup>de</sup> Clasfe der Dagvogelen. Het staat my niet voor haar <sup>en 4.</sup> immer in de vlugt, of in eenige verzameling van Insecten, gezien te hebben; en houde het derhalven daarvoor, dat zy gebragt moeten worden, tot die geen en welken men *zeldzaam* noemt.

Men kan haar, vooral van wegens de bovenste vleugelen, noemen;

*Eene*

\* Zie SWAMMERDAM, *Bybel der Natuur*, Hoogduitsche Druk, *Bladz.* 223.

† *De Natuur-onderzoeker*, 75<sup>te</sup> Stuk, *Bladz.* 380. en *verv.*; alwaar de gedachte van SENGUERDIUS, over de oorzaak van den schuinschen vlugt der Insecten, uit het Latyn in 't Hoogduitsch overgezet, te vinden is.

*Eene tot de 2<sup>de</sup> Classe der Dagvogelen behoorende geel-groen-achtig witte, bruin en wit geboorde, en met witte kringen*  
*verfierde Kapel. TAB. XIV. Fig. 3 en 4.*

## §. 6.

TAB.  
XIV.  
Fig. 3.

De bovenste zyde der vier vleugelen is, zo als *Fig. 3.* aantoont, meereendeels helder en glanzig geel-groenachtig wit; doch ze zyn, aan 't gewricht, met eenige blaauw-weerschynachtige hairtjens en vederstof als besprengd; allen zyn zy bruin en wit geboord; en ieder heeft, aan den buitensten rand, tuschen de aderen der vleugelen, in den bruinen grond, eenige witte ringswyze vlekken; welken in de voorvleugelen doffer schynt te weezen dan in de achtervleugelen. De twee laatste vier vlekken raaken aan elkander, en formeeren de cyfferletter  $\infty$ .

Het lyf van deeze kapel is eigenlyk zwart; doch met veele helderblaauwe hairtjens bezet; welken haar een byna volkomen blaauw aanzien geeven.

## §. 7.

*Fig. 4.* In *Fig. 4.* zien wy haar zittende, en dus de onderste zyden van haare opgeklapte vleugelen.

De grond der voorvleugelen is helder graauw; derzelver buitenste rand is met wit geboord, en met zes kleine bruine en tien zwarte vlekken bezet. Daarentegen is de grondkleur der achtervleugelen zeer helder bruinachtig graauw, zynde de buitenste rand mede met wit geboord. Zy zyn behalven dat voorzien van verscheidene geelachtig witte ringswyze vlekken, in welker midden kleiner zwarte vlekken gezien worden. Wyders bespeurt men, tegen den buitensten vleugelrand aan, geelachtig bruine vlekken, welken van verschillende gedaante zyn; en by het gewricht der vleugelen zyn ze met een helder groenachtig stof als befrooid.

Het voorlyf, de baardspitsen, en de schinkels der drie paar pooten, zyn helder blaauwachtig groen; de scheenbeenderen van dezelve, zo wel als het onderste van het achterlyf is wit; en de oogen, benevens de zuigsnavel, zyn zwartachtig bruin; de leden der haardunne voelhoornen hebben eene zwartachtige, en de kolswyze einden derzelven in tegendeel eene helderbruine kleur. Het finale achterlyf plaatst deezen vlinder nogthans onder het manlyk geslacht. Uit welke rups zy voortkomt, kan ik met

met geene zekerheid melden; naar alle gedachten echter zal dezelve tot <sup>TAB.</sup>  
de schildrupsjens behooren. <sup>XIV.</sup>

## §. 8.

Onder *Fig. 5*, beschouwen wy voorts nog eene kapel, die ik, zo lang *Fig. 5*.  
haare rups my mede onbekend is, onder de derde Clasfe der Nachtvlin-  
ders stel; en noem haar derhalven:

*De tot de derde Clasfe der Nachtvinders behoorende geel-en  
zwart-gevekte Nacht-Kapel. TAB. XIV. Fig. 5.*

Ik stel haar op die wyze voor, vermits ik geloof, dat zy zekerlyk veel-  
eer haaren oorspronk verschuldigd zal wezen, aan eene Spanrups, dan  
aan eene andere soort van de vierde Clasfe der Nachtvinders. Ook om-  
trent deeze kapel zal, wat de gedaante en de kleuren betreft, eene af-  
beelding meer afdoen, dan eene uitvoerige beschryving.

## §. 9.

Op den grond haarer vier vleugelen zien wy, in 't algemeen, eene  
fchoon geele kleur; en aan derzelver uitersten rand, zo wel als over de  
geheele lengte en breedte daarvan, op de voorvleugelen, veele doffe,  
doch op de achtervleugelen volstrekt donkerzwarte vlekken en stippen.  
En alhoewel haar rug en dikke achterlyf, (waardoor het kennelyk is, dat  
zy tot het vrouwlyk geslacht behoort,) ook geel zyn, vertoont die kleur  
zig echter, wegens de daarmede vermengde haitjens en pluimtjens, hier  
niet zo fchoon, als op de vleugelen.

Haare oogen zyn zwartachtig graauw; de hairdunne voelhoornen zwart-  
achtig, en de pooten, die met borstels bezet zyn, helder geel. Schoon  
deeze kapel klein zy, maakt ze nogthans door haare kleur en gedaante  
eene zo gevallige vertooning, dat zy niet recht, in de verzamelingen van  
kapellen, eene plaats verdienet.


## B Y D R A A G E

Tot de AMERICAANSCH E Spin, op de XI<sup>de</sup> en XII<sup>de</sup>  
TAB. vertoond.

BYDR.  
tot TAB.  
XI en  
XII.

't Zal mynen geëerden Leezeren nog voorstaan, dat ik, by het beschryven van de *Americaansche Spinne*, op de beide naast laatst voorgaande Plaat en afgebeeld, gewag gemaakt heb, van tweeërle soorten van klauwswyze deelen, (zie *Tab. XI. Fig. 1.* by A, en E. en *Tab. XII.* by A B C D. en *Fig. 6.* by e,) welken de Schryvers, aldaar genoemd, niet hadden waargenomen. Ik besloot hieruit, dat deeze myne spin tot het mannelyk geslacht behoorde; aangezien de gemelde deelen aan eene andere van dergelyke soort niet gevonden worden; en in dit myn denkbeeld ben ik nu nog nader bevestigd. Ik ben onlangs, door de goedheid van mynen hooggeschatten begunstiger, den beroemden Heere Hofraad TREW, voor eenige dagen deelgenoot geweest van het werk, door den Engelschen Insecten-maaler, den Heer ELEAZAR ALBIN, onder den tytel van *A Natural-History of Spiders and other Curious Insects*, 1736, in Gr. Quarto te *London*, in 't licht gegeven. By het doorbladeren van 't zelve ontdekte ik, dat de Heer ALBIN de bedoelde soort van spinnen, op zyne 35<sup>ste</sup> *Tab.* uit twee stukken bestaande, zynen Leezer ook medegedeeld heeft; en dat hy aan de *grootste* spin de bovengemelde twee klauwswyze deelen insgelyks aantoonde; de *achterklauwen* naamlyk, welke ik op myne XI<sup>de</sup> *Tab.* met A heb aangewezen; mitsgaders de spitse flakswyze klauwen, welke, volgens myne XII<sup>de</sup> *Tab. Fig. 6.* aan de beide voelpooten gevonden worden; en dat verders de Heer ALBIN die deelen aan de *kleinste* spinne, (welke een dikker en grooter achterlyf heeft,) niet vertoont. Dit doet my thans met te grootere zekerheid gelooven, dat dergelyke uitlandische spinnen, welke die deelen hebben, onder het *mannelyke*, en dat zy, die daaraan niet voorzien zyn, onder het *vrouwelyke* geslacht betrokken moeten worden. Voor 't overige heeft gezegde schryver die spin ook met agt oogen, doch de uiteinden der pooten zonder klauwen, (die zy echter hebben,) afgebeeld.





*C. F. C. Kleemann fecit et exc.*



*Beschryving van een Water - Insect, of Worm zonder pooten, benevens deszelfs verandering in eene Mug, met een langen en stevigen Zuignavel; of een Waterworm, behoorende tot eene nieuwe en zulk eene Classe van Waterwormen, die geen pooten hebben, en zig in Poppen en Insecten met twee vleugelen veranderen.*

## §. 1.

*V*liegen of *Muggen* zyn, volgens de verklaring van den Heere RÖSEL, \* Insecten, welken met twee naar pergament gelykende doorzichtige vleugelen voorzien zyn, dat is, ze hebben twee vleugelen, die, hoewel doorzichtig, echter vry stevig zyn. De Heer RÖSEL gebruikt de Hoogduitsche woorden *Mucken* en *Schnacken* zonder onderscheid, schoon het hem anders niet onbekend ware, dat men de eene soort ook wel *Vliegen*, en de andere *Mucken* noemt. † Ik heb verder op deeze beschryving niets aan te merken, maar alleen met hem 'er by te voegen, dat de *Muggen* zig voornaamlyk daar door van de *Vliegen* onderscheiden, dat de *zss* Pooten veel langer zyn, en het lyf veel ranker is, by de *Muggen*, dan by de *Vliegen*. TAB. XV en XVI.

## §. 2.

Beide deeze soorten kan men gevoegelyk onderscheiden in *Water - en Aard-*

\* Zie het tweede Deel van zyn Werk, in het Voorbericht over de verzameling van *Vliegen* en *Muggen*. Bladz. 530.

† Het niet behoorlyk onderscheiden deezer benaamingen heeft wel eens eenige verwarring in de vertaaling veroorzaakt. By Rösél waren somtyds *Mucken* eigenlyk *Vliegen*, doch ook nu en dan *Muggen*; maar Kleemann verstond veelal, door *Mucken* bepaaldlyk *Vliegen*, en *Schnacken* waren, (gelyk ook hier,) by hem *Muggen*; doch hy was zigzelven niet altoos gelyk. Vergel Tab VII en VIII. van de *Hommelen* en *Wespen*, en Tab. I en V. van de *Vliegen* en *Muggen*, mitsgaders het Voorbericht voor de tweede Classe der *Waterinsecten*. Ter laatste plaatze Bl. 175, 176 en wat laager 235, (om dit ter deezer gelegenheid te melden,) gelieve de goedgunstige Leezer het woord *Slak* in dat van *Vlieg* te veranderen: zynde de mistelling voortgekomen, uit het geringe onderscheid tuschen de woorden *Schnacken*, aldaar *Vliegen*, en *Schnecken*. dat is, *Slakken*.

DE VERTAALER.

TAB.  
XV en  
XVI.

*Aard-Vliegen*, en in *Water- en Aard-Muggen*. Want allen *Water-Vliegen* en *Water-Muggen* is, van haar beginfel in het ei af, tot aan haare verandering, zo in Wormen als vervolgens in Poppen, het water zolang noodzaaklyk, tot zy het vliegende verlaaten; en zig in eene andere gedaante, op het drooge vertoonen kunnen. Daarentegen hebben de *Land- of Aard-Vliegen* en *Aard-Muggen*, 't zy als Wormen of als Maaden, en by haare verdere verandering, het verblyf in 't water niet noodig; maar onthouden zig van den eerften trap haarer veranderinge, tot den laaften, op het Land; deels in de aarde, deels in gewassen, mitsgaders in allerlei doode of levendige fchepfelen. Zy onderscheiden zig van de zogenaamde *Libellen* of *Waternimphen*, *Hommels* en *Wespen*, ligtlyk daardoor, dat zy niet, gelyk deeze vier, maar slechts twee vleugels hebben. En fchoon men een tamelyk getal *Libellen* vinde, welken niet alleenlyk mede het water tot haare eerfte verblyf gehad hebben, maar men teffens befpeurt, dat ook eenige van haare wormen, (gelyk de *Muggeworm*,) van achteren Lucht fcheppen; ('t geen, wel is waar, de *Waterkeverworm* ook doet;) zo behoort nochtans de *Muggeworm* niet onder haare Claffe; vermits dezelve geene voeten heeft, als de *Libellenworm*, en ook niet gelyk deeze, in een Infeet met vier maar met twee vleugelen verandert. Hier komt nog by, dat onze *Muggeworm*, niet als deeze, tot aan zyne volkomene verandering, zig onder het water geneert, of zonder merke-lyke gedaanteverandering, tot eenigen wasdom komt: maar dat hy verandert in eene pop van eene andere gedaante; welke, van die verandering af, geen voedzel meer noodig heeft, en dan eerst de *Mug* hervoord brengt. — De Heer RÖSEL heeft de *Mug*, om de doorzichtigheid van haare vleugelen, en om dat haar *Worm* zig in 't water onthoudt, wel in de Claffe der *Libellen*, die by hem de tweede Claffe der *waterinfeften* uitmaaken, geplaatst; dan daar my het onderscheid tusfchen een *Worm* met, en zonder pooten, en zo ook tusfchen een Infeet met vier, en een met twee vleugelen, te byzonder en opmerkenswaardig voorkomt; en 'er, behalven dit, ook nog wormen bekend zyn, die geen pooten vertoonen, en insgelyks in Infeften met twee vleugelen veranderen, zal men my 't wel willen toeflaan, dat ik, zo lang de ondervinding my niet beter leert, eene nieuwe Claffe bepaale, voor die Infeften, welken als *Wormen zonder pooten*, en als *zonder voedzel levende Poppen* zig in 't water onthouden, en in Infeften met twee vleugelen veranderen. \*

§. 3.

\* Gemaklyk zou ik de onderscheidstekenen tusfchen onzen *Muggeworm* zo wel als de *Mug* zelve, en tusfchen anderen in 't water levende Infeften breedvoerig en duidelyk kunnen aantoonen, hadde ik voor mynen toegenegen Leezer niet eene te groote achtung dan dat ik zyn geduldin dit geval zoude misbruiken, of ten minste vermoegen. Om nu niet breeder te melden, dat ik my vervolgens over de kentekenen en verdeelingen der Infeften nader denk te verklaren.

## §. 3.

De Mug is zulk een bekend Insect, dat ik met eene breede beschry-  
 ving van dezelve geen dank zou behaalen, veel min den Leezer eenig ge-  
 noegen verschaffen. Wie toch zal niet terstond begrypen, dat ik van zo-  
 danig een Insect spreek, 't welk in de heete zomerdagen, naar ons bloed  
 dorstende, om ons heen vliegt, en niet eens in bedenking neemt, of hy  
 onzen huid met zynen Angel zal doorbooren, om zyn dorst op deeze  
 wyze te leschen; en dat zich op die geenen, welken haar in dit oog-  
 merk wil hinderen, door uitftorting van een schadelyk vocht in de ge-  
 maakte wond, (welk vocht eene hevige jeuking, ja zelfs eene opzwellling  
 aan 't gekwetste deel veroorzaakt,) poogt te wreken? Wegens eene an-  
 dere soort van Muggen, aan deeze echter byna gelyk, zal ik in 't ver-  
 volg nog wel gelegenheid bekomen, om 'er iets van te zeggen,

## §. 4

De Wormen van de Muggen, waar over ik thans myne geachte Lee-  
 zers uitvoerig zal onderhouden, hebbe ik 't eerst ontdekt in een mocras in  
 een bosch gelegen; vervolgens mede dikwyls in de Lente, in den Zomer,  
 en in den laaten Herfst, gevonden in een steenen waterbakje, in den  
 aan myne wooning grenzenden Tuin. Ook hebben de voortreffelyke en  
 zeer beroemde Natuuronderzoekers HOOKE, \* SWAMMERDAM † en  
 REAUMUR § dezelve reeds voorlange hunne opmerking en beschry-  
 ving waardig gekeurd. Maar, dewyl noch HOOKE, noch REAUMUR,  
 zich daartoe van onze taal bediend hebben; en de, in de Duitfche spra-  
 ke, overgezette Bybel der Natuur van den Heer SWAMMERDAM, niet  
 in ieders handen is; zo vertrouwe ik, geen vergeeffchen of nutloozen ar-  
 beid te zullen onderneemen, indien ik het merkwaardigste, dat ik zelf  
 aan deeze schepfelen ontdekt en gezien heb, in deeze myne Bydraagen  
 mededeelde.

## §. 5.

Op de hier nevensgaande XV<sup>de</sup> Tab. vertoont zich in de 1<sup>ste</sup>, 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> en *Fig. 1, 2 en 3.*

\* MICROGRAPHIA: or some Physiological figures of minute bodies made by magnifying  
 glasses: with observations and inquiries thereupon by R. Hooke, Fellow of the Royal Socie-  
 ty. London 1667. Gr. 4<sup>o</sup> p. 185. Schem. XXVII & XXVIII.

† Zie zyn Bybel der Natuur. Clasf. III. p. 144 — 148. Tab. XXXI & XXXII.

§ Memoires pour servir a l'Histoire des Insectes. Tom. IV. Mem. XIII. p. 573 — 636.  
 planche 39 & 40.

TAB.  
XV en  
XVI.

3<sup>de</sup> Fig. deeze Muggeworm in zyne natuurlyke gedaante en grootte. Zy worden, uit een zeker aantal eiëren, welken de vrouwlyke Mug, altoos in eene aan beiden einden spits toeloopende gestalte, en digt by elkander, op de oppervlakte van een stilstaand (nooit stroomend) water, nederlegt. Dan, vermits het, tot opheldering van den oorsprong en den wasdom deezer Wormen, noodzaakelyk is, den aart en de wyze, hoe deeze eiëren gelegd worden, eenigzins nader te leeren kennen, zo dient men te weeten, dat het Muggewyfsjen zich alvorens, met het Mannetjen van dezelfde soort, moet vermengd hebben, indien 'er dergelyke scheidzels uit zullen voordkomen. Waanneer nu deeze paaring geschied is, dan begint het achterlyf van 't Wyfsjen, van tyd tot tyd, dikker te worden; de menigte van bezielde eiëren wordt haar eerlang te zwaar, en de drift om 'er zich van te ontlasten wordt gaande. Maar zou nu het Wyfsjen, by het gevoel van deeze drift, zich slechts van haaren last ontdoen, zonder te vooren daartoe eene bekwaame plaats uitgekoozen te hebben? Zou zy, vraage ik, zo onbedachtzaam en liefdeloos, omtrent de vrucht van haar Lichaam, ja omtrent haar gantsche nakomelingschap handelen, dat zy haare eiëren zou leggen op eene plaats, alwaar de jongen, uit gebrek aan voedsel, tusschen met hunne geboorte, hunnen ondergang te vreezen hadden? — Zou zy op deeze wyze, op eenmaal, de afschuwelykste Moorderes van meer dan 300 levendige kinderen worden? — Neen! zo onvoorzichtig handelt dit hoewel onvernunftig scheidzel niet met haare Eiëren, en aanstaand gezin; wy bespeuren veel eer in haar eene zeer zorgvuldige en rechtshapen Moeder, die alsdan zulk een water tot haar verblyf verkiest, waarop zy haare eiëren onbezorgd kan nederleggen; en alwaar de daar in verborgen jongen, het aanstaande noodige voedsel by de geboorte, vinden kunnen.

### §. 6.

Te gelyk verkiest zy, op dat zy haar eigen leven niet in gevaar stelde, voor zich in, of naby het water, eene drooge plaats, waarop zy kan nederzitten; en deeze is doorgaans een dryvend blad, of de oever zelve. Hier op zet zy zich met de vier voorste voeten vast; keert het achterlyf tegen het water, en legt, achter en nevens het eerste ei, altoos twee naast elkander, op de oppervlakte van het water. Hier mede vāart zy zo lange voort, tot dat zy zich van haare geheele Eiërdragt ontleedigd heeft. En dit geschiedt wel indiervooge, dat niet alleen de zwaarste zyde van elk ei, maar ook het ei zelve, recht op het water sta: met welke baaring zy een vierde gedeelte van een uur bezig is. Het getal der eiëren, die zy dus nederlegt, is niet altyd even groot; nogthans hebbe ik onderzonden, dat zy gemeenlyk drie, maar zelden vierhonderd belooopen. — De aan beide einden spitstoelopende gestalte, waarin zy liggen, gelykt naar


maar een klein schuitje of bootje, en is *Fig. 4.* in haare natuurlyke groot-<sup>TAB.</sup>  
 te te zien. Maar wat doet het Muggenwyfjen, tot deeze zamenvoeging <sup>XV en</sup>  
 van zulk eene schuitswyze gestalte, by het leggen der eiëren; waarin ie-<sup>XVI.</sup>  
 der ei recht opstaan blyft; en wel zo, dat zy zich niet van elkanderen <sup>Fig. 4.</sup>  
 scheiden, en dat ook de eerstgelegde eiëren niet van onder haar Lichaam  
 wegdryven, maar integendeel in den behoorelyken stand blyven, tot dat  
 de gantsche verzameling van eiëren voltallig is? Geschiedt zulks slechts  
 toevalliger wyze; of bezit het Wyfjen eene aangeborene bekwaamheid,  
 om dit kleine gebouw dus te vervaardigen? Ik hebbe het laatste opge-  
 merkt; en daarby gezien, dat zy, om de zamengevoegde eiëren niet al-  
 leen de voorzeide schuitswyze gedaante te geeven; maar ook om dezelve  
 recht op staande te houden, en voor het wegdryven te bewaaren, zich van  
 haare twee lange achterpooten bedient. Zy sluit dezelve, (zo lange zy  
 met leggen bezig is,) derwyze gepast om de eiëren te zamen, dat de  
 eersten zo wel als de volgenden haar recht opstaanden stand behouden, en  
 zo dicht by elkander moeten blyven, dat zy niet vallen, of van elkander  
 wegdryven kunnen. De eiëren zelve schynen eenigzins kleeverig te zyn,  
 als zy gelegd worden; het geen de zamenvoeging, zo wel als den gemel-  
 den stand, wanneer ze door de Lucht gedroogd worden, bevordert. Doch  
 waarom moeten die eiëren juist zoo staan, dat altoos het zwaarste gedeel-  
 te onder, en het ligste boven zy? Moeten wy zulks aan de wetten der  
 zwaartekracht toefchryven? — Ik antwoorde: niet alleenlyk aan de  
 eeuwige wetten der natuur, volgens welken het zwaarste gedeelte van 't  
 ei nederwaards en naar het water zakt: maar ook aan het toeverzicht van  
 het eiërleggende Wyfje op, en de benoodigheit voor den daarin verbor-  
 gen zynden Worm; die alleenlyk uit het dikste gedeelte van 't ei kan  
 voortkomen. Indien het ei niet recht op, en het zwaarste gedeelte niet  
 naar 't water gekeerd stond, dan zou de worm, niet terstond in zyn na-  
 tuurlyk element zynde, gevaar loopen, van by het uitkomen te sterven;  
 ook is de naauwe zamenvoeging der eiëren hoogst noodig, om dezelve  
 recht op te doen blyven staan. Dit levert ons inderdaad een heerlyk  
 bewys der almogende voorzorge van den Godlyken Schepper, waar door  
 zelfs de twyfelar en spotters gedwongen wordt uitteroepen; *Hoe groot zyn  
 uwe werken, O Heere! Gy hebt ze alle met wysheid gemaakt.* — Ver-  
 mits nu de Almagtige Voortbrenger der gantsche Natuure, die het onein-  
 dig grootte, zo wel als het allerkleinfte, op zyn wenk te voorschyn doet  
 komen, by de voordbrenging van alle zyne werken, altoos de wyste  
 maatregelen, ook met betrekking tot derzelver onderhouding, genomen  
 heeft, zo zullen wy ook diezelfde wyze voorzorge, by deeze zo gering  
 schynende Mugge, en derzelver groeiing, in myne verdere beschryving  
 duidlyk kunnen gadeslaan.

## §. 7.

TAB.  
XV en  
XVI.  
Fig. 5.

Ik heb in de 5<sup>de</sup> Fig. eenige Muggen-eiëren, in die orde waarin zy gelegd worden, sterk vergroot afgebeeld. — De gestalte van 't ei is kegelrond; onder dikker dan boven; hebbende het fatsoen van eene omgekeerde flesch zonder hals; de koleur valt in 't bruin-grauwe, en is aan 't boveneinde donkerer dan beneden. Voorts heb ik over 't algemeen, by dergelyke eene verzameling van eiëren, een tweeërlei onderscheid waargenomen; eenigen (als Fig. 5. a a) hadden van onderen een grooten verhevenen Wratt, met een zwart punt; en van boven een kleinen Wratt: anderen (ook Fig. 5. b) hadden van onderen, in plaats van een wratt, slechts een zwart punt; doch van boven denzelfden kleineren wratt, als de anderen. Of nu dit onderscheid in deeze eiëren mogelyk het vrouwlyke en manlyke geslacht aanwyze, kan ik met geen zekerheid beweezen. Maar meer beslissender wyze kan ik melden, dat de daar in verborgen Muggeworm, by warm weder, na verloop van drie dagen, tot doorbreken bekwaam wordt; en uit eigener kracht hervoordkomt. Men bemerkt als dan aan het ei eenige beweging, en wordt weldra gewaar, dat het onderste dikke deel, als het dekzel van eene kan, opengaat; het welk ik by Lett. c. afgebeeld hebbe. Dit dekzel wordt, van den nog in het ei beslooten zynden Worm, met den kop open gestooten; en als dat verricht is, ziet men het diertje langzaam, uit zyne gevangenis, voor den dag komen; waar op het, na van dien arbeid een weinig uitgerust te zyn, zo meesterlyk als de volwasene wormen, in het water, gints en herwaards zwemt, zyn voedsel, dat in modder bestaat, opzoekt, en, gelyk de anderen, op de oppervlakte van 't water, lucht komt scheppen. Wie, dit nagaande, kan loochenen, dat men in dit alles de duidelykste kenmerken eener verstandige voorzienigheid gewaar wordt? \* Het onderscheid tusschen

\* Ik kan niet voorby, hier ter plaatze nog mede te deelen eene waarneeming, omtrent de Muggen-eiëren, door my gedaan; waar toe ik gebragt ben door andere Proeven, welken ik genomen heb, deels met de manlyke zaaden van Kikvorschen, Vlinders en derzelver reinigings vocht, dat zy daadlyk na hunne doorbreking laten vloeën; deels ook met de vochten van zo wel bevruchte als onbevruchte uitgedrukte vlinder eiëren. Het laatstgemelde vocht bekwam ik van den, door den Heer Rötzel in de derde Classe der Nachtvinders, eerste Deel, Tab. 1. Fig. 5. afgebeelden Vrouwlyken Span-Vlinder; dien ik, na zyn voordkomen uit de Pop, aan eene naaltespeet had. Ik ontdekte, in 't gezegde vocht, geheele Legers van kleine diertjens, dergelyke men in de zaaden van andere dieren gewaar wordt; ze vertoonden allen eene levendige en willekeurige beweging; zelfs poogden zy, wanneer ze te dicht op een kwamen, elkander te ontwyken; en ze stierven slechts dan, wanneer de vochtigheid, waar in zy zich bevonden, opdroogde. Dergelyke diertjens houdt de Heer



C. F. C. Kleemann fecit et exc.



ſchen zulk een pas geboornen, en een volvaſſen Muggeworm, beſtaat <sup>TAB. XV en XVI.</sup> alleenlyk in den ongelyk veel grooteren Kop, en zyne helderer koleur. <sup>Fig. 6</sup> hebbe ik eenige zodanige wormen, in hunne natuurlyke grootte, afgebeeld. Zy neemmen zeer ſchielyk in waſdom toe; ſtryken weldra voor den eerſten keer hunnen huid agter zich af; zy worden dan nog eens zo groot, verhuizen vervolgens ten tweeden en ook ten derden maale; waarmede zy hunne volkomene grootte verkrygen, en van gedaante zyn, zo als zy in de 1<sup>ſte</sup> 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> <sup>Fig. 1, 2 en 3.</sup> Fig. vertoond worden. De Heer Dr. SULZER zegt wel, in zyn Syſtema der Inſecten, (*bladz. 170 ſqq.*) dat dee-  
ze

Heer de Buffon voor alleenlyk organiſche deelen, of wel voor eene enkele geſting; doch die gedachten voldoen my echter niet, en het door hem aangevoerde kan my niet tot zyn gevoelen overhaalen. Ik hoopte ook iets van die natuur, in de uitgedrukte vochten der verſch gelegde Muggen-eiëren te ontdekken; kneuſde tot dat einde eenige nieuwgelegde eiërklompen, en zag in derzelver vocht mede daadlyk zulke levende diertjens. Terſtond daarop kneuſde ik nog anderen, die geen vier-entwintig uren gelegd waren; en werd onder dezelven, een, niet geheel verbryzeld, maar echter geopend ei gewaar, uit het welk iets dat zich beweegde poogde voort te komen; dat ik, na het uitgekomen was, hield, voor het eerſte beginzel van een Muggeworm; en wel, om deſzelfs, ſchoon onduidelijken, omtrek, en zyne beide mede eenigzins onkenbaare dikke voorſte deelen, (welken ik voor den kop en de borst nam,) alsmede de twee achterſte deelen, die even onduidelijk en niet zo dik waren. Dan met dit alles kon ik 'er, gelyk anders, noch gewrichten, noch oogen noch ingewanden aan bemerken; en het ſcheen my ook toe, dat de binnenſte doorzichtige deelen ſchier, uit enkele ovaalen zich beweegende Lichaamtjens, beſtonden. Ik beſpeurde aan dit, op zichzelve onkennelyke ſchepzel, eene beſtendige uit en in-trekkende beweging, by welke de beide achterſte deelen, die ik ſchier voor de Lucht-gaten en den Stuit hield, beſtendig de ſterkſte beweging maakten. Ik had het ge-noegen het diertjen door myn vergrootglas, aan meer dan zes perſoonen, dien het zo min als my aan een ſcherp gezicht ontbrak, te vertoonen; en zy allen zagen het zelfde dat ik gezien had. — Na verloop van een uur, wanneer dit vocht droog geworden was, ſtierf het. Hier na onderzocht ik de dooijers van verſcheide Hoendereiëren, en zag daar in een verbaſend getal van dergelyke diertjens; ik zwyge van anderen, die ik in de uitgedrukte vochten van veele Planten ontdekt heb. Ondertuſſchen wil ik, met de melding deezer waarnemingen, noch die geen, die hunne ondervindingen op het Leerſtelzel der eiëren, noch hen, welken op de ſtelling van zaaddiertjens bouwen, noch ook hun die zich op de beide vooronderſtellingen gronden, hier mede iets tegen werpen, of in de hand werken; maar ik kan, als een geſlaagen vyand van onwaarheid, volkomen verzekeren, dat het geene ik, tot hier-toe, gezegd heb, van die ontdekte zogenoemde zaaddiertjens in vochten van verbryzelde en onbevruchte Inſecten-eiëren, ja ook in de dooijers van Hoendereiëren, de waarheid is; ſchoon ik tot deeze onderzoekingen het zonne-mikroskoop nog niet gebruikt hebbe. Deeze waarnemingen zouden middelerwyl, indien men dezelven als echt erkent, aanleiding kunnen geeven, om te ſtellen, dat deeze zaaddiertjens by het Wyſſen zo wel als by het Mannetjen gevonden worden; en mooglyk, tot de voortteeling, by de eene en andere ſexen noodig zyn. Dan dit is eene byzonderheid welker verklaring ik billyk den geenen overlaat, die het geheim der voortteeling dieper en ſcherpzinniger, dan ik, ingezien hebben.

TAB. ze wormen, na ongeveer veertien dagen, geheel volwasfen, en tot de  
 XV en verandering bekwaam zyn; dan dit heb ik niet befpeurd; volgens myne  
 XVI. waarneemingen hebben zy doorgaands vier weeken, en als de gesteldheid  
 van het weder niet dienstig is, nog wel langer tyd daartoe noodig.

## §. 8.

Fig. 1. De 1<sup>ste</sup> Fig. op Tab. XV. vertoont ons zulk eenen volwasfen Worm, in die gestalte, zo als dezelve onder de oppervlakte van het water hangt, en teffens, in die houding, waarin hy lucht fchept, welke hy in zyn nat verblyf niet kan ontbeeren. Zulks heeft hy met de meeste wormen van Waterkevers en Libellen gemeen; doch met dit onderscheid, dat hy niet, (zo als eenigen van de laatstgemelden doen,) door de zelfde opening, waar door hy lucht inademt, ook het water inzuigt en weder van zig uitlaat. Om dit luchtscheppen duidelyker te verklaaren, moeten wy de gedaante van onzen Worm nader befchouwen, en hier toe zal eene fterke vergrooting dienstig zyn. Vermits ik nu deezen Worm, door middel van een zeer fterk vergrootend Mikroskoop, voor my zelve afgebeeld hebbe; zo zou ik hem ook ongelyk grooter in plaat voorgesteld hebben, indien de ruimte van de plaat het had toegelaaten: ondertusfchen kan ik  
 Fig. 7. verzekeren, dat ik my in deeze afbeelding, (zie Fig. 7.) bevytigd heb, om alles op de duidelykste wyze uittedrukken; en myne geachte Leezers kunnen zelve, indien 't hun gevalt, uit de vergelyking met de afbeeldingen van anderen, die hem mede fterk vergroot hebben, afleiden, of hy in deeze afbeelding duidelyker of onduidelyker getroffen zy.

De geheele worm beftaat uit drie voornaame deelen; naamlyk, de Kop, den Rug of het Borstftuk, en het dunne Achterlyf; zynde voorts de korte Hals, beneffens de twee byhangzels, waar door hy lucht fchept, niet mede gerekend. Deszelfs huid is glimmend, doorschynend, overal met tedere aderen doorweeven; en wyders met kleine fchubben bedekt; de koleur is bruinachtig-geel. De kop is, naar evenredigheid van het achterlyf, tamelyk groot; evenwel kleiner dan het Borstftuk; eenigzins breed, van achteren rond; en heeft van vooren, naast den snuit, een paar voelfpitfen, welke ieder in drie hairige Leden verdeeld zyn, (zie *Lett. d.*)\* De met roodgeeie hairen begroeide snuit fchynt wel byt- of knyptangen te hebben; die evenwel niet te voorschyn komen, dan als de Worm modder of  
 wa-

\* Beide deeze Voelfpitfen veranderen, denke ik, aan de Mug in voelhoornen; fchoon de Heer SWAMMERDAM, in zyn *Bybel der Natuur*, des aangaande eene andere gedachte te berde brengt, gelyk ik vervolgens nader zal aantoonen.

water inflokt; waarom zy zich ook niet volkomen beschryven laten. Doch <sup>TAB.</sup> men ziet, door middel van dit deel, het voedsel, als donkere vlekken, <sup>XV en</sup> door den Kop en den dunnen Hals, in het dikke Borststuk overgaan. <sup>XVI.</sup>

Recht boven den Snuit wordt men, digt by ieder voelspits, eene donkerbruine vlek gewaar; welke ik in geene andere afbeelding heb gevonden, dan in die van den Franfchen Hoogleeaar in de wiskunde, by de Schilder- en Beeldhouw-academie, ik meen den Heer L: JOBLOT, op de 13<sup>de</sup> Plaat van zyn uit twee deelen bestaande voortreffelyk Werk, over de, door vergrootglazen, gedaane Natuurkundige waarneemingen van veele Insecten en kleine Dieren, in toebereide en niet toebereide vochten, \*

Behalven deeze twee donkere vlekken, heeft de Kop ook nog eenige anderen, die met kleine tengere Aderen omzet zyn; welken ik houde voor deelen, die tot den snuit behooren; welken zich echter min duidelyk dan de anderen vertoonen. Verder ziet men, ter wederzyde van den kop, twee groote, in twee verhevenheden afgedeelde achter over gebogene oogen, die zwart schynen, doch by eene sterke vergrooting duidelyk in 't groene speelen; en niet geheel glad zyn zo als de anders scherpsziende SWAMMERDAM meent. † Ze vertoonen zich dan netswyze, of zo getralied, als de beroemde *Engelschman*, de Heer HOOKE, § en nog eerst onlangs de Heer Justitie-Raad LEDERMULLER, \*† dezelve afgebeeld hebben. Uit de gesteldheid dier getraliede oogen schynt het scherpe gezicht deezer Wormen te ontstaan: want het is ongemeen vermaaklyk te zien, hoe snel zy zich weeten te verbergen, wanneer zy menschen of eenig ander ongewoon voorwerp gewaar worden. De wormen en poppen vlugten dan, met dezelfde omzichtigheid, als de vreesachtige kikvorschen; en de een poogt den anderen in de snelle verberging onder het water

VOOR-

\* De Tytel van 't Werk is; *Observations d'Histoire Naturelle, faites avec le Microscope, sur un grand Nombre d'insectes et sur les animalcules, qui se trouvent, dans les Liqueurs preparées, et dans celles, qui ne le sont pas, avec la description, Et les usages des différens Microscopes &c. Partie déjà publiées par feu M. JOBLOT, Professeur en Mathématiques de l'Académie de peinture et de sculpture, partie rédigées sur les observations postérieures avec un grand nombre de figures. Tome Premier. a Paris chez Briasson Libraire, rue saint jaques, a la science 1754. in 4°.*

† Zie zyn *Bybel der Natuur*. 3<sup>de</sup> Clasfe. Bladz. 144.

§ Zie zyne *Micrographia*. Tab. XVII. Fig. 1.

\*† *Mart. Froben. Ledermüllers Microscopische gemuttes und augen-Ergotzung. pag. 154. 156. Tab. 79. Fig. 8. Nbg. 1761. in 4°.*

TAB.  
XV en  
XVI.      voorby te ftreeven, waar uit zy niet weder te voorschyn komen, voor dat zy zich genoodzaakt vinden, de oppervlakte van 't water te zoeken om adem te haalen.

## §. 9.

Op den Kop volgt eerst de korte en niet zeer breede hals; en dan voorts het breede, dikke, gewelfde, doorschynende Borststuk met deszelfs ingewanden. — Dit laatste heeft zes hoeken, waar op kleine, met eenige lange tedere borstelige hairen bezette Wratten staan. In deeze Borst vertoonen zich ook twee eenigzins ver van elkander afftaande, uit en inwards gebogen, adergelykende, roodbruine groeven of canaalen, die zich gestadig uit- en intrekken; ze loopen voorwaards heen door den Hals en den Kop, en eindigen niet ver van de oogen als tedere aderen: dan, naar achteren toe loopen zy, door het gantfche achterlyf, als breedere canaalen, neemende haaren uitgang aan het buitenfte byhangzel. (*zie Lett. e.*) Men erkent dezelve gereedlyk voor die deelen, waar door deeze worm lucht inhaalen en weder uitlaaten kan; ze worden by de Kikvorfchen de longblaazen genaamd; doch daar zy in onzen worm meer naar eene ader dan eene blaas gelyken, zo wil ik ze liever hunne Luchtaderen noemen. Tusschen die aderen is de Borst, met eene troebele of vuile stof vervuld, waar in men het genuttigde voedsel ziet dryven. Dewyl het voedsel zich nu in deeze plaats het langfte ophoudt, en van daar in het dunne achterlyf gevoerd wordt; en 'er in die plaats ook eene geduurige beweging is, zo geloove ik, dat hier de maag zy; waar in de spys verteerd, en van daar achterwaards, in den daar onder liggenden mestdarm voordgedreeven wordt. Dan, waar voor ik wyders de zes donkerbruine nierswyze beweegbare deelen van de Borst, die zich binnen in, buiten aan en benevens de luchtaderen bevinden, en tot aan de verandering van den Worm, (wanneer zy echter onkenbaar beginnen te worden,) aldaar blyven, moet houden, kan ik niet zeggen. Ik heb dezelve ook nergens, dan in de Figuuren van den Heere Joblot afgebeeld gevonden: mogelijk bevatten zy in zich de stof, tot de vorming der zes pooten van onze Mug.

## §. 10.

Het smalle dunne Achterlyf hangt aan de Borst, is daar mede verbonden, en bestaat uit acht afdeelingen, welken, ieder ter wederzyde, een met zeer tedere borstelachtige hairen bezetten wrat hebben; die door den Worm, by het zwemmen, heen en weder bewogen kunnen worden. Men ziet de beiden luchtaderen hier, in alle deeze afdeelingen, tot aan haaren uitgang toe, duidelyk liggen; en, als de Worm aan de oppervlakte van 't water hangt, zyn ze in eene geduurige uit- en in-ademende beweging. Deze lucht-ade-

aderen sluiten den met donker olyven-groenen drek opgevulden mest-<sup>TAB.</sup>  
darm in; en den daarin zynden drek kan men somtyds, van elkander af-<sup>XV en</sup>  
gescheiden, bespeuren: dezelve heeft zynen uitgang door het aan de laat-<sup>XVI.</sup>  
ste verdeeling vastgehechte korte byhangzel, 't welk men den stuit des  
Worms zou mogen noemen. Ik heb dit byhangzel en deszelfs uitgang in  
onze 7<sup>de</sup> Fig. met *Lett. f.* doch, beneffens de laatste afdeeling in de *Fig. 7.*  
8<sup>ste</sup> Fig. die ongelyk meer vergroot is, met *g* getekend. Dat dit byhang-<sup>*Lett. f.*</sup>  
zel smaller zy, dan de laatste afdeeling van den Worm, en dat dezelve <sup>*Fig. 8.*</sup>  
eene ruime opening, (waar door de vervuilde stof uitgaat,) hebbe, is 'by <sup>*Lett. g.*</sup>  
*Fig. 1* en 7. duidelyk te zien. Voorts ontdekt men, rondsom deeze ope-  
ning, vier zeer doorzichtige witachtige bladswyze Vinnen; welken de worm  
uit elkanderen slaat, wanneer hy zig van zynen drek ontlasten wil: ook  
bedient hy 'er zig van tot zyne beweeging in 't zwemmen. De Heeren  
SWAMMERDAM en BLANKAART spreekten van deeze vinnen geheel  
niet, en de Heer Justitie-Raad LEDERMULLER zegt, dat hy 'er slechts  
twee waargenomen heeft: dan daarentegen vertoonen JOBLET en RE-  
AUMUR dezelve allen vier duidelyk.

Die stuit van deezen Worm bestaat niet uit drie afdeelingen, zo als  
dezelve door den Heer LEDERMULLER voorgefeld wordt; noch uit  
twee, zo als de Heer BLANKAART, die den worm in den tyd van  
zyne verandering kan beschouwd hebben, aftekt; maar is, zo als de  
Heeren HOEK, BAKER, JOBLET en SWAMMERDAM dien afbeel-  
den, slechts één ééning onafgescheiden deel. Het zelve is, aan de bui-  
tenste zyde, met zeer veele lange borstelige tedere Hairen overdekt; en  
'er vertoont zig, beneffens hetzelfde, even aan de laatste afdeeling van  
den worm, nog een ander, maar veel langer en smaller roerswyze deel,  
waar in de bovengemelde twee luchtaderen eindigen. Dit gedeelte is,  
(gelyk *Fig. 7. Lett. e.* en *Fig. 8. Lett. h.* vertoonen,) op beide de <sup>*Fig. 7.*</sup>  
zyden met korte Hairen bezet; en heeft aan 't boveneinde, alwaar het <sup>*Lett. e.*</sup>  
smaller wordt, en zig opent, twee breede en drie smalle kleinere pun- <sup>*Fig. 8.*</sup>  
tigtoeloopende deelen; waar mede zy, als zy onder water is, de opening <sup>*Lett. h.*</sup>  
kan sluiten; die zy echter by de oppervlakte van 't water weder openen  
kan; wanneer zy zig, om lucht te scheppen, gelyk men *Fig. 1.* ge-<sup>*Fig. 1.*</sup>  
zien heeft, in den aldaar afgebeelden stand plaatst, in welken zy somtyds  
een goed kwartier uurs, aan de oppervlakte des waters, blyft hangen.  
Deeze puntig toeloopende deelen schynen eene olyachtige stof te bezit-  
ten, die het indringen van 't water belet; vermits zy nooit nat worden;  
en, wanneer 'er al eenige vogtigheid, in die Luchtbuizen, (dus noem ik  
deeze deelen,) inkomt, zo ziet men, dat de Worm, dezelve, door mid-  
del van zyn finuit, waar door hy de vochtigheid inzuigt, weder tracht  
nitteperfen. Wanneer nu onze Worm zig uit de diepte in de hoogte,  

P

dat

TAB.  
XV <sup>CB</sup>  
XVI.

dat is, naar de oppervlakte van 't water, wil begeeven, om daar aart te hangen en lucht te scheppen, dan ryst hy achterwaards naar boven, door zyn lichaam geduurig heen en weder te beweegen; waar by deszelfs kop en staart doorgaands elkander naderen, als in de 2<sup>de</sup> Fig. te zien is: en dit spel of tydverdryf wordt de worm nimmer moede.

§. II.

Als de tyd der veranderinge deezer Insecten komt, dan naamelyk, als zy hunnen laatsten huid zullen afleggen om Poppen te worden, zo ontdoet de Worm zig van alle vuiligheid, en wordt veel helderer en bleeker; hy tracht dan aan de oppervlakte van het water te komen, alwaar hy tot aan de verandering, en dus wel een half uur, hangen blyft. Het Borststuk begint zig daarop sterk uittezetten; en men wordt, buiten aan en voor-waards, op hetzelfde twee kleine zwartbruine stippen of kringswyze wratten gewaar, die men 'er voorheen niet bespeurde; en tefkens de zekerste kentekenen zyn, dat hy zig nu van zynen huid ontdoen, en in eene Pop veranderen zal. In de 3<sup>de</sup> Fig. heb ik een Worm in die gestalte afgebeeld, en te gelyk de plaats, daar de wrattens staan, met de Letteren *ii.* getekend.

Eindelyk neemt de Worm, met het Borststuk en den Kop, eene andere richting aan. Hy poogt dezelve aan de oppervlakte van 't water te brengen; trekt het Lichaam vervolgens dikwyls uit en in; krygt op den Borst, en de overige afdeelingen van 't Achterlyf, eenige dofroode Vlekken, en begint de vier bladswyze Vinnen aan zyn Stuit, nu te openen, dan toe te sluiten. De Borst verheft zig voorts nog hooger, zo dat de beide Luchtaderen, digter aan den huid van den Worm, gedrongen worden; en de Worm vertoont zig, als ware hy overal tuschen den huid met water opgevuld. Doch naauwlyks bemerkt men deezen toestand, of men wordt tefkens gewaar, dat de Kop zig, onder den Borst, eenigzins intrekt; en te gelyk komen 'er, uit de kleine zwartbruine kringswyze Borstwratten, (*Let. ii. Fig. 3.*) plotslings twee holle hoornachtige deelen voord. De sterk opgezwoilen Borst berst nu, bovenwaards, schie-lyk vanéén; en het schynt, als of daar door, op het zelfde oogenblik, de luchtaderen des worms, van de luchtbuizen, onthonden worden; en dat ze by de voordkoming deezer hoornen verdwynen, terwyl die in derzelver plaats komen. De kop trekt zig nu vervolgens nog meer in; evenwel wordt men de Voelspitfen by aanhoudendheid gewaar; alleenlyk ziet men, dat ook de huid van deeze spitfen, gelyk die van het gantsche Lichaam, afgetrokken wordt; en dat zy voorts eerlang mede geheel verdwynen.

Wan-

Wanneer onze Worm nu alle deeze veranderingen ondergaan heeft, <sup>TAB.</sup> dan stroomt hy zyn huid, met den stuit en de luchtbuizen, in den tyd <sup>XV en</sup> van eene minuut, volkomen achter zig af; buigt te gelyk zyn Achterlyf <sup>XVI.</sup> benedenwaards, tegen den Kop te zamen; en neemt terstond zulk eene plompe gedaante aan, als wy in de 9<sup>de</sup> Fig. volgens de natuurlyke ver- <sup>Fig. 9</sup> tooning, maar in de 10<sup>de</sup> eenigzins vergroot afgebeeld hebben. En dec- <sup>en 10.</sup> ze gestalte mag, (vermits het Insect dan geen voedsel meer gebruikt, en de Mug zich onder dat bekleedzel vormt,) met recht deszelfs Pop ge-  
naamd worden.

## §. 12.

Tot nadere kennisneeminge van deeze Pop, zal de vergrooting, (*Fig.* 10.) geen gering licht byzetten. Zy vertoont zig in 't eerst gantsch helder, zelfs helderer dan de Worm was; maar ze neemt schieelyk eene bruiner kleur aan, en wordt eindelyk geheel donkerbruin. De reeds gevormde leden der vleugelen, der pooten, der voelhoornen, en van den zuigtnavel, mitsgaders wel byzonder de getraliede oogen der aanstaande Mugge, laaten zig nu veel duidelyker dan voorheen in den Worm zien. Zy liggen naast den rug, in het dikke voorste deel van de Pop, op eene aartige wyze te zamengevouwen, en maaken het lompe deel der Poppe uit.

Op den rug staan de twee achterwaards geboogene holle hoornswyze deelen, waar mede zy zig aan de oppervlakte van 't water, (doch nu geheel anders dan de Worm deed,) vasthecht. Onder *Lett. k.* heb ik *Lett. k.* zulk een hoorn, nog iets vergroot, voorgesteld. Deszelfs opening is lang-achtig, en verdeelt zig boven in twee spitsen, welken de Heer de REAUMUR in de voorreden van zyn vierde Deel bladz. 25. by Ezelsooren vergeleeken heeft.

Vermits wy nu in de voorgaande §. gezien hebben, dat deeze hoornen reeds voor handen zyn, al eer de voelspitsen van den Worm verdwynen; en dat de luchtaderen, by de voordkoming van genoemde hoornen op eenmaal schynen te verdwynen; zo kunnen dezelve geenzins uit de voelspitsen ontstaan; welke gisting de Heer SWAMMERDAM, in zyn *Bybel der Natuur* bladz. 146, aldus opgegeeven heeft. — „Men „moet, (zegt hy) deeze Buizen, (de hoornen der Pop naamlyk) aan „den Kop, voor gehuide hoortjens, (zo noemt hy de voelspitsen) aan- „zien; welken zig uitgezet en hun gebruik veranderd hebben; vermits „zy slechts een weinig meer voorwaards zyn komen te staan.” — Dan daar ik in §. 9, by de beschryving van den Worm, reeds toonde, dat de luchtaderen haaren oorsprong niet in de Borst, maar als tedere aderen

TAB  
XV en  
XVI.

in den Kop, niet ver van de Oogen neemen; en de Hoornen van de Pop ook dicht by de oogen voordkomen; zo is het veel eer te gelooven, dat deeze zelfde luchtaderen, en niet de voelspitfen van den Worm, haar gebruik behouden, en alleenlyk, by het uitbreken der hoornen, van plaats veranderen; en dat zo de voelspitfen in tegendeel in de Pop tot Voelhoornen aangroeijen. Voor 't overige denk ik, dat de Pop, door meer gemelde twee hoornen, lucht fchept; doch ik heb niet gezien, dat zy zig, wanneer zy onder het water komen, toefluiten: maar ik heb wel bemerkt, dat de Pop nooit onder 't water gaat, of zy moet, door eene ongewoone beweeging in 't zelve, of door eenigen vyandyken tegenftand, er als onder gejaagd worden. Ook behoeft deeze Pop, daar ze verder geen voedsel noodig heeft, zig niet meer onder 't water te begeeven; 't is veeleer haare zaak op de oppervlakte te blyven, ten einde de leden der Mugge, door het inademen der lucht, hunne behoorlyke vastigheid verkrygen; en zy, te voorfchyn komende, geen gevaar loope van te verdrinken.

### §. 13.

Het achterfte en veel dunner gedeelte der Pop beftuit het achterlyf des Worms in zig; en beftaat, niet uit vyf, (zo als de afbeelding van den Heer HOOK in zyne *Micrographia* vertoont,) ook niet uit zes of zeven, (tot welk getal de Heer JOBLET dezelve in zyn Werk gebragt heeft,) maar even als het lyf des Worms, uit acht afdeelingen; waar van elk, op den rug, een klein boschje korte haren heeft. Verder heeft ook het laafte gedeelte, of de achterfte afdeeling, (die de Heeren LEDERMULLER, BLANKAART en SWAMMERDAM verkeerdlyk voorgesteld hebben,) niet flechts één, maar wel twee rienswyze, zeer doorzichtige breede, en niet fpitftoeloope, (gelyk ze in de platen van den Heer JOBLET vertoond worden,) maar, zo als de Heer de REAUMUR ze ook afbeeldt, rondachtige Vinnen; welken der Poppe, in het zwemmen, ter voordroeiing dienen. In deeze werkzaamheid is onze Pop op verre na zo traag niet, als de Heer LEDERMULLER aanduidt: zy heeft vooral geen langzaamere beweeging dan de worm zelve; maar fchynt dien veeleer daarin nog te overtreffen; hoewel zy zig van eene andere wyze van zwemmen bediene. Haar dunne Achterlyf bezit zulk eene fterke beweegkracht, dat het lompe voorfte deel, zo haast de Pop het achterfte achter zich uitflaat, (waarby zy teffens de roerriemen uitfpreidt,) zig eensklaps verheft, en, neffens het Achterlyf, tot op een vry grooten afstand als voordgeflingerd wordt. Wanneer nu de Pop dit achteruitslaan dikwyls en fchielyk herhaalt, zo kan zy veel gezwindter dan de Worm, die altoos twee beweegingen van de eene zyde des Lyfs tot de andere te maaken had, door het water komen.



## §. 14.

By geen te koud of te vochtig weder, komt de Mug, na drie dagen, <sup>TAB.</sup> uit de Pop te voorſchyn: men kan haare uitbreeking als kort aanſtaande <sup>XV en</sup> te gemoet zien, wanneer men bemerkt, dat de Pop geheel zwartbruin en <sup>XVI.</sup> haare groene oogen meer rond verheven worden of meer uitpuilen.

Het uitkomen van de Mug gaat in deezerveogen toe. Boven, tusſchen en voor de hoornen, ſpilt de huid der Pop; haar kromme dunne achterlyf begint zig vervolgens in de langte uittreſſen; en de daar in verborgene Mug komt, als dan, uit het geopende deel, door middel van eenige ſtooten, die zy zig geeft, telkens een weinig tyds uitrustende, eerst met den rug, den kop, de voelhoornen, den zuignavel, en eindelyk met zyne vleugelen, pooten en het gantsche lyf te voorſchyn. Zie *Fig. 12.* Voorts begint zy haar zuignavel en de voelhoornen verſcheide *Fig. 12.* maalen te beweegen; ſtrekt eerst de voor- vervolgens de middelſte pooten voorzichtig in de hoogte, ten einde dezelve niet, als nog ongehuide, op het water komen; waar door zy naar beneden zinken en verdrinken zou: op dezelfde wyze doet zy ook met de achterſte pooten; waar mede zy zig ondertuſſchen nog aan haar ledige Poppevlies vaſthoudt. Wanneer nu de pooten droog en wel gehuid zyn, dan beweegt zy dezelve, benevens de vleugelen, verſcheide maalen; en zodra ze genoegzaame krachten beſpeurt, verlaat zy het Poppevlies, zoekt een ander element tot haar toekomend verblyf, en vliegt zo vlug als eene andere, ſchoon reeds lange in het vliegen geoefende Mug, van 't water af.

Zy zoekt dan verder terſtond haar voedsel, en vindt hetzelfde wel dra, deels in ons bloed, deels in het ſap der planten. Welk eene wonderbaare verandering van een Diertje! Naauwlyks drie dagen geleeden, was het water voor dit Inſect, als Worm, nog onontbeerlyk; en thans zou het voor het zelve als Mug, doodlyk zyn, wanneer het 'er in verplaatst wierd.

## §. 15.

In de 12<sup>de</sup> *Fig.* van *Tab. XV.* heb ik eene Wyfjens-, en in de 13<sup>de</sup> *Fig. 12.* *en 13.* eene Mannetjens- Mug, in de natuurlyke grootte, en met kruiswyze over elkander geſlaagen vleugelen, afgebeeld. Het wyfjen is van 't mannetjen onderscheiden door het dikke achterlyf; ook heeft zy geene zo bosachtige Voelhoorns en veel korter baartſpiſſen. *Fig. 14.* vertoont zulk *Fig. 14.* eene vrouwelyke Mug iets vergroot, en met uitgeſpreide vleugelen. Haare kleur is over, 't algemeen bruin. De gantsch niet groote kop is met twee groote, rond uitpuilende, in 't groene ſpeelende, nets- of tralies-

TAB. wyze oogten, (die ik vervolgens breeder zal befchryven,) voorzien.  
 XV en Boven op twee verhevenheden, als twee halven, maar in 't midden inge-  
 XVI. drukte kogels, ziet men twee voelhoornen, welken uit veertien leden be-  
 staan, en met eenige kleine tedere Hairen bezet zyn; loopende het laafte lid zo fpijs toe, als de Heer REAUMUR \* het heeft laaten afbeelden.  
 Lett. II. den. (zie *Lett. II.*) Voorwaards, onder deeze voelhoornen, en onder aan den kop, is de angel geplaatst, waar mede deeze Muggen zo gevoelig kunnen fteeken. (zie *Lett. m.*)

Van deezen angel is echter, wanneer de Mug denzelven niet gebruikt, niets meer te zien, dan het overtrekfel, den koker of de fchede, waar in dezelve als een degen verborgen zit. Hier neffens, en kort aan den kop, ziet men twee korte, en in twee leden afgefcheiden deelen, welken ik, (vermits zy aan dezelfde plaats fchynen te ftaan, daar men de baardspitfen der Vlinders vindt,) ook baardspitfen mag noemen; en hier, gelyk ik reeds gezegt hebbe, veel korter dan by 't Mannetje zyn. De borst, en de met donkerbruine ftreepen voorziene rug, is vry verheven en hairig. In de borst zelve, zyn zes lange pooten, die uit zeven of acht gewrichten beftaan, en met twee fyne fcherpe klaauwen voorzien zyn; mitsgaders de beide vleugelen, door hunne geledingen vastgehecht; ook vertoonen zig aldaar de kolfjes, die by alle twee vleugel-infecten onder en achter de vleugelen gevonden worden; ze hebben, (gelyk *Fig. 15.*  
*Lett. nn.* 15. *Lett. nn.* vertoon) eene dofglimmende witachtig geele kleur. De Heer SWAMMERDAM noemt dezelve *Hamertjes* † (mifchien om dat hy geloofde, dat zy het geluid der Muggen veroorzaaken;) van anderen worden ze *Evenaars* of *Gewigtkolfjes* genaamd, op die vooronderftelling, dat zy het lyf van 't Infect in evenwigt houden. En fchoon DE REAUMUR, in het vierde deel van zyn werk, p. 253, belyde, dat hy het gebruik van dezelve niet weet, zo komt het my toch gantsch aanneemlyk voor, dat zy niet flechts het geluid veroorzaaken, wanneer zy tegen de uitgefpannen vleugels aan ftaan; maar dat ze ook den wind onder de vleugels aanwakkeren, om de vlugt te bevorderen. Zulks komt my te meer waarfchynelyk voor, aangezien ik waargenomen heb, dat zy onder het vliegen van het Infect gefladig wervelswyze draaijen; des zy zo wel *Wind-* of *Vlieg-* als *Geluidkolfjes* verdienen genaamd te worden.

De Vleugels hebben eene langwerpige gedaante, zyn fterk gefpannen, door-

\* *Memoires pour servir à l'Hift. des Infect.* Tom. IV. Mem. XIII. Pl. 39. Fig. 3.

† *Bybel der Natuur.* Bladz. 148.

doorzichtig en speelen, in het licht, met de hoogste kleuren van den Regenboog. Ze zyn met verscheidene tedere aderen of ribbetjes als doorweeven; en ieder van deeze aderen is, als by de vergrooting der vleugelen blykt, op beide de zyden, met vele sierlyke pluimvedertjes bezet. Deeze vedertjes geeven den vleugelen een zeer voortreffelyk aanzien; en niet minder doen zulks de tedere wratjes, (die men alleenlyk door eene sterke vergrooting ontdekt,) waar mede dezelve als bezaaid zyn, benefens de, aan den buitenrand der vleugelen, hangende pluimvedertjes; welken in de uitmuntende werken van DE REAUMUR en SWAMMERDAM, als ook in het werk van den Lofwaardigen Heer LEDERMULLER zeer aartig afgebeeld zyn. Dit alles verstrekt teffens tot een voldingend blyk, van de wyze inrichting des grooten Scheppers.

Het achterdeel, of achterlyf van onze Mug is, uit acht donkerbruine, met vederen en hairen bezette afdeelingen, te zamengesteld; waar van het laatste de teeldeel in zig bevat.

## §. 16.

Eer wy tot de verklaring van den kop eener Mammetjensmug overgaan, (zie *Tab. XVI.*) zullen wy eerst melden, hoe onze Mug steekt en zuigt; en hier toe zal ons de 13<sup>de</sup> *Fig.* van *Tab. XV.* vertoonende den kop *Fig. 15.* zonder vleugelen, achterlyf of pooten, met een daarby afgebeeld stukje Menschenvel, tot ophelderinge dienen. Hoe zeer ook de voordragt van den Heer DE REAUMUR \* wegens het zuigen der Muggen, gegrond zy, zo, dat ik aan derzelyer echtheid niet behoefte te twyfelen, kan ik echter niet ontveinzen, dat myne nieuwsgierigheid, om eene Mug te zien zuigen, veel te groot was, om my, met Zyne beschryving alleen te laten vergenoegen.

Ik zocht dan, op een heeten zomerdag, gelegenheid, om zelf van zulk eene Mug getooken te worden; en die gunst verkreeg ik zeer spoedig. Weldra plaatste zich eene Wyfjensmug op myne hand, die op verscheidene plaatsen met haaren Angel in myne huid trachtte te booren. Toen zy eene daar toe voor haar geschikte plaats gevonden had, trok zy haare pooten dicht by elkander, hield de beide vleugels in de hoogte, boog den kop benedenwaards, en liet my haar gelukte voorneemen, door een gevoeligen steek, ondervinden. Ik ontdekte hier by, dat de schede van den zuigangel zig by den kop, tegen den borst, begon te buigen, en eindelijk

\* *Mem. pour servir à l'Hist. des Insectes.* Tom. IV. Mem. XIII. Pl. 41. Fig. 7. p. 961.

TAB. XV en XVI. *Lett. o.*  
*Lett. p.* lyk dubbeld te zamen te liggen; (zie *Lett. o.*) en nu werd ik eerst den weezenlyken Angel, (zie *Lett. p.*) volkomen en buiten de fchede gewaar; ook kon ik zeer duidelyk bemerken, dat dezelfs roode kleur voordkwam uit myn bloed, 't welk door dat canaal in de hoogte fteeg. Zy itak dien Angel byna tot aan den kop toe in myn vleesch, en ik kan verzekeren, geen pyn, dan by den eerften fteek, gevoeld te hebben. Eindelyk werd ik gewaar, dat het onderlyf zo fterk opzwol, dat het fcheen te zullen bersten, en teffens eene roode kleur aannam.

De Mug had ongeveer den tyd van ééne Minuut befteed, om zig voltezuigen en zyn bloeddorst te stillen; waarna ik dezelve, (zonder iets meer te gevoelen,) met een zwaar beladen Lichaam van daar zag wegvliegen. Vermits ik nu, niet tegenftaande ik my, behalven van deeze, ook nog van anderen zo Mannetjens als Wyfjensmuggen had laaten fteeken, niet anders dan den eerften fteek gevoeld, en van denzelven geene kwaade gevolgen ondervonden, of builen bekomen heb; zo befluit ik daaruit, dat alleenlyk die geenen, na den fteek, eene pynlyke jeuking of zwelling ontwaar worden, die den fteek der Mug willen afweeren. De dubbeldé Angel, dien ik by onderzoeking van den Mug ontdekt heb, bevestigt deeze myne gedachten. Of 'er Menfchen zyn, die, volgens hun voor-geeven, niet van de Muggen geftoken kunnen worden, zal ik noch toeftemmen noch ontkennen: indien 'er zulken zyn, dan heeft mooglyk deeze uitzondering plaats, omtrent zeer vette lichaamen; in 't fteeken van welken de Muggen geen fmaak vinden. Ondertusfchen is de fteek van onze inlandfche Mug, op verre na, niet van zulke gevaarlyke gevolgen, als van die welken in heete luchtfreeken gevonden worden. Ik herinner my ter deezer gelegenheid desaangaande geleezen te hebben, dat 'er Muggen gevonden worden, die dezulken, welken aan den oever der zee woenen, met haar fteeken zeer plaagen; en daar door dikwyls veroorzaaken, dat 'er by hen, die door haar op de knie geftooken waren geworden, zulk eene ontfteeking op volgde, dat zy het gekwetfte lid hadden moeten laaten afzetten. Dat 'er althans in andere werelddeelen insgelyks Muggen zyn, getuigt MARCGRAAF in zyne *Hift. Brasil Nat.* L. VII. pag. 257, en hy deelt ons zo wel derzelver befchryving als afbeelding mede.

## §. 17.

TAB. XVI. Nu ftaat ons wyders nog den, op Tab. XVI. afgebeelden zeer fterk vergrooten kop, van eene Mannetjensmug te befchouwen, en na te gaan, waar door hy van dien van het Wyfje onderfcheiden is. Ik heb denzelven met alle zyne deelen, zo als hy op de boven-zyde gezien wordt, voorgesteld. De grondkleur is voorwaards graauwachtigbruin; maar achter

ter na den nek toe meer donkergrauw; en met veele bleekwitachtig gele pluimtijens bezet; ook is dezelve nog van onderen, met andere afhangelende donkerbruine langwerpige vederen, versierd. De onder den kop staande hals, met *Lett. A* getekend, is bruinachtig geel, in 't midden gespleeten, en aan den nekhouder vastgehecht. Op den kop zelven vertoonen zich (*Lett. BB.*) de groote gewelfde of uitpuilende Oogen. Zy beginnen op den Schedel van den kop, zeer naby aan elkanderen, loopen voorts in eene breedere gestalte, rondsom den gantschen kop, en voegen zig onder by de keel, daar zy weder iets smaller worden, geheel samen. Deeze beide sterk gewelfde Oogen, anders het zintuig van 't gezicht geheeten, bestaan niet slechts uit twee, maar, (gelyk de afbeelding aanwyst,) uit zeer veele, en meer dan 400 zeshoekige, en, binnen deeze hoeken, ronde en linswyze Oogen; die zo geschikt zyn, dat derzelver hoornvlies zig als een net of traliwerk vertoone. De kleur dezzer Oogen is wel groen, maar speelt echter in 't licht als 't fynste goud; 't welk derzelver donkeren grond een ongemeen prachtig aanzien geeft; en achter aan den kop zyn ze met witte franje opgefierd.

TAB.  
XV en  
XVI.

*Lett. A.*

*Lett. BB.*

Ik behoeve hier, zo ik achte niet te bewyzen, dat dit de waare oogen van de Mug zyn; deels, om dat ik boven reeds gezegd heb, dat, hoe duidelyker dezelve zich vertoonen, des te scherper ook het gezicht van dit Insect en deszelfs Pop zyn moet; en deels ook, om dat reeds de Heeren HOOKE, LEEUWENHOEK, SWAMMERDAM, DE REAUMUR, RÖSEL, LEDERMULLER, met veele anderen, en in 't byzonder de Heer PUGET, die, (volgens het bericht van den Heer DE REAUMUR \*) een geheel tractaat over de Oogen geschreeven heeft, dit onwederleggelyk beweezen hebben; het welk ieder in de schriften van deezen beroemden Natuur-onderzoeker kan nazien.

### §. 18.

Boven op den kop, en tuschen die twee groote oogen, staan twee van boven cenigzins ingedrukte, en als twee halve kogels gevormde deelen, naast elkander; waar uit de Voelhoornen (*Lett. CC.*), welken drie onderscheidene hoofdafdeelingen hebben, voordkomen. De eerste en grootste hoofdafdeeling bestaat weder uit twaalf leden; elk van dezelve is van boven roodachtig bruin, doch van onderen witachtig geel, en rondsom met veele lange hairborstels bezet. Wat wyders de tweede en derde hoofdafdeeling belangt, deeze schynen uit tien tot twaalf kleinere leden te be-

\* *Memoires pour servir à l'Hist. des Insectes.* Tom. I. Pag. 210.

Tan. beftaan; waar onder het laafte, in de derde afdeeling, hier even zo fpits, als by het wyfjen, toeloopt. Voor 't overige zyn zy allen met vier korte buitenwaards ftaande hairbosfchen bezet, waardoor de voelhoornen van 't Mannetjen niet alleen een grooter vertoon boven die van het Wyfjen hebben, maar ook eene veel prachtiger gedaante verkrygen. Hierby komt nog, dat ze, niet alleen door deeze menigte van hairbosfchen, maar ook door het ongelyk grootere getal van Leden, (waar van ruim 30 by die van 't Mannetjen, en by die van 't Wyfjen maar 14 te tellen zyn,) onderscheiden worden. De Heeren SWAMMERDAM \*, en LEDERMULLER †, hebben derhalven in dit ftuk gedwaald; daar zy, aan de voelhoornen van de Manlyke Mug, niet zo veele leden toefchryven, als men 'er wezenlyk aan gewaar wordt.

## §. 19.

Onder aan den kop voorwaards ftaat de lange en met eene bruine Lett. D. fchede bedekte Angel, (Lett. D.) en recht over denzelfven ftaan de nevens hem aan den kop ingewrichte bruine baardfpitfen van deeze Man- Lett. HH netjensmug, door de Letters H H. aangewezen.

De zuigangel, of liever deszelfs fchede, is, van vooren breeder dan van achteren, over langs gefpleeten; met zeer veele fchubachtige vederen en korte hairen bezet; dezelve heeft ook voorwaards een pylswyze gedeelte, (Lett. E.) by welks begin de fpleet der fchede doorgebroken fchynt te weezen. Aan deeze fpleet moet men het toefchryven, dat de fchede, (fchoon zy nergens eenige afdeeling vertoone,) by het fteeken van de Mug achter zig te zamen gevouwen wordt; 't welk niet zou kunnen gefchieden, indien zy als eene degenfchede onbuigzaam en nergens opengefpleeten ware. Ondertusfchen zou evenwel de Angel gevaar loopen, van niet weder in zyne fchede te kunnen komen, wanneer dezelve niet zo ingericht ware, dat zy, op de aangetoonde wyze, ter plaatze daar ze pylvormig is, zig over den Angel vereenigen en zamenfluiten kon; en gevolgelyk, wanneer zy, als tweevoudig te zamen gefchooven wierd, met dat pylswyze gedeelte toch altoos aan den Zuigangel zou moeten blyven hangen. De Mug kan nu den Angel onder zig houden, wanneer de fchede over denzelfven naar beneden affchiet; aangezien zy van vooren zwaarer en breeder dan van achteren is; en wanneer de Mug den Angel nu flechts een paarmaal heen en weder draait, dan fluit zig de fpleet weder zo naauw te zamen, als die voor het gebruik geweest is.

## §. 20.

\* Zie *Bybel der Natuur*. Bladz. 146. en 148.

† Zie deszelfs *Microscopifche Hart. en Oog-verlustiging*. Bladz. 167.

## §. 20.

Het buitenste gedeelte van deezen Angel, dat zig, by het steeken van de Mug, het eerst buiten de schede vertoont, en waarmede zy bloed zuigt, ziet men by *Lett. F.* Het is, by zyne hardheid, evenwel buigzaam, zeer doorzichtig, en achter aan den kop dikker dan voorwaards. Wanneer men dien Angel door een goed vergrootglas beschouwt, zo ziet men, aan het spitse einde, eene tamelyk langachtige opening, waar door de Mug het bloed naar zig haalt; en waar uit zy, (zo men haar het zuigen belet,) waarfchynelyk den tweeden veel spitter en fyner Angel, welken ik by haar ontdekt heb, en die op de Plaat met G getekend is, hervoord doet komen; waar uit zy dan teffens een schadelyk vocht fchiet, dat eene pynlyke jeuking en groote builen kan veroorzaken. Zo dat men, met recht, den eenen den *Zuig-*, en den anderen den *Kwetzenden Angel* zou mogen noemen. TAB. XV en XVI. *Lett. F.*

## §. 21.

Het is my menigmaalen, schoon niet zonder groote moeite, gelukt, de bruin gevederde schede, over den gladden zuigangel, voorwaards te trekken; en dien onder een goed vergrootglas te beschouwen. Ik zag 'er dan altoos den kwetzenden Angel wel in liggen, maar ik heb 'er nooit foortgelyke andere deelen, of Angelen in gezien, als de Heeren SWAMMERDAM, BAKER, en DE REAUMUR, (welken ieder andere, in gedaante verschillende, afbeeldingen 'er van mededeelen,) voorgeeven daarin ontdekt te hebben. Mogelyk zullen die byzonderheden zomwylen, door nog eenige der daar in zynde verschillende vochten, of het daaropvallende licht, gevoegd by de verlichting door de ontfaane fpeelingen van het Microscop, myne zorgvuldige waarneemingen ontflipt zyn. Edoch daar de Heer SWAMMERDAM niet zegt, dat hy deeze zogenaamde Angelen, binnen den zuigangel, heeft waargenoomen; maar wel fchryft, dat hy dien eerst in tweeën heeft moeten drukken, als hy dezelve wilde waarneemen; en daar de Heer DE REAUMUR voorgeeft nog meer dergelyke deelen, gezien te hebben, (zie zyne afbeeldingen,) zo werd ik aangefpoord, om het zelfde te doen; en drukte, met behulp van een bekvaam vergrootglas, den zuigangel, die ongelyk veel tederer dan een hair is, open. Toen dit gefchied was, beschouwde ik, waarlyk, niet alleen den beschadigenden Angel, maar ook rondsom denzelven eenige andere foortgelyke deelen, als de Heeren SWAMMERDAM \* en BAKER † heb-

\* Zie zyn *Bybel der Natuur*, Tab XXXII. Fig. 3.

† Het Microscop gemakkellyk gemaakt, of beschryving van de beste en nieuwste Microscop

TAB.  
XV en  
XVI.

hebben laten afteekenen, en ook zulken als door den Heer DE REAUMUR § voorgesteld zyn. Dan ik houde dezelve, op eene wel tienmaal herhaalde proeve, voor geene byzondere deelen, maar veel eer voor loutere gebrooken en afgesplinterde stukken van de door my verbryzelde buize des zuigangels: te meer, om dat ik ze allen geheel anders van gedaanten bevonden heb.

Ik hebbe eens het geluk gehad, om den Zuigangel zo van een te splyten, dat 'er geene stukjes van af splinterden. Dezelve was van het uiterste einde, tot aan het andere, van elkanderen gespleeten; zo dat ik nu, niet alleenlyk zyn binnenste, maar ook daarin, den tederen, doorzichtigen, kastanjebruinen kwetzenden Angel, onverhinderd, en duidelyk konde bespeuren; doch ik kon, by die gelegenheid, even zo min als voorheen, andere daarin liggende deelen gewaar worden. Den kwetzeni-Angel trok ik, zorgvuldig, en zonder dien eenig letzel toe te brengen, geheel uit de opengespleeten schede van den Zuigangel; ik beschouwde denzelven, met alle mooglyke oplettendheid, door een goed vergrootglas; maar ik kon desnietteenstaande, veelligt om deszelfs fynheid, 'er geene de minste opening aan ontdekken. Hy zag 'er zo glad en fyn uit, dat niets, 't welk door menschlyke kunst of bekwaamheid gemaakt wordt, 'er mede te vergelyken zy. Voords werd ik toen ook nog gewaar, dat 'er van achteren, daar hy breeder dan aan de punt is, vier bandswyze deelen aan hem hingen; waar mede hy mischien aan den kop verbonden geweest was.

Ik zou zo wel den Zuig- als den Kwetzenden Angel, van de schede ontbloot, vergroot afgebeeld hebben; indien het my gelukt ware die deelen, welken DE REAUMUR en SWAMMERDAM meenen gezien te hebben, te ontdekken.

#### §. 22.

Na dit bericht, nopens den Angel, heb ik nu nog kortlyk de baardspitsen, die recht over en nevens de angelschede staan, te beschryven. *Lett. III* Zie *Lett. HH*. Deezen, wat langer dan de angelschede, zyn van voren buitenwaards geboogen, en schynen, eerder uit vier dan vyf bruine, met korte haren en schubachtige veders bezette leden te bestaan. Wanneer

coopen, en van derzelver behandeling, als mede een bericht van de verbaazende ontdekkingen, door HENRY BAKER. Te Amsterdam 1744. Tab. XIII. Fig. 9.

§ *Memoires pour servir a l'Histoire des Insectes*. Tom. IV. Pl. 42. Fig. 7—13.



neer men de twee laatste leden byzonderlyk beschouwt, dan ontdekt men <sup>TAB.</sup> aan dezelve verschiede andere en langere hairboschjes, die buitenwaards <sup>XV en</sup> korter zyn, dan naar de binnenste zyde van de angelchede; en welken <sup>XVI.</sup> aan deeze deelen eene fraaie gestalte byzetten. Dat wyders deeze baardspitfen by het Wyfjen veel korter zyn, en naauwlyks tot over de helft van 't eerste lid komen, heb ik boven reeds opgemerkt.

Verders blykt uit deeze beschryving, dat dit kleine Insect, voor geene anderen, zelfs onder de grootste dieren, niet eens voor het prachtige Damhart, met betrekking tot het wonderbaare zamenstel zynes lichaams en de inrichting zynere leden, in voortreffelykheid behoeft te wyken.

## §. 23.

Eindelyk moet ik hier nog aanmerken, dat 'er, buiten deeze soort, ook verschiedene andere haar bykans gelykende Muggen zyn, die mede uit het water hervoordkomen, en zig van deeze onze beschreeven Mug onderscheiden; het zy door haare grootte, en haar veel korteren byna onzichtbaaren Zuigangel; of ook door de Voelhoornen, en geheel gladde vleugelen, waar op men, zelfs door vergrootglazen, geen pluimvedertjens ontdekt. De Heer Hooke heeft, in zyne voortreffelyke *Micrographia*, Tab. XXVIII. te gelyk met het Insect, naar 't welke onze Mugworm getekend is, zulk eene met gladde vleugelen, maar met geen zichtbaaren zuigangel voorziene Mug afgebeeld. Dan, daar dit werk in het Engelsch, (welke taal ik niet versta,) geschreeven is, zo kan ik niet zeggen; of hy derzelver oorsprong, uit de kort te vooren door hem afgebeelden Mugworm, die dezelfde is, welken ik tot hier toe beschreeven heb, afleide, dan niet. In het eerste geval zou 't moeten zyn, dat de Heer Hooke zyne Wormen niet genoeg van elkanderen gescheiden en afgezonderd heeft; vermits zyne voorgestelde Mug haaren oorsprong aan eenen geheel anderen Worm, dan daar afgebeeld is, te danken heeft.

## §. 24.

Onze Mug kan, wel is waar, haar geslacht, even zo min als andere gevleugelde Insecten, by herhaaling niet voordplanten, zy moet op eenmaal de voortdeeling van haar kroost volbrengen; en het jaar van haare geboorte is ook het jaar van haaren dood. Dan om die reden schynt, aan de voortdeeling deezer Insecten, eene te grootere en wel zodanig eene kracht van uitwerking gegeven te zyn, dat ze een Nakomelingschap van 300 haars gelyken kunnen voortbrengen. En dit zo zynde hoe zouden wy Menschen voor 't aantal van Muggen veilig weezen, indien zy be-

TAN.  
XV en  
XVI. kwaam waren meer dan éénmaal, en telkens op' zulk eene talryke wyze, haar geslacht voortteplanten?

Welk eene menigte kost 'er niet nu al gebooren worden? als ééne, eenige Wyffjensmug 300 eieren legt, kan de eene helft van dezelve, zo als men vooronderstellen mag, Mannetjens, en de andere helft Wyffjens worden, waar van ieder bekwaam is om weder 300 eieren te leggen; als men dit aanneemt, dan zou reeds de eerste nakomelingfchap, van een paar Muggen, te faamen 45000 eieren kunnen leggen. Indien men nu van deeze 45000 wederom de helft op Mannetjens en de helft op Wyffjens rekent, (welken laafften dan een getal van 22500 zullen uitmaaken,) en op dien gelegden grond voords vastfelt, dat elk van deezen 300 eieren kan leggen, dan krygt men een getal van 6750000; des 'er meer dan zes millioenen Muggen uit kunnen voortkomen.

Hoe verbaazend groot is niet deeze vermenigvuldiging van zulk een klein fchepzel! En middelerwyl is 't evenwel zeker, niet alleen dat elke Wyffjensmug, (indien het weder gunstig is,) zyn geslacht zo fterk kan voortplanten, maar ook dat deeze Infeften wel driemaal in 't jaar te voorschyn kunnen komen; daar men zulks, by andere Infeften, slechts ééns of tweemaal gewaar wordt. Deeze vermeerdering zal evenwel in dien trap nooit plaats hebben, wanneer men ze binnens huis in glazen laat voortteelen; dewyl alsdan de groeiing der Wormen zeer langzaam toegaat, zo als ik by ondervinding getuigen kan. Hieromtrent heb ik, in het tegenwoordige jaar 1762, by het lang aanhoudende warme Lenteweder, de volgende waarneeming gedaan, waar door ik daarachter gekomen ben. Ik had naamelyk deeze wormen ook in eene houten kuip, waar in men regenwater opvang, reeds in 't begin van de maand van Juny, volwasfen gevonden, en eenigen derzelven spoedig tot verandering gebragt; waartoe ik de kuip leeg maakte, en eenige dagen zonder water ftaan liet. Tegen het einde dier Maand liet ik dezelve echter met ander fchoon water vullen; en werd, in 't begin van July, zeer veele Muggeneieren, daarin gewaar, welk broedzel al vroeg in de maand Augustus tot rypheid kwam. Ik goot daarop de kuip weder leeg, vulde dezelve op nieuw met versch water; en vond 'er, na verloop van eenige dagen, Muggeneieren in; welken omtrent het midden van de maand September altemaal jongen leverden. In de thans loopende Herfstmaand van dit jaar, heb ik nog Muggeneieren gevonden, wier wormen echter nu, omtrent het einde van die maand, naamelyk, terwyl ik dit fchryve, nog niet fchynen te zullen veranderen: weshalven ik geloove, dat zy, zonder voedzel overwinteren, en in de Lente van 't volgende jaar van gedaante verwisfelen zullen. Ik heb dergelyke volwasfene wormen

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 3.




Fig. 5.



Fig. A.



Fig. B.



men, reeds in April en May, in de Boschmoerasfen gevonden; ja zelfs in <sup>TAB.</sup> de maand Maart van dit jaar, heb ik, op een schoonen dag, eene Man-<sup>XV</sup> netjensmug gevangen, die ik voor geen overwinterde, maar wel voor <sup>XVI.</sup> eene versch uitgekomene mogt houden. Men ziet dat deeze Muggen, zo wel van het Manlyke als Vrouwlyke geslacht, by warm weder, byzonder tegen den avond, gezellig te zamen, troeps- en kringswyze door elkan- der vliegen, en menschen en beesten lastig vallen. Wy zyn gevolgelyk eenigen vogelen onzen dank schuldig, dat zy zig van die Muggen tot spyze bedienen, en daardoor te gelyk haar getal verminderen. Anders zou ons het leger van Muggen te magtig worden; en wy, met de Brasilia- nen, genoodzaakt zyn, haar door den rook van gebrande koeimest te ver- jaagen; indien het verhaal van MARCGRAAF, in 't 7<sup>de</sup> Boek van zyn *Hist. rer natur. Brasil.* gegrond zy.

*Beschryving van eene tweeerleie Rupsen gestalte, benevens die van eene Pop, welker Rups reeds voorheen in 't vierde Deel van RÖSEL beschreeven en afgebeeld is; met derzelver verandering in eenen tot de twee- de Clasfe behoorenden Nachtvliinder. Tab. XVII. en XVIII.*

§. 1.

*De hooggeele langhairige Rups, met 9 paar deels geele deels roode Pyramiedswyze Borstels voorzien, benevens haare verandering in een Vlin- der, behoorende tot de tweede Clasfe der Nachtvinders.*

Deeze zonderlinge zeer schoone Borstel-Rups is wel reeds voorheen <sup>TAB.</sup> door den zaligen Heer RÖSEL, in het vierde Deel van zyn Werk over <sup>XVII.</sup> de Insecten *Tab. IV. Fig. 5.* voorgedraagen; maar hy heeft dezelve, (als <sup>Fig. 1-5.</sup> duidelyk blykt,) toen naar eene slecht getroffene tekening afgebeeld, en ook, zonder haare verandering te melden, beschreeven. Vervolgens echter heeft die beroemde Man deeze, voorzeker zeldzaame Rups, naderhand nog eens, door de nooit genoeg gepreezen goedheid, van zo wel zynen als mynen dikwyls geroemden begunstiger, den Heer Hofraad VAN HAGEN, in de maand Augustus bekomen; met een bygevoegd bericht, dat dezelve onder een wilden kastanje-boom (*Castanea Silvestris*) ge- vonden was, en de bladen van deezen boom met smaak at. Van deeze maak-

Taf.  
XVII.  
Fig. 1  
en 2.

maakte hy eene nieuwe, naamlyk even die afbeelding, welke ik de eer heb mynen geachten Leezeren op *Tab. XVII. Fig. 1* en 2. voor te leggen; doch hy heeft de Rups zelve niet tot verandering kunnen brengen. Dan wat laater heeft my een gunstig geval, (of liever het voorjaarweer,) in de hand gewerkt; en 't is my gelukt deeze, anderzins in onze Landen niet dikwyls te voorfchyn komende rups, tweemaal te vinden: de eerfte maal op eenen tammen (*Castanea Vulgaris*) en de tweedemaal op een wilden Kastanjeboom. Dan eene derzelven, welke van de maden reeds met den dood bedreigd werd, had geen lust om zig intefpinnen; de andere daarentegen deed het werkelyk: doch die zelfde foort van vyanden greep, tot myn groot verdriet, ook deeze Pop zo gevoelig aan, dat my daar door alle hoop, om een Vlinder uit dezelve te erlangen, geheel werd benomen. Ik zou dit verlies gewis zeer fterk beklagen; indien ik niet, reeds eenigen tyd te vooren, door den Heer RORNER \* in *Frankfort*, in staat gefteld ware geworden, om myne verzameling met een dergelyken Vlinder te vermeerderen, en hier door dit fchoone Infeet met zyn weefzel, pop en vlinder thans te kunnen afbeelden en befchryven.

### §. 2.

Toen ik deeze rups kreeg, en eer hy nog volwasfen was, fchoon hy reeds ten dertemaal fcheen van huid veranderd te zyn, bedroeg zyne lengte, buiten de hairen, iets meer dan een duim. De kop is glanzig zwart, en met een fchoonen okergeelen driehoek getekend. De grond van het lyf, van 't welke men, wegens de hairen, niets meer, dan alleenlyk een zeer fchoon getekenden ruggenftreep, in het midden, gewaar wordt, is niet zo hoog geel als de hairen zelve. En deeze gemelde ruggeftreep vertoont ons even zo veele zeer fchoone zilverwitte en zwartomboorde vlekken, als de rups afdeelingen aan het lyf heeft. Buiten deeze fchitterende pracht, ziet men, aan beide de zyden, 9 paar hooge, byna puntig toeloopende Pyramiedswyze borstels; welken, grootendeels, uit digt aan elkanderen verbondene hooggeele en flyve hairen bestaan; zy vertoonen zig in deeze orde. Na de 3 eerfte afdeelingen, (van den kop af te beginnen,) ziet men een paar tegen over elkander fttaande borstels, die eene geele kleur hebben; maar in hunne binnenfte vlakke, insgelyks tegen over elkander fttaande, zyn ze van eene bevallige carmynroode kleur. Hier op volgt een geheel geel paar; en vervolgens ontdekt men weder drie paaren, die, even als het eerfte paar, aan den binnenkant

\* Deeze waarde Vriend berichtte my te gelyk, dat deeze rupsen, behalven op de wilde kastanjeboomen, ook op wilde pruimenboomen en fteeneiken gevonden worden.

kant rood zyn: en ten laafien befpeurt men hier nog vier paaren derge-TAB.  
lyken geheel geele Pyramiedsvyze borftels, die evenwel allengskens in XVII.  
hoogte afneemen. Naaf deeze fpitftoeloopende hairbofchjes zyn, zo wel  
de drie voorfte, als de achterfte afdeelingen, en de beide zyvlakten met  
zeer veele fchoone geele korte en lange hairen derwyze bezet, dat de  
rups 'er geheel ruig uitziat; des men zyne pooten, benevens de negen  
luchtgaten, die aan iedere zyde van het lyf zyn, nooit gewaar wordt;  
zynde flechts de kop, als de rups eet, zichtbaar.

## §. 3.

Vermits ik deeze rups, niet in haare jeugdlyke gefalte, indien ik dus  
fpreeken mag, bekomen heb, zo kan ik niet zeggen, in hoe verre, de-  
zelve, by haare zekere driemaalige vervelling verandert, dan of zy be-  
ftendig dezelfde gefalte blyve behouden. In het kruipen overylt ze zig  
niet; zy zit al vry beftendig op haar uitgekoozen plek; en als zy zig ge-  
plaatft heeft, ligt ze zywaards geboogen, of op de wyze als Fig. 2. is Fig. 2;  
afgebeeld, geheel ftijl, tot dat men de bovengemelde hairen of borftels  
aanraakt; en dit voelt zy oogenblikkelyk, hoe zacht en omzichtig het  
ook gefchiede; dan keert zy den kop daar heenen, als wilde zy zig in  
een' ftaat van tegenweer ftellen. Het zamenrollen by de aanraaking, heeft  
ze met anderen zeer hairige rupfen gemeen. Ter oorzaake deezer lichaams-  
fchikkinge, vergelykt ULYSSES ALDROVANDUS \* haar by de ge-  
daante van eene fter; en hy heeft haar zo wel kruipend, als in eene der-  
gelyke vervelling, in een houten plaat laaten afbeelden. De Heer  
FRISCH, † welke deeze rups, die hy ook op een wilden Kaftanjeboom  
gevonden had, heeft haar insgelyks, doch alleen kruipende, voorgefteld;  
en vergelykt dezelve mede by eene gefchilderde fterrenfiguur; dan hy  
geeft tevens zyn ongenoegen te kennen, over de afbeeldingen van eeni-  
ge andere Infeften-befchryvers, die 'er, gelyk hy verzekert, dikwyls  
zeer ongefchikte tekeningen van geleverd hebben. En men kan, fchoon  
de afbeelding deezer Rupfen door den Heer FRISCH beter konde zyn,  
dan zy waarlyk is, niet ontkennen, dat zyne aanmerking gegrond mag  
heeten, en dat de fterswyze figuur van dergelyk eene zamengeboogen  
rups, by veelen overgedreeven en tegen natuurlyk uitgevallen is. De  
En.

\* *Ulyss Aldrovand de Infeftis*. L. II. Tab. 3. Fig. 15. A. 16. pag. 269. edit. Bonon.  
1602. in fol.

† Zie zyne *Befchryving van allerlei Infeften in Duitschland* Iste Deel. Tab. V. pag.  
24 — 27. Berlyn 1730. in 4°.

TAB.  
XVII.

Engelfchen Infeftenfchilder ELIAZAR ALBIN \* heeft deeze rups, zo wel uitgetrekt als zaamengerold, voorgesteld; en even zo ook WILKE † in zyne verzameling, welke, schoon niet meer dan 120 Plaatën behelzende nogthans meer dan 9 L. str. kost; terwyl echter die Plaatën meendeels uit anderen overgenomen zyn; gelyk hy mede in dit geval de eerstgemelde aftekeningen flechts gecopieerd fchynt te hebben; hoewel dezelve, gelyk op meer plaatfen, in eene andere orde in plaat gebragt zyn. ALBIN zegt, dat hy deeze rups, by den aanvang van de maand July gevonden, en met *Sycamoren* of wilde vygenbladen gevoed heeft. WILKE fpreekt ook van de *Sycamoren*, en zegt, dat hy de rups in Augustus gevonden heeft. Men vindt haar desgelyks in het werk van DE REAUMUR, zo wel in eene uitgetrekte als zamengerolde houding, en tot op zyne verandering in eenen vlinder afgebeeld; met het nariicht, dat dezelve onder den naam van *Oostindifche Kaffanje-Rups* (che-nille de moronier d'Inde) bekend is, § en dat ze zig, met het afloopen van July, ter veranderinge fchikt. Die zelfde beroemde Natuuronderzoeker heeft mede opgemerkt, dat de hairen van deeze rups, uit geene wratjes voortkomen, gelyk men dit wel by andere hairige rupfen befpeurt. Of nu echter de thans hier voorgedraagen afbeelding van deeze rups nader by de Natuur komt, dan die van den Heer DE REAUMUR en andere bovengenoemde Infeften-befchryvers, (voor wie ik anders alle hoogachting heb,) laat ik den onpartydigen Leezer zelven beoordeelen. Dat deeze rupfen, volgens het bericht van GOEDART, by gebrek van voedsel elkander zelven zouden verflinden, kan ik met geene zekerheid bevestigen; aangezien ik deeze proef, met de twee die ik bezat, niet genomen heb, en ook geen lust gehad heb om dezelve te neemen.

## §. 4.

Met betrekking tot de verandering van deeze rups, heb ik het zelfde  
waar-

\* Zie zyne *Historia Naturalis Insectorum Angliæ*. Tab. LXXXIII. pag. 83. welke, te Londen 1731 in gr. 4<sup>o</sup>. uitgekomen, 100 gekleurde koperen plaatën heeft, en met aanmerkingen van den Heere WILL. DERHAM voorzien is.

† Zie Plaat LXVII. Lib. 1. ch. 1. Numb. VI. cl. 3. S. c. 6. In zyn Werk, 't welk ten tytel voert: *The English Mots, and Butterflies, to gether with The Plants flowers, and Fruits whereon they feed, and are usually found. All drawn and Coloured in such a manner as to represent their several beautiful Appearances, being copied exactly the subjects themselves and painted, on the best Atlas Paper &c.* Londen gr. 4<sup>o</sup>.

§ Zie zyne *Memoires pour servir à l'Histoire des Insectes*. Tom. 1. p. 509 &c. XII. Mem. Pl. 34. Fig. 7. 8. 9. &c.

waargenoomen, het geen DE REAUMUR reeds daar van geschreeven heeft. Zy gebruikt tegen dien tyd geen spyze meer; maakt zig van binnen zuiver, en zoekt eene bekwaame plaats uit. Zy vindt dezelve, op het ruime veld, of onder eene haag, of tegen een' muur. Myne rups moest, in plaats van zulk eene gelegenheid, hare gevangenis daar toe gebruiken; en het dekzel van de doos, waar in zy bewaard was, scheen haar bekwaam genoeg, om 'er de draaden tegen aan te spinnen; welken zy, even als de Zyworm en andere rupfen, uit de wrat, die gewoonlyk onder den kop zit, trok; die zy daarop vastmaakte, en waaruit zy voorts eene tot de verandering bekwaame, en voor slegt weder verzekerde woning voorbereide. Gedurende deeze bewerking buigt de rups het ligchaam bestendig heen en weder; heft den kop dikwyls in de hoogte; trekt zig alle de haren uit, welken zig als dan van zelve gemaklyk loslaaten; en windt zig eindelyk, in een met die haren vermengd, van buiten helder bleekroodachtig, en van binne wit, tamelyk dicht, doch met openingen voorzien Weefzel in, gelyk *Fig. 3. Tab. XVII.* aanwyst. *Fig. 3.*

In die woning verandert zig deeze nu byna geheel naakte rups, in een enigzins langachtige bruinroode, en by het aanraaken ligt beweegzaame pop; welke op deeze zelfde *Tab.* in de 4<sup>de</sup> *Figuur*, buiten het weefzel, *Fig. 4.* is afgebeeld. De kop, rug, en de vleugels, van den daar ingevormd wordende vlinder, zyn in de voorste deelen der poppe genoegzaam te zien: het achterlyf is afgedeeld in volkomene kenbaare verdeelingen, welken het vereischte getal van spiegelpunten of luchtgaten hebben; schoon dezelve hier, wegens de enigzins donkere verwe der pop, niet duidelyk kunnen aangetoond worden. Midden op de laatste afdeeling vertoonen zig, in plaatse van den steelswyzen staart, waar mede anders de poppen van de tweede clasfe bezet, en daar door van de eersten onderscheiden zyn, eenige kleine tedere omgeboogen haakjens, die de pop, by het inspinnen, zekerlyk daar toe dienen, om 'er zig mede aan het weefzel vast te houden. Eene byzondere omstandigheid, waanloer tevens het uitkomen van den vlinder gemaklyker gemaakt wordt; want, daar de pop derwyze gevormd zy, zo vindt de vlinder, wanneer hy uit de poppenfchaal wil uitbreeken, aan dezelve noodzaakelyk eenigen tegenstand; en even om dezelfde reden kan hy te ligter doorbreeken.

### §. 5.

Het uitkomen van den vlinder zelve te zien, hebben my de vyandige maden, waar van ik boven in de eerste § sprak, belet; en hier door ben ik gevolglyk ook buiten staat gesteld, om myne eigene ondervinding des-aangaanden mede te deelen. Intusschen hebben FRISCH, REAUMUR,



TAB.  
XVII.

ALBIN en WILKE reeds opgemerkt, dat de vlinder zyn winterverblyf niet eerder dan in May of Juny verlaat.

## §. 6.

Fig. 5.

Het is te verwonderen, dat de vlinder, die aan deeze rups zynen oorsprong te danken heeft, aan dezelve in schoonheid niet gelyk is; zo als de 5<sup>de</sup> Fig. waarin hy met uitgebreide Vleugelen voorgeteld wordt, uitwyst. Ik zal my om die reden ook met geene breede beschryving van denzelven ophouden; maar alleenlyk melden, dat de grondkleur van de voorste vleugelen, over het algemeen, wit-graauw is, en dat denzelven met verscheidene, deels zwartachtige en deels bruinachtige vlekken, trekken en streepen veelal dwars overdekt zyn, tuschen welken men hier en daar eene helderer witachtige kleur gewaar wordt.

Den buitensten vleugelrand vindt men eenigzins uitgeschulpt; en de diepte van elken schulp is met eene zwarte vlek opgesierd. Kort aan deezzen voorsten rand hebben de vleugels een tedere zwartachtige figuur byna als eene O of twee tegen elkander gekeerde halve kringen (); die ook door den Heer FRISCH gade geslagen zyn.

De beide onder- of achter-vleugelen zyn bleeker dan de voorste of bovenvleugelen; en ze hebben, behalven de aderen die 'er door heenen loopen, geene vlekken, maar glinsteren, zo het licht 'er op valt, als witte zyde. Verders zyn ze met een witachtig boordzel omzoomd; en wel inzonderheid aan den rand en by het gewricht met tedere hairen bewaasfen. De insgelyks hairige kop en rug, zo wel als de dunne voelhoorns zyn wit; de oogen zyn donker, en het, met hairen bezette, achterlyf, is geel-graauw.

## §. 7.

Of myne gegeven afbeelding waarlyk die van een wyfjen zy, (gelyk men uit het eenigzins dikke achterlyf en de dunne voelhoornen zou kunnen besluiten,) durf ik niet bepalen; aangezien ik van dergelyken vlinder nog geen paar levendig bekomen heb, en vermits de afbeeldingen van de Heeren FRISCH, DE REAUMUR, ALBIN en WILKE geene andere maar ook dergelyke voelhoorns vertoonen, zo geloof ik dat deeze foort van vlinders van beiderleie geslacht daarmede voorzien zal zyn.

By aldien het waar is, dat deeze vlinder, zittende, zyne vleugels evenwyd van elkanderen en vlak, of even over het lyf geslooten, draagt, (zo als de Heer DE REAUMUR voorgeeft, en ik zelf ook schier geloof,) dan

dan dwaalt WILKE, door hem, met dekswyze of schuins op het lyt liggende vleugelen, aftebeelden. TAB. XVII.

Voor het overige heeft deeze vlinder een langen zuigfnavel, welken hy, buiten de noodzaake van gebruik, flakswyze zamenrolt; en DE REAUMUR tekent aan, dat de vlinder, met zodanig een' zuiger, aan een weinig hem voorgehouden fuiker, gezoogen had.

Hoe veele eieren deeze vlinder legt, hoe groot, en van welke kleur ze zyn, hoe veel tyds zy tot aan het uitkomen der rupsen noodig hebben, kan ik op geene eigene ondervinding of met zekerheid bepaalen; echter geloof ik, (vermits hy zo laat uit zyne pop voortkomt,) dat hy alleenlyk éénmaal in 't jaar verschynt.

### §. 8.

Thans zal ik overgaan, om eene andere pop, en eenen nachtvlinder, mede tot de tweede clasfe der nachtvlinders behoorende, te beschouwen, waar van de rups, door mynen zaligen Schoonvader, in het derde Deel van zyn werk over de Insecten, op *Tab. LXVIII. Fig. 6.* afgebeeld, en *Bladz. 344*, onder den naam van de onaanzienelyke bruine Aardrups, is beschreeven geworden.

Ik heb even als de Heer RÖSEL, deeze rups, in 't jaar 1761, in de maand Juny, niet geheel volwasfen, in de aarde gevonden; en opgemerkt, dat zy zig daar onder, waarlyk, van geene andere spyze bedient, dan van de tedere wortelen van gras en andere kruiden, welken ik haar ook, benevens versche aarde, langer dan agt dagen moest voorleggen; waar na zy 'er niets meerder van aannam, en my daar door haare aanstaande verandering te kennen gaf. Dit ontdekkende bezorgde ik haar voor de laatste keer versche aarde; en vond myn rups eindelyk, den 8 July, tot myn groot genoegen, daar onder, in eene oranjegeele pop veranderd; hebbende zig een klein hol toebereid.

*Fig. A. op Tab. XVII.* vertoont deeze pop, in haare natuurlyke grootte, gedaante en kleur. Zy is indedaad eene schoone pop te noemen; niet zo zeer wegens haare kleur, die echter niet gevallig is, maar, gelyk ik gezegd heb, grootendeels in het donkeroranjegeele valt, als wel voornaamlyk wegens haare netgevormde gestalte, en buitengewoone sterken, doch fynen glans; zo dat zy met het beste vernis schynt bedekt te zyn; en niet minder om de zeer duidelyk zichtbaare ledemaaten, van den daarinliggenden vlinder. Zy is, boven anderen kennelyk, door vier zwarte in haar voorste deel staande vlekken; waar van de twee grootften niet an-

TAB.  
XVII.

ders zyn, dan de oogen van den vlinder, welken door den zeer doorzichtigen poppenhuid heen blinken; terwyl de twee kleinere vlekken de plaats aanwyzen, daar het gewricht van den bovenvleugel des vlinders ligt. De afdeelingen van deeze pop zyn overal zeer duidelyk van elkanderen onderscheiden en met donkerrood bruine spiegelpunten of luchtgaten bezet. Op het midden van de laatste afdeeling, is wyders een kort klein steelpunt, dat uit twee zachte spitsjens bestaat; mogelyk zyn ze der poppe dienstig, om zig in haare verblyfplaats omtewenden. Voor het overige is deeze pop zo levendig van gevoel, dat zy de minste aanraaking gewaar wordt, en zulks door eene sterke beweging van haar achterdeel, waarmede zy zig om en om keert, terstond te kennen geeft. Het levendige vertoon, dat deeze pop maakte, beantwoordde intuschen niet aan myne verwachting; vermits ik daarnit vermoedde, dat de aanstaande vlinder een van de vroegsten zou zyn. In stede daar van verliep niet alleen de Herfst en de Winter, maar ook de Lente en een goed deel van den Zomer, des dusver verloopen jaars 1762, tot den 28<sup>ten</sup> July, wanneer myne ongeduldige verwachting eerst, door de beschouwing van den vlinder, te vrede gesteld werd; na dat de rups, reeds den 8<sup>ten</sup> July des voorigen jaars in eene pop veranderd was.

Men moet zig inderdaad verwonderen, dat een schepsel, 't welk van zyne geboorten af aan, als eene rups, zonder voedsel niet lang in 't leven zou blyven; naderhand, als eene pop, langer dan een jaar, buiten eenig gevaar des levens of vrees voor uitteering, zonder voedsel doorbrengen kan. Dat echter deeze wyze schikking van den Schepper, en die onthouding van voedsel, voor het behoud van den vlinder hoogst noodzaakelyk is, zal ik den genegenen Leezer, zo ik hoope, in 't vervolg nog bewyzen.

### §. 9.

*Fig. B.* De vlinder zelve, *Fig. B.* vliegend afgebeeld, is wel niet zo schoon, als de Heer RÖSEL uit zyne onaanzienlyke rups schynt verwacht te hebben, (want de ondervinding had hem reeds geleerd, dat dikwyls de schoonste rupfen de slechtste vlinders leveren; gelyk men aan de boven beschreeven kastanjerups ziet; en dat de onaanzienlykste rupfen dikwyls integendeel de schoonste vlinders voortbrengen;) dan echter is hy ook niet zo afzigtelyk, dat hy geen plaats in de geschiedenis der Insecten zou verdienen. Zyne beide, offchoon roodbruine, en zeer weinig uitgeschulpte, voorvleugels vertoonen tog een zeer bevalligen zydachtigen glans; dezelve zyn tegen den buitenrand iets donkerer dan in 't midden, en met een dubbeld smal boordzel omzoomd. Niet ver van den voorsten rand hebben zy, tusschen de beide hoofdaderen, genoegzaam in 't midden,

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



den, eene zeer donkerbruinen vlek, versierd met nog twee anderen, doch <sup>TAB.</sup> helderroodbruine vlekken, naamlyk eene kleine byna ovaalswyze, en eene <sup>XVII.</sup> grootere, op de eene zyde wit, en de andere zwart ingevat, en omtrent van eene fikkelvormige gedaante.

De achterste, met tedere aderen doorvlochten, vleugelen zyn mede glanzig, en hebben eene geelachtige heldergrauwe kleur, die echter tegen den buitensten, niet uitgeschulpten, maar geboorden rand, in eene donkere verwe wegfmet. De kop, de baartspitsen en de dunne voelhoorns, zyn benevens den met hairen begroeiden rug, donkerroodachtig bruin; maar de beide oogen zyn van eene donker zwart bruine verwe. De zuigsnavel is geelbruin; doch het aan den rug met hairen bezette achterlyf, vertoont zig bruinachtig graauw.

In het zitten houdt deeze vlinder, gelyk de meeste der geenen welken tot die clasfe behooren, zyne vleugels dekswyze om het lyf geslooten. Voor 't overige, denk ik, geene andere dan een vrouwlyken vlinder beschreeven te hebben; het welk ik eenigzins uit zyne tedere dunne voelhoornen, (die echter het Mannetjen ook hebben kan,) en uit zyn kort stomp achterlyf, afneeme.

*Nu volgt de schoone geelachtig graauwe rups, met een smal-  
len helder-geelen streep op den rug en op de zyde, en ver-  
sierd met verscheidene witachtige streepjens en stipjens;  
benevens haare verandering in eene Kapelle, behooren-  
de tot de tweede Clasfe der Nachtvinders.*

#### §. 10.

Deeze ongemeen aangenaam groen gekleurde rups werd my, eerst in <sup>TAB.</sup> de maand July des afgelopen jaars, uit *Frankfort* toegezonden, door <sup>XVIII.</sup> den Heer RORNERS; vervolgens vond ik haar, in dezelfde maand, tot mynent, op een olmenboom, (*Ulmo*;) waarop gemelde Heer haar ook gevonden had. De myne was bykans geheel volwasfen; alzo zy haare derde vervelling reeds beleefd had.

In de eerste *Fig.* onzer *XVIII. Tab.* zien wy de rups in haare natuur-*Fig. 1.* lyke gedaante, en gansch uitgestrekte langte; beslaande omtrent  $1\frac{1}{2}$  duim. Eene recht bevallige helder geel-groene kleur versiert haar over het geheel; alleenlyk is de kop, die tamelyk groot is, vry sterker blaauwachtig groen.

TAR.  
XVIII.

groen. Deeze kop heeft eene eenigzins roode, gewelfde, doch een weinig verdeelde gedaante; en daarin vertoont zig een witachtig groen gebit; 't welk zig, zo als by alle rupfen plaats heeft, in de breedte opent: boven hetzelfde staan, aan beide de zyden van den kop, 12 kleine oogen. Haar lyf, dat met zeer tedere en korte hairen bewasfen is, bestaat, zo als by alle rupfen, welke 8 paar pooten hebben, behalven den kop, uit 12 leden; waarvan het elfde een weinig boven het laatste verheven is, Over alle deeze leden loopt, op het midden van den rug, een zeer finale witachtig-geele streep.

Een andere, even zo smal, maar meer helder geele streep, ligt onder aan het lyf, op iedere zyde van de rups, die van vooren, by het eerste lid, reeds aanvangt, en verder tot op 'het uiterste einde van het staartklepjen voortloopt. Op de elfde geleding vertoont zig, over dwars, nog een andere kleine streep, welke zig met den bovengemelden vereenigt. Tusschen en onder die streepen, zyn de geledingen deezer rups bezet, met verscheidene witachtig-geelen, nu dwars dan recht staande, doorlopende streepen en stippen, welken in de langte, als 't ware heen en weder geflingerd, genoegzaam over het geheele ligchaam loopen, doch alle deeze zyn, wegens de veelvuldigheid en ongemeene kleinte, in 't kleuren der afbeeldingen niet wel aanteduiden. Aan iedere zyde van het lyf heeft de rups negen luchtgaten: het eerste daarvan ziet men op de eerste geleding; en de agt overigen liggen, van de vierde tot op de laatste geleding; doch deezen vallen niet in 't oog, ten zy men 'er met opmerkzaamheid naar zoekt. De pooten staan, gelyk by andere rupfen, aan de gewoone geledingen; naamlyk de drie paar spitse voorpooten op de drie eerste gewrichten, onmiddelyk na den kop volgende; daarop hebben de vier paar stompe buikpooten, hunnen stand onder de 6<sup>de</sup> 7<sup>de</sup> 8<sup>te</sup> en 9<sup>de</sup> geleding; en eindelyk staat het laatste paar stompe pooten, die de voortzetting des lyfs in 't loopen bevorderen, aan de laatste geleding, vlak onder het staartklepjen. Allen hebben zy dezelfde kleur als de rups, naamlyk eene geelachtig groene.

## §. II.

*Fig. 2.* Zy kruipt zeer snel, maar niet veelvuldig of geduurig. Als zy zig zat gegeten heeft, neemt zy eenen stand aan, als onder *Fig. 2.* vertoont wordt; in welken zy alle haare geledingen zo dicht aan elkander dringt, dat haar lyf daardoor, niet alleen korter, maar ook dikker schynt te wezen: in deezen loggen stand houdt zy zig zo lang, als zy niet, door honger, of enig ander toeval genoodzaakt wordt, denzelven te verlaaten. Zy is geen liefhebber van het schynzel der zonne, en houdt zig daarom meesttyds onder de schaduw der elmenboomen verschoolen; alwaar

zy

zy dan ook niet gemaklyk gevonden wordt. De Nederlandsche Insecten-TA-  
maaler JOH: GÖDART spreekt mede van eene rups, in verwe en teke-<sup>XVII.</sup>  
ning aan de onze genoegzaam gelyk, welke de hitte der zonne ook niet  
kon verdraagen; zig daarom meestentyds op de aarde onder de schaduw der  
bladen en kruiden verbergen, insgelyks groen van kleur weezen zoude. \*  
Dan, daar dezelve veel laater dan de myne, naanlyk eerst in September,  
veranderd is, en uit het poppen, in plaats van eene kapel, eene vlieg is  
voordgekomen; en, daar hy zyne rups niet met olmen-, maar met vioole-  
blaadjens gevoed heeft, is het onzeker, of deeze en de myne wel dezelf-  
de rupsen zyn: waren zy dezelfden, zo zoude de afbeelding, welke hy,  
als Insecten-maaler, daarvan geeft, veel beter en kenbaarder moeten wee-  
zen. Of myne rups intuschen, van haare geboorte af aan, met die aange-  
naame groene kleur pronkt, kan ik niet met zekerheid bepalen; om dat ik  
haar, vóór haare laatste vervelling, nog niet gehad heb.

## §. 12.

Vermits ik wyders de tegenwoordig beschouwde rupsen kreeg, toen zy  
reeds byna geheel volwasen waren, gebruikten zy ook slechts nog korten tyd  
het voedsel, 't welk ik haar voorlegde. Spoedig ontdeeden zy zig van haar  
inwendig vuil; schikten zig tot de verandering, en waren in haar doosjen zeer  
omzichtig; ze kroopen by aanhoudendheid op en neder; hecchten, nu in het  
eene, dan in het andere hoekjen van het doosjen, eenige draaden vast, waar-  
mede zy echter niet besteneig aanhielden. Ik meende hieruit te mogen beslui-  
ten, dat het ledige doosjen haar niet voldoende was; maar dat haare ver-  
andering beter zoude kunnen geschieden, onder eenige bladen; die zij dan  
naar welgevallen daartoe konden zamenvoegen; derhalven voorzag ik haar  
nogmaals van eenige olmen-bladen, en ik had het genoeg van te zien, dat  
de eene zig terstond één daarvan ten nutte maakte. Door middel van eenige  
draaden uit den spinnewrat, welke onder haar snuit is, trok zy het blad van  
alle kanten zamen; en wikkelde zig, binnen korten tyd, in het zelve, in  
een witachtig, eenigzins doorschynend spinfel; op die wyze als ik dit onder  
*Fig. 3.* in een klein olmenblad afgebeeld heb. Even zo gedroeg zig ook *Fig. 3.*  
de andere rups, met dit onderscheid, dat zy haar weefzel en aan het blad,  
en te gelyk aan de wanden van het doosjen vasthechte.

Des anderen daags bekreop my de nieuwsgierigheid om te zien, hoever  
zy binnen 28 uren veranderd was. Ik opende derhalven haar weefzel, met  
eene

\* JOH: GODARTIUS, *de insectis in method. redact. Londinens. cum appendic. ad historiam  
animalium Angliæ ejusdem*, M. LESTER edit. 2de una cum scarabacorn Anglicanorum  
quibuscumque tabulis. 8°. Lond. 1685. in 8°. p. 124. Num. XLVIII. Tab. 48.

TAB.  
XVIII.

eene voorzichtige snede; en zag haar, wel nog onveranderd, maar tamelyk dik opgezwollen, en sterk in elkander gekrompen; tevens bespeurde ik dat zy zig nog bewoog, en terstond aan 't werk ging, om de snede, in haar weefzel gemaakt, zo goed mogelyk weder te fluiten. Dit bewoog my, ten volgenden dage, nogmaals haar weefzel te openen; doch ook toen was zy nog niet veranderd, en ik bemerkte dat de indringende lucht, alhoewel de door my gemaakte opening maar zeer klein ware, haar niet zeer beviel. Zy begaf zig, even als de eerste keer, van nieuws op de been, en liet niet af van werkzaam te zyn, voor zy ook deeze opening weder gefloten had. Op den vierden dag veroorzaakte ik haar ten derden maale die moeite; en zy was even bemoedigd om de opening ook nogmaals te fluiten; echter wreekte zy zig over myne nieuwsgierigheid, daardoor, dat zy vier dagen laater dan de andere, die ik ongemoeid gelaten heb, naamlyk eerst op den twaalfden dag van haare inwikkeling in het blad, in een popjen veranderde.

§. 13.

Fig. 4.  
Lett. a.

Dit popjen ziet 'er eerst geheel groen uit; doch die kleur veranderd van tyd tot tyd, en wordt eindelyk geheel donkerachtig rood-bruin. Haare schaal is zo sterk glanzig, dat dezelve fraai gepolyst, of met de beste glansvernys overtogen schynt. Fig. 4. vertoont dat popjen in deszelfs natuurlieke grootte, gedaante en kleur; naast hetzelfde ligt by *Lett. a* de afgestroopte rupfenhuid; die 'er echter thans niet meer groen, maar helder geelachtig graauw uitziet. Ik vlei my deeze afbeeldingen zo natuurlijk voorgesteld te hebben, dat ik daarby deswegens verders niets behoefte aantekenen, meldende nog alleenlyk, dat het popjen, aangeraakt wordende, zyne gevoeligheid terstond betoont, door eene beweeging, die echter zeer flaauw is. De luchtgaten zyn op deszelfs geledingen, aan de gewoone plaatsen; en het laatste lid heeft, op eene kleine verhevenheid, eene kleine korte steelswyze spits, welke, door een vergrootglas beschouwd, uit twee, eenigzins groote gekromde haakjens bestaat; naast welken nog andere kleine haakjens gezien worden.

§. 14.

Na verloop van 6 à 7 weeken, (gerekend van het inspinnen der rupfen af,) kwamen de kapellen, in dit spinsel en de popjens tot volkomenheid gebragt zynde, ten voorschyn: 't welk gemeenlyk na middernacht geschiedt. Volgens de gewoonte der meeste nachtvogelen, lieten zy ook, zo dra haare vleugelen de vereischte grootte, en vastigheid of stevigheid verkreegen hadden, eenige droppen van een geelachtig bruin vocht vallen, 't welk onder den naam van reinigings-sap bekend is. De kapel poogde terstond, na haar te voorschyn komen, in de hoogte van het doosjen te geraaken, alwaar zy ook den




den gantschen volgende dag met zamengeflotene vleugelen bleef zitten: tegen den avond werd zy echter taamlyk onrustig, en toonde weldra dat ze bekwaam was om te vliegen. Met betrekking tot het schoone, hierin hebben deeze kapellen aan myne verwachting op verre na niet beantwoord; vermits ik gedacht had uit zulke schoone rupfen zeer schoone kapellen te zullen bekomen; dan, de ondervinding deed my, gelyk meermaals, op nieuw zien, met hoe weinig zekerheid 'er uit de schoonheid, of het ongevallig aanzien der rupfen iet te besluiten zy, tot de meer of mindere schoonheid der kapellen.

## §. 15.

Onder *Fig. 5.* zien wy deeze kapel, zo als zy zig vliegende en op de bovenzyden van haare vier vleugelen vertoont. De grondverwe der beide voorvleugelen, zo wel als die van den met hair bewasfen kop en rug, valt in het roodachtig bruine. Gemelde vleugelen, zyn met zeer onregelmaatige, fommige heldere, fommige donkere, vlekken bezet; weshalven ik 'er geene breede beschryving van geeven, maar alleenlyk daar omtrent aantekenen kan, dat zy een weinig glanzig, en aan haare buitenste randen eenigzins uitgekapt zyn; dan, de achtervleugelen hebben geene vlekken; maar zyn in tegendeel van eene heldere, eenigzins naar 't geel hellende, roodachtig bruine kleur; ze zyn daar benevens aan de randen met een nog wat helderder boordzel versierd. Het achterlyf, dat van buiten, op iedere zyde der geledingen, met korte en boschachtige hairen bezet is, vertoont zig bruinachtig; en is van zulke eene gestalte, dat ik de kapel, (offchoon zy geene baardwyze voelhoornen draage,) voor een mannetjen gehouden heb: waarom ik dan ook, aangezien alle de anderen, by my uitgekomen kapellen, dergelyke voelhoornen en achterlyf gehad hebben, vastlyk geloof, dat ik het wyfjen, (welke onfeilbaar ook met zulke voelhoornen bedeed zal weezen,) nog even zo weinig ken, als deszelfs eieren.

Zittende heeft deeze kapel haare vleugelen niet geheel dakswyze, maar meer, in eene horizontale ligging, digt aan 't lyf gesloten, als onder *Fig. 6.* te zien is. Tegelyk kan men aldaar bespeuren, dat de schenkels van de pooten niet alleenlyk digt met hair begroeid, maar ook met stekelige spitfen bezet zyn, en voor aan de eerste leden twee kromme klaauwen voeren. In deeze 6<sup>de</sup> *Fig.* ziet men ook zeer duidelyk den vooruitgetrokken helderbruinachtigen zuigsnavel; benevens één van de zwart-bruine oogen deezer kapellen.



*Eene Dagkapel van de tweede Clasfe, benevens eene Rups  
en Popjen, wier Dagkapel van de eerste Clasfe, in het  
4<sup>de</sup> Deel den Heer RÖSEL, reeds afgebeeld is: als  
mede eene zeldzaame Nachtkapel van de vier-  
de Clasfe, met 6 vleugelen, en eene Rups  
met derzelver verandering in eene Nacht-  
kapel van de tweede Clasfe.*

§. 1.

Taf.  
XIX.  
XX.

Op de XIX Tab. Fig. 1 en 2. zien wy eene zeldzaame dagkapel tot de 2<sup>de</sup> Clasfe behoorende. Haare schoonheid is, wel is waar, niet zeer uitmuntend; want ten dien opzichte heeft zy veelen boven zig; doch haare byna algemeene geheel bruine kleur maakt haar, (hoewel alleenlyk met betrekking tot haare Clasfe,) merkwaardig; ja in die Clasfe is zy mischien wel de eenige die geheel bruin is. Dit echter zou niet als iet merkwaardigs voorkomen, indien zy tot eene of andere foort van de eerste Clasfe der Dagvogelen behoorde, aangezien daaronder dergelyke kapellen niet zelden, ja zelfs in menigte, voorkomen. Myne afbeelding van dezelve is intusfchen niet naar 't leven; ik heb het der gunste van zyne Hoog-vorstlyke Doorluchtigheid, den Heere Erfprins van *Saxen-Coburg*, te danken, dat ik myne Bydraagen daarmede kan versieren. 't Heeft hoogst denzelven gunstig behaagd, my, door den Heer SCHELER, te *Coburg*, eene zeer naauwkeurige afbeelding dier kapellen te laten toekomen; met de verzekering dat dezelve volmaakt naar het leven getroffen was. Eene gunst, die ik zekerlyk wel naar waarde kan schatten; maar ik vind my te onvermogen om ze naar vereisch te roemen. Die afbeelding heb ik allerzorgvuldigst getracht, voor myne Bydraagen, afgetekenen. Mogelyk is de rups deezer kapellen, (die zo ik gis groen zal moeten weezen,) by den eenen of anderen myner Leezers of reeds bekend; of mogelyk krygt hy dezelve, in 't vervolg van tyd, nog wel onder de oogen; in beide die gevallen verzoek ik den zodanigen, by deezen, ernstig, my dezelve, met haar voedzel, goedgunstiglyk ter aftekening te willen laten toekomen.


Hier mede tot de beschryving deezer kapellen overgaande, noem ik haar :

*De*

*Fig. 1.*



*Fig. 2.*



*Fig. A.*



*Fig. B.*



*Fig. a.*



*Fig. b.*



*De zeldsaame aardbruine, met vier zwarte oogvlekken versierde Kapel, tot de 2<sup>de</sup> Classe der Dagvogelen behoorende. TAB. XIX. Fig. 1 en 2.*

## §. 2.

Onder *Fig. 1.* zien wy haar met uitgebreide vleugelen, en van de bovenste zyde. Haare grondkleur is, zo wel op de gemelde vleugelen, als op den kop, aan de oogen, de haardunne en van boven met pluimtijns versierde voelhoornen, op den rug en het achterlyf, aardbruin. De zeer weinig, ja byna geheel niet, uitgeschulpte randen der vleugelen zyn hiervan alleen uitgesloten; want deezzen vallen een weinig donkerder. In ieder voorvleugel, niet ver van deszelfs buiten rand, zyn twee merkelyk groote ronde vlekken; en binnen in ieder van dezelve bespeurt men nog een kleiner blaauwachtig stofvlekjen. TAB.  
XIX.  
*Fig. 1.*

## §. 3.

In de 2<sup>de</sup> *Fig.* vertoon ik haar in eenen zittenden stand; zodanig dat de onderzyden van haare vleugelen gezien kunnen worden; deeze zyn almede bruin; doch vallen meer in 't heldere en geele. *Fig. 2.*

De voorvleugel heeft, dicht rondsom den buitensten rand, een zeer smallen donkerbruinen streep. In deezen stand ziet men ook de twee ronde zwarte oogvlekken, die zig op de bovenste zyden vertoonen; doch hier zyn zy met een helder bruinachtigen kring omgeeven; de kleiner blaauwe ingeslotene vlekken, bovengemeld, zyn hier mede duidelyk te zien.

De achtervleugel is, van zyne gewricht af, tot over het midden, van eene zelfde geel bruine grondkleur; welke echter afgebroken wordt, door eene breede vlek, die overdwars en hoogswyze over den vleugel ligt; helder bruin, en met veele kleine streepjens en stippen als besprengd is. Achter deeze vlek begint de gemelde grondkleur wel weder; maar ze is eenigzins donkerder, en eindigt, als met uitkapfels, aan eene tweede helderer breedten vlek, van gedaante als de eerst gemelde; doch ze is niet zo helder, loopt rondsom den buitensten rand van den vleugel, en wordt omboord door een zeer smallen donker bruinen streep. Verder heeft deeze kapel aan haare borst, die eenigzins hairig is, 6 genoegzaam bruine pooten, als kenteeken, dat zy tot de tweede Classe behoort. Dit doet my derhalven besluiten, dat haare rups geene doornspitsen heeft; en dat het popjen, waaruit zy voortkomt,

TAB. XIX. komt, niet loodrecht zal hangen, maar veel meer overdwars aangespannen zyn; en dat het geene maskerswyze gedaante hebben zal.

## §. 4.

Maar zoude ik my wel durven verflouten, een dergelyk besluit, van de kapel tot haare rups en pop, te maaken; daar ik voorneemens ben mynen geëerden Leezers eene rups zonder doornspits, ja, wat meer is, zonder hartswyzen gedeelden kop, en die echter in de daad tot de eerste clasfe der dagvlinders behoort, ter beschouwinge voorteleggen; daar de gemelde kentekenen, tot heden toe, evenwel allerzekerst de eerste clasfe aangewezen hebben? Zal ik my niet blootstellen aan openbaare tegenspraak, als ik beweer, dat deeze rups, schoon zy noch eenen hartswyze, maar zeer ronden kop, noch eene zichtbaare doornspits hebbe, en veel eer tot de tweede dan tot de eerste Clasfe schynte te behooren, echter tot de eerstgemelde Clasfe, waarvan zy 't volstrekt tegengestelde schynt te wezen, moet gebragt worden? Maar ik beroep my, in deezen gevalle, op het geen ik hiervoor bladz. 11. gezegd heb; naamlyk, dat ik de kentekenen van rupfen en poppen, door den Heer RÖSEL opgegeeven, niet voor zo volstrekt bepaalend houde, dat omtrent deeze of geene Clasfe volstrekt geene uitzondering daarin zoude plaats hebben: vooral wanneer de insecten nog eene verandering ondergaan moeten, eer zy tot hunnen laatsten stand en gedaante gekomen zyn. Met dat alles ben ik evenwel verzekerd, dat het getal van zulke insecten, by welken somtyds eenige der bedoelde kentekenen misfen, (en die gemeenlyk nog niet geheel volwasfen zyn,) zo gering is, in vergelyking van die geene, welken aan alle kentekenen beantwoorden, indien zy slechts alle hunne veranderingen onverhindert kunnen ondergaan, dat deezen der eerstgemelden over 't geheel zeer verre zullen overtreffen. Intusfchen laat de Natuur, die anders zekerlyk in alles orde is, zig niet zo naauw tusfchen methodifche paalen insluiten, dat zy zig, om zo te fpreken, de vryheid niet zoude voorbehouden, van omtrent een of ander voorwerp somtyds eenen buitenftap te doen. Ook zien wy dikwyls dat haare voordbrenzels, in derzelver jeugd, op verre na niet gelyken aan anderen van hunne foort, ja zelfs eenigzins gebreklyk fchynen te wezen; doch dat zy, na hunnen volkomenen wasdom verkreegen te hebben, den anderen volkomen gelyken, en ons daar door stoffe verfchaffen, om de groote oorzaak van al het gefchapene te bewonderen. De rups *Tab. XIX.* onder Letter A afgebeeld, verftrekt hiervan ten overtuigenden bewyze; want zy is niet voorzien van die veele doornspitfen, welken anderen van haare foort hebben; en nogthans is de kapel, waarin zy verandert, volmaakt even als de anderen van gedoornde rupfen voordkomende; 't geen

ie.

ieder myner geëerde Lezers kan ondervinden, als hy, of zelf zulke eene rups opvoedt, of slechts de kapel tot deeze rups behoorende \* in oogen schouw neemt. TAB. XIX.

## §. 5.

Daar ik deeze rups voorheen nooit gezien had, was myn genoegen te grooter, toen ik dezelve den 1 October 1761, ontving, door de geëerde medewerking van den Heere RORNER, in *Frankfort*; die zig, wegens zyne uitmuntende verzameling van Insecten, reeds verdienstelyk gemaakt heeft. Ik ontving daar by het bericht, dat gemelde rups gevonden wordt op Boschgras, het zelve ook voor voedsel gebruikt, en dat uit dezelve, de bovengemelde kapel voortkomt. Daar nu deeze rups geene doornen heeft, noem ik dezelve,

*De byzonder schoone grasgroene rups, met een ronden kop,  
en zonder doornen, behoorende tot de eerste Clasfe  
der Dagvlinders. Fig. A.*

## §. 6.

Dat zulk eene rups uit het ei van een wyfjens kapel van haare soort gebooren wordt, is zo zeker, als dat zy, van haare jeugd, tot haare volwassenheid eene zelfde gedaante behoudt. Haare grootste langte strekt zig naauwlyks uit tot een duim: zy is, over 't algemeen beschouwd, van eene aangename grasgroene kleur: haar kop is van boven niet hartswyze verdeeld, gelyk by andere rupsen van deeze Clasfe plaats heeft; dezelve is rond, en met zeer korte tengere haartjens begroeid. Zy heeft echter het gewoone getal van 12 oogen, welken voor een scherp gezicht gereedlyk te bespeuren zyn; dezelve staan om beide de zyden van den kop, als kleine zwarte verhevene en glanzige stippen, geplaatst by manier van een halven cirkel. De mond van deeze rups is wel tamelyk klein, niettemin voorzien van alle de daartoe behoorende deelen; onder anderen ook van een zeer goed, en naauw in elkander sluitend gebid. De groote natuurkenner REAUMUR, † welke deeze rups mede beschreven, en afgebeeld heeft, Fig. A.  
ver-

\* Zie het Vierde Deel van den Heere RÖSEL, *Tab. 33. Fig. 3 en 4*, alwaar dezelve *Bladz. 182 en 183.* ook beschreeven wordt; onder den naam van: *de met veel gele Vlekken, eenige gelykkleurige ringen, getekende kleiner Dagvlinder, tot de eerste Clasfe behoorende.*

† Zie zyne *Memoir. pour servir à l'histoire des insectes. Par. I. mem. X. p. 421--433. pl. 27. fig. 11-17.*

verzekert, dat hy by dezelve ook eene tong heeft gezien. Daar ik nu dezelfde ontdekking ook gedaan, en in den mond van andere rupfen mede zeker deel gezien heb, 't welk de gewoone verrichtingen van eene tong deed; en het my boven dien bekend is, dat de Heer LYONET, (die, met een onbeschryfelyk geduld, en nooit genoeg te roemen oplettende naauwkeurigheid, de ontleding van eene rups, niet meer dan drie duimen lang, ondernomen heeft;) dat die Heer, zeg ik, zyne rups op zekere plaats mede een tong toefchryft; stel ik de aanwezigheid van dat deel buiten twyfel. Hierdoor zal ieder, met my, te meer opgeleid worden, om de ondoorgrondelyke wysheid van den almachtigen Schepper, met diepe eerbied, te bewonderen; en verbaasd staan over het voortreffelyke maakzel van de kleinste fchepfelen. — Voor 't overige vermoede ik met den Heere REAUMUR, dat de kleinte des monds van onze rups de oorzaak is, dat zy het gras flechts aan den kant afknaagt.

## §. 7.

Het ligchaam van deeze rups beftaat uit 12, niet diep ingefnedene, geledingen, die op het midden van 't lyf het dikfte zyn; en wier kleur eenpaarig groen is. Over deeze geledingen loopt, van vooren tot achter, een finalle donkergroene ftreep; twee andere dergelyken, maar helder groene ftreepen, loopen over de gemelde geledingen, aan ieder zyde der rups, mede van vooren naar achteren. Zy is, (gelyk ik reeds gezegd heb,) niet met ftekellachtige doornen bezet, maar heeft, in plaats van dezelven, op ieder geleding, korte dunne hairtjens, die, als men ze door een vergrootglas befchouwt, op kleine wrattjens in de huid fchynen te staan.

Offchoon men aan deeze rups geene geregelde doornen ontwaart, heeft zy echter van achteren, op haare laafte geleding, die in 't kruipen achter na fchuift, een paar geelachtig groene ftyve fteelfpitzen, die elk met zeer korte, hairfwyze borftels bewafen zyn; en die zy niet dan met behulp van haar gantfche ligchaam kan beweegen. Ik zou dezelven, byaldien zy wat meer overeenkomst hadden met de doornen van andere rupfen, (voornaamlyk, om dat zy ook ftyf zyn,) wel willen houden voor waare doornen, en dus tevens voor kentekenen, dat deeze rups tot de eerfte Clafse behoort. Zy heeft voorts eenigzins kleine pooten, en zo wel de 6 fpijfe voor- als de 8 ftompe buik- en 2 nafchuif-pooten, zyn doorgaands groen.

## §. 8

Wat betreft haar voedsel, zy is met weinig te vreden: zy maakt in 't kruipen geen grooten haast, en de Heer REAUMUR zegt, dat zy ook lang-

langzaam opgroeit. Die, welke ik had, was reeds volwasfen, toen ik <sup>TAB.</sup> haar ontving, en toonde my, door het uitwerpen van haar inwendig vuil, <sup>XIX.</sup> dat zy naby haare verandering was. Intusfchen verwonderde het my niet weinig, toen ik haar, des niettegenftaande, daartoe geen gewoon verblyf, maar flechts eene eenigzins vooruitfteekende vlakke zag verkiezen. Aan deeze hield zy zig met haare nafchuif-pooten vast; en nam, na korten tyd, eene, met den kop naar beneden hangende, gekromde houding aan. Door eene tamelyk fterke beweeging, kromde zy echter fomtyds haar gantschen ligchaam zodanig te zamen, dat het fcheen, als of zy met haar' kop haare vastgehechte nafchuif-pooten geheel wilde naderen: hierby werd ik gewaar dat haar rug, digt by haaren kop, vry dik werd; welke verdikte plaats, toen dezelve op het dikfte fcheen gekomen te wezen, en de rups een grooten dag in gemelde houding gehangen had, eindelyk door eene geweldige heen-en weder-beweeging openborst; en waaruit, binnen omtrent een paar minuten, een popjen te voorschyn kwam. Hetzelve was, onder de nu afgeftreken rupfenhuid, tot die volkomenheid gebragt, in welke ik het onder *Fig. B.*, zo loodrecht hangende *Fig. E.* als het waarlyk hing, voorftel. Het fmertte my, dat andere noodzaakelyke bezigheden my toen niet veroorloofden ook de gemelde voordkoming aftebeelden; in welken gevalle ik niet nagelaten zou hebben, de geflaltsrichting der rupfe in die omftandigheden ook duidelyk afte maalen.

In vergelyking met andere popjens, tot deeze Clafse behoorende, is het onze eenigzins kort en dik te noemen; en 't wykt ook van dezelve daarin af, dat het op zyne geledingen geene ftekelychte verhevenheden heeft; zyn voorfte gedeelte is ook niet zo zichtbaar grynsvormig, en 't heeft over hetzelve een paar fpits toeloopende hoornen. De vleugelfcheden zyn duidelyk aan deeze pop te zien; ook is 'er het gewoone getal der luchtgaten zichtbaar aanwezig: deszelfs kleur was in het begin een aangenaam groen; doch die werd allengskens donkerder en eenigzins olyf vormig. Tot myn ongeluk verdroogde deeze pop, waardoor myne verwachting gantschlyk te leur gefield werd. Intusfchen geloof ik den Heere REAUMUR ten volle, wanneer hy bericht, dat dit popjen, by warm weêr, zyne kapel in tien dagen voordbrengt; en dat zulk eene rups by hem reeds in Juny begon te veranderen. Doch daar dit by my integendeel eerst in October gefchiedde, zo vermoed ik niet te zullen dwaalen, wanneer ik vooronderftel, dat haare kapel tweemaal 'sjaars, (naamlyk eens by den aanvang van den zomer, en nog eens in den laaten herfst,) verfchynt.

## § 9.

Den Lezer, in de voorgaande §, met de befchryving van eene onge-  
T woo.



TAB  
XIX.

woone rups bezig gehouden hebbende, zal ik denzelven thans trachten te vermaaken, met het beschryven van een insect, dat zekerlyk even zeldzaam, en, op zig zelf, nog merkwaardiger is. 't Geen men met reden van het Ryk der dieren zo wel als van het Ryk der planten zegt, naamlyk, dat dezelve met veelerleie zeldzaamheden pryken, en ons duizende gelegenheden tot eene bewonderende waarneeming als aan de hand geeven; dat zelfde kan ook van het uitgebreide Ryk der insecten in 't byzonder gezegd worden. Niet de jaarlykche ondervinding alleen, maar ook de schriften van zulke Natuuronderzoekers, die geen kort verloop van twee of weinige meer jaaren, maar het grootfte gedeelte van hun leven vlytig doorgebracht hebben, in het navorschen der Natuur, verstrekken tot borgen voor deeze waarheid. Men sla by voorbeeld, slechts het oog op de uitgaave eener beschryvinge van eenige tweestaltige insecten of gehoornde kevers; welke wy te danken hebben aan den roemwaardigen yver van den Heere D. SCHAFERT, te *Regensburg*; \* en deeze is alleen genoeg ter volkomener overtuiging.

Hoe veele insecten 'er intusfchen, door de zorgvuldige naspooring van beroemde Mannen, reeds ontdekt mogen weezen, zo twyfel ik echter sterk, of dat, het welk ik de eer heb mynen Leezer hier voortestellen, wel immer van hem gezien zy. 't Is, wel is waar, eene kleine, maar inderdaad wonderbaare kapel; die, boven het gewoone getal van vier vleugelen, nog twee anderen heeft, welken van eene zeer zonderlinge gedaante zyn.

## §. 10.

't Is bekend, dat de meeste en voornaamste onderzoekers en beschryvers der Insecten, dezelve onderscheiden in verschillende geslachten; en wel in schepselen met- of zonder vleugelen; dat ze de laatst gemelde wederom verdeelen in twee- of vier- vleugelige; en eindelyk dat ze de kapellen onder de vier- vleugeligen hebben betrokken; doch nimmer zal een van hun, onder deeze groote menigte van insecten, opzetlyk ook eene kapel met zes vleugelen gezocht, of 'er melding van gemaakt hebben. Toevallig is dit nothans gelukt, aan een zeer waardig navorscher in dit fak der Natuur; ik meen den meergemelden Heere RÖRNER, te *Frankfort*. Deeze verkreeg, in de maand Maart des afgelopenen jaars 1762, uit twee poppen, van eene hem nog onbekende gladde rups, (die waarfchynelyk, een *bladrollder* zal geweest zyn,) welken hy op een' boekenboom gevonden had, onverhoopt twee kapellen, waarvan de eene vier vleugels had; doch de andere,

\* Zie deeze uitgaave *Bladz. 1—36*. Tab. I. II en III. Te *Regensburg* 1758, in 4°.

re, als een wonderdier vertoonde, by haare ontwikkeling dat ze met zes <sup>TAB.</sup> vleugelen bedeed was. Groot zekerlyk was de vreugde van gemelden my- <sup>XIX.</sup> nen begunstiger, by het zien van deeze wonderbaare verschyning; maar niet minder verheugd was ik, toen ik het genoeg smaakte, van beide die kapellen van den Heere RÖRNER, mynen waarden vriend, te mogen ontvangen. Ook houde ik my ten hoogsten verplicht, om zulke eene goedgunstigheid dankbaarlyk te erkennen; te meer daar ik het, daardoor, alleen ben, die, zynen waardigen Leezer, eene getrouwe afbeelding van zulk een zonderling voordbrngzel der Natuur kan mededeelen.

Dat zeer zeldzaam Insect noem ik

*De tot de vierde Clasfe der Nachtolinders behoorende Kapel, die 6 vleugelen heeft: als twee helder-graauw zwart getekende voor-, en vier wit-graauwe kleine achter-vleugelen. TAB. XIX. Fig. a en b.*

### §. II.

De afbeelding *Fig. a.* vertoont ons dit beschouwenswaardig insect, in *Fig. a.* deszelfs natuurlyke grootte, en met zyne zes uitgestrekte vleugelen. De voorvleugelen zyn de grootsten; en hebben meestendeels eene heldere, eenigzins in het geelbruine vallende graauwe grondkleur; en in dezelve wordt men niet slechts verscheidene dwars over den vleugel staande bruin-graauwe vlekken, maar ook eenige sierlyke, tedere, zwarte kapswyze trekken gewaar, welken ik niet verder zal beschryven, aangezien ik hoop dezelve ten allernaauwkeurigsten afgebeeld te hebben. Alleenlyk zal ik, met opzigt tot deeze vleugels, nog aantekenen, dat de buitenste vleugelrand niet uitgeschulpt is; dat voor denzelven een dunne zwarte streep heenloopt, en 'er eenige bruinachtig graauwe vlekken, op gevonden worden.

De achtervleugels, die hun gewricht aan de borst der kapelle, naby onder het gewricht van de voor- en boven-vleugels hebben, zyn niet getekend; ze hebben een zeer heldere witgraauwe kleur; die in het licht een volstrekt witten glans aanneemt. Ze zyn aan den buitenrand, welke mede niet uitgekapt is, met een nog helderer boordzel bezoomd. Uit eene vergelyking van deeze met de voorvleugelen ziet men, dat dezelve redelyk smal zyn, en zulke fijne aderen hebben, dat men byna zoude vermoeden, dat de ligtheid van deeze vleugelen, in vergelyking van de ongelijk grootere zwaarte der voorvleugelen, de kapel haaren vlugt zo moejelyk zoude

TAB.  
XIX.

maaken, dat zy dezelve, zonder eenige andere bykomende hulpe, niet dan met groote vermoënis kan volbrengen. Op dat echter zulks geene plaats mogte vinden, en haar deeze arbeid ligter zoude vallen, heeft het den alvermogenden Schepper behaagd, ook hier een veelvuldigmaal herhaalde blyk van zyne onuitputtelijke wysheid aan het licht te brengen. Ten einde der kapelle het vereichte tegengewigt te bezorgen, plaatste hy aan derzelve borst, behalven de beide achtervleugelen, nog een paar anderen, van zodanig eene grootte, als de voorvleugelen ten gemelden einde vorderen. Op het oog schynen zy lepelswyze gevormd te zyn; doch als men ze door een vergrootglas beschouwt, ontdekt men dat hunne gedaante genoegzaam met die der beide achtervleugelen overéénkomt; en dat zy ook met een dergelyk veder-stof als deezen bedekt zyn. Dit alles toont ons overtuigend, dat die vleugelen geen kentekenen van eene misgeboorte zyn, maar wel degelyk gehouden moeten worden, voor waare, volkomene, welgevormde, en tot zekere oogmerken ingerichte vleugelen. Schoon nu dus deeze kleine vleugelen de vlugt der kapelle schynen te verligten, staan zy evenwel boven de achtervleugelen, en niet onder dezelve; gelyk zulks, by andere tweevleugelige insecten, omtrent de zogenaamde Evenaars, of liever Wind- of Vliegkolfjens, welken met een zelfde oogmerk schynen ingericht te wezen, plaats heeft.

## § 12.

De overige deelen van deeze kapel zyn niet slechts zeer netjes gevormd, maar vertoonen zig ook even zo volkomen als by eenige andere kapel. Haar regelmaatige kop, haar smalle rug, en insgelyks smal, doch langwerpig achterlyf, het welke (niettegenstaande de dunne voelhoornen,) ten kenteken verstrekt dat zy tot het manlyk geslacht behoort, zyn bruinachtig graauw, de hals alleen is witachtig; de oogen zyn zwartachtig, en de haardunne voelhoornen vertoonen zich bruinachtig graauw. De grooten, waarvan men in de afbeelding slechts twee zien kan, zyn met stekelige spitsen bezet, en van eene helder-geelachtig-bruine kleur.

## §. 13

Gelyk ik my verbeelde, onder deeze kapel met zes vleugelen, een mannetjen beschreeven te hebben, zo vermoede ik, dat die geene welke men onder *Fig. b.* afgebeeld ziet, en met vier, haar evenwigt gelykmaatige, vleugelen, voorzien is, het wyfjen van de eerstgemelde zal wezen. In deeze gissing word ik versterkt, door haar korter en dikker achterlyf (als een gewoon onderscheidingsteken van het geslacht der kapellen,) en niet minder door haare overige gedaante. Zy schynt slechts daarin alleen eenige voortreffelykheid boven het mannetjen te bezitten, dat zy niet alleenlyk,

*Fig. b.*

lyk, in hare voorvleugelen, eene aangenaamere tekening heeft; maar ook op hare volkomen achtervleugelen eene driefvoudige rei van ongemeen tedere graauwachtige kaptrekken ten toon spreidt. Daar ik intuschen, door eene nadere ondervinding, nog niet verzekerd ben, dat het mannetjen van deeze soort altyd zes vleugelen heeft, zo zal ik ook deeze beide ongewoone vleugelen nog niet bepaaldlyk opgeeven, voor kentekenen van het geslacht. Echter ware het niet onmogelyk, dat zulks plaats had; aangezien allen liefhebberen van insecten bekend is, dat men zelfs vrouwlyke kapellen vindt, die geheel geene vleugelen hebben. By aldien middelerwyl onze kapel slechts de eenige in hare soort mogte wezen, welke by toeval door de Natuur met zes vleugelen bedeed is, zo verdient dezelve nogthans, ter oorzaake van hare volkomene, en met elkander in grootte en gelykheid zeer overeenkomstige vleugelen, geene mindere verwondering, dan eenig ander wonder der Natuure, dat dikwyls niet zo wel overeénstemmende, ja niet zelden zeer gebrekkig is. Inderdaad, wy zouden tog moeite genoeg hebben, om te kunnen doorgronden, hoe het mogelyk heeft kunnen wezen, dat de altoos werkzaame Natuur, dit verschynzel heeft kunnen te wege brengen; daar zy hier, buiten hare gezette paalen, ik meen, buiten de regelmaatige en anders gewoone vorming, zig nog eene dubbelde vorming heeft moeten voorneemen. 't Is ten hoogsten te verwonderen, dat de Natuur, van den eersten oorsprong der kapelle af, derhalven door alle de veranderingen, welke zy heeft moeten doorloopen, zo onder het mom van het eitjen, als van de rups, en van het popjen, (want in 't popjen alleen zouden deeze vleugelen niet gevormd hebben kunnen worden, indien de bouwstofte daartoe niet zo wel als die tot de andere vleugelen, voorheen bekwaam gemaakt ware,) dat, zeg ik, de altyd werkzaame Natuur heeft kunnen slaagen, in het voortbrengen van dit byzonder, doch gelykvormig paar vleugelen, die zo regelmatig, zonder het minste gebrek, en door hunne holle lepelswyze gedaante zo merkelyk onderscheiden zyn van de andere vleugelen. Dan daar de goede God in en door de Natuur werkt, moeten wy dit alles toekennen aan zyne onnadenkelyke wysheid, en Hem daarin roemen. — Hy kan voortbrengen wat Hy wil.

## §. 14.

Eindelyk komen wy tot het beschryven der rupse, op de twintigste Plaat afgebeeld; en daar zy tot de Classe der Beerenrupsen behoort, geef ik haar den naam van

*De kleine, ongemeen snelloopende Rups, versierd met bruine hairen, een geelen rugstreep, en zwarten kop, die als koper glimt. TAB. XX. Fig. 1 en 2.*

TAB.  
XX.

Ik zal haare verandering tot in eene kapel naauwkeurig aantekenen.

In het afgelopen jaar 1762, heb ik eenige van deeze rupsen, ter groot-  
Fig. 1. te der afbeeldinge onder Fig. 1, en nog vóór de eerste vervelling, ont-  
vangen, van mynen hier voor gemelden Vriend, te gelyk met het bericht,  
dat hy dezelve in de maand Juny bekomen had, uit de eieren van eene  
kaneelbruine kapel, welke ik straks nader zal beschryven: hy had zyne  
rupsen gevoed met tuinsalade, en ook met groot en klein grind of sca-  
biofenkruid. Ik lag haar derhalven dezelfde voedzels voor; doch onder-  
vond, by zekere gelegenheid, dat zy ook de spitse of lange Weegbreë  
met smaak at.

Fig. 2. Fig. 1. vertoont deeze foort van rups in haare eerste jeugd; welke ge-  
daante zy ook, nog na haare derde verhuiding, en derhalven in haare vol-  
komene volwasenheid behoudt; als onder Fig. 2. duidelyk blykt, volgens  
welke haare geheele lengte niet boven die van een duim gaat.

Haar kop, van eene middenmaatige grootte, is benevens de 12 zeer  
kleine oogen, die aan de gewoone plaatfen staan, van eene zwarte kleur,  
welke in het licht glimt als koper. De twaalf geledingen van het lyf,  
waarvan 't middenste het dikste is, zyn eenigzins diep ingekorven, en  
van grondkleur zwartachtig bruin. Echter loopt 'er, over het midden  
van den rug, van de eerste tot de laatste geleding, eene smalle helder-  
geele streep; die op 't midden van iedere geleding, afgebroken wordt  
door eene niet veel breeder oranje-geele vlek.

Op iedere zyde van elke geleding staan vier kleine, verhevene, ovaals-  
wyze, zwart-bruine knopjens; alle welken begroeid zyn, met eenige ste-  
vige, niet zeer lange bruin-roode hairen; die op de achterste geledingen  
echter een weinig zwarter en langer vallen; waar door deeze rups die  
hairige gedaante verkrygt, in welke zy zig vertoont. Genoegzaam voor  
de onderste knopjens die tegen den buik zyn, ziet men duidelyk negen  
kleine witte stipjens, welken niet anders zyn dan die kleine openingjens,  
waardoor de rups de lucht inademt, en weder uitsdyft. Het eerste daar-  
van is geplaatst op de eerste geleding; doch de agt overigen ziet men  
van de vierde tot de laatste geleding.

De

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



De driepaar spitse voor- en de twee stompe naschuif-pooten zyn zwart; <sup>TAB.</sup> doch de vierpaar buikpooten bruin-rood. Deze rups kruipt, voor het <sup>XX.</sup> overige, ongeméén snel, waarom men, in ze optezoecken, wel moet toezien; want anders verliest men ze ligtlyk uit het oog; voornaamlyk daar zy zig gaarne in de schaduw der gewassen verbergt.

## §. 15.

By haare annaderende verandering gebruikte zy geheel geen voedsel; ze ontlastte zig van haare inwendige onzuiverheid, en veranderde zodanig van kleur, dat zy graauw werd. Zy bespon zig, op den 3 July, aan het dekzeltjen van haar verblyf, met een tamelyk eil doorzichtig weefzel, dat eenigzins graauw van kleur, en overal met heure hairen vermengd was; (zie *Fig. 3.*) en veranderde vervolgens, na het afstryken van haare huid, *Fig. 3.* in zulk een popjen, als ik den geëerden Lezer onder *Fig. 4.* voorstel. *Fig. 4.*

Dit popjen is glanzig, en meerendeels donkerbruin van kleur; zynde inzonderheid aan de afscheiding der vleugelen, of de vleugelscheden, gantsch donker. Haare geledingen zyn zeer zichtbaar ingekorven, en zo wel als de rups met het noodige getal van luchtgaten voorzien. De laatste afdeeling heeft van achteren eene kleine steelspitse; en alle de geledingen maaken eene sterke beweeging als men het popjen aanraakt.

Na 12 dagen kwam de kapel reeds voor den dag; en ze werd binnen korten tyd, (na dat zy vooraf het gewoone reinigings vocht had laten vallen,) zo schoon en volwasfen van gedaante, als wy haar van *Fig. 5.* tot 8. voorstellen.

## §. 16.

De 5<sup>de</sup> Figuur vertoont, wel is waar, slechts eene wyfjens kapel; maar *Fig. 5.* echter tevens zodanig eene, die, wegens het groot onderscheid van haare kleuren, met die van het mannetjen, de naauwkeurigste beschouwing verdient. Ter dier oorzaake heb ik verkoozen haar aftebeelden, als vliengende; want dan kunnen de vier vleugelen tog duidelyker gezien worden. Over 't algemeen heeft deze kapel op haare vier vleugelen, die nog uitgekapt, noch, gelyk by 't mannetjen, met een rooden streep omgeboord zyn, zo wel als op haaren kop, die met twee hairdunne voelhoornen, en met eenige zwarte vlekken en bruinroode oogen, pronkt, benevens den eenigzins hairigen rug, en het zwartgevekte dikke achterlyf, eene zeer aangenaame kaneelbruine grondkleur. De voor- en achtervleugelen zyn met zichtbare roodbruine aderen doortrokken; en, in ieder van de eerstgemelden, ziet men eene veelhoekige donkerbruine vlek, die  
haar

TAB.  
XX.

haar begin neemt uit de hoofdader, uit welke de andere aderen ontfstaan. De achtervleugelen zyn, van het gewricht af, tot op het midden toe, met tedere zwarte hairen, en vederstof belegd. Aan het einde dier hairen en vederstoffe, niet ver van den rand der voorvleugelen, en tusfchen twee groote vleugeladeren in, ziet men een zeer zwarte, uit- en in-wards gebogene, en in eenige hoeken gedeelde vlek; voorts achter deeze vlek, even binnen den uiterften rand der vleugelen, nog eene rei van eenigzins lange en hoekige zwarte vlekken, die door de vleugeladeren verdeeld worden.

§. 17.

Fig. 6.  
7 en 8.

De zelfde kapel, doch de manlyke, vertoon ik den Leezer onder *Fig. 6*, *7*, en *8*, niet alleenlyk vliegende, maar ook in haaren stand zo als zy zit. Men vindt in deeze afbeeldingen niet slechts het groote onderscheid tusfchen hem en 't wyfjen, dat, gelyk wy boven gezien hebben, ongelyk donkerder van kleur is, dunner voelhoornen, en een veel dikker achterlyf heeft, gewaar, maar men ontdekt 'er tevens duidelyk uit, het onderscheid dat onder de mannetjens zelven plaats heeft, ten bewyze van de bekende ftelling; dat 'er in de geheele wereld geen twee dingen zyn, die elkander volkomen in alles gelyken.

*Fig. 6* en *7* vertoonen wel, wat de voor- en achter-vleugelen betreft, byna dezelfde kleur; en wy zien dat de vleugelen, zo wel als de hairige kop en rug, eene aangename ftroogeele verw hebben; welke by fommingen wel wat doffer is dan by anderen. Ook komen ze daarin overeen, dat zy beiden aan den buitenften en binnenften rand verfierd zyn, met een fchoon menie-rood boordzel; als mede dat ze, over den grooten hoofd-vleugelader, eene menie-roode, hoekige vlek hebben, in welke wyders nog eenige zwarte vlekjens gezien worden.

In tegendeel vertoont zig in de vlekken der achtervleugelen die zo wel als het eenigzins lang en smal achterlyf, bleek-, of dof-geel van grondkleur zyn, een zo veel te grooter onderscheid: want, volgens *Fig. 6*, zyn ze, uitgenomen derzelver rooden rand-trek, zo bleek, dat men ze met die, welken wy onder *Fig. 7*. befchouwen, niet wel in vergelyking kan brengen.

Fig. 6  
en 7.

§. 18.

De foort deezer kapellen was my wel reeds bekend, aleer ik haare rups leerde kennen; maar ik heb by verfcheidenen daarvan geene zwarte vlekken in de achtervleugelen ontdekt; ja zelfs waargenomen, dat die mannetjens, by welken deeze vlekken 't zwartst zyn, niet slechts

de



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



de schoonsten genoemd mogen worden, maar ook het zeldzaamst voor- TAB. XX.  
komen.

Hoe deeze kapel, in eene zittende gestalte haare vleugelen geflooten draagt, vertoon ik onder *Fig. 8.* alwaar ik haar uitgebeeld heb, met geel, doch aan de gewrichten roode pooten. Wyders mag men, uit haare spoedige uitbreeking uit het poppen, met grond van waarfchynelykheid, wel gissen, dat deeze kapel tweemaal in 't jaar ten voorschyn komt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*De kleine Kaneelbruine Rups, versierd met een hoog-vleeschkleurige vlek, hebbende een byzondere Rug- en staart-spits, zonder naschuijspooten; met haare verandering in een Nachtkapel van de tweede Clasfè; benevens eene blaauwachtig groene Rups, met haare verandering, mede in eene Nachtkapel van deszelfde Clasfè. TAB. XXI en XXII.*

### §. I.

**C**telyk de ongemeene goedwilligheid van mynen waarden Vriend, TAB. XXI en XXII.  
den Heere RÖRNER, my reeds meermaalen in staat gesteld heeft, om mynen achtingwaardigen Leezeren allerlei zonderlinge insecten te vertoonen, zo heb ik ook de zeer ongemeene en aartige Rups, die het voorwerp van myn tegenwoordigen letterarbeid zal' weezen, aan zyne loflyke zucht voor de historie der Insecten te danken. — Op den 1 October des jaars 1761, ontving ik reeds zodanig eene Rups, onder den naam van *Stamrups*, en van die grootte, als waartoe zy na haare derde en laatste verhuizing gekomen was: een bygevoegd toereikend bericht hield in, dat zy van haare eerste jeugd af die gedaante gehad had, zig op Boekenboomen onthield, en met derzelver bladen voedde, offchoon zy ook, by gebrek daarvan, eikenbladen ate: de beide Engelsche Natuuronderzoekers, de Heere ALBIN \* en WILKE † hebben deeze Rups mede afgebeeld, en gezegd, dat men haar, behalven op de Eikenboomen, ook op de wilde Roos, (Ro-

\* ALBIN *Hist. Natural. Insectorum Angliæ. Tab. I.XV. pag. 65.*

† WILKE *The English Moths and Butterflies &c. Tab. XXX. lib. I. ch. I. num. III. cl. 1. S. E. 3. pag. 14.*

TAB.  
XXI.

(*Rosa silvestri*) kan aantreffen: de eerstgemelde vertoont ons zelfs nog eene andere Rups, van dezelfde gedaante, uit welke hy echter, (is 't anders dat hy zig niet bedriege,) eene andere Kapel, dan de onze gewoon is voortbrengen, doet ontstaan; voorgeevende dat hy deeze zyne Rups op een Sleedoorn, of wilde pruimboom, (*Pruno silvestri*) gevonden, en bemerkt heeft, dat zy in een koperkleur spinfel tot een popjen veranderde.

§. 2.

TAB.  
XXI.  
Fig. 1  
en 2.

Op de XXI Tab, fig. 1 en 2. vertoon ik de rups in haare natuurlyke en volkomene grootte, zynde nog geen duim lang; des niet tegenstaande hebben beide bovengemelde Engelsche Natuuronderzoekers, dezelve veel grooter afgebeeld: mag men derhalven deezen hunne afbeelding voor waarheid aanneemen, zo is daaruit te besluiten, dat die rupsen welken in *Engeland* gevonden worden, onze inheemschen overtreffen.

§. 3.

Haar kop is, over de helft eenigzins afgedeeld, van vooren in tegendeel plat, onder breeder dan boven, en is van eene wat hoekige gedaante, geel-bruin van kleur, en heeft aan beide zyden twaalf kleine oogen; over 't algemeen is haar gantsche lyf kaneel-bruin, welke kleur echter op den rug afgebroken wordt, door eene in tweeën afgedeelde hoog-vleeschkleurige vlek, die tamelyk groot, in de midden eenigzins breed, en voorwaards naar den kop wat spits toeloopende is; deeze vlek is geplaatst op die geledingen, onder welken de vier paar stompe buikpooten staan: vóór dezelve ziet men nog eene andere kleiner witte vlek, haar begin nemende naby den kop, uit twee witte kapswyze smalle streepen of zyranden, welken de drie voorste geledingen beslaan: midden door alle de geledingen van den rug loopt eene zeer smalle donkere streep: boven op het midden der derde geleding, steekt echter een zeer byzonder kaneel-bruin, spits en voorwaards gekromd deel uit, buiten 't welke, zig, naar achteren toe, op de laatste geleding, nog een dergelyk ongewoon deel vertoont, hebbende eene steelswyze gedaante, even als ware het een klein staartjen; bepaaldlyk staat dit deel daar, alwaar by andere Rupsen het zogenaamde staartklapjen eindigt, en onder 't welke die werktuigen liggen, waardoor zy zig van haare uitwerpzels ontdoen, die echter ook by deeze Rupsen aanwezig zyn, en onder welken ook anders het bekende paar naschuifpooten, die onze Rups in 't geheel niet heeft, staan. De gemelde staartpunt is roodachtig bruin, en daarin van de zogenaamde hoortjens, of staartpunten der meeste Rupsen van de eerste Classe, (waartoe deeze niet behoort,) onderscheiden, dat het niet gebogen, maar recht is; ook niet achter of boven op de laatste ge-

geleding staat, maar laager, en wel op die plaats, alwaar, gelyk ge-<sup>TAB. XXI.</sup>  
zegd is, anders het staartklapjen eindigt.

Voor 't overige heeft zy drie paar spitsachtige voor- en vier paar stompe buikpooten, van welken de eerstgemelden bruinachtig zyn, doch de anderen, zo wel als de onderfte zyden der geledingen, eene bleek-geele, of heldere zandkleur hebben.

#### §. 4.

Onder de byzondere eigenschappen van deeze Rups, kan geteld worden, haar zeldzaamen stand die zy neemt, zodra men haar aanraakt; en in welken stand men haar, *Fig. 2.* beschouwt; zy komt in dit opzicht overeen met de Veldrups\*; zy heft het voorfte gedeelte van haar lyf, benevens haare drie paar spitsachtige voorpooten, (die zy tegelyk na zig toetrekt,) in de hoogte, en richt tevens het achterfte gedeelte van haar lyf, een weinig op, in dier voege dat zy nu alleenlyk op de agt buikpooten, waarmede zy zig wèl vasthoudt, rust: in deeze weerbaare en tegenstand-biedende houding, blyft zy zo lang tot zy vooronderstelt, geene vyandlyke voorwerpen meer by zig te hebben: om echter te meer van haare zekerheid overtuigd te weezen, draait zy den kop, voorzigtiglyk, van den eenen kant naar den anderen, waaraan men duidelyk kan zien, dat zy onderzoekt of 'er zig ook nog eenige vyand in haare nabyheid onthoudt: zo zy nu geen gevaar meer vermoedt, vervolgt zy haaren weg; zy kruipt echter zeer langzaam, 't geen waarfchijnlijk een gevolg van het gebrek aan nafschiuipooten is.

#### §. 5.

Hoe zeer nu deeze Rups hierin met de tweeftaartige Veldrups overeen kome, zo heb ik echter niet kunnen waarneemen, dat zy, even als die, uit haar staartpunt, een draadswys en spitsachtig deel kan doen voordkomen; weshalven ik ook geloof, dat haar staartpunt van zulk een deel niet voorzien, en geheel anders dan die der Veldrups gemaakt is, ten ware dan dat myne navorfchingen in deezen niet naauwkeurig genoeg mogten gedaan weezen; en waarlyk, ik konde dezelve ook niet volkomen naar mynen zin aanstellen, aangezien myne Rups reeds zeer naby haare verandering was, en my naauwlyks zo veel tyds overbleef als ik noodig had om haar aftekenen: door het herhaald aanraaken, zoude ik haare verandering ongetwyfeld ook zeer vertraagd hebben, 't geen ik echter niet raadzaam oordeelde te weezen.

#### §. 6.

\* RÖSEL. *Insectenbel.* 1 th. in der N. 17. sten Classe. Tab. XIX. fig. 4. und 6. seit. 124.

## §. 6.

TAN.  
XXI.

Fig. 3.

De verandering zelve geschiedde op de volgende wyze: myne Rups vertoonde zig zeer onrustig, en gaf my door het uitwerpen van haare onzuiverheid te kennen, wat zy voorhad te doen: zy hechtte ook werklyk eenige draaden aan een blad vast, en trok door dat middel, de randen van hetzelfde een weinig, over zig heen, zamen, houdende vervolgens yverig aan, met op de verkozene plaats tot het veranderen, een toereikend roodachtiggeel, doorgebroken en eenigzins styf spinfel, zo als Fig. 3. vertoont, te vervaardigen: onder deeze overdekking streek zy, na verloop van weinige dagen, haare laatste rupfenhuid geheel af, en nam daarentegen de gedaante van een popjen aan.

## §. 7.

Fig. 4.

Ik heb besloten de voornaamste deelen van deeze afgelegde rupfenhuid, en het popjen (zie Fig. 4.) een weinig nader te beschryven: men zoude zulks, wel is waar, voor overtollig kunnen houden, om dat veele popjens elkander zo gelyk zyn, dat men zoude meenen te mogen besluiten, het ware genoeg alleenlyk te weten, dat de popjens van eene zelfde Clasfe, over 't algemeen ook eene zekere gelykheid aan elkander hebben, en dat des ééne of twee afbeeldingen van zulke popjens, tot eene zelfde Clasfe behoorende, toereikende zyn, om eenen Liefhebber van Insecten het noodige duidelyk denkbeeld van alle de overigen te geeven: dan, hier op merk ik aan, dat deeze vooronderstelling reeds daarom valsch is, dat de popjens elkander nimmer zo gelyk zyn, als by voorbeeld het eene ei 't andere; neen, maar dat zy ook onder elkander verschillen, of door hunne kleur, of door hunne gedaante, of ook door geheel byzondere kentekenen, (offchoon deeze niet zo terstond in 't oog vallen,) en daarom ook zeer wel eene meer dan vlugtige betrachting, die zig verder uitbreidt, dan tot een oppervlakkige eerste beschouwing, en het daar naar gevormde denkbeeld, waardig zyn; myne grondstelling dat altoos het ééne popjen anders van gedaante is dan het andere, zal zo wel door de tegenwoordige als nog volgende afbeeldingen, haar volkomen beslag verkrygen.

## §. 8.

Iet byzonders aan ons popjen, dat anders regelmatig van gedaante, en met alle de kentekenen van de tweede Clasfe voorzien is, is haar geheel met blaauw overdekt voorste gedeelte, waaronder men de vleugels, voelhoornen, pooten en oogen van de toekomende Kapel, tamelyk duidelyk kan zien liggen: indien men dit blaauw nu afwischet, vertoont zig terstond de waare, naamlyk de donker bruine kleur van dat voorste gedeelte: het ge-  
mel-

melde blaauw schijnt op zig zelf niet anders te weezen, dan eene vochtig-<sup>TAB. XXI.</sup>heid, welke uit de menigte van zweetgaatjens, die, (voor het bloote oog echter onzichtbaar,) op de schel van het popjen gevonden worden, ontspringt, en wanneer zy droog wordt, zig op zulke eene wyze verdikt, dat zy aan de gemelde bast of schaal van het popjen hangen blyft, welke bast daardoor als met een blaauw dons overtoegen schijnt te weezen: deeze gisting is allezins zeer waarfchynelyk, om dat, als men het popjen, terftond na de verandering der Rups, afwascht, het gezegde blaauwe na weinig tyds weder te voorschynt komt — voor het nut der gemelde uiterfing door de zweetgaatjens, kan ik geen anderen grond opgeeven, dan de gisting, dat de leden van het Kapelletjen, niet zo gemaklyk hunne behoorelyke rypheid en vastigheid zouden verkrygen, zo het popjen zig van een vocht, dat de Rups hoogstnoodig was, maar voor het popjen zelf overtollig is, op deeze wyze niet konde ontdoen.

## §. 9.

Het achterfte gedeelte van hetzelfde bestaat uit zeer zichtbaar verdeelde geledingen, welke de benodigde luchtgaatjens hebben, maar niet zo fterk met blaauw overftreken zyn als het voorfte gedeelte; het is in tegendeel van eene eenigzins geelachtig-bruine kleur: op het uiterfte gedeelte van de laafte geleding, ziet men achter op deszelfs midden, met het bloote oog, eenige kleine onkenbaare puntjens (*Litt. a.*) wier stand, (daar dezelve achter op het midden van de laafte geleding, doch niet over dezelve is,) ten kenteken verftrekt, dat het popjen tot de tweede Clafse behoort: wanneer men echter deeze puntjens genoegzaam vergroot, zal men gewaar worden, dat zy bestaan uit enkel uit- en in- waards gekromde donkerbruine haakjens, en wel, vier groote by elkander fttaande, (van welken het ééne paar echter grooter is dan het andere, *Fig. 5. litt. bbbb*) benevens twee klei-<sup>Fig. 5.</sup>ner, niet zo veel gekromde, doch breedere, die ter zyde van de grootere geplaatst zyn: ieder van gemelde vier groote haakjens, heeft een wel breed, uitgehold, doch fcherp, en op twee fpitfe hoeken uitloopend eind, het welk in de tweede kleinere, wel mede breed, doch in drieën afgedeeid is.

## §. 10.

Nu valt zeer natuurlyk de vraag: welk oogmerk heeft de groote Schepper gehad, in dit fchepfel met dergelyke zonderlinge deelen te voorzien? — hierop antwoord ik: mogelyk heeft zyne wysheid het alzo verordent, op dat zulk een popjen zig in haar befloten verblyf te gemaklyker en zonder zig te befchadigen, zoude kunnen keeren, en zig voor zyne doolvyanden, de fluijp-wespen, of andere infecten, met nadruk befchermen: want door middel

TAB.  
XXI.

van gemelde haaken, kan het poppen zig in deszelfs, uit enkel draaden vervaardigd weefzel, vasthangen, en zig zonder groot bezwaar, of te duchtene befchadiging, zo fterk beweegen, dat het de fliipwesp moejelyk moet vallen, het met eieren (wier uitbroeding noodzaakelyk den ondergang van het poppen ten gevolge zoude hebben,) te beleggen: echter kunnen, behalven dat, zulke haakjens daartoe dienen, dat, als de Kapel wil doorbreken, de fchel der pop, door de inwendige beweeging derzelve, niet heen en weder geflingerd, en haar daardoor het uitkomen niet bezwaarlyk, of geheel onmogelyk gemaakt, en zy niet verminkt worde, maar dat die fchel of fchaal in tegendeel vast hangen blyve, en door den kleinen wederftand, welke het gevolg van zulke eene houding moet weezen, de werking van het poppen, voor de kapel gemaklyker maake. — Een blindlings vorfchen naar de reden, waarom evenwel andere poppen, welken van dergelyke haakjens niet voorzien zyn, echter volmaakte Kapellen voordbrengen; en waarom de groote Bouwmeester der Natuur, deeze foort van Rupsen, ten dien opzichte met iet byzonders, ja fchier overtolligs, bedeed heeft, zoude ons geen voordeel aanbrengen, en wy zouden na afloop van alle bedenkingen moeten bekennen, dat wy veel te weinig verftand en fcherpzinnigheid hebben, om over alle Gods oogmerken te kunnen oordeelen: het zoude even moejelyk vallen de overtolligheid van de bedoelde deelen deezer poppens te betoogen, als het voor ons onmogelyk is te doorgronden, alle de middelen die door de hoogfte Wysheid deezen of geenen poppens, ter hunner inftand houding, verleend zyn, welke middelen, offchoon niet altoos onder het bereik onzer zintuigen vallende, echter ongetwyfeld van het zelfde nut, als de meer gemelde haakjens zullen weezen — liever bewonderen en roemen wy, ook hier, eerbiediglyk, de oneindige almagt en het toeverzicht van den Eeuwige, die, in de eerfte dagen der wereld, door zyn alles vermogend woord, *daar zy!* zo veele duizende fchepfelen op éénmaal hun aanzyn gegeven, en de regelen der werkende Natuur, tot aan het einde van alle dingen bepaald heeft.

## §. II.

Het Kapelletjen waaraan dit poppen ten verblyf heeft verftrekt, kwam in den nacht van den 20 April des jaars 1762, en derhalven eenigzins vroegtijdig, waarfchynelyk wegens het toenmalige fchoone lenteweder, ten voorfchyn, na vooraf een dropjen reinigingsvocht te hebben laten vallen: 't was een mannetjen, en had baardachtige voelhoornen: *Fig. 6.* vertoont ons hetzelfde in zyne vliegende houding: zyn geheele lyf, zyn kop, waarin groene oogen ftonden, de voelhoornen, de pooten, en vier vleugelen, zyn, over 't algemeen befchouwd, van eene donker-roodachtige, of eigenlyk donker-oker geelachtige grondkleur; echter fchynt de kleur der achter-vleugelen, een weinig helderder te zyn dan die der voor-vleugelen.

Dee-

Fig. 6.

Deeze loopen aan den buitensten rand aartig in en uit, en hebben vóór dien <sup>Taf.</sup> rand een zeer smalle bruine invatting, die echter aan de voorste vleugel-<sup>XXI.</sup> hoeken zwart is; vóór deezen smalle invatting ziet men een ander, maar breeder, ookergeel boordfel, op welk een nog breeder uit- en in-loopende, mat-bruine vlek volgt, die dwars over het midden van de vleugel staat: WILKE heeft in dezelve één, ALBIN echter twee donkere vlekken waargenomen, welke vlekken mogelyk by eenigen gevonden worden, doch die ik intusfchen niet ontdekt heb.

Op de achtervleugelen vertoont zig, in het midden, ook wel een breede doch veel bleekere vlek, en deeze vleugelen zyn aan den buitenrand niet in- en uit-loopende, maar rond; en 'er ligt voor dien rand ook eene zeer zacht-bruine invatting.

### §. 12.

Het vrouwlyk Kapelletjen, is, wat de kleur betreft, het zelfde als 't manlyke, en onderscheidt zig van dit alleenlyk door haare dunner voelhoornen.

*Fig. 7.* vertoont ons haar, zittende, met geflotene vleugelen, die zy een *Fig. 7.* weinig dakswyze draagt; in dezelfde *Fig.* zien wy ook 't eerste paar haarer voorpooten, en haare eiëren, uit welken de boven beschrevene foort van Rups te voorschijn kwam: zy is afgebeeld, met voorwaards uitgetrekte voelhoornen, alhoewel zy, vliegende, gewoon is dezelven rugwaards te trekken: haare eiëren zyn klein, ovaal, en van eenen bleek-geele kleur; ik vermoede dat zy die op zulk eene plaats zal leggen, alwaar de uit dezelve voortkomende rupsjens, terstond voedsel kunnen bekomen.

Dat deeze Rups ook hier ter plaatse gevonden wordt is zeker, want nog onlangs heb ik zulk eene Kapel vinden zitten, aan den stam van een laagen Eik

Thans ga ik over tot de beschryving van eene andere Rups, waartoe de afbeeldingen op de XXII. Plaat my aanleiding geeven. — Men kan de Rups welke ons aldaar vertoond wordt, voegelyk noemen,



*De blaauwachtig groene en met een geel hals-boordfel versierde Rups, benevens haare verandering in een Kapel, tot de tweede Classe der Nachtvinders behoorende, en versierd zynde met een doodshoofd. TAB. XXII.*

## §. 13.

TAB.  
XXII.  
Fig. 1.

*Fig. 1.* vertoont ons deeze Rups, en welke afbeelding ik te danken heb, aan de goedhartige mededeeling, van mynen reeds zo dikmaals geroemden begunstiger, den Heere Dr. GLADBACH, te *Frankfort*: die waardige Geleerde, welke, buiten zyne hoofdbezigheid, naamlyk de uitoefening der Geneeskunde, een roemwaardig navorscher der Natuurlyke historie toont te weezen, heeft de goedheid gehad my gemelde afbeelding, door hem zelve vervaardigd, en die ik myne gunstige Leezers by deezen aanbiede, te laten toekomen.

## §. 14.

In gevolge het bygevoegde bericht van gemelden Begunstiger, werd deeze Rups, in de maand November des jaars 1762, op de tuinalade gevonden, reeds volwasfen zynde\*: haare lengte was, volgens deeze tekening, niet boven de twee duimen, en haare kleur was doorgaands schoon blaauwachtig groen: haare eerste geleding, of eigenlyk gesproken, haar hals, heeft een ongemeen schoone hoog-geele boord: de negen luchtgaten deezer Rups, zyn voornaamlyk kenbaar door dezelfde schoone hoog-geele kleur: zy heeft een gelyk getal van pooten, als alle de andere Rupsen van deeze Classe; en die pooten zyn allen, zo wel de zes voorste spitse, als de agt stompe, en de twee naschuifpooten, van eenerleiën kleur, naamlyk blaauwachtig groen.

## §. 15.

Op den 23 November des bovengenoemden jaars, trachtte zy onder de aarde tot haare verandering te komen; want toen de Heer Dr. GLADBACH, haar, in haar verblyf, zynde eene doos, van aarde voorzien had, groef zy zig onder dezelve, en zo wel de bodem als de eene rand der doos, schieen haar voornaamlyk dienstig, ter vervaardiging van een ruim onderaardsch verblyf, en legerstede voor haar poppen: zy overtrok dezelve met een wit spinfel, en maakte het hol zo vast en duurzaam, dat de over haar heen ligg-

\* 't Is derhalven niet te bepaalen, of zy van haare geboorte af, door alle verhoudingen heen, zo gekleurd is, als waarmede zy ons hier vertoond wordt.

Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.



gende aarde, het noch indrukken noch verdringen konde: in deezen staat <sup>TAB. XXII.</sup> bragt zy niet, gelyk eenige andere Rupfen doen, geheel den winter door; maar stroomte, waarfchynelyk reeds na verloop van agt dagen, haar rupfenhuid af, 't welk ik befluit, daaruit, dat de Heer Dr. GLADBACH, my bericht, hoe hy haar, na verloop van drie weeken, in een popjen veranderd gevonden heeft, in een verblyf als boven befchreven is, en welk verblyf ook, als het diertjen zyne volkomene vryheid heeft, waarfchynelyk geene andere gedaante zal hebben, als die onder *Fig. 2.* afge- *Fig. 2.* beeld wordt, alwaar ik, in gevolge myne gisfing, een langwerpig ovaalen aardkluit voorftel.

## §. 16.

De gedaante deezer pop, en dat zy donker roodbruin van kleur is, zien wy onder *Fig. 3.* genoegzaam duidelyk, en deeze zelfde afbeelding, ver- *Fig. 3.* strekt tevens ter ftaavinge van het geen ik hier vóór, § 7. gesteld heb, dat naamlyk *geen popjen het andere volkomen gelyk* is, oftchoon zy tot een zelfde Claffe mogen behooren: want behalven dat de laaste geleding deezer poppe, geen zo spitse fteelpunt heeft, als andere, maar, in tegendeel veel eer een ftoppachtig rond deel, (*zie litt. a;*) zyn ook de geledingen *Litt. a.* van haar achterlyf, zodanig eng, en in elkander gefchoven, dat zy geheel niet vergeleken kunnen worden, met de dikwyls veel breedere geledingen van andere poppen; ja 't fchynt zelfs, dat het achterlyf van dit popjen uit veel meer geledingen bestaat, dan men by andere poppen waarneemt: evenwel toont het gewoone getal van luchtgaten aan, dat zy niet meer geledingen dan anderen heeft, en dat dezelve derhalven flechts veel naauwer, in elkander gefchoven zyn; en gesteld, men wilde dit onderscheid voor geheel niets betekenende en krachtloos houden, zo kan echter de vergroo- *Fig. 4.* ting van het bovengemelde ftoppe achterdeel, gelyk onder *Fig. 4.* te zien is, het zonderlinge van dit popjen, boven anderen, duidelyk doen zien; vermits men in die vergroo- *Litt.* ting, op hetzelfde, veele doornachtige, zwarte, harde ftekelpunten, van onderscheidene grootte, (*zie litt. bbbbbbb*) ge- *Litt.* waar wordt, welke punten met de haakjens, hier voor § 9, befchreven, *bbbbbb.* geheel geene overeenkomst hebben, en des niettegenftaande, in hunnen aart, voor dit popjen zo nuttig kunnen weezen, als de gemelde haakjens voor het andere.

## §. 17.

Van Nov. 1762, tot in de maand Maart des volgende jaars, bleef de Kapel in haare pop verborgen; den derden der laatstgemelde maand was de dag van haare verlosfing uit die gevangenisse; want ten dien dage kwam eene wel niet prachtig, maar echter zeer zonderling getekende Kapel voor den dag.

Taf.  
XXII.

Indien deeze zonderlingheid altoos, dat is by alle Kapellen van haare foort, op dezelfde wyze plaats heeft, verdient zij met recht de *kleine doodekop* genaamd te worden, wegens het figuur, aan zulk een kop zeer na gelykende, het welk zy op haaren rug heeft.

## §. 18.

Fig. 5. Haar waare gedaante zien wy onder Fig. 5. alwaar zy in eene vliegende houding, dat is met uitgestrekte vleugelen afgebeeld is: violet-bruin is de grondkleur van haaren voorvleugel, waarop, behalven eenige zwarte kaptrekken, en golfswyze lynen, verscheide deels groote, zo donker-oly-verwige, als helder geelachtig groene; deels kleine vlekken, over 't algemeen van eene ongeschikte gedaante, gevonden worden, van welken de Lezer zig beter denkbeeld kan maaken, door derzelver afbeelding, dan door eene breede beschryving daar van, welke beschryving, behalven dat, in dit geval zeer moeijelyk te geeven zoude weezen: het zy derhalven genoeg, wanneer ik aanmerk, dat langs den buitensten helder graauwachtig-geele vleugelrand, eene zachte zwarte lyn getrokken is, en door zeven zwarte helder graauwachtig geele ingeslotene vlekken, even zo cierlyk, eene gedaante bekomt, als of die rand in der daad uitgekapt ware.

De achtervleugels, die, wel is waar, mede geene uitkappingen, maar echter eenen bruin-grauw gevleekten rand heeft, zyn van eenen iet in 't bruine vallende, helder geelachtig graauwe kleur, in welken men geene vlekken, maar alleenlyk de tedere vleugel-aderen beschouwt.

## §. 19.

De kop van deeze Kapel is helder geelachtig graauw, boven met twee zwarte streepen, en naar gewoonte met twee dunne voelhoornen voorzien: haare oogen zyn graauw; haar hals en rug hebben eenen zwarten grond, waarop van vooren naar den kop, en het gewricht van den vleugel toe, een paar geelachtig wit graauwe, breede vlekken staan, tusschen welken op den rug van de Kapel, nog eene andere geelachtig-grauwe vlek gezien wordt, en welke laatstgemelde vlek vry duidelyk de gedaante van een doodshoofd vertoont, door middel van de zwarte punten die op dezelve gevonden worden; ik zwyge dat zig boven dit figuur, eene foort van deksel, en onder het zelve, een geboorden hoed schynt te vertoonen.

Haar achterlyf is bruinachtig graauw en aan iedere zyde haarer geledingen met hair begroeid: vermits ik gis dat deeze Kapel, als zy zit, haare vleugelen eenigzins dakswyze en tegen het lyf aan draagt, heb ik haar,

Fig.

Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



*Fig. 6.* in zulk eene houding afgebeeld, en wel zodanig gericht, dat ook <sup>TAB. XXII.</sup> haare pooten eenigzins te voorschyn komen: of nu de manlyke Kapel, <sup>Fig. 6.</sup> ook zulke dunne voelhoornen heeft, als deeze, (die ik voor de vrouwlyke houde,) kan ik niet stellig beweeran, noch ook voltrekt verzekeren, dat het doodenkopjen by beide geslachten even kenbaar is.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*De eenzaame, gladde, gemeen-groene Rups, welke zig op de tabakspiant onthoudt, benevens haare verandering in een Nachtvlinger van de tweede Classe, TAB. XXIII.*

§. I.

**D**at kruid en die bittere plant, om welke te bekomen veele duizen- <sup>TAB. XXIII.</sup> ten van menschen zig op de woeste zee waagen, de verstaafgelegene gewesten bezoeken, en om wier behouding en aankweeking, de zwarte Moor de heetste zonnestralen moet doorstaan; dat kruid het welk de beroemdfte Dichters bezongen hebben, ik meen de tabak, (*petum tabaci*, *S. herba Nicotiana*,) is de plant die door de Rups, welke Plaat XXIII. fig. 1. voorgesteld wordt, gewoon is, tot haar verblyf, verkozen wordt, en dat zelfde kruid, het gebruik van 't welk zig van de Wilden, tot onder de beschaafde volken uitgebreid, en by ryken en armen, by geleerden en ongeleerden, bemind gemaakt heeft, dient deeze rups mede tot een aangenaam voedsel: zichtbaar werd ik daarvan overtuigd, toen ik, twee jaaren na elkander, (de eerste maal in het begin van September, doch de tweede keer in July,) het geluk had haar op dat kruid, welks bladen zy at, echter altoos slechts eenigen, en wel die geen en die reeds genoegzaam volwasfen waren, aantetrefen: ik hield deeze Rups aanstonds voor iet zonderlings, en verplaatste haar onder myne overige kostgangers, doch bespeurde tevens weldra dat haare verzorging my niet veel moeite meer zoude baaren; want al rasch verkreeg zy haaren vollen wasdom, en naderde het tydperk haarer verandering: zy ontledigde zig binnen kort van haare vuiligheid, en groef zig, terstond daarna, onder de aarde, waarmede ik zeker glas had gevuld, op dat zy te bekwaamer zoude kunnen veranderen: aleer dit gebeurde trachtte ik echter te onderzoeken of het beestjen alleenlyk tabaksbladen ate, dan of zy, by gebrek aan deezen, ook met eenig ander kruid gevoed zoude kunnen worden: ik legde haar daarom de wel niet zo wrang, maar echter bitter *Sukerei*, (*Cichorium Silvestre*,) als mede de gelyklyk bittere bladen van den Perzikeboom voor, welke beide voedzels ook door haar

TAB.  
XXIII.

gegeten werden : dit bragt my op de gedachten of de gezegde Rups niet zo wel op deeze beide gewasfen als op den tabak gevonden zoude worden : ik doorzocht derhalven herhaalde keeren, zo wel myne Suikerei als Perzikeboomen, ja meermaals dan ik den tabak gedaan had, doch ik trof haar op geen van beiden aan; echter werd myne moeite door het vinden van weder eene andere, my tot nog toe onbekende Rups, beloond.

## §. 2.

Indien nu de eerstgemelde Rups, zig meermaals en liever, of wel met uitsluiting van alle andere gewasfen, op den tabak alleen onthoudt, is het zeer gegrond te vermoeden, dat deeze foort van Rupsfen, voor tweehonderd jaaren in *Europa* nog niet bekend geweest is, maar eerst ten tyde, dat men de tabak uit het Eiland *Tabaco*, of uit *Florida* en *Virginiën* herwaards begon overtebrengen : waarfchynelyk dat de eïeren van haaren Kappel, in eene lading van dit zo zeer geliefde kruid, even als colonisten, uit *America*, in ons werelddeel overgekomen zyn, en zig vervolgens verder voortgeplant hebben : ik kan niet zien dat de tegenwerping, ontleend van de verandering van gewest, in staat zoude weezen, om myne gisfing ten deezen opzichte krachtloos te kunnen maaken, daar men weet dat de tabak by ons niet minder dan in *America*, (offchoon niet zo fmaaklyk en goed,) aangekweekt kan worden : intusfchen hebben de beminnaars van den tabak geen reden van klaagen over myne ontdekking van eene Rups die hun zo zeer bemind kruid fchadelyk is, daar die foort van Rupsfen op verre na niet in zo groot eene menigte te voorfchyn komt, dat men voor eene ongemeen hoogen prys van den tabak zoude behoeven te vreezen, 't welk zekerlyk te duchten zoude weezen, zo deeze myne Rups, zo veelvoudig voorkwame, als die van een onderfcheidene foort, (welke ik kortlings, hoewel ook meermaals op andere gewasfen,) op den tabak aantrof : de Heer RÖSEL, die echter een goed gedeelte van zyn leven met het navorfchen van de gefchiedenis der Infeften heeft doorgebracht, roert in zyn werk de tabaksplant in 't geheel niet aan; waarom hem deeze foort van Rups volftrekt onbekend gebleven is, en hy ook op den tabak geene Rups ontdekt heeft \*.

## §. 3.

\* Ik heb, wel is waar, behalven deeze Rups, nog twee andere foorten ontdekt, ééne van welken, nog jong zynde, ik tevens op andere gewasfen aangetroffen, en voor die geene gehouden heb, welke door den Heer RÖSEL in zyn eerste Deel, onder de nachtvinders van de tweede clasfe (*Tab. XLVIII.*) afgebeeld is : de andere was de zogenaamde groote Windrups, ook in het gemelde eerste Deel van den Heere RÖSEL, onder de Nachtvinders van de eerste clasfe (*Tab. VII.*) en in het derde Deel (*Tab. VI. fig. 3*) voorgefteld : deeze echter gebruikte geen voedsel meer, wegens haare nabyzynde verandering, en liet my derhalven in de onzekerheid, of zy zig met tabak voedde, dan of zy flechts by toeval daarin gekomen ware.

## §. 3.

De gedaante van onze Rups, nu byna haaren volkomenen wasdom verkregen hebbende, kunnen wy op Plaat XXIII, *fig. 1.* zien; dan haare grootte in haare jeugd, kan ik, zonder slechts gissingen te schryven, niet bepalen, aangezien ik haar in de eerste dagen haars levens nooit te zien gekregen heb: haare lengte was 1½ duim; zy is geene der dunsten, zeer glad, van eenen bleeken of gemeen-groenen kleur, en komt dikwyls als vlekachtig voor, ter oorzaake dat haare ingewanden door haar huid heen schynen; op dat men my echter niet zoude beschuldigen van eenige onwaarheid in de afbeelding, moet men weten, dat ik de schoonste van de beide Rupfen die my ten deele vielen, en die geen vlekkege huid had, daartoe heb verkozen.

TAB.  
XXIII.  
Fig. 1.

Haar glanzige geelachtig-bruine kop, is van boven wel rond; maar zo als zulks by alle andere Rupfen plaats heeft, in twee deelen gedeeld, welke deelen van voren over den bek, wyder van één wyken, en eene driehoekige ruimte beslaan: behalven twaalf oogen telt men op haaren kop, twaalf zeer kenbaare afgedeelde geledingen, die in 't midden dikst zyn; en over den rug loopt, een eenigzins donker-groene, lyn, die zig somtyds wat roodachtig vertoont, en welke men in eene bestendige op- en afloopende beweging ziet: de Heer FRISCH \* nam daaruit oorzaak van te gelooven, dat die lynen de polsaderen van de Rups verbeeldden; de Heer RÖSEL † hield ze echter voor derzelver maagen, aangezien hy eers by de ontleding van een Haagvorsch eene dergelyke beweging, of *Motum peristalticum*, aan derzelver maag meent waargenomen te hebben: beide gissingen, en of deeze beweging mogelyk niet veeleer die der hersenen zy, laate ik, tot nadere ondervinding, onbeslist. De geledingen zelve zyn over den rug meestendeels bezet met etlyke kleine, fyne, zwarte punten, (die wegens hunne kleinte in het kleuren der afbeelding niet wel aanteduiden waren,) doch de eerste geleding heeft van boven eene iet bruinachtige vlek, en op iedere zyde, vlak onder de luchtgaten, ziet men een helder-geelachtig groen boordfel, welke echter op de eene plaats meer zichtbaar is, dan op de andere. De negen luchtgaten, die aan hunne gewoone geledingen kenbaar zyn, vertoonen zig by eenigen deezer Rupfen geheel zwart, en hebben van boven eene gekromde dwarslyn; by anderen zyn zy als met wit en zwart ingevatte ovaale punten.

De

\* Beschryving van allerlei Insecten, 7 Deel, Bladz. 15.

† Historie van de Kikvorschen en Padden deczer landen. 2de Afdeeling Bladz. 52. Tab. XII.



TAB.  
XXIII.

De voorpooten zyn geelachtig glanzig groen, de overigen echter zyn van kleur als het lyf: in het kruipen is deeze Rups ongemeen langzaam, gaande het zelve op deeze wyze toe: zy zet vooreerst de beide nafschiifpooten voorwaards, brengt vervolgens de vóór- en overige pooten in beweging, en rukt daarmede zo ver voorwaards aan, als zy haare nafschiifpooten uitgestrekt heeft: als zy valt, of sterk behandeld wordt, rolt zy zig geheel zamen, en blyft in die houding zo lang, tot zy gelooft geene hinderpaalen meer in haare nabyheid te hebben; waarna zy haaren langzaam tot weder voordzet.

§. 4.

Den 7 September des jaars 1762, begon myne Rups haare merkwaardige verandering: ten dien dage ontdeed zy zig van haare innerlyke onzuiverheid, betrok ten gelyken tyde haar winterkwartier, onder de aarde, en bereidde zig uit een, met haar weefzel vermengde, sponsachtige aardkluit, zulk een verblyf, als wy onder *Fig. 2.* vertoonen: in het zelve veranderde zy niet eer tot een popjen, als in de naderende lente des jaars 1763; toen zy haaren huid achter zig afstreek, en een popjen werd, dat eerst groen was, maar daarna rood-bruin, en eindelyk byna geheel zwart en glanzig werd: *Fig. 3.* vertoont ons het zelve, benevens de afgestroopte huid, en doet ons tevens waarneemen, dat het met de diklyvigheid van deszelfs Rups overeenkomt: voor 't overige is dit popjen, ten opzichte van zyne gedaante, even als dat van andere Rupfen deezer Classe, en heeft alles wat een popjen hebben moet: op de laatste geleding van haar achterste, vertoonen zig, in plaats van den steelpunt, twee eenigzins groote, en een paar zeer kleine kromme haakjens, die men, door het vergrootglas, ten duidelyksten kan zien: door middel van deezen houdt zy zig in haar aardkluit, en beweegt zig, doch nu alleenlyk met haar achterlyf, in het zelve, wanneer zy eenige aanraaking gewaar wordt: deeze beweging is in den beginne heviger, dan wanneer de Kapel reeds haare volwassenheid heeft bekomen.

§. 5.

Zes weeken waren genoegzaam voor de rypwording van het popjen; na verloop van deezen had ik, den 29 Mei, het vergenoegen, van de Kapel, met nog zeer korte vleugelen, uit de aarde te zien voordkomen, en naar de hoogte te zien stygen; aldaar hechte zy zig met haare pooten zodanig vast, dat zy haare over elkander geslagene vleugelen, (die zeer vochtig scheenen te weezen,) zo lang liet afhangen, tot zy hunnen vollen wasdom verkregen, en gedroogd zynde, de vlugt konden wederstaan, al het welk in een half uur geschiedde; daarna sloot zy haare vleugelen  
kruis-

kruiswys over elkander, en droeg dezelfen plat boven het achterlyf, der-<sup>TAB.</sup> halven niet dakswys zo als andere Kapellen gewoonlyk doen: aan haaren <sup>XXIII.</sup> zuigsnavel ontdekte ik een dropjen vochtigheid, dat vry zeer naar water geleck, en 't geen haar by het uitkomen, waarfchynelyk, zal gediend hebben, tot doorweeking van de aardkluit.

## §. 6.

Daar nu deeze Kapel geene der onaanzienlykften is, zo verdient zy ook eene nadere en opmerkzaamer waarneeming, waartoe haar vliegende ftand, de bekwaamfte zal weezen: ik verkies by haare voorvleugelen te beginnen: deezen zyn niet uitgekapt, en hebben, over 't algemeen befchouwd, een donker bruine, of katanje-kleurigen grond, waarin men vooreerst, naar den buitenften rand toe, twee heen-en-weder loopende zwarte lynen ziet, binnen welken men een eenigzins helderder bruine ruimte, dan de grond van dezelfen befpeurt; en nevens dezen, twee andere dergelyke, doch niet uit elkander, maar digter zamen loopende lynen. Zo ziet men van het gewricht des vleugels, tot over het midden van denzelven, digt naar vooren van den rand, een helder, okergeele, langwerpig vlek, die met den grondkleur vermengd is, en achter zig, en tusfchen de vleugeladeren nog eene kleine zwarte vlek; op deeze echter nog twee anderen, (als een kleine bruin-achtig graauwe, en een groote zodanige, die ongelyk, en byna maanswyze, met helder-oker-geel ingevat is,) welke vlekken, derhalven, wegens haaren helderen kleur, op een donkeren grond, onze Kapel een tamelyk goed figuur doen maaken.

## §. 7.

De achtervleugelen zyn op dezelfde wyze glanzend, en van een helder graauwachtigen geelen kleur, die met zachte bruinachtige aderen doorweven, en voor den buitenften onuitgekaptten rand, met een donkergraauwe ftreep omgeven is.

De kop van de Kapel, de baardspitfen en de halsbanden, (indien ik dus mag fpreeken,) die zyne beide fchouderbladen bedekken, zyn van eenen graauwen met oker-geelgemengden kleur; de oogen zyn intusfchen donkerbruin; de zuigsnavel, dien zy, denzelven niet gebruikende, zamenrolt, is bruin-achtig geel, en de beide haardunne voelhoornen, zyn bruin: de kleur van den rug komt echter met dien van de vleugelen overéén, en zyn katanje-bruin: naar het einde van den rug, is zy met geelachtig graauwen hairen bewafen: deeze leggen over het op dezelfde wyze met bruinachtig graauwe haartjens bedekte achterlyf.

## §. 8.

## §. 8.

TAB.  
XXIII.

Ik noem het met reden een ongeluk, dat ik geen manlyke Kapel van deze foort heb kunnen bekomen; want die welken my geboren werden, waren wyfjens, 't geen uit haar dik achterlyf te befluiten was.

Ik kan derhalven niet verzekeren, of het mannetjen voelhoornen van dezelfde gedaante heeft als het wyfjen; indien ik in het toekomende des-aangaande eenige ondervinding bekom, zal ik niet nalaten, daaromtrent myne aantekeningen te houden.

## §. 9.

Fig 5.

De zittende ftand van deze Kapel is onder *Fig. 5.* te befchouwen: vermits zy nu met geflotene vleugelen afgebeeld is, komen hunne bruine en oker-geel gevlekte, en, volgens den aart der Nachtvinders, met punten bezette pooten, meestendeels ten voorfchyn.

Daar deze Kapel met recht onder de Nachtvogelen geteld mag worden, zal zy waarfchynelyk alleenlyk des nachts vliegen; vermoedlyk zo wel om te paaren, als om haar voedsel te zoeken: dit voedsel beftaat voornamlyk in bloemen, welken eenige zoetigheid bevatten; het geen ik daaruit befluit, dat daar zy, alfchoon met een naald doorftoken zynde, echter nog zulk eene begeerte na eenige vochtig gemaakte fuiker, welke haar voorgehouden werd, toonde, dat zy haar zuigfnavel zeer verre naar dezelve uitftrekte, en deze vochtigheid gretig naar zig nam, ja zelfs, toen ik de fuiker van haar verwyderde, haare ontevredenheid daarover door het heen- en weêr-draajen van haaren fnavel liet blyken, en zo dra ik dezelve haar weder voordiende, zo lang daar aan zoog, tot zy haare begeerte daarnaar voldaan had; waarna zy haaren fnavel voornoemd weder in den zamengerolden ftand bragt.

Daar ik het voords der moeite waardig achtte gezegden fnavel door het vergrootglas te befchouwen, zag ik door middel daarvan, het fuikerachtig fap door deszelfs kanaal zeer natuurlyk in de hoogte fteigen.

## §. 10.

Fig. 6.

Het geen my echter een bewonderend vergenoegen verfchafte, was, dat na eenen tyd van agt dagen, deze doorboorde Kapel, nog veele ronde kleine mat-geele eiëren, gelyk *Fig. 6.* vertoonend worden, lag: daar ik zulks nu voor eene meermaals gewenschte gelegenheid aanzag, om myne reeds

reeds gedaane ontdekkingen, wegens de zaaddiertjens in de vochtigheid der eiëren van Insecten te herhaalen, en wel verzekerd was dat deeze eiëren niet bevrucht waren, bragt ik dezelve onder een zogenaamd zamengeftelde, en uit een buis bestaand *Microscopium*, ten einde vooreerst hunne uitwendige gedaante, gelyk ik tot nog toe omtrent alle eiëren van insecten gewoon was te doen, te onderzoeken: hierdoor ontdekte ik dat deeze eiëren niet overal gelyk, maar boven eenigzins dieper, en van veele insnydingen of afdeelingen, over welken kleine dwarsgroeven lagen, voorzien waren.

De juiste gedaante van zulk een ei, genoegzaam vergroot, wordt den goedgunstigen Leezer, onder *Fig. 7.* aangeboden.

*Fig. 7.*

By myne eerste ontdekking van dergelyke verdiepte insnydingen op insecteneiëren, heb ik, wel is waar, verzuimd dezelve te tellen; en was een geruimen tyd in de meening, dat deeze verdiepingen veroorzaakt werden, door de geledingen van de in de eiëren verborgene Rupfen, en dat derhalven eene en andere evenveel in getal moesten weezen; maar de volgende ondervinding toonde my meer dan dertig dergelyke verdiepte indeelingen aan zulk een ei, en derhalven zo veele dat de oorzaak derzelven in geenen deele in de geledingen der Rupfen gezocht kan worden; te meer daar ik bovengedachte insnydingen reeds eer waarnam, dan men uit de stoffe van een ei eene Rups konde kennen.

#### §. II.

Wat nu eindelyk myne herhaalde waarneeming aangaat; ik heb, echter door middel van een ander daartoe dienftig *Microscopium*, in het vocht van deeze eiërtjens, dikwyls zaaddiertjens ontdekt, van welken ik by eene nadere gelegenheid omftandiger zal handelen.

Voor 't overige gis ik dat de Kapellen haare eiëren slechts alleenlyk aan de tabaksbladen hechten, en de jonge Rupfen, na verloop van veertien dagen of drie weeken, daaruit te voorschyn komen; dat als de eiërtjens vroeg in de Lente gelegen worden, de Rupfen in July, (als de eiëren laater gelegen worden, ook later,) haaren vollen wasdom verkrygen, terwyl zy intusschen niet meer dan éénmaal in 't jaar ten voorschyn zullen komen,



*De gladde, helderbleek flecht-bruinachtige Rups, met een  
 grauw-bruinen, en met zwart getekenden kop, een bruin-  
 grauwen Rug, en zy-streepen; benevens haare  
 verandering in een Nachtkapel van de  
 tweede Clasfe. TAB. XXIV.*

§. 1.

TAB.  
XXIV.

De Rups welke den Leezer op deeze Plaat, onder *Fig. 1* en *2.* volgens haare natuurljke gedaante, voorgesteld wordt, houde ik voor dezelfde, die reeds door den Heer RÖSEL, in zyn 3de Deel Tab. LXXI. *Fig. 2.-11.* gegeven, en Bladz. 431. beschreven is, onder den naam van, *Rups, op de zuuringplant leevende, glad en vleeschkleurig, met groene en zwarte afgebrokene streepen, behoorende tot de tweede clasfe der Nachtylinders; benevens haar poppen*: volgens zyn verhaal heeft hy de- zelve op de zuuringplant gevonden, haar ook met die plant gevoed, en ge- zien dat zy zig na verloop van drie dagen in de aarde verschool, en haar vervolgens na nog vyf dagen wedergevonden, onder een gewelfzel, door haarzelve, zonder behulp van eenig spinfel, vervaardigd, als een rankig poppen, oranje geel van kleur, en aan het einde van zyn laatste geleding, met twee hairspitsjens voorzien; doch een Kapel heeft hy 'er niet uit ge- kregen: tusschen deeze zyne Rups, en de myne, vertoont zig, wel is waar, ten opzichte van de kleur, (de tekeningen welken by deeze Rup- sen zelden veel verschillen, uitgenomen,) eenig onderscheid; want geene is vleeschkleurig, doch de myne valt meer in het bruine; dan, zulks moet niemand vreemd voorkomen, aangezien ik onder drie Rupfen, welken my niet in July, maar eerst in September, van het jaar 1762, ten deele vielen, en ook, even als die van den Heere RÖSEL, op een zuuring- plant zaten, mede een vleeschkleurige aantrof, die zonder verder eenig voedsel te nuttigen, terstond tot haare verandering onder de aarde over- ging; die ook, ten opzichte van het poppen, en alle andere verdere om- standigheden, volmaakt overeenkwam, met de bovengemelde van den Heere RÖSEL; hoewel zy echter, na haare verandering, geen andere Kapel dan beiden de overigen voordbragt: dit, hoop ik, zal een toereikend bewys opleveren, daarvan, dat ik my niet vergis, wanneer ik de meer- gemelde Rups van den Heere RÖSEL, met die welke ik mynen Leezer hier vertoon, voor eene gelykfoortige opgeef, offchoon zy in kleur van el-

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



elkander verschillen: dat de Heer RÖSEL de zyne een geheele maand <sup>TAB. XXIV.</sup> vroeger gevonden heeft, dan ik de myne gevonden heb, maakt ook myne Rups tot geene andere soort; want niettegenstaande ik haar in het laatstleden jaar eerst zeer laat gekregen hebbe, vond ik echter in het jaar 1763 eene andere, veel vroeger dan hy, naamlyk, reeds den 8 Juny, ook op een zuuringplant, waaraan zy knaagde, (hoewel nog vóór haare laatste verhuiding,) terwyl zy reeds haar vollen wasdom verkregen had, en zo groot was als die van den Heere RÖSEL: of nu ook de Kapel van deeze Rups, reeds in de maand July in een poppen veranderd, nog zal voordkomen, moet de tyd leeren.

Even weinig kan ik verzekeren of myne Rups van haare jeugd af dezelfde gedaante en kleur gehad heeft; echter is zulks wel te vermoeden; vermits ik op de zuuringplant, naast deeze Rups, eene andere gevonden heb, die zeer klein, en met kleine eiërtjens, (wier uitbroeding haaren spoedigen ondergang veroorzaakte,) bezet en, ook even als de groote getekend was.

## §. 2.

Maar laat ons overgaan tot de beschouwing van *Fig. 1.* alwaar wy deeze Rups zien, zo als zy zig slechts na haare tweede verhuiding, en tot aan haare derde voordgetroeid, vertoont: in myne beschryving hiervan kan ik tusschen *Fig. 1* en *2.* geen ander onderscheid opgeeven, als dat de eerste, ten opzichte van den kleur, nog bruinachtig-grauwer, en donkerder; en ten opzichte van de gedaante, nog iet kleiner en minder diklyvig dan de andere schynt te wezen; want van tekening zyn deeze beide figuren volkomen gelyk: in plaatse derhalven van myn waarden Leezer, met eene breedere beschryving optehouden, zal ik de derde verhuiding der Rups nauwkeuriger beschryven: deeze heeft zig dan op de volgende wyze toegedragen:

Zodra zy de grootte van *Fig. 1.* verkregen had, wilde zy geen voedsel meer gebruiken, maar onthield zig den meesten tyd onder de bladen van de zuuringplant, zonder eenige beweeging en uitgestrekt, verborgen; daarby werd zy aan haar' kop en het voorste gedeelte van haar lyf zodanig dik, dat zy gezwollen scheen te wezen, en eindelyk borst niet alleen haar huid, boven aan het voorlyf, maar ook tornde het vel van den kop geheel van denzelfen en van den romp af, en de Rups streek toen haar oude huid in twee minuten achter zig heen: daarop verscheen zy in haar nieuw gewaad, ('t welke vooraf reeds onder het oude aangegroeid was,) met een eerst eenigzins helderen, geelachtig grauwen, nog onge-

TAR.  
XXIV.

tekenden kop, dikke pooten en een eenigzins helder lyf: niet lang daarna werd zy donkerder, haar verlorene eetlust kwam weder, en, om kort te gaan, zy verkreeg eindelyk de grootte en gedaante als onder *Fig. 2.* volgens welke zy, volwasfen en uitgestrekt zynde, byna de langte van  $1\frac{1}{2}$  duim heeft.

Vermits ik myne Rups nu onder *Fig. 1.* reeds uitgestrekt voorgesteld heb, en zy, in rust zynde, zulk een houding aanneemt, dat zy het vóórlyf na het achterlyf toe kromt, heb ik haar in de tweede figuur als zodanig voorgedragen.

## §. 3.

Haar kop is eenigzins groot, glanzig, en helder-bruin; om haar voorhoofd heen loopen twee zwarte streepen, onder en tusfchen welken zig nog een kleiner vertoont, benevens het gewoone getal van oogen: haar lyf is thans eenigzins dikker dan voorheen, en de kleur van haar vel over 't algemeen, iet helderder, vallende in het helder-bruinachtige; zy heeft ook eenen kleinen glans, ter oorzaake van haare dikte, en gladheid.

De eerste geleding vertoont ons van boven een bruinachtige, glanzige, en met zwart getekende vlek: van deeze eerste geleding tot over de laatste, zien wy, over het midden van den rug, een zo dunne en zo dicht zamengevoegde, dubbelde, donkere lyn, dat zy naauwlyks meer dan eene enkelde fchynt te weezen; naast dezelve ftaan op iedere geleding vier kleine zwarte punten; door eenige van deeze punten loopt, aan iedere zyde van den rug, eene golfswyze donkere lyn, op welke voords een helder-bruinachtige, zig onder naar de luchtgaten toe ftrekkende, en weder door een dergelyke lyn ingeflotene ruimte, volgt, waarna de iet donkere grondkleur van de Rups te voorschyn komt, in welke zig de negen luchtgaten, aan de gewoone geledingen, als zwarte ovaale punten, vertoonen: beneden deezen, is onze Rups aan iedere zyde van het lyf, met een helder-geelachtig graauw borduurfel versierd, en een zelfde kleur heeft ook de onderste zyde van het lyf.

De zes spitse voorpooten zyn glanzig geelachtig bruin, de overigen echter zyn van kleur als de Rups zelve, alleenlyk met dat onderscheid, dat zy van onderen met zwart ingevat zyn.

## §. 4.

Tot het kruipen gebruikt zy veel tyds, en om te rusten zyn de fchaduwe.



duwachtigste plaatfen haar de liefste, het welk de reden is, dat men haar zelden te zien krygt, vermids zy zig veel meer onder dan op de bladen van de zuuringplant bevindt: onder de gezellige soorten van Rupsen kan zy derhalven niet betrokken worden; gelyk ik haar ook altyd slechts in de eenzaamheid en alleen heb gevonden: zy kan niet wel verdraagen dat men haar betaste; zo dra men haar te na komt rolt zy zig op, gelyk wy haar op Plaat XXIII afgebeeld hebben, en zo als zekere andere hairige Rupsen doen, en blyft zo lang in dien stand, tot zy geene verdere veront-rusting meer vermoedt.

## §. 5.

De zulken van deeze Rupsen, welken ik in de herfst gevonden heb, gingen ook nog in den herfst tot haare verandering onder de aarde over, na zy zig, volgens gewoonte, van haare onzuiverheid gereinigd hadden: zy bereidden van de aarde, een hol, en van binnen zo veel mogelyk glad, verblyf, dat van buiten wél gesloten was (*Zie Fig. 3*); dit maakten zy door kleine worteltjens en een zeker kleverig vocht (dat zy, hoewel spaarzaamlyk, uit een wrat, die zy onder haar bek hebben, uitpersten) nog hechter, entot het oogmerk bekwaamer; in dit verblyf, veranderen de gemelde Rupsen die laater gevonden worden, niet zo spoedig tot pop-jens, als die geenen welken men in Juny en July vindt, en wie het, ten dien tyde gewoone warme weêr, niet weinig te stade komt, ter vorminge haarer leden, en derzelver ontwikkeling, waarom dezulken ook gemeenlyk na vyf dagen reeds veranderen: deeze laate Rupsen hebben dan een langer tyd noodig, en blyven geduurende den gantschen winter door Rups, maar eenigzins dik opgezwollen, en met een naauw samengetrokken lyf; met dat al blyven zy ook, onmagtig om het minste voedsel te gebruiken, onveranderd liggen, tot dat de Lente, en het zachte weêr, haare aannaderende verandering bevorderen.

## §. 6.

Den 4 Maart van het jaar 1763 opende ik zeer voorzichtig, één der winterverblyven van myne Rupsen, om 'er het popjen, ter afbeeldinge, uit te neemen: maar ik vond, in plaats van het popjen, de Rups zelve, die wel nog leefde, maar echter onmagtig scheen: het geen ik nog meer bewonderde was, dat zy al haare krachten verzamelde, zig weder op de pooten begaf, en terstond bezig hield met de gemaakte opening weder te stoppen, het geen tamelyk zwak te werk ging, echter volbragt zy deezen haaren arbeid gelukkiglyk, zonder haare verandering te benadeelen; eene verrichting, waarlyk, die meer dan eene loutere werktuiglyke beweeging ten grondslage heeft: maar ook gesteld, de Rups handelde in

TAB.  
XXIV.

deezen slechts werktuiglyk, en men wilde dit anders zo gering geacht ſchepſel, alle begrip, inbeeldingskracht, en het vernuft ontzeggen, ja haar alleen houden voor een zo kunitig en ſyn ſtoflyk zamenſtelfel, op het welke de uitwendige perſing van de lucht, van het licht, en van het geluid, enz. zodanig werkte, en het in zulke beweging konde brengen, dat zy ſcheene willekeurig te werken, zo zoude zulke eene dierlyke machine, evenwel nog groote, ja grootere bewondering verdienen, dan het grootſte en aanzienlykſte voordbrengzel der kunst; om dat het, na zulke eene merkelyke verandering haars werktuig gelykende ligchaams, (als de verandering tot een popjen naamlyk,) echter haar reeds voor lang volbragt bouwſel, dat nu slechts een weinig beſchadigd is, om zo te ſpreken weder van nieuws af aan kan beginnen, de beſchadigde plaats ontdekken, en de verbetering in 't werk ſtellen, zonder daardoor iet aan haare overige werktuiglyke bedryven te benadeelen; maar is iet dergelyks wel van een bloot dierlyk werktuig te verwachten? en zoude wy alle zwaarigheid in deezen te boven komen, zo wy de dieren begrip, inbeeldings en oordeel kracht en geheugen volſtrekt ontzegden? zou niet veel eer een voortreffelyke REIMARUS, ons op zyne zyde trekken, en zouden wy hem niet gelyk moeten geeven, als hy zegt: „ Dergelyke voorbeelden toonen overtuigend, „ dat de dieren een bepaald model van hunnen arbeid in hun hoofd hebben, en het afwykende, of verſtrooide naar zulk een voorschrift veranderen, en tot zamenſtemming brengen; gevolgelyk, dat zy niet, als enkele werktuigen, aan hunnen zekeren arbeid bepaald zyn? — Inderdaad onze Rups heeft zig in voorverhaalde werking, meer kunitig dan werktuigelyk getoond; waarom ik het liever houde met den gemelden Heere REIMARUS, (die in zyn nuttige waarneemingen over de drijfden der dieren, hoofdzakelyk echter over hunne kunst-drijfden, deeze onvernunftige ſchepſelen, voor 't minst zo veel deels aan het verſtand geeft, als zy tot hunne dierlyke verrichtingen noodig hebben,) dan met den anders grooten CARTESIUS, of andere, met voorgemelde gevoelens ſtrydende denkers: indien ik intuſſchen myn onderzoek meermaals hadde willen herhaalen, zoude myne Rups zekerlyk te ver verzwakt, en voor de verandering onbekwaam geworden zyn.

### §. 7.

Om my nu niet van myne Kapel, waarop ik zulke eene groote hoop gevestigd had, geheel te berooven, begroef ik de Rups weder zorgvuldiglyk onder de aarde, en zag niet eer weder na haar om, als in de maand van Mei, toen ik, tot myn grootſte genoegen, een popjen vond, zo als onder *Fig. 4.* afgebeeld is, achter welk de afgeſtroopte Rupsenhuid nog lag, die by het aanraaken nog eenige beweeging maakte; wel is waar, zy zag 'er

*Fig. 4.*

'er niet zo lenig uit, als de Heer RÖSEL haar in zyn 3 Deel. *Tab. TAB. LXXI. Fig. e. 12.* voorstelt, maar het kan weezen, dat daar myne Ka-<sup>XXIV.</sup>pel alleenlyk vrouwlyke Kapellen voordgebracht heeft, dat uit de andere mogelyk een manlyke zoude geboren zyn geworden; en dat derhalven dit onderscheid alleenlyk door de verscheidenheid van het geslacht veroorzaakt wordt.

Behalven dat schein zy, met betrekking tot haar zeer sterken glans en geelbruinen kleur, veel overeenkomst te hebben met dat popjen, 't welk ik op *Tab. XVII.* van deeze myne Bydraagen heb voorgesteld; want niet alleen zyn haare ledemaaten en luchtgaten zeer kenbaar; maar zy heeft ook nog aan die plaats, alwaar het gewricht van de scheiding des vleugels, en de oogen, door de schors van het popjen heenschynt, een klein zwart vlekjen; ja indien het voorste gedeelte van den rug, niet een weinig hooger, en de plaats der voelhoornen, niet wat naauwer ware, konde iemand die dit vond, het zeer gemaklyk voor het andere neemen: by het annaderen van den tyd waarin de Kapel zoude uitkomen, werd dit popjen donkerder en bruiner, en toonde, door de scheiding der vleugelen, de aderen derzelve zeer duidelyk aan.

Op de laatste geleding, naar achteren toe, heeft dit popjen in plaats van een steelfpits, twee lange gekromde haakjens, (welken nog twee kleinen naast zig hebben,) die het in zyne verblyfplaats tot vasthouden en beweegen moeten dienen.

### §. 8.

Omtrent het einde van de maand Mei, kwamen twee Wyffens kapellen te voorschyn, zulken naamlyk als onder *Fig. 5.* vliegende, en onder *Fig. 6.* *Fig. 5. 6.* in eene zittende houding, (uit welke haare wyze om de vleugels te draagen is afteneemen,) vertoond worden; ik beken dat myne verwachting, op veel schooner Kapellen, indedaad door de uitkomst niet bewaarheid werd; want zo wy haare gedaante en kleur in 't oog houden, schynen de onuitgeschulpte voorvleugelen helder-geelachtig flecht bruin te zyn, doortrokken van veele sterke aderen, wier tusfschenruimte menigmaal als donkerbruin voorkomt.

De achtervleugelen hebben mede geene uitkapsels, en eenen flechten in 't bruinachtig graauwe vallenden kleur; ook geene zo sterke aderen als de voorvleugelen: haar kop, dien zy eenigzins naar de laagte draagt, is, benevens den rug, die aan den halskring slechts iet of wat bruin getekend is, zo wel als de pooten en de voorvleugelen, van eenerleien kleur.

Haa-

TAB.  
XXIV.

Haare oogen zyn zwartachtig, en de zuigshavel geelachtig-bruin; de dunne voelhoornen, slecht helder-bruin, doch haar dikker achterlyf bruinachtig graauw: voor het overige hoop ik dat myne waardste Leezers, geen misnoegen zullen opvatten tegen de onaanzienlyke gedaante van deeze Kapelle, en my het uitgeeven van dezelve ten beste willen houden: hoe zouden wy het schoone weten te waardeeren en te beoordeelen, zo het onbehaagelyke ons onbekend bleee? uit de tegen elkander strydende begrippen, ontvangen wy een te duidelyker denkbeeld van beiden.

Van de eiëren deezer Kapellen kan ik niets aantekenen, alzo ik geenen van haar heb bekomen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Twee soorten van Span-rupfen, tot de derde Clasfe der Nachtvlin-  
ders behoorende, met haare verandering; bene-  
vens een Span-kapel van dezelfde Clasfe:*

Tab. XXV. en XXVI.

§. I.

TAB.  
XXV.

**D**e Kapel die wy op onze XXV Plaat onzen Leezer mededeelen, behoort, wel is waar, zo veel minder onder de zeldzaamen gerangschikt te worden, als zy gemeener en bekender is; want de Natuur stelt dezelve tweemaal ieder jaar op haar overschoon tooneel ten toon; de eerste keer naamlyk in de aangename lentedagen, gemeenlyk in de maand van Mei; en de tweede keer tegen het einde van den Zomer, bepaaldlyk in Hooimaand: haar verblyf is ook zeer gemaklyk te ontdekken, want by iedere wandeling kan men haar op de groene velden ontmoeten; en zo wel des nadenmiddags als in de nachtyke uren bezig vinden met het vocht uit de zoetste bloemen te zuigen; des niet tegenstaande schynt het dat de Rups, aan welke zy haar bestaan te danken heeft, voor verscheidene Natuuronderzoekeren verborgen is gebleven, vermits ik in hunne schriften geene melding desaaangaande gemaakt vinde: ik heb het derhalven voor een geluk gehouden dat deeze tot nu toe nog onbekende Rups, my, onverhoopt, in handen gekomen is: dit gebeurde op den 22 Juny des jaars 1762, toen ik op zeker veld verscheidene voedsels voor eenige andere Rupfen zocht: by deeze gelegenheid werd myn oog getroffen, door een paar bruinachtig gestreepte Rupfen, die bezig waren met aan de bladen van de gemeene klaver, (*Trivolio*,) te knaagen: zy scheenen my terstond toe nog onbekend te zyn, en myn genoegen vergrootte nog, daar ik onder de  
bla-

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 9.



Fig. 8.



Fig. 10.



bladen van de klaver, nog eenige anderen ontdekten, welken reeds byna haaren volkomenen wasdom bereikt hadden: in de maanden Juny en September des volgenden jaars, heb ik nogmaals van deeze soort van Rupsen gevonden, zo wel die reeds volwasfen waren, als anderen vóór haare laatste verhuizing; in dit tydperk van haar leven, hebben deezen echter met de volwasfenen eene zelfde gedaante: de Kapellen van die geen en welken ik in de maand Juny gevonden had, kwamen reeds in July ten voorschyn; daar in tegendeel de anderen, die ik in September gevonden had, eerst in liet affopen van den winter, en wel in Mei des volgenden jaars, voor den dag kwamen — hieruit blykt onwederfprekelyk dat deeze soort van Rups, met haare Kapellen, gewoon is tweemaal 'sjaars te verschynen; om die reden noemde ik haar,

TAB.  
XXV.

§. 2.

De bruinachtig geele, bruin gestreepte *gladde* Spanrups,  
*met veertien pooten, behoorende tot de* Nachtvinders  
*van de derde Clasfe.* Tab. XXV. Fig. 1. en verv.

Onder Fig. 1. 2 en 3 zien wy drieërleie houdingen, en drieërleie kleuren van deeze onze nieuwe Rups: haare lengte gaat niet boven de 1<sup>ste</sup> duim, en haar lyf is noch dik noch leenig, offchoon zeer goed geproportioneerd: haar kop is met de voorste geleding des lyfs, byna van gelijke dikte; dezelve is eenigzins spitsachtig, niet afgedeeld, en is van denzelfden grondkleur als het lyf, welke kleur volgens Fig. 1, sterk in het geele valt; volgens Fig. 2. helder, en volgens Fig. 3. byna die van zand is: haare beide zyden verkrygen door eenige aartige donkerbruine streepen, welken van het midden des voorhoofds, tot aan den bek, een helder driehoekig open laten, een zonderling cieraad en een tamelyk bevallige gedaante: haar bek is helder, en voorzien met een donkerbruin gezicht: beide zyden van den kop, zyn, zo wel als die van andere Rupsen, voorzien van kleine oogen, die echter niet duidelyk gezien kunnen worden, dan door middel van een goed vergrootglas.

TAB.  
XXV.  
Fig. 1.  
2 en 3

§. 3.

Het lyf van deeze Rups is wel niet zo styf als dat van andere, denzelfden naam voerende, naamlyk Spanrupsen; maar eenigzins vleesachtiger, evenwel is het zo als by alle soort van Rupsen plaats heeft, zamengevoegd uit twaalf geledingen, welken ter plaatse alwaar zy zamenkomen, maar eene geringe diepte maaken, verscheidene tedere plooitjens hebben, en naar achteren toe, op zyn dunst eindigen: door het midden van de

Z

rug-

TAB.  
XXV.

ruggen deezer geledingen heen, loopt in een eenigzins heldere ruimte, welke eigenlyk uit drie geheel tedere lynen bestaat, doch die, oppervlakkig beschouwd maar een eenige lyn schynen te wezen, van vooren naar achteren, een dunne donkere lyn, die aan iedere zyde van den rug eene andere, eenigzins donkerbruine, mede van vooren naar achteren begeleidt: deeze lyn is intusschen aan alle Rups tot deeze foort behoorende niet even duidelyk zichtbaar; maar dikwyls zo dof en dun, als wy onder *Fig. 3.* hebben trachten te vertoonen; gelyk dan ook die puntjens, welken, (*Fig. 2.*) onder aan het lyf gevonden worden, niet aan allen zyn, blykens *Fig. 1* en *3*; want by deezen ziet men in de plaats van deeze puntjens slechts een doffe lyn, van welke lyn by *Fig. 2.* intusschen geheel niets gezien wordt: de negen luchtgaten, staan by deeze Rupsen ook op hunne behoorelyke plaats, naamlyk van onderen op iedere zyde van de eerste geleding één; de overige agt, staan als kleine ovaale zwarte punten, van de vierde tot de elfde geleding, gelyk *Fig. 3.* duidelyk aanwyst, zynde dezelve aldaar, door andere deelen, niet zo zeer verduisterd en onkenbaar gemaakt: eenige van deeze Rupsen, zyn ook met een schoon helder geel zyboordzel versierd, 't welk boven, alwaar de luchtgaten zyn, met een zeer dunne donkere lyn bezet is, doch onder aan den buik is hetzelfde in donker bruin ingevat: dit boordzel schynt niet by allen geel te wezen; by *Fig. 2.* is het volstrekt niet, en *Fig. 3.* alleenlyk helder bleek bruin.

#### §. 4.

Met betrekking tot haare zes spitsachtige klaauw-pooten, op de drie voorste gewrichten zo wel, als tot haare stompe buik- en naschuif-pooten, gelykt zy over het algemeen, wel naar alle andere Rupsen, maar het getal derzelve stemt noch met dat der Spanmeeters, (die om haaren Spanswyze gang, dien naam draagen, en op welken grond ik deeze myne nieuwe Rups ook onder dezelve telle,) noch met dat van andere Rupsen overeen, en zy verdient om die reden den naam van *zeldzaame Spanrups*; want ofschoon, in het werk van den Heere RÖSEL, \* onder andere byzondere Rupsen van deeze foort, ook eene vertoond worde, die in de plaats van de twee stompe buikpooten, met welken gemeenlyk alle Spanrupsen, of achter de negende of onder de tiende geleding voorzien zyn, en door middel van welken zy instaat zyn, haaren spauswyzen gang te doen, vier zulke pooten, als twee onder de agtste, en twee onder de negende geleding heeft, zal men echter by gemelden Schryver geene aantreffen, die zo als de onze, in plaats van een eenig paar, drie paar zulke

poo-

\* Eerste Deel, derde Classe der Nachtlinders, Tab. V.

pooten heeft; doch de onvergelykelyke REAUMUR, \* is ten deezen TAB. opzichte gelukkiger geweest, hebbende eene Rups van deeze foort, met XXV. drie paar buikpooten bekomen, welke hy, volgens zyne verkozene rangschikking, onder zyne tweede en derde Classe, (waaronder hy anders, wel is waar, geene Spanrupfen betreft,) geplaatst, en ons twee afbeeldingen van dezelve medegedeeld heeft, offchoon geen van die naar onze Rupfen gelyke; want zonder in aanmerking te neemen dat de zynen, die de pooten onder dezelfde geledingen als de onzen hebben, niet glad, maar met hair bedekt zyn, staan ook by de eerstgemelden, offchoon gladdere Rupfen, de pooten niet onder dezelfde geledingen als by de onzen: het eerste paar buikpooten staan by geenen ter dier plaats, welke anders eigenlyk dient voor het tweede paar, naamlyk by die Rupfen die vier paar buikpooten hebben; daar in tegendeel de Rups van den Heere REAUMUR, het eerste paar buikpooten op die plaats heeft, alwaar by de overige agt buikpootige Rupfen, het eerste paar gevonden wordt: 't is daarom buiten alle twyfel dat onze Rups, door geene van de gemelde beide afbeeldingen wordt aangewezen; offchoon zy anders onder het geslacht der Rupfen met drie paar buikpooten behoore: veel meer waarschynelyk is het, dat 'er nog andere soorten van dezelve moeten wezen, onder welken de onze, om haare gezegde eigenschappen, in allen deele onder de derde classe der nachtvlinders, (onder welke ik met den Heere RÖSEL, de Spanmeeter stel,) behoort geplaatst te worden.

Daar my de ondervinding nu geleerd heeft dat, behalven de Spanrupfen die over 't algemeen tien of twaalf pooten hebben, † en behalven onze veertien-pootige, ook zulken gevonden worden, die, gelyk alle Rupfen van de overige clasfen, zestien pooten hebben, en echter, als volkommene Spanrupfen, ook een even volkomen *Span-capel* voortbrengen; zoude men zeer gemaklyk de Spanrupfen zelve, in haare eerste classe, weder in verscheidene geslachten kunnen afdeelen: alleenlyk meen ik te mogen gelooven dat het voldoende zy, ons te bepalen slechts by die hoofdenmerken, waardoor zy zig van anderen niet tot haare classe behoorende Rupfen onderscheiden, naamlyk by haaren Spanswyzen gang, en den meest rechten, en slyf uitgestrekten stand van haar ligchaam als zy in rust is; want

\* Zie zyne *Memoires pour servir à l'Histoire des insectes* Tom. I. Pag. 69 & 102. Pl. 1 Fig. 1. 2 & 3, Parysche druk van het jaar 1734. in groot quarto.

† Deeze laatste foort heeft de Heer REAUMUR, (Tom. II, men. VIII. pag. 323.) mogelyk voor de eenige gehouden, die twaalf pooten hadden; om dat hem, behalven deeze geene andere bekend zal geweest zyn; doch ik kan verzekeren dat 'er ten minste nog één haars gelyke gevonden kan worden.



TAB.  
XXV.

want ten opzichte van haare overige eigenschappen, ſchynt deeze foort  
iet byzonders te hebben boven alle andere Dag- en Nachvlinder-Rup-  
fen, 't welk ik in het vervolg nog nader zal aanwyzen.

## §. 5.

Zou intusſchen mogelyk iemand de veertien-pootige Spanrups, over  
welke wy tot hier toe geſproken hebben, voor geen echte foort, en  
haare zes buikpooten, niet allen voor volkomene pooten, maar vier van  
dezelfen voor enkele hoogten willen houden, en gelooven dat ik dezelve  
ſlechts daarom voor natuurlyke pooten gehouden heb, om dat zy dezelfde  
plaats beſlaan, welke by de Rupsen voor deeze ledemaaten bepaald is, dee-  
zen zoude ik van alle twyfel ontheffen, door te verzekeren, dat niet al-  
leen den gang van myne Rups Spanswyze geſchiedt; maar ook dat het  
onderſte van haare zes volkomene pooten met kleine haakjens bezet zyn,  
welke haakjens men aan alle andere Rupspooten waarneemt: het voorſte  
paar onder de zevende geleding ſtaande, is het kleinſte, en de Rups  
trekt dezelve, na eenige aanraaking, geheel in zyn ligchaam, zodanig zelfs  
dat men ze niet eerder weêr gewaar wordt, dan wanneer zy kruipt, of  
in ongeſtoorde rust is.

## §. 6.

In het kruipen is zy naarſtig, en gedraagt zig daarby op de volgende  
wyze: haar voorlyf richt zy zodanig op, dat de kop laager komt dan haar  
rug, die zy ten gelyke tyde kromt; met het achterſte van haar lyf, houdt  
zy zig, door middel van haare buik- en naſchuif-pooten, aan de ſteelen  
van de planten vast, ten einde op die wyze, haar opgericht voorlyf, in  
de hoogte te kunnen blyven houden; daarna beweegt zy, met behulp van  
den gemelden reeds beſchrevenen ſtand van het voorlyf, den kop, een paar  
maal, nu lings dan rechts ter zyde heen, laat het voorlyf weder daalen,  
en voelt, eer zy haare zes voeten in een vasten tred nederzet, met het-  
zelve heen en weder, op dezelfde wyze, als zy voorheen haar' kop ge-  
draaid heeft, ten einde den ſtaat van den weg dien zy zal begaan te onder-  
zoeken: (indedaad eene voorzichtigheid, welke dikwyls by de verſtandlyke  
wezens, in 't verkiezen van haaren weg niet wordt waargenomen; zy zet-  
ten hunne voeten op den weg, zonder te onderzoeken of dezelve op een  
goed of kwaad einde zal uitloopen:) dit geſchied zynde, zet zy haare  
voorpooten, met een zeer ſterk in de hoogte gebogenen rug vast, en  
brengt tevens de buik- en naſchuif pooten in beweging, zodanig, dat de  
voorpooten het eerſte paar buikpooten tamelyk naby komen: in deezen  
zamengetrokkenen ſtand blyft zy niet lang; maar herhaalt zodra zy eene  
ſchrc =

schrede gedaan heeft, alle de voorgemelde bewegingen tot het doen van een volgende: ik kan dit haar bedryf niet beter vergelyken dan by dat van een mensch die iet met spannen afmeet; strekkende zyn hand uit, en dezelve dan weder zamentrekkende, zo dikwyls op dezelfde wys na elkander, tot hy eene zekere ruimte afgemeeten heeft: deeze wyze van gaan heeft ook plaats by alle Rupfen, welken gelyken naam draagen. TAB.  
XXV.

## § 7.

Als zy stil ligt, of rust, bepaalt zy zig niet altoos aan eene zelfde houding: ik heb waargenomen dat zy nu eens den zonderlingen stand van *Fig. 2* aanneemt, en zig wel met de naschuiſ- en de vier grootſte buik- pooten, (want de kleine gebruikt zy daartoe nooit,) vast zet, maar in de plaats dat zy, gelyk andere Rupfen, dan ook het overige van haar ligchaam, met de zes voorpooten, een tyd lang in de hoogte, en uitgestrekt zoude houden, haar voorlyf zo ſterk naar beneden kromt, dat haar kop, zeer na onder de zevende geleding van haar lyf, en, om zo te ſpreken, byna geheel op den ſchedel komt te liggen: in eenen zo wonderlyk gekromde, en naar oogſchyn onnatuurlyken stand, behaagt het haar dikwyls uren na elkander in rust te blyven: ſomwylen verkiest zy daartoe eene geheel andere wyze, rustende naamlyk op alle haare pooten, met een recht uitgestrekt ligchaam; dan deeze houding ſchynt haar niet zo eigen en natuurlyk te weezen, als de eerstgemelde, die ik haar meermaals dan deeze zag verkiezen, tevens bemerkte ik dat zy zig by eene aanraaking, of krom zamen trekt en op den grond valt, of de eerstgemelde zonderlinge houding aanneemt.

## §. 8.

Ten opzichte van haare verandering heeft zy niets anders dan andere Rupfen: zig van alle onzuiverheid gereinigd hebbende, maakt zy, tusſchen het gras en de klaverbladen, om zig heen, zeker ovaal ſpinfel, bruinachtig wit van kleur, ondoorgebroken, doch niet dik, (*Fig. 4.*) gebruikende Fig. 4. daartoe draaden die zy uit een wrat, welke onder haar keel ligt, trekt: in dit verblyf, ſtroopt zy, by warm weder, na verloop van weinige dagen, haar laafte Rupfenhuid, ten vierdenmaale af, en verandert in een popjen, waarvan ik onder *Fig. 5* en *6.* eene afbeelding mededeel.

## §. 9.

Dit popjen nu verdient zeker nog eenige betrachting: *Fig. 5.* vertoont Fig. 5. ons hetzelfde op den buik liggende, en zo als het zig in de Natuur opdoet, naamlyk zo blauw als een blaauw pruimtjen, in plaats dat het anders

TAB.  
XXV.

bruin is: dat deeze blaauwe kleur hier, even als by andere zodanig ge-  
 verwde poppen, ontstaat, uit eene, door de zweetgaten heen gedrongene  
 en verdroogde vochtigheid, is zeker eene uitgemaakte zaak; echter heb  
 ik tevens waargenomen dat dit poppen, niet overal even dik met deeze  
 blaauwe stof overtoegen was, en dat, als ik dit gedroogde zweet van de  
 schaal van het poppen afwischte, zulks niet, (gelijk ik by anderen heb  
 waargenomen,) op nieuw weder uitbrak, voornaamlyk als de geboorte  
 van de Kapel reeds naby was: haare waare, naamlyk de roodachtig brui-  
 ne kleur wordt zichtbaar, als men de blaauwe afwischte, en als zodanig  
 heb ik haar onder *Fig. 6.* op den rug liggende voorgesteld: de ligging,  
 en alle deelen en geledingen van de aanstaande Kapel, als mede de  
 luchtgaten, ziet men aan dit poppen, even zo goed, als by de andere  
 onder *Fig. 5.* en wanneer men het aanraakt, toont het zyne gevoeligheid  
 door eene, hoewel slechts flaauwe beweging: boven dat heb ik ook  
 waargenomen, dat de dikke poppens de vrouwlyke, en de dunnen, ledi-  
 ger, de manlyke Kapellen insluiten: op de laatste geleding, in *Fig. 5* en *6*  
 met *a* getekend; vertoonen zig, in de plaats van een eenige steelpunt, ver-  
 scheidene kleine punten, wier eigenlyke gedaante echter eerst door eene  
*Let. a.* aanmerkelyke vergrooting zichtbaar wordt: *Let. b.* vertoont het vergrootte  
 achterste gedeelte van deeze geleding, benevens het spitsjen, uit zes korte  
 en twee lange gekromde haakjens zamengefeld: met deeze haakjens,  
 houdt het poppen zig aan het spinsel vast, en kan het zig daarin naar ge-  
 noegen keeren en wenden: wy hebben dergelyke haakjens, hier vóór, reeds  
 by andere Rupsen-poppens waargenomen; doch dezelve waren in eene  
 andere orde geplaatst.

## §. 10.

Wanneer zulk een poppen niet onder de laten behoort, kan men de  
 Kapel na verloop van drie of vier weeken verwachten; wordt zy anders  
 niet den prooi van zekere smallyvige Wesp; want dit schadelyk insect,  
 zoekt reeds van der jeugd aan, als eene made, in de ingewanden van de  
 Rups zyn voedsel, en verandert vervolgens in zulk een zonderling ver-  
 blyf, tot groote schade van deszelfs voedster, tot eene zogenaamde Sluip-  
 wesp; maar behoort het poppen tot de laten, zo moet de Natuuronderzoeker,  
 gelyk reeds gezegd is, den gantschen winter door, tot het volgende jaar,  
 ontrent de maand Mai geduld hebben, als wanneer eerst een Kapel,  
 als onder *Fig. 7* en *8* vertoond wordt, daaruit voordkomt: dit ge-  
 schiedt gemeenlyk des voorddenmiddags, of wel reeds vóór het aanbreken  
 van den dag: de vleugels deezer Kapel, zyn by de eerste verschyning  
 uit haare donkere schuilplaats, zeer kort en vochtig; doch zy krygen ech-  
 ter weldra hunne volkomene grootte, waarop de Kapel een bleek-bruinach-  
 tig dropjen vochts laat vallen, en zig daarna ter vlugt bekwaam vindt; ech-  
 ter

Fig. 7  
en 8.

ter neemt zy die vlugt liever des namiddags op, ook wel in de eerste uren <sup>TAB.</sup> van den nacht; zy waagt zig voorts niet zeer hoog, maar blyft zig in de <sup>XXV.</sup> laagte onthouden.

## §. 11.

De gedaante van deeze Kapel, komt niet zeer overéén met die van anderen haarer Clasfe, doch heeft veel gemeens, met de Nachtvinders van de tweede Clasfe, voornaamlyk als zy haare vleugelen gesloten draagt: in deeze houding zyn dezelve echter niet, gelyk by andere Kapellen van Span-rupfen plaats heeft, plat, en zodanig uitgebreid, dat de onder- en achter-vleugelen, in het oog vallen, vermits zy dezelve, boven den rug, dikwyze, zamenluit: deeze eigenschap zoude my, alvorens ik de noodige kundigheid van deeze Rups had, hebben doen dwaalen, door naamlyk myn Kapel in de tweede Clasfe van de Nachtvinders te plaatfen; dan daar mij de eigenschap van hare Rups nu genoeg bekend zyn, zoude ik de Clasfen-orde van den Heere RÖSEL niet volgen, indien ik haar, ter oorzaake van haare vleugelen, niet in de derde Clasfe wilde plaatfen: want volgens hem moet men de geheele verandering van een insect kennen, zo men hetzelfde met grond in de eene of andere Clasfe wil plaatfen; even als men, naar de wyze van den beroemden TOURNEFORT, een plant niet met zekerheid in eene Clasfe kan rangschikken, alvorens men haar heeft zien bloejen en vruchten draagen; daar intusfchen alle schikking van Clasfen haaren grondslag heeft in de willekeur des Schikkers zelve, en een zelfd voorwerp zig dikwyls in verscheidene onderdeelen laat schiften, is 't my om 't even onder welke Clasfe een liefhebber deeze Kapel begeere te plaatfen; 't zy mij voldoende, het genoegen gehad te hebben, van mynen waarden Leezer nogmaals eene byzondere soort van Rups, met derzelver verandering te hebben kunnen mededeelen.

## §. 12.

De grondkleur van de oppervlakte der vleugelen, is, van het voorste paar, dof-bruin, doch van de achterste dof-zwartachtig bruin, hoewel zy nooit geheel overeenkomen; in tegendeel heeft de onderste zyde, meestal, een okergeelen kleur: in de voorvleugelen is de uiterste rand die niet uitgekapt is, naar de binnenzyde toe, omgeven van een dunne lyn, waarop een helderbruine uit- en in-gebogen vlek volgt, loopende die, van den eenen hoek des vleugels naar den anderen, dwars over dezelve heen; vóór die vlek, aan den voorsten rand, vertoont zig op den grond van den vleugel, nog eene zwartachtig bruine vlek; hier op volgt, mede dwars over den vleugel, in het midden van denzelven, eene andere breedere, uitgekapte bruine vlek, omgeven van eene zwart- en helder-bruinachtige streep: laatstgemelde vlek, besluit nog een kleine helderbruine, en heeft ook nog eene ruimte van denzelfden kleur voor zig; vóór deeze ruimte ziet men weder nog een ander don-

TAR.  
XXV.

donker-bruine, uit- en in-waards gebogene vlek, die na by het gewricht van den vleugel, in een helder-bruin ingesloten, dwars over denzelfen loopt: de achtervleugels hebben, op dezelfde wyze, een ongekapt bruinachtigen rand, rondsom welken een dunne zwarte lyn loopt; op dezelve volgt, tusfchen de vleugeladeren, voor eerst een rei van zes okergeele vlekken, daarna de bruine grond van den vleugel, en op deezen weder eenige okergeele hoekige vlekken.

## §. 13.

Voor het overige draagt deeze Kapel, even als andere Span-kapellen, den kop uitgestrekt voor zig heen, welke kop, benevens den rug, die met hair bewasfen is, en de dunne voelhoornen, van een donker bruinen kleur zyn; verders ftaan in den kop twee dof-groene oogen, ook heeft de Kapel een donker-bruinen zuignavel.

Het achterlyf is zwartachtig bruin, met korte hairen begroeid; bij het mannetjen is hetzelfde eenigzins dunner, (*Fig. 7.*) dan by het wyfjen, (*Fig. 8.*) ook is achter op de laafte geleding van deeze, meer hairs dan op de vrouwlyke Kapel: de beide geflachten kunnen met het bloote oog, by de voelhoornen, nauwlyks onderscheiden worden; want offchoon die van het mannetjen met vezelen bezet zyn; zyn dezelve echter zo kort en dun, dat men het onderscheid tusfchen deezen en die van het wyfjen door een vergrootglas moet zoeken: de buik is van een graauw-achtig geelen kleur, zo mede de zes pooten, die ook van eenige fpitsen voorzien zyn.

## §. 14.

Schoon myne Kapellen geene eiëren gelegd hebben, vond ik echter eene geheele menigte daarvan in het achterlyf van een wyfjen, welke ik ten onderzoek daarom geopend had: deezen waren helder groen, gelyk zy onder *Fig. 9.* in hunne natuurlyke gedaante, doch onder *Fig. 10.*, zeer veel vergroot vertoond worden: uit deeze vergrooting blykt, dat de eiëren meer breed dan rond zyn, en van boven iet hebben, tamelyk wël gelykende aan een eenigzins diep, echter in het midden wat hooger deksel, over het welk nog een kleiner fchynt te liggen; rondsom het eerstgemelde deksel, ziet men ook diepten, die met zeer dunne dwarsvooren betrokken zyn: of nu deeze eiëren ook groen zyn, als zy gelegd worden, kan ik niet befliffen; echter zoude ik denken dat zulks zodanig zy, offchoon ik ook wel wil gelooven, dat zy daarna, by den groei der in dezelve beflotene Rups, kunnen veranderen; gelyk het my dan ook waarfchynelyk voorkomt, dat de Rups, in zulk een eitjen befloten, zo lang een opgerolden ftand behoudt, tot dat zy, na het doorknabbelen of openftooten van het voorgemelde deksel, uit hetzelfde ten voorfchyn komt.

## § 15.

Fig. 9  
en 10.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.

100 2 4  
4 4 6

Fig. 7.



Fig. a




Fig. b.



## §. 15.

Daar ik nu hoop de Figuren op Plaat XXV. genoegzaam verklaard te hebben, zal ik ook, ten opzichte van de afbeeldingen op Plaat XXVI. geplaatst, het zelfde doen, en nog eene andere soort van Spanrups beschryven: deze heeft, wel is waar, zo veel byzondere eigenschappen niet, als de vorige, maar daar zy nog zeldzaamer dan die is, en slechts éénmaal 'sjaars gevonden wordt, als mede alle kentekenen van eene ware Spanrups heeft, durf ik het waagen haar in gezelschap van de andere te vertoonen, en, door haar te beschryven, de natuurlyke historie der Insecten te vermeerderen.

Vermits zy, gelyk de meeste Spanrupfen, zes vóór-, twee stompe buiken en twee dergelyke naschuijfpooten heeft, geloof ik haar zeer geschikt te kunnen noemen:

*De gladde, roodachtig-bruingeel-gevlekte, en zwart gestippelde Spanrups, met tien pooten: behoorende tot de derde Classe der Nachtvinders. Tab. XXVI. Fig. 1.*

## §. 16.

Ik heb deze Rups by den aanvang myner waarneemingen reeds gevonden, doch dezelve niet tot haare verandering kunnen brengen, voor het my eindelyk gelukte, haar, in den aanvang van de maand Mei des jaars 1762, na zy naauwlyks ten tweeden maale verhuide was, (toen zy 'er even zo uitzag als na de derde verhuiding,) op een jong pruim-boomtjen, van welks loof zy at, te vinden, en haare verandering waarteneemen: haaren volkomen wasdom bereikt hebbende, was zy iet langer dan één duim en twee lynen; haar kop die met de geledingen eenerleie dikte heeft, is van voren plat, en van boven onverdeeld; 'er zyn twaalf oogen in, hy is helderbruin, met donkerbruine vlekken en puisten bezet: haar gantsche lyf ziet 'er gladachtig uit, en bestaat uit twaalf zeer kenbaar afgedeelde geledingen, van welken de achtersten de diksten zyn: allen zyn zy van een helderroodachtig bruine kleur, welke zig op den rug in het geele verliest: over het midden van den rug, loopt, van de eerste tot de laatste geleding, een smalle, dofgroene streep; op beide zyden der geledingen ziet men zeer dunne lynen, en over de helft van dezelve verscheidene zwarte punten, de eersten van welken naauwlyks met het bloote oog gezien, en daarom in onze afbeelding ook niet aangetoond hebben kunnen worden: in tegendeel vertoonen zig op de elfde geleding, twee merkbaare zwarte punten op twee kleine geele vlekken: de negen luchtgaten zyn mede zwart,

TAB.  
XXVI.

en naar onderen toe, iet voorwaards, (alwaar de zyde van het lyf, naar den buik toe, even als ingetand; eindigt,) is van de vierde tot de negende geleding, een helder geele golfswys loopende vlek: de zes spitse voorpooten zyn onder de drie eerste geledingen geplaatst, en zyn bruinachtig, zo wel als de twee stompe buikpooten, die onder de negende geleding gevonden worden; doch de nafschiifpooten zyn van eene groenachtige kleur.

§. 17.

Kruipende, brengt deeze Rups haar voor- en achter-lyf, zo na by elkander, dat zy daardoor haaren rug zeer sterk in de hoogte kromt, waarna zy, gelyk alle Spanrupfen doen, met het voorlyf naar vooren aanrukt; terstond brengt zy het achterlyf weder zeer na aan het voorlyf, op voorgemelde wyze, en derhalven vertoont zy in haar omkruipen beurtlings een' krommen en dan eenen uitgestrekten rug: als zy rusten wil, zet zy zig met haare buik- en nafschiif-pooten vast, strekkende haar ligchaam recht voorwaards uit, evenwel met den kop en de drie eerste geledingen eenigzins rugwaards in de hoogte gebogen; in dien stand kan zy verscheidene uren lang zitten blyven: heeft zy somtyds het ongeluk dat zy van een takjen valt, of wordt zy gewaar dat haare aanstaande verandering naby is, zo heeft zy de bekwaamheid van zig aan een dun gesponnen draad, zeer voorzichtiglyk te laten afdaalen.

§. 18.

By myne Rups werd ik de voorbereiding tot gezegde verandering gewaar, op den 24 Mei des jaars 1762, ten welken dage zy zig onder de aarde groef, en van kleine kluitjens, over zig heen, een ovaal hol verblyf vervaardigde: de vochtige draaden, welke zy uit een spinwrat, die zy onder haar bek draagt, spon, diende haar om de gezegde aardkluitjens met elkander te verbinden, en tevens voor den binnenwand van haare woning, welke, voltooid zynde, eene gedaante bekomen had als onder *Fig. 2.* vertoond wordt. — Den 8 Juny eerstvolgende, vond ik haar in dat verblyf, na de Rupfenhuid afgestreken te hebben, als een beweegend popjen, op welks geel-bruine en glanzige geledingen de luchtgaten zichtbaar waren; van achteren had het een steelfpits, en van vooren de olyfgroene vleugel-scheden; alles gelyk onder *Fig. 3.* wordt aangewezen.

§. 19.

Vervolgends kwam de Kapel den 27 February des volgenden jaars (1763,) zynde een zeer schoone en vrolyke dag, ten voorfchyn, en derhalven nog al vroegtydig: zy kwam uit haar aardhol, waarin zy haar inkleedzel of schil terug



terug gelaaten had, aan het licht, onder de gedaante van een wyfjen, dat is met een dik achterlyf; haare vleugelen waren kort en nog nat, en haare geheele gedaante was nog zo onvolkomen, als ik haar, benevens een bruin reiningssap, onder *Fig. 4.* heb voorgesteld: onder *Fig. 5.* ziet men haar in haare volkomene grootte, welke ik een weinig breedvoerig zal beschryven.

De grondkleur van alle vier haare vleugelen, is helder-bruinachtig graauw, voornaamlyk naar de buitenzyde toe; echter verliest die kleur zig, omtrent het vleugelgewricht, in eene andere iet donkerder; gezegde kleur is tevens met veele fyne puntjens en streepjens als bezaaid: de rand van de voorvleugels heeft geene uitkapzels; evenwel is dezelve binnewaards omgeeven, van een golfswys loopende donkerbruin graauwe streep, op welke nog twee andere streepen of lynen volgen, die onregelmatig loopen en dof donker zyn; achter deezen ligt, dwars over het midden van den vleugel, eene gekromde uit- en in-waards loopende donker bruin graauwe vlek, welke by het begin van den voorsten vleugelrand, in twee takken verdeeld is: voorts ziet men een binnen- en buiten-waards gekromde donkere, dof-graauwe, vlek, en op deeze, niet ver van het vleugelgewricht, nog een andere die donkerbruin-graauw is.

De achtervleugelen, die een eenigzins uitgehakten rand hebben, zyn byna van dezelfde tekening als de voorvleugelen, welken slechts, wegens den omtrek, zig een weinig anders voor het oog vertoonen, waarom ik in deezen alle verdere beschryving voor onnodig houde: wegens den kop moet ik nog aanteekenen, dat dezelve zo wel als de hairdunne voelhoornen, het achterlyf en deszelfs geledingen, met zwart afgedeeld zyn, doch de vleugels en pooten, zyn op eene zelfde wyze, naamlyk bruinachtig graauw, gekleurd; de korte zuignavel is geelachtig bruin, en de oogen donkerbruin van kleur.

### §. 20.

Als deeze Kapel zit, strekt zy de vier vleugelen niet over haar lyf, maar zodanig uit, dat hetzelfde geheel onbedekt blyft, en zy zelve, (even als alle Span-kapellen van deeze soort,) zulke een' stand bekomt, als of zy met haar uitgestrekte vleugelen vastgeplakt ware aan de plaats alwaar zy zit: of het mannetjen dezelfde gedaante heeft als het wyfjen, kan ik, uit gebrek aan ondervinding, niet bepalen; doch van haare eieren kan ik nog iet aantekenen: myn Kapel lag 'er eenigen zeer klein, helder-geel, langwerpig, en in alles zodanig van gedaante als onder *Fig. 6.* blykt: wanneer men zulk een eitjen vergroot, ziet men dat het met veele insnydingen en dwarsgroeven voorzien is; naar boven toe is het spitsachtig, naar onderen toe breeder, gelyk ik het onder *Fig. 7.* afgebeeld heb: daar ik voor

A a 2

het

TAB.  
XXVI.

het overige, de daaruit voortgekomen Rups altyd alleen vond, vermoede ik dat de Kapel haare eieren in het voorjaar, op de eerst uitgesprotenet takjens van een' pruimboom, ook slechts ieder afzonderlyk zal leggen.

## §. 21.

Myne begeerte om de waarneemingen, die my reeds voorheen, in verscheidene vochten, zaaddiertjens hebben doen vinden, te herhaalen, en my daardoor van de waarheid myner ontdekkingen te overtuigen, deed my andermaal besluiten, niet alleen het bovengemelde zuiveringsvocht, dat myne vrouwlyke Kapel, nu uit het popjen gekomen zynde, had laten vallen, maar ook het vocht van haare onbevruchte eieren, onder voortreffelyke vergrootglazen te brengen: de uitneemende deugd van deeze glazen, had my reeds het genoegen verschaft, de zaaddiertjens van groote scheidfelen, met hunne staartjens, zo dikwyls ik maar wilde, en zo goed mogelyk, te beschouwen; thans deden zy my ook, in de gemelde beide vochten, eene door elkander woelende beweging, gelyk eenige zaaddiertjens altyd gewoon zyn te maaken, waarteneemen; deeze scheidfeln waren van eene ovaal-ronde gedaante, doch hadden geene, of ten minsten niet zo lange staartjens, als de zaaddiertjens doorgaands hebben: offchoon nu de beweging die ik zag my voorkwame als eene volstrekt willekeurige dierlyke beweging, weet ik echter wel dat men dergelyke verschyningen, niet wel als zeker kan houden, alvorens ons dat geene, wat wy gelooven gezien te hebben, ook door een goed Zonne-microscopium vertoond is: daar ik derhalven deeze vochten nog niet onder zulk een microscopium, (dat my, tot myn hoogst genoegen, de zaaddiertjens uit manlyke scheidfelen ten allerduidelyksten vertoont,) heb kunnen brengen, en voldoende onderzoeken, begeer ik, niettegenstaande het groot getal ooggetuigen, welken hetzelfde met my gezien hebben, myne ontdekking niet voor volstrekte waarheid op te geeven, aler het zonne-microscopium my een dergelyke verschyning heeft doen zien, het welk echter ongelyk veel moeelyker, dan alle andere proeven, zal vallen, zo deeze ovaal-ronde diertjens geen' staart mogen hebben; want gestaarte diertjens kunnen het benedenwaards vloejen van het vocht dat op de lootrechtstaande glasfchyf, van de schuif aangebragt wordt, tamelyk wel verhinderen en den aandrang van denzelven wederstaan: zo derhalven deeze ovaale ligchaamtjens noch staartjens, noch andere ledemaaten hebben, die den aandrang van de loodrecht afvloeyende stoffe, offchoon deeze niet buiten haaren vochtkring loope, kan verzwakken; houde ik die diertjens voor niet sterk genoeg, ja mogelyk voor geheel ongeschikt, om zig willekeurig te kunnen beweegen, in een vocht, dat gelegd is op de niet horizontale, maar loodrecht geplaatste vlakke van een glas: ik zal myne voornaamste bezigheid maaken van dit alles met alle mogelyke zorgvuldigheid en opmerkzaamheid te onderzoeken.

§. 22.

## §. 22.

Eindelyk beschouwen wy op onze XXVI. Plaat, nog eene aartige manly-<sup>TAB.</sup> ke en een wyfjens Span-kapel, het bezit van welken ik te danken heb aan <sup>XXVI.</sup> de goede genegenheid van myn waarden Begunstiger, den Heere WEISMAN-TEL, ook, SCHNEIDER genaamd, een waardig Candidaat te *Erfurt*, wiens vriendlyke mededeeling ik niet zonder het verbindendste gevoel van dankbaarheid kan gedenken: de gemelde Kapel, mag, naar myne gedachten, den naam draagen van,

*De helder-leer-geele Span-kapel, met in- en uit-loopende, bruinachtig-geele cierlyk getekende vleugelen, behoorende tot de derde Clasfe der Nachtvlinanders.*

Tab. XXVI. Fig. a en b.

*Fig. a.* vertoont ons de manlyke en *Fig b.* de vrouwlyke Kapel; bei-<sup>Fig. a</sup> den zyn zy echter van gelyke tekening en kleur, zo dat zy alleenlyk te <sup>en b.</sup> onderscheiden zyn door haare voelhoornen, welken by de vrouwlyken dunner en by de manlyken breed en baardig zyn; ook wordt het gezegde onderscheid kenbaar door het achterlyf, het welk by het wyfjen dikker dan by het mannetjen is.

## §. 23.

Het zal derhalven voldoende weezen, wanneer ik het mannetjen alleen beschryf: deeze heeft dan zeer cierlyke uitgekapte achter- en voor-vleugelen, welken, benevens den kop, de voelhoornen, den hairigen rug en het achterlyf, helder-oker of leer-geel van kleur, en doorweven zyn, met zichtbaare, meerendeels geelachtig-bruine, offchoon niet zeer sterke aderen; de vier uitgekapte vleugelranden, zyn allen van een donker bruin boordsfel omgeven, welk boordsfel zig met eene bruin-roodachtig-geele kleur, waarmede de vleugelen ter dier plaatse aartiglyk beschaduwde zyn, op dezelfde wyze vermengt, als mede nog twee andere streepen die dwars in- en uit-waards over den vleugel loopen, en van een geel-roodachtig bruine kleur zyn; deeze streepen zyn echter op de achter-vleugelen niet zo kenbaar, als op de voorvleugelen: intusschen verkrygen die deelen van de Kapel door dit alles een zeer goed aanzien.

De oogen zyn donkerbruin, en de korte zuignavel dof-geel: volgens de ontvangene berichten van den bovengemelden begunstiger, is deeze zeldzaame Kapel, in het *Erfurtsche*, onder den naam van *Keizers vogeltjen* bekend,

TAB. XXVI. kend, om reden dat de menging of schakering van haare kleuren, met de Keizerlyke Postlivrei vergeleken kan worden.

Gemeenlyk vindt men ze in de wouden, somtyds ook in de tuine vliegen, omtrent de maand Juny; haare Rups is by my geheel onbekend; derhalven verzoek ik myne waarde Leezers, my, in gevalle iemand van hun die Rups mogt kennen, het Insekt zelf, of eenig bericht desaangaande, goedgunstig medetedeelen, op dat ik in staat gesteld moge worden, derzelver Historie te voltooien, en die in betere volkomenheid den Liefhebberen medetedeelen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Een Span-rups, tot de derde Classe der Nachtvinders behoorende, en wier Kapel wy hier vóór op Tab. XIV. afgebeeld hebben, benevens vyf tot gemelde Classe behoorende Span-kapellen. Tab. XXVII, en XXVIII.*

TAB. XXVII.

Nogmaals heb ik de eer, de waardige begunstigers van deezen mynen arbeid, de afbeelding van eene tot nog toe onbekende Spanrups, medetedeelen: deeze soort van Rups wordt geboren, van een Kapel, (welke ik reeds op Plaat XIV. Fig. 1 en 2. afgebeeld, en aldaar ook beschreven heb,) en wel uit een langachtig ovaal rond ei, dat door de Wyfjens-kapel. (zie gemelde Plaat, Fig. 2.) terstond na haar paaren, gemeenlyk nog vóór het afloopen van den Zomer, op allerlei ooftboomen, zo wel als op de vlierboomen en andere planten, welken in de boschen groejen, meerendeels verstrooid, gelegd wordt: na verloop van drie of vier weeken, breekt de Rups in zulk een eitjen verscholen zynde, dóór; welk eitjen, ten dien tyde, eenigzins modderkleurig wordt: en vermits het jonge Rupsjen door de wyze voorzienigheid van den altyd goedgeoonden Schepper, terstond zyn tafel gedekt vindt, vindt het ook terstond smaak in de daarop voorgediende spyzen; evenwel heeft het geen schade van dat vroegtydig eeten te wachten, alzo het geen vraatigen aart heeft, en ook zeer langzaam groeit: reeds in de maanden September en Oótober des jaars 1762, ontmoette ik Rupsen van deeze soort, zynde dezelve echter nog zeer jong, en byna van grootte zo als zy onder Fig. 1. aaaa op een jong pruimentakjen afgebeeld zyn; ik zoude dezelve echter, wegens haare gelykkleurigheid met den bast van het takjen, niet ontdekt hebben, ware het niet dat een stoot aan het takjen, hetzelfde zo sterk hadde doen schudden, dat een paar van deeze Rups-

Fig. 1  
aaaa.

Rupfen, om zig voor het afvallen te behoeden, niet in beweeging geraakt, <sup>TAB.</sup> en zig aan een dunne draad, welke zy uit een kleine opening onder haaren <sup>XXVI.</sup> bek uittrokken, hadden willen afsluiten; hier door verrieden zy zig, en werden myne gevangenen: en schoon ik, ten zelfden tyde, niet aanstonds konde beflisten, of zy my reeds bekend waren, (want tot het maaken van dat besluit waren zy nog te jong,) paste ik haar tog zorgvuldiglyk op, en tekende haar vóór iedere verhuiding naauwkeurig af; ik heb geoordeeld dit Insect te mogen noemen,

*De platte bruinachtig groene tienvoetige Span-rups, met een bartswyse gedeelden, en helder zwart ruitswys getekenden kop. Tab. XXVII. Fig. 1 en 2.*

§. 2.

Vóór haare eerste verhuiding schynt haare kleur eenigzins donkerder, <sup>TAB.</sup> en bruinachtig-groener te zyn, dan na dezelve; ook is haar ligchaam <sup>XXVII.</sup> alsdan eenigzins leeniger: haare vlekken en tekening blyven echter, door alle de verhoudingen heen, byna onveranderlyk dezelfden, behalven eenige dunne zwarte streepen, die op den rug gevonden worden; want deezzen vertoonen zig tegen den tyd der verhuiding niet meer zo levendig als te vooren: haar langzaame groei is zekerlyk ook de reden dat men haar moet rangschikken onder die soort van Rupfen, welken aan het strengste winterweêr blootgesteld zyn: zy bereikt, wel is waar, van het begin des winters af, zulk eene grootte, als ik haar onder *Fig. 2.* afgebeeld heb; *Fig. 2.* op welke grootte haar het eerste vel te eng wordt, zo dat zy het voor een nieuw moet verwisfelen, en zulks geschied zynde, kan zy ook nog eenen tyd lang voedsel gebruiken en in groei toeneemen; maar zodra de bladen der boomen of planten hunne sappn verliezen, verdwynt by onze Rups ook allen eetlust; en zy ziet terstond om, naar een voldoende winterverblyf, verkiezende daartoe de gespletene kloofjens in stammen of takken: in deezzen brengt zy den gantschen winter door, zonder eenig voedsel te gebruiken, even als lage zy verdoofd, en in eenen diepen slaap.

§. 3.

Het komt ons zekerlyk wonderbaarelyk voor, dat zulk een klein, en boven dien nog geheel naakt schepseltjen, den gantschen winter door niet beschadigd wordt van de strengste koude, die dikwyls een mensch, uit gebrek aan toereikend dekfel, om het leven brengt! echter toont de oogschynelyke ondervinding dat zulks waarheid is: ieder myner Lezeren zal zig nog te binnen brengen, hoe streng de koude was, in het begin van  
de

TAB.  
XXVII.

de maand December des jaars 1762, eene koude welke niet alleen in deezen oord, maar ook over een groot gedeelte van Europa nog tot ver in het jaar 1763 heeft aangehouden, zo zelfs dat de gevolgen daarvan voor menschen en vee hoogst gevaarlyk waren, en de verdienstelyke Doctor en Professor, DELIUS, die de *Erlanger Academie* zo veele eere aandoet, niet zonder groote vlyt, door het zakken van de kwik, waargenomen heeft, dat op den 15 February, de graad van koude, op 14  $\text{th}$  12 $\frac{1}{2}$  graad onder o geweest is \*; niettegenstaande deeze groote koude en scherpe lucht, aan welke ik myne Rupsjens op 21 December 1762, blootstelde, in een met floers bekleed, en met aarde aangevuld glas, benevens een paar jonge Salamanders, die meer dan een half jaar lang zonder voedsel geweest waren, in een ander dergelyk glas, bleeven deeze tedere en naakte Rupsjens nog in 't leven, daar in tegendeel de jonge Salamanders, hun door den honger reeds byna uitgebluscht leven terstond geheel verloren, offchoon de koude toen nog op verre na zo streng niet ware als op den 15 February des volgenden jaars 1763: intusschen zouden myne Salamanders de koude ook wel doorgegaan hebben, hadde ik ze niet vooraf zo lang zonder voedsel gelaten, maar of andere soorten van dieren, den bedoelden kouden nacht, of ook den gantschen winter door, in eene plaats, zodanig aan de strengheid der lucht blootgesteld, als het verblyf van myne Rupsen, zouden doorgegaan hebben, zonder benadeeling van hunne gezondheid, komt my zeer onwaarschynelyk voor: ik heb echter in het meergemelde Jaar, 1763 waargenomen, dat de aanhoudende drooge winterkoude, de gedachten van hun die gelooven, dat dezelve zo niet allen, ten minsten de meeste Rupsen, doodlyk is, niet bewaarheid; maar wel dat integendeel daarna, verscheidene soorten van schadelyke Insecten als mede andere die minder bekend zyn, en zulken welken zig in veele jaaren lang maar zeldzaam opdoen, by ons gevonden worden: echter wil ik desaangaande niet stellig verzekeren, dat alle koude en drooge Winters den Rupsen onschadelyk zyn: de drooge lucht kan dikwyls zwanger weezen van schadelyke zwaveldampen, die even gemaklyk als het vochtige en koude winterweér, (dat volgens myne gedachten, de Insecten nog veel schadelyker is,) den dood deezer diertjens veroorzaaken, want de minste Rupsen zyn bestand tegen eene zeer vochtige koude; zy worden dan ziek, en verliezen, als nog onvolwasfene scheidels, het leven.

## §. 4.

Doch ik begeer my niet langer optehouden met natuurkundige gisningen over

\* Zie de Frankischen Samml. von Anmerkungen aus der Naturlehre, Arzneygelehrheit, Oekonomie, &c. in 7ten Bande, 39. st. feke. 196-218. Nurnb. 1783. 8vo.

De Hollandsche vertaling is niet verder verschenen.  
(Zie „Bouwsloffen voor eene fauna van Nederland  
Nyeen vertaamt door J. A. Herklotz. Leiden by  
E. J. Brill <sup>1853</sup> & de root aldaar -)



